

[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123) ・生物 (単位 : pg/g-wet)

調査年度 : 2015
 検出頻度 (地点ベース) : 23/23(欠測 : 0)
 検出頻度 (検体ベース) : 23/23(欠測 : 0)
 検出下限値 : 0.7
 定量下限値 : 1.8

| 集計値 | |
|-------|---------|
| 幾何平均値 | 8.5 |
| 中央値 | 7 |
| 最大値 | 160 |
| 最小値 | tr(0.8) |

| | 貝類 | 魚類 | 鳥類 |
|--------------|---------|---------|-----|
| 検出頻度 (地点ベース) | 3/3 | 19/19 | 1/1 |
| 検出頻度 (検体ベース) | 3/3 | 19/19 | 1/1 |
| 幾何平均値 | 2.6 | 10 | 11 |
| 中央値 | 2.5 | 7.0 | 11 |
| 最大値 | 8.7 | 160 | 11 |
| 最小値 | tr(0.8) | tr(0.8) | 11 |

| | 地方公共団体 | 地点番号 | 調査地点 | 生物種 | 測定値 |
|----|--------|------|-------------------|------------|---------|
| 貝類 | 岩手県 | 1 | 山田湾 | ムラサキイガイ | 2.5 |
| | 横浜市 | 2 | 横浜港 | ムラサキイガイ | 8.7 |
| | 石川県 | 3 | 能登半島沿岸 | ムラサキイガイ | tr(0.8) |
| 魚類 | 北海道 | 1 | 釧路沖 | シロサケ | tr(1.2) |
| | | 2 | 釧路沖 | ウサギアイナメ | 2.2 |
| | | 3 | 日本海沖 (岩内沖) | アイナメ | 6.1 |
| | 岩手県 | 4 | 山田湾 | アイナメ | 8.8 |
| | 宮城県 | 5 | 仙台湾 (松島湾) | アイナメ | 7.0 |
| | 茨城県 | 6 | 小名浜沖 | サンマ | 2.3 |
| | 東京都 | 7 | 東京湾 | スズキ | 160 |
| | 川崎市 | 8 | 川崎港扇島沖 | スズキ | 54 |
| | 名古屋市 | 9 | 名古屋港 | ボラ | 9.1 |
| | 滋賀県 | 10 | 琵琶湖安曇川 (高島市) | ウグイ | 32 |
| | 大阪府 | 11 | 大阪湾 | スズキ | 150 |
| | 兵庫県 | 12 | 姫路沖 | スズキ | 110 |
| | 鳥取県 | 13 | 中海 | スズキ | 5.2 |
| | 広島市 | 14 | 広島湾 | スズキ | 33 |
| | 香川県 | 15 | 高松港 | ボラ | 55 |
| | 高知県 | 16 | 四万十川河口 (四万十市) | スズキ | 2.0 |
| | 大分県 | 17 | 大分川河口 (大分市) | スズキ | 2.5 |
| | 鹿児島県 | 18 | 薩摩半島西岸 | スズキ | 3.5 |
| | 沖縄県 | 19 | 中城湾 | ミナミクロダイ | tr(0.8) |
| 鳥類 | 鳥取県 | 1 | 天神川 (倉吉市) | カワウ | 11 |
| | 山梨県 | 参考値 | 笛吹川下曾根橋下流左岸 (甲府市) | カワウの卵 (卵黄) | 6,300 |
| | | | | カワウの卵 (卵白) | 11 |

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
 「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。
 (注2) 検出下限値以上を検出とした。
 (注3) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。