

[8] ヘプタクロル類・生物 (単位 : pg/g-wet)

調査年度:2015  
 検出頻度(地点ベース):22/23(欠測:0)  
 検出頻度(検体ベース):22/23(欠測:0)  
 検出下限値: 5  
 定量下限値: 14

集計値	
幾何平均値	33
中央値	42
最大値	190
最小値	nd

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度(地点ベース)	3/3	18/19	1/1
検出頻度(検体ベース)	3/3	18/19	1/1
幾何平均値	22	36	21
中央値	16	46	21
最大値	92	190	21
最小値	tr(7)	nd	21

	地方公共団体	地点番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	tr(7)
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	16
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	92
魚類	北海道	1	釧路沖	シロサケ	57
		2	釧路沖	ウサギアイナメ	29
		3	日本海沖(岩内沖)	アイナメ	42
	岩手県	4	山田湾	アイナメ	33
	宮城県	5	仙台湾(松島湾)	アイナメ	tr(8)
	茨城県	6	小名浜沖	サンマ	190
	東京都	7	東京湾	スズキ	110
	川崎市	8	川崎港扇島沖	スズキ	47
	名古屋市	9	名古屋港	ボラ	81
	滋賀県	10	琵琶湖安曇川(高島市)	ウグイ	70
	大阪府	11	大阪湾	スズキ	91
	兵庫県	12	姫路沖	スズキ	85
	鳥取県	13	中海	スズキ	tr(11)
	広島市	14	広島湾	スズキ	25
	香川県	15	高松港	ボラ	46
	高知県	16	四万十川河口(四万十市)	スズキ	tr(8)
	大分県	17	大分川河口(大分市)	スズキ	nd
	鹿児島県	18	薩摩半島西岸	スズキ	tr(10)
	沖縄県	19	中城湾	ミナミクロダイ	160
鳥類	鳥取県	1	天神川(倉吉市)	カワウ	21
	山梨県	参考値	笛吹川下曾根橋下流左岸(甲府市)	カワウの卵(卵黄)	13,000
				カワウの卵(卵白)	74

- (注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。
- (注2) 検出下限値以上を検出とした。
- (注3) ※定量[検出]下限値は該当物質の定量[検出]下限値の合計値とした。
- (注4) 「nd」は不検出を意味する。
- (注5) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。