

表6 年度別 p, p' - DDT濃度 (昭和53~平成9年度)

(魚 類)			(単 位 : μg/g-wet)																			
採取地点	種	区分	53年度	54年度	55年度	56年度	57年度	58年度	59年度	60年度	61年度	62年度	63年度	元年度	2年度	3年度	4年度	5年度	6年度	7年度	8年度	9年度
北海道釧路沖	サケ (シロザケ)	平均	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大	nd	0.002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	0.001	nd	0.001	nd	nd	nd	nd	0.001	nd
北海道根室沖	オオサガ (コウジンメヌケ)	平均	0.034	0.017	0.036	0.041	0.069	0.052	0.058	0.023	0.039	0.035	0.039	0.029	0.03	0.046	0.034	0.078	0.036	0.022	0.018	0.026
		最大	0.048	0.026	0.074	0.068	0.11	0.068	0.081	0.041	0.072	0.051	0.068	0.076	0.037	0.088	0.043	0.095	0.05	0.044	0.035	0.047
山田湾	アイナメ	平均			0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大			0.005	0.004	0.003	0.006	0.003	0.002	0.003	0.001	tr	nd	nd	nd	tr	nd	0.002	nd	0.001	tr
常磐沖	サンマ	平均	0.004	0.002	0.003	-	0.002	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大	0.004	0.002	0.003	0.001	0.002	0.002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
日本海東北沖	マダラ	平均			0.008	0.003	0.004	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大			0.015	0.005	0.008	0.002	0.002	0.003	nd	0.004	nd	nd	nd	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
東京湾	スズキ	平均	0.012	0.002	0.007	-	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.007	-	0.002	0.001	0.002	-	0.002	0.003	-
		最大	0.016	0.003	0.009	nd	0.003	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.012	nd	0.002	0.003	0.003	nd	0.002	0.004	0.001
大阪湾	スズキ	平均			0.01	0.013	0.006	0.007	0.005	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	-	0.002	0.002	0.002	0.017	0.008	0.002
		最大			0.022	0.022	0.01	0.013	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	0.001	0.003	0.003	0.003	0.03	0.013
瀬戸内海	スズキ	平均		0.028	0.007	-	0.093	-	0.002	0.008	0.003	0.002	0.019	0.003			-	-	-	-	-	-
		最大		0.036	0.01	0.075	0.16	0.004	0.002	0.014	0.007	0.004	0.062	0.005			nd	nd	0.002	0.003	0.016	0.005
山陰沖	スズキ	平均					0.009	0.007	0.002	0.006	-	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.001	-	-	-	-
		最大					0.011	0.009	0.003	0.022	0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.004	0.002	tr	tr	0.002	nd
四万十川河口	スズキ	平均							0.012	0.007	0.007	0.005	-	-	0.005	-	-	-	-	-	-	-
		最大							0.03	0.016	0.022	0.01	nd	0.002	0.007	0.002	nd	0.007	nd	nd	nd	tr
祝言島地先	スズキ	平均														-	-	-	-	-	0.003	-
		最大														0.001	tr	nd	nd	tr	0.004	0.002
薩摩半島西岸	スズキ	平均							0.003	0.005	0.002	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大							0.008	0.011	0.002	0.003	nd	0.003	nd	0.001	0.001	0.001	tr	0.001	0.001	nd
沖縄県中城湾	ミナミクロダイ	平均											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大											0.001	0.001	0.001	nd	nd	nd	nd	tr	nd	tr
琵琶湖	ウグイ	平均																		0.004	0.004	0.002
		最大																		0.005	0.004	0.003

(貝 類)																						
山田湾	ムラサキイガイ	平均	0.002	0.002	0.001	-	0.002	0.001	0.001	-	0.003	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大	0.003	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	nd	0.003	tr	0.002	tr	0.001	0.002	nd	nd	nd	nd	nd	nd
三浦半島	ムラサキイガイ	平均	0.003	0.005	0.002	-	0.001	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	-	0.001	-	-	-	-	-	-
		最大	0.003	0.006	0.003	nd	0.002	0.004	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	nd	0.001	nd	nd	nd	nd	nd
能登半島	ムラサキイガイ	平均				0.004	0.002	0.005	-	-	-	-	0.001	0.001	-	-	-	-	-	-	-	-
		最大				0.004	0.002	0.007	0.002	nd	nd	nd	0.001	0.001	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
伊勢湾	ムラサキイガイ	平均													-	-	-	-	-	-	-	-
		最大													nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
島根半島	ムラサキイガイ	平均															0.001	-	-	-	0.021	-
		最大															0.001	tr	nd	nd	0.024	nd
鳴門	イガイ	平均	0.01	0.007	0.004	-	0.008	0.003	0.003	0.002	0.001	0.002	-	-	0.002	-	-	-	-	-	-	-
		最大	0.013	0.008	0.005	nd	0.01	0.003	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

(鳥 類)																						
盛岡市郊外	ムクドリ	平均	0.003	-	0.007	-	-	0.004	-	-	-	0.002	0.001	-	-	-	-	0.001	0.001	-	-	-
		最大	0.007	nd	0.013	0.006	0.002	0.005	0.001	0.001	0.004	0.006	0.002	tr	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	tr
東京湾	ウミネコ	平均						-	-	-	0.011	-	-	-	-	0.003	-	-				
		最大						nd	0.001	nd	0.043	0.001	nd	nd	nd	0.002	0.005	nd	nd			
蕪島	ウミネコ	平均																		-	-	-
		最大																		nd	nd	nd

(注) "nd" は不検出、"tr" は検出限界未満で検出