



患者Iの自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※全く出現しなかった項目は
グラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (1/30)	負荷後 (1/30) 後前	負荷前 (1/31)	負荷後 (1/31)	負荷前 (2/1)	負荷後 (2/1)
関節の痛み	68	70	68	79	61	70
筋肉の痛み	68	70	79	79	61	70
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	67	10	10	10	9	19
目・鼻の刺激	9	9	9	29	0	0
しみる感じ	10	0	0	20	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がぼーとする	0	0	0	0	0	0
眠い、あくびが出る	0	0	0	11	0	0
いらだち気味	0	0	9	27	0	0
身体がだるい	40	40	18	0	9	8
意欲低下	0	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	0	0	0	10	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	88	93	80	0	78	88
口やのどの乾き	9	9	9	8	0	0
手足の冷たい感じ	0	1	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	359	302	282	273	218	256
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.916		p=0.406		p=0.057	
負荷後-負荷前の比較 (Friedmanの検定)	p=0.320		p=0.537			
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)						