


患者2の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※全く出現しなかった項目はグラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (1/17)	負荷後 (1/17)	後-前	負荷前 (1/18)	負荷後 (1/18)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	20	0	-20	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	42	20	-22	11	-8	40
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	46	46	0	0	0
どろき	0	38	38	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	18	11	-7	4	0	15
吐き気	0	20	20	0	0	0
気持ちが悪い	0	50	50	6	6	0
頭がボーとする	17	51	34	0	59	10
眠い、あくびが出る	17	19	2	0	50	6
いらだち気味	0	10	10	0	0	0
身体がだるい	8	33	25	3	47	6
意欲低下	3	20	17	0	14	6
頭の重い感じ	20	26	6	2	44	16
頭痛	32	22	-10	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	7	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やどの乾き	11	53	42	4	27	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	188	419		32	274	99

負荷前後の比較
(Wilcoxonの符号付順位検定)

負荷後-負荷前の比較
(Friedmanの検定)

負荷後-負荷前の症状比較
(Friedmanの検定)

p=0.041

p=0.021

p=0.249

p=0.0034 (40ppb負荷後は、プラセボ負荷後に比べ有意に低値)

p=0.046 (40ppbで他二つの負荷時より有意に低値)