


患者3の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※全く出現しなかった項目はグラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (3/13)	負荷後 (3/13)	後-前	負荷前 (3/15)	負荷後 (3/15)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	10	-16
筋肉の痛み	0	0	0	0	10	-16
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	0	0	0	0	9	-8
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	10	-10
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がボーとする	0	9	9	0	7	-4
眠い、あくびが出る	0	0	0	0	0	0
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	5	0	-5	0	4	-3
意欲低下	5	0	-5	0	0	0
頭の重い感じ	5	8	3	0	6	-2
頭痛	0	8	8	0	6	-2
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やどの乾き	6	6	0	0	7	-8
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他 (首のリンパの腫れ)	50	50	0	3	21	-5
その他 (うっすら汗をかいた)	0	50	50	0	0	0
その他 (股の付け根のリンパの腫れ)	0	0	0	0	8	0
その他 (顔の皮が腫れている感じ)	0	0	0	0	8	0
計	71	131	3	3	170	88
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.248		全く変化なし		p=0.005	
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p=0.005 (8ppb負荷後は、プラセボ負荷後に比し、有意に低値)					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.002 (40ppbで、プラセボに比し、有意に低値)					