


患者4の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※ 全く出現しなかった項目は
グラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (3/13)	負荷後 (3/13)	後-前	負荷前 (3/15)	負荷後 (3/15)	後-前
関節の痛み	5	0	-5	2	0	-2
筋肉の痛み	40	40	0	8	5	-3
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	25	28	3	8	3	-5
目・鼻の刺激	29	50	21	8	0	-8
しみる感じ	50	50	0	9	0	-9
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	15	0	-15	30	0	-30
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がボーとする	27	33	6	7	6	-1
眠い、あくびが出る	13	13	0	0	6	6
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	15	10	-5	4	0	-4
意欲低下	14	11	-3	10	0	-10
頭の重い感じ	39	20	-19	8	5	-3
頭痛	50	7	-43	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	32	10	-22	27	23	-4
口やのどの乾き	43	50	7	7	0	-7
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	397	322		128	48	99
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.306			p=0.009		p=0.689
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p=0.010 (8ppb負荷後が、プラセボ負荷後に比し、有意に低値)					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.330					