


患者4の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※ 全く出現しなかった項目は
グラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (3/13)	負荷後 (3/13) 後-前	負荷前 (3/15)	負荷後 (3/15) 後-前	負荷前 (3/14)	負荷後 (3/14) 後-前
関節の痛み	5	0	2	-2	0	5
筋肉の痛み	40	40	8	-3	7	-7
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	25	28	8	-5	9	-9
目・鼻の刺激	29	50	8	-8	40	-26
しみる感じ	50	50	9	-9	0	6
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	15	0	30	-30	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がボーとする	27	33	7	-1	7	31
眠い、あくびが出る	13	13	0	6	8	32
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	15	10	4	-4	0	50
意欲低下	14	11	10	-10	0	9
頭の重い感じ	39	20	8	-3	8	0
頭痛	50	7	0	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	32	10	27	-4	10	-10
口やのどの乾き	43	50	7	-7	10	-10
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	397	322	128	48	99	170
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.306		p=0.009		p=0.689	
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p=0.010 (8ppb負荷後が、プラセボ負荷後に比し、有意に低値)					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.330					