


患者5の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (2/27)	負荷後 (2/27)	後-前	負荷前 (2/28)	負荷後 (2/28)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	3	2	-1	2	2	0
しみる感じ	3	2	-1	8	8	3
舌がどりどりする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	3	0	-3	5	1	-1
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	1	1	0
気持ちが悪	0	0	0	0	0	0
頭がぼーとする	2	3	1	2	2	-2
眠い、あくびが出る	0	3	3	4	1	-1
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	0	0	0	6	2	0
意欲低下	0	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	2	0	-2	4	1	0
頭痛	2	0	-2	3	3	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やのどの乾き	0	0	0	3	3	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	15	10	18	44	25	29

負荷前後の比較
(Wilcoxonの符号付順位検定)

負荷後症状の比較
(Friedmanの検定)

負荷後-負荷前の症状比較
(Friedmanの検定)

p=0.347

p=0.003

p=0.398

p=0.0008 (8ppb負荷後が、プラセボに比し、有意に高値)

p=0.0024 (8ppbでプラセボに比し、有意に高値)