


患者6の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※全く出現しなかった項目はグラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (1/17)	負荷後 (1/17)	後-前	負荷前 (1/18)	負荷後 (1/18)	後-前
関節の痛み	9	6	-3	7	9	2
筋肉の痛み	10	9	-1	8	7	-1
けいれん	11	11	0	8	8	0
こわばり	10	8	-2	8	7	-1
目・鼻の刺激	19	50	31	9	8	-1
しみる感じ	18	50	32	7	20	13
舌がピリピリする	9	11	2	7	6	-1
息苦しい	17	11	-6	25	7	-18
どうき	14	12	-2	8	12	4
脈の異常	11	10	-1	9	10	1
お腹の不快感	13	11	-2	23	10	-13
吐き気	12	9	-3	9	7	-2
気持ちが悪い	13	9	-4	10	7	-3
頭がぼーとする	25	12	-13	11	10	-1
眠い、あくびが出る	11	27	16	9	8	-1
いらだち気味	10	10	0	8	8	0
身体がだるい	11	11	0	10	7	-3
意欲低下	10	12	2	10	8	-2
頭の重い感じ	25	7	-18	10	8	-2
頭痛	17	12	-5	9	8	-1
めまい	13	8	-5	11	10	-1
ふらつき	18	20	2	9	7	-2
発疹、かゆみ	18	9	-9	10	10	0
口やどの乾き	14	10	-4	10	10	0
手足の冷たい感じ	10	10	0	7	10	3
その他 (手がしびれる)	18	24	6	0	0	0
計	366	379		252	222	
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.290		p=0.114		p=0.001	
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p<0.0001 (40ppb負荷後は、他二つの負荷後に比し、有意に高値)					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.0003 (40ppbが、他の二つに比べ、有意に高値)					