


患者8の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (3/8)	負荷後 (3/8)	後-前	負荷前 (3/7)	負荷後 (3/7)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	0	0	0	0	0	0
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がボーとする	0	0	0	0	0	0
眠い、あくびが出る	0	0	0	0	0	0
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	0	0	0	0	0	0
意欲低下	0	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	0	1	1	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	20	17	-3	18	20	2
口やのどの乾き	0	0	0	0	0	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	20	18		18	20	
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.141		p=0.225		p=0.180	
負荷後-負荷前の比較 (Friedmanの検定)	p=0.867					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.223					