


対照1の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※ 全く出現しなかった項目は
グラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前	負荷後 (2/27)	後-前	負荷前 (2/28)	負荷後 (2/28)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	0	0	0	0	0	0
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	5	-5	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪	0	0	0	0	0	0
頭がぼーとする	0	0	0	0	0	0
眠い、あくびが出る	0	7	7	0	6	-4
いらだち気味	0	0	0	0	9	-4
身体がだるい	0	0	0	0	0	0
意欲低下	0	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0
めまい	0	0	0	0	3	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やのどの乾き	0	0	0	0	0	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	0	7	7	5	18	8

—症状のみ変化

負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定) p=0.157

負荷後症状の比較 (Friedmanの検定) p=0.273

負荷後・負荷前の症状比較 (Friedmanの検定) p=0.061

p=0.319