


対照2の自覚症状変化 (y軸/-100~100)



※ 全く出現しなかった項目はグラフ作成時に除外した。

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (3/8)	負荷後 (3/8)	後-前 負荷前 (3/7)	負荷後 (3/7)	後-前 負荷前 (3/6)	負荷後 (3/6)
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	0	0	0	0	0	0
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	0	0	0
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	0	0	0	0	0	0
吐き気	0	0	0	0	0	0
気持ちが悪い	0	0	0	0	0	0
頭がボーとする	0	0	0	0	0	0
眠い、あくびが出る	0	0	0	0	0	0
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	0	0	0	0	0	0
意欲低下	0	0	0	0	0	0
頭の重い感じ	0	0	0	0	0	0
頭痛	0	0	0	0	0	0
めまい	0	0	0	0	0	0
ふらつき	0	0	0	0	0	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やのどの乾き	0	0	0	0	0	0
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0

全く変化なし

全く変化なし

全く変化なし

	プラセボ		ホルムアルデヒド8ppb		ホルムアルデヒド40ppb	
	負荷前 (2/21)	負荷後 (2/21)	後-前	負荷前 (2/20)	負荷後 (2/20)	後-前
関節の痛み	0	0	0	0	0	0
筋肉の痛み	0	0	0	0	0	0
けいれん	0	0	0	0	0	0
こわばり	0	0	0	0	0	0
目・鼻の刺激	0	0	0	14	0	-14
しみる感じ	0	0	0	0	0	0
舌がピリピリする	0	0	0	0	0	0
息苦しい	0	0	0	16	0	-16
どうき	0	0	0	0	0	0
脈の異常	0	0	0	0	0	0
お腹の不快感	11	0	-11	0	0	0
吐き気	0	16	16	10	0	-10
気持ちが悪い	0	15	15	12	15	3
頭がボーとする	10	30	20	12	15	3
眠い、あくびが出る	8	11	3	1	20	19
いらだち気味	0	0	0	0	0	0
身体がだるい	10	0	-10	9	12	3
意欲低下	0	1	1	0	0	0
頭の重い感じ	0	0	0	14	0	-14
頭痛	0	0	0	12	0	-12
めまい	0	33	33	0	0	0
ふらつき	0	20	20	0	0	0
発疹、かゆみ	0	0	0	0	0	0
口やどの乾き	50	40	-10	33	18	-15
手足の冷たい感じ	0	0	0	0	0	0
その他 (手が汗ばむ)	0	0	0	0	0	0
計	89	166	166	133	80	145
負荷前後の比較 (Wilcoxonの符号付順位検定)	p=0.114		p=0.240		p=0.144	
負荷後症状の比較 (Friedmanの検定)	p=0.125					
負荷後-負荷前の症状比較 (Friedmanの検定)	p=0.084					