

表1 対象者の特性

	男性 (n = 34)	女性 (n = 33)	計 (n = 67)
平均年齢(歳)	37.9	39.6	38.7
(標準偏差)	14.4	11.5	13.0
年齢階級			
40歳未満(%)	55.9	44.1	58.2
40歳以上(%)	60.6	39.4	41.8
婚姻状態			
未婚	38.2	28.1	33.3
既婚	55.9	68.8	62.1
離別	5.9	3.1	4.6
最終学歴			
中学校	0.0	3.1	1.5
高等学校	36.4	31.3	33.8
短大・専門学校	9.1	34.4	21.5
大学・大学院	54.5	31.2	43.1

(%)

表2 居住環境(現在の居住地)

	男性 (n = 34)	女性 (n = 33)	計 (n = 67)
居住地			
兵庫県	58.8	51.5	55.2
大阪市	20.6	27.3	23.9
大阪府(大阪市以外)	17.6	12.1	14.9
京都府	2.9	3.0	3.0
奈良県	0.0	6.1	3.0
周囲の環境			
住宅地	91.2	93.9	92.5
商業地	5.9	6.1	6.0
農山村	2.9	0.0	1.5
住居構造			
木造一戸建て	32.4	21.2	26.9
鉄筋一戸建て	8.8	6.1	7.5
木造集合住宅	0.0	6.1	3.0
鉄筋集合住宅	58.8	63.6	61.2
その他	0.0	3.0	1.5

(%)

表3 居住環境(これまでに最も長い居住地)

	男性 (n = 34)	女性 (n = 33)	計 (n = 67)
周囲の環境			
住宅地	84.8	87.9	86.4
商業地	6.1	3.0	4.5
工業地	0.0	3.0	1.5
農山村	9.1	6.1	7.6
住居構造			
木造一戸建て	36.4	39.4	37.9
鉄筋一戸建て	24.2	9.1	16.7
木造集合住宅	3.0	12.1	7.6
鉄筋集合住宅	33.3	36.4	34.8
その他	3.0	3.0	3.0
道路沿いでの居住歴			
あり	33.3	42.4	38.1
なし	66.7	57.6	61.9

(%)

表4 昨年1年間の月別症状出現頻度

	症状の出現した月												再掲	
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1~12月	2~4月
(1) くしゃみ	15 (24.6)	31 (50.8)	42 (68.9)	40 (65.6)	27 (44.3)	17 (27.9)	14 (23.0)	11 (18.0)	13 (21.3)	16 (26.2)	13 (21.3)	15 (24.6)	51 (83.6)	49 (80.3)
(2) 鼻みず	12 (19.7)	28 (45.9)	39 (63.9)	41 (67.2)	26 (42.6)	12 (19.7)	10 (16.4)	9 (14.8)	11 (18.0)	14 (23.0)	14 (23.0)	13 (21.3)	52 (85.2)	49 (80.3)
(3) 鼻づまり	8 (13.1)	22 (36.1)	36 (59.0)	34 (55.7)	24 (39.3)	12 (19.7)	9 (14.8)	8 (13.1)	10 (16.4)	12 (19.7)	8 (13.1)	9 (14.8)	46 (75.4)	43 (70.5)
(4) 鼻のかゆみ	6 (9.8)	17 (27.9)	26 (42.6)	25 (41.0)	15 (24.6)	9 (14.8)	6 (9.8)	5 (8.2)	8 (13.1)	7 (11.5)	5 (8.2)	6 (9.8)	33 (54.1)	31 (50.8)
(5) 眼のかゆみ	5 (8.2)	20 (32.8)	37 (60.7)	34 (55.7)	18 (29.5)	8 (13.1)	4 (6.6)	3 (4.9)	6 (9.8)	8 (13.1)	5 (8.2)	8 (13.1)	47 (77.0)	45 (73.8)
(6) 眼の充血	3 (4.9)	9 (14.8)	18 (29.5)	13 (21.3)	8 (13.1)	3 (4.9)	1 (1.6)	1 (1.6)	1 (1.6)	2 (3.3)	1 (1.6)	6 (9.8)	25 (41.0)	22 (36.1)
(7) 涙が出る	2 (3.3)	9 (14.8)	13 (21.3)	13 (21.3)	10 (16.4)	5 (8.2)	2 (3.3)	2 (3.3)	2 (3.3)	3 (4.9)	2 (3.3)	3 (4.9)	24 (39.3)	17 (27.9)
(1)~(7)の いずれか	20 (32.8)	38 (62.3)	50 (82.0)	46 (75.4)	33 (54.1)	21 (34.4)	18 (29.5)	14 (23.0)	18 (29.5)	21 (34.4)	18 (29.5)	21 (34.4)	61 (100.0)	57 (93.4)

上段:人数, 下段:%

表5 昨年1年間の月別症状出現頻度(性, 年齢階級別)

	1~12月のいずれか				2~4月のいずれか			
	男 (n = 31)	女 (n = 30)	40歳未満 (n = 34)	40歳以上 (n = 27)	男 (n = 31)	女 (n = 30)	40歳未満 (n = 34)	40歳以上 (n = 27)
(1) くしゃみ	27 (87.1)	24 (80.0)	30 (88.2)	21 (77.8)	26 (83.9)	23 (76.7)	30 (88.2)	19 (70.4)
(2) 鼻みず	28 (90.3)	24 (80.0)	28 (82.4)	24 (88.9)	27 (87.1)	22 (73.3)	27 (79.4)	22 (81.5)
(3) 鼻づまり	27 (87.1)	19 (63.3)	26 (76.5)	20 (74.1)	26 (83.9)	17 (56.7)	26 (76.5)	17 (63.0)
(4) 鼻のかゆみ	16 (51.6)	17 (56.7)	18 (52.9)	15 (55.6)	16 (51.6)	15 (50.0)	18 (52.9)	13 (48.1)
(5) 眼のかゆみ	24 (77.4)	23 (76.7)	27 (79.4)	20 (74.1)	24 (77.4)	21 (70.0)	27 (79.4)	18 (66.7)
(6) 眼の充血	12 (38.7)	13 (43.3)	14 (41.2)	11 (40.7)	11 (35.5)	11 (36.7)	13 (38.2)	9 (33.3)
(7) 涙が出る	12 (38.7)	12 (40.0)	12 (35.3)	12 (44.4)	10 (32.3)	7 (23.3)	10 (29.4)	7 (25.9)
(1)~(7)の いずれか	31 (100.0)	30 (100.0)	34 (100.0)	27 (100.0)	30 (96.8)	27 (90.0)	33 (97.1)	24 (88.9)

上段:人数, 下段:%