


8	CAS 番号：95-78-3	物質名：2,5-ジメチルアニリン
<p>化審法官報公示整理番号：3-129（ジアルキル(C=1～5)アニリン）</p> <p>化管法政令番号：</p> <p>分子式：C₈H₁₁N 構造式：</p> <p>分子量：121.18</p> <div style="text-align: center;">  </div>		
<p>1. 物質に関する基本的事項</p> <p>本物質の水溶解度は 5.6×10³ mg/L(12)で、分配係数(1-オクタノール/水)(log Kow)は 1.83 (pH=7.4)、蒸気圧は 0.15 mmHg (=20 Pa) (20)である。生物分解性(好氣的分解)は BOD 分解率で 0%であり、生物蓄積性はない又は低いと判断されている。また、加水分解性の基をもたない物質とされている。</p> <p>本物質の主な用途は、染料の原料とされ、ジアルキル(C=1～5)アニリンとして平成 16 年度における製造(出荷)及び輸入量は 1,000～10,000t/年未満であった。</p> <hr/> <p>2. ばく露評価</p> <p>化学物質排出把握管理促進法(化管法)第一種指定化学物質ではないため、排出量及び移動量は得られなかった。Mackay-Type Level III Fugacity Model により媒体別分配割合の予測を行った結果、大気、水域、土壤に等量排出された場合、土壤に分配される割合が多い。</p> <p>人に対するばく露として吸入ばく露の予測最大ばく露濃度を設定できるデータは得られなかったが、限られた地域(川崎市)のデータを用いた場合には 0.0007 μg/m³ 未満の報告があった。経口ばく露の予測最大ばく露量は、地下水のデータから算定すると 0.00016 μg/kg/day 未満程度であった。本物質は環境媒体から食物経由で摂取されるばく露によるリスクは小さいと考えられる。</p> <p>水生生物に対するばく露を示す予測環境中濃度(PEC)は、公共用水域の淡水域、海水域とも 0.004 μg/L 未満程度となった。</p> <hr/> <p>3. 健康リスクの初期評価</p> <p>本物質を高濃度にばく露すると、意識低下を起こし、メトヘモグロビン(MetHb)を生成することがある。吸入すると眩暈や嗜眠、頭痛、吐き気を生じ、経口摂取すると唇や爪、皮膚のチアノーゼ、眩暈、嗜眠、頭痛、吐き気、意識喪失を生じる。</p> <p>本物質の発がん性については十分な知見が得られなかったため、非発がん影響に関する知見に基づいて初期評価を行った。</p> <p>経口ばく露については、イヌの中・長期毒性試験から得られた無毒性量(NOEL) 2 mg/kg/day(肝臓の脂肪変性)を試験期間が短いことから 10 で除した 0.2 mg/kg/day を無毒性量等に設定した。吸入ばく露については、無毒性量等の設定ができなかった。</p> <p>経口ばく露については、地下水を摂取すると仮定した場合、予測最大ばく露量は 0.00016 μg/kg/day 未満程度であった。無毒性量等 0.2 mg/kg/day と予測最大ばく露量から、動物実験結果より設定された知見であるために 10 で除して求めた MOE(Margin of Exposure)は 130,000 超となる。環境媒体から食物経由で摂取されるばく露によるリスクは小さいと推定されることから、そのばく露を加えても MOE が大きく変化することはないと考えられる。従って、本物質の経口ばく露による健康リスクについては、現時点では作業は必要ないと考えられる。</p> <p>吸入ばく露については、無毒性量等が設定できず、全国レベルのデータも得られなかったため、健康リスクの判定はできなかった。なお、参考として吸収率を 100%と仮定し、経口ばく露の無毒性量等を吸入ばく</p>		

露の無毒性量等に換算すると 0.67 mg/m³ となるが、これと局所地域のデータとして報告のあった一般環境大気中の予測最大値 0.0007 μg/m³ 未満を用いて算出した MOE は 96,000 超となる。

本物質の大気中での半減期は 0.32～3.2 時間であり、大気中に排出された場合でもほとんどが大気以外の媒体に分配されると予測されていることなどから、一般環境大気からの吸入ばく露による健康リスクの評価に向けて吸入ばく露の情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。

有害性の知見				ばく露評価		リスクの判定			総合的な判定			
ばく露経路	リスク評価の指標		動物	影響評価指標 (エンドポイント)	ばく露の媒体	予測最大ばく露量及び濃度						
経口	無毒性量等	0.2	mg/kg/day	イヌ	肝臓の脂肪変性	飲料水	-	μg/kg/day	MOE	-	×	
						地下水	< 0.00016	μg/kg/day	MOE	> 130,000		
吸入	無毒性量等	-	-	-	-	一般環境大気	-	μg/m ³	MOE	-	×	()
						室内空気	-	μg/m ³	MOE	-	×	×

4. 生態リスクの初期評価

本物質については、水生生物に対する毒性値に関して十分に適切な知見が得られなかったため、次回以降にとりまとめることとした。

有害性評価 (PNEC の根拠)			アセスメント係数	予測無影響濃度 PNEC (μg/L)	ばく露評価		PEC/PNEC 比	評価結果
生物種	急性・慢性の別	エンドポイント			水域	予測環境中濃度 PEC (μg/L)		
-	-	-	-	-	淡水	<0.004	-	×
					海水	<0.004	-	

5. 結論

	結論		判定
健康リスク	経口ばく露	現時点では作業は必要ないと考えられる。	
	吸入ばく露	リスクは判定できない。情報収集等を行う必要性は低いと考えられる。	()
生態リスク	本物質については、水生生物に対する毒性値に関して十分に適切な知見が得られなかったため、次回以降にとりまとめることとした。		×

[リスクの判定] : 現時点では作業は必要ない、 : 情報収集に努める必要がある、 : 詳細な評価を行う候補、 × : 現時点ではリスクの判定はできない
 () : 情報収集等を行う必要性は低いと考えられる、 () : 情報収集等の必要があると考えられる。