


Figure V. Exposure pathways from releases of radioactive material to the environment



1. 放射性ブルームの大気中移動
 - ✓ 外部被ばく
 - ✓ 内部被ばく (吸入)
2. 地表沈着
 - ✓ 外部被ばく
 - ✓ 内部被ばく (再浮遊、吸入)
3. 地表等沈着
 - ✓ 内部被ばく (飲食物移行)

主な評価対象の被ばく経路

- ① ブルーム中放射性物質による外部被ばくと吸入による内部被ばく
- ② 地表沈着放射性物質からの外部被ばく及び飲食物移行放射性核種の摂取による内部被ばく
- ③ 海産物へ移行した放射性物質の摂取による内部被ばく

事故により環境中に放出された放射性物質による被ばく線量を推定するために、被ばくの形態の分析が行われます。

この図は、放射性物質による被ばくの経路を整理して示したものです。放射性ブルームとして大気中を移動した後、人々の居住地域に到達する経路です。この場合、通過するブルーム中に含まれる放射性物質からの外部被ばくとブルーム中の放射性物質を吸い込むことにより起こる内部被ばくの2つの経路があります。

さらに、ブルーム中に含まれた放射性物質が降雨などにより地表に沈着した場合にも、2つの被ばく経路があります。1つ目は、地表に沈着した放射性物質からの放射線による外部被ばくです。2つ目は、沈着した放射性物質が農作物に移行するか、あるいはそれを食した家畜を摂取することにより起こる内部被ばくです。飲食物の摂取による被ばくとしては、水道水など放射性物質が含まれる飲料水を飲むことによる内部被ばくと、海洋に移行した放射性物質が魚介類に移行しそれを食することによる内部被ばくの経路が考えられます。

また、地表に沈着した放射性物質が大気中に再浮遊して、それを吸入することによる内部被ばくも考えられないことはありませんが、この被ばく経路の放射線影響は小さいと評価されています。

以上より、大気中に放出された被ばく経路の主なものは次の通りとなります。

- ①放射性ブルーム中の放射性核種による外部被ばく
- ②放射性ブルーム中の放射性核種の吸入による内部被ばく
- ③地面に沈着した放射性核種からの外部被ばく
- ④食品及び水に含まれる放射性核種の摂取による内部被ばく

【報告書記載箇所】

・UNSCEAR 報告書 (Annex A, 日本語版 p.24, 第 65 ~ 66 項、Appendix C, p.160 ~ 161, 第 C3 ~ C7 項から作成)

本資料への収録日：2015年3月31日