


水質汚濁に係る農薬登録基準の設定に関する資料  
ジメスルファゼット

## I. 評価対象農薬の概要

## 1. 物質概要

化学名 (IUPAC)	2' - [ (3, 3 - ジメチル - 2 - オキサゼチジン - 1 - イル) メチル ] - 1, 1, 1 - トリフルオロメタンスルホンアニリド				
分子式	C <sub>13</sub> H <sub>15</sub> F <sub>3</sub> N <sub>2</sub> O <sub>3</sub> S	分子量	336.3	CAS 登録番号 (CAS RN <sup>®</sup> )	1215111-77-5
構造式					

## 2. 作用機構等

ジメスルファゼットは、スルホンアニリド系の除草剤であり、その作用機構は超長鎖脂肪酸合成の阻害と考えられている。

本邦では未登録である。

製剤は粒剤及び水和剤があり、適用農作物等は稲として、登録申請されている。

## 3. 各種物性等

外観・臭気	白色粉末、無臭	土壌吸着係数	$K_{F^{ads}_{oc}} = 8.2-19$ (25°C)
融点	130.1-131.3°C	オクタノール /水分配係数	$\log Pow = 2.6$
沸点	減圧下で 226.0°C (大気圧下で測定不能)	生物濃縮性	—
蒸気圧	$3 \times 10^{-5}$ Pa (20°C) $6 \times 10^{-5}$ Pa (25°C)	密度	1.4 g/cm <sup>3</sup> (20°C)
加水分解性	5日間安定 (50°C ; pH 4、7、9)	水溶解度	75 mg/L (20°C、蒸留水)
水中光分解性	半減期 43.0-79.9日 (東京春季太陽光換算 185-344日) (滅菌緩衝液、pH 7、25°C、425 W/m <sup>2</sup> 、300-800 nm) 25.5-33.5日 (東京春季太陽光換算 109-144日) (滅菌自然水、pH 7.7、25°C、425 W/m <sup>2</sup> 、300-800 nm)		
pKa	4.1 (21°C)		

## II. 安全性評価

一日摂取許容量 (ADI)	0.0039 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、令和5年5月9日付けで、ジメスルファゼットのADIを0.0039 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働大臣に通知した。</p> <p>なお、この値は各試験で得られた無毒性量のうち最小値0.39 mg/kg 体重/日を安全係数100で除して設定された。</p>	

### Ⅲ. 水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

#### 1. 製剤の種類及び適用農作物等

申請者より提出された申請資料によれば、本農薬の製剤は粒剤及び水和剤があり、適用農作物等は稲がある。

#### 2. 水濁 PEC の算出

##### (1) 水田使用時の水濁 PEC（第1段階）

水田使用時において、PEC が最も高くなる使用方法（下表左欄）について、第1段階のPEC を算出した。算出に当たっては、農薬取締法テストガイドラインに準拠して下表右欄のパラメーターを用いた。

PEC 算出に関する使用方法		各パラメーターの値	
適用農作物等	稲	$I$ : 単回・単位面積当たりの有効成分量（有効成分 g /ha） （左欄の最大使用量に、有効成分濃度を乗じた上で、単位を調整した値）	150
剤 型	3.0%水和剤	$N_{app}$ : 総使用回数（回）	2*
当該剤の単回・単位面積当たり最大使用量	500 mL/10a	$A_p$ : 農薬使用面積（ha）	50
地上防除/航空防除の別	地上防除		
使用方法	無人航空機による滴下		
使用回数	1回		

※ 各製剤の使用回数は1回だが、異なる製剤を組み合わせ使用した場合のジメスルファゼットとしての総使用回数は2回のため、パラメーターには2を使用した。

##### (2) 水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC (mg/L)
水田使用時(第1段階)	0.003994
非水田使用時	適用なし
合 計 <sup>1)</sup>	0.003994 ÷ <u>0.0040 (mg/L)</u>

<sup>1)</sup> 水濁 PEC の値は有効数字2桁とし、3桁目を四捨五入して算出した。

## IV. 総合評価

### 1. 水質汚濁に係る登録基準値

登録基準値	0.010 mg/L
以下の算出式により登録基準値を算出した。 <sup>1)</sup>	
0.0039 (mg/kg 体重/ 日)	× 53.3 (kg) × 0.1 / 2 (L /人/ 日) = 0.0103… (mg/L)
ADI	体重 10 %配分 飲料水摂取量

<sup>1)</sup> 登録基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1 日 2L、有効数字は 2 桁（ADI の有効数字桁数）とし、3 桁目を切り捨てて算出した。

#### <参考> 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 <sup>1)</sup>	なし
水質要監視項目 <sup>2)</sup>	なし
水質管理目標設定項目 <sup>3)</sup>	なし
ゴルフ場指導指針 <sup>4)</sup>	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン <sup>5)</sup>	なし

<sup>1)</sup> 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

<sup>2)</sup> 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

<sup>3)</sup> 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。

<sup>4)</sup> 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止及び水域の生活環境動植物の被害防止に係る指導指針について」（令和 2 年 3 月 27 日付け環水大土発第 2003271 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された水濁指針値。

<sup>5)</sup> Guidelines for drinking-water quality, fourth edition

### 2. リスク評価

水濁 PEC は 0.0040 mg/L であり、登録基準値 0.010 mg/L を超えないことを確認した。