


【乳児の栄養方法の推移】

%	母乳のみ	ミルクと母乳の混合	ミルクのみ
平成23年度	30.4	62.5	7.0
平成24年度	35.2	54.9	9.8
平成25年度	36.6	54.4	8.7

離乳食を始めるまでの栄養方法については、母乳で育てる方が増えてきています。

【妊産婦のうつ傾向の推移】



「気分が沈みがち」「物事に興味がわかない」という設問に、両方あるいはいずれかに当てはまると回答された方の数値



妊産婦さんのうつ傾向は徐々に減ってきています。

第18回福島県「県民健康管理調査」検討委員会資料より作成

離乳食を始めるまでの栄養方法を尋ねた項目では、2011（平成23）年度に比べて、母乳のみで育てる母親が増加傾向にありました。

一方、気分が沈みがち、物事に興味がわかない、といった妊産婦の方のうつ傾向に関する項目については、その両方あるいはいずれかに当てはまると回答された方の数は減少傾向にあるものの、ほぼ4人に1人（24.5%）という割合でした。

本資料への収録日：2015年3月31日

関連 Q&A

- ・ 2章 QA41 事故当時妊娠していました。放射線の影響はありませんか
- ・ 2章 QA42 結婚したばかりですが、これからの出産に問題はありますか
- ・ 2章 QA43 事故直後、母乳で子育てをしていたのですが、大丈夫だったのですか
- ・ 6章 QA78 震災後生まれた子どもが甲状腺がんになるのではないかと心配です
- ・ 6章 QA79 震災後生まれた子どもが心室中隔欠損症（VSD）でした。放射線の影響でしょうか
- ・ 6章 QA80 放射線の影響で二分脊椎裂、無脳児などが生まれるのでしょうか
- ・ 6章 QA81 「受精直後にたくさん被ばくする」と「たくさん被ばくした卵子で妊娠する」の間にリスクの差はあるのでしょうか