

(参考5) 毒性評価文献を収集する生物種の範囲

「我が国に生息する有用動植物（魚介類）とその餌生物」のほか、毒性評価に係る内外の知見を可能な限り広く収集することとし、目標値の導出に利用する対象生物群を以下の通り設定する。

(1) 淡水域

(魚介類)

我が国の淡水域に生息し、漁獲・放流あるいは養殖の対象となっている魚介類（魚類、甲殻類、貝類、藻類等）。

その他、元来我が国に生息する水生生物で、かつ、通常の実験等に供される水生生物種(例：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）、農薬取締法及びOECDテストガイドラインの推奨種であるメダカ)

(魚介類の餌生物)

我が国の淡水域に生息している全ての生物のうち、上記魚介類を除く生物。ただし、魚類については、餌生物になっている種類もあるが、その実態が不明なこともあり、餌生物としては扱わない。

その他、に該当する生物の同属種、または、通常の実験等に供される魚類以外の種類(例：化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）、農薬取締法及びOECDテストガイドラインの推奨種である緑藻)

(2) 海域

(魚介類)

我が国の海域に生息し、漁獲・放流あるいは養殖の対象となっている魚介類(魚類、甲殻類、貝類、藻類等)。

(魚介類の餌生物)

我が国の海域に生息している全ての生物のうち、上記魚介類を除く生物。ただし、魚類については、餌生物になっている種類もあるが、その実態が不明なこともあり、餌生物としては扱わない。

その他、に該当する生物の同属種

(参考6) 慢性影響について

1. 慢性影響について

水生生物の世代交代を考慮した、個体群の存続への影響を慢性影響とする。

主な影響内容とエンドポイント：成熟、繁殖、増殖、交尾、胚と稚仔の生残・死亡、成長（生長）等に対する NOEC 及びこれに準ずる影響内容とエンドポイント

ばく露期間(試験期間)：対象生物の寿命あるいは世代交代の期間を超える期間の試験は慢性影響を判定する試験として位置付ける。また、世代交代あるいは個体群を維持するために重要な成長段階への影響を捉えるための試験は慢性影響に対する試験とし、それに要する期間をばく露期間とする。これには、魚類では胚から稚魚、未成熟から成熟・産卵にいたる期間以上、ミジンコ類では 14 日間以上（繁殖）、その他、カゲロウ類・トビケラ類等の水生昆虫や貝類等については成長や繁殖等への影響が認められる期間以上が該当する。ただし、藻類に対する急性、慢性影響の考え方は統一した見解が得られていないことから、ばく露期間は急性影響と同様の 72～96 時間とする。

2. 急性影響について

水生生物の生物寿命を考慮した上で、比較的短期間に生じる個体の生存に関わる影響を急性影響とする。水質目標値の導出においては、急性影響をそのまま用いることはしないが、慢性影響を捉えるための情報として用いる。

主な影響内容とエンドポイント：死亡に対する LC50、孵化阻害、遊泳阻害、増殖阻害、生長遅延等の EC50 及びこれらに準ずる影響内容とエンドポイント

ばく露期間(試験期間)：藻類は 72～96 時間、甲殻類・魚類及びその他の生物(動物)は 48～96 時間のばく露期間を要する試験とし、それ以上のばく露期間の試験においても、対象生物の寿命、世代交代期間等を勘案し、急性的な影響と判断された場合には急性影響として扱う。

(参考7) 目標値検討に用いる影響内容と試験法等

水生生物保全に係る水質環境基準での類型区分において、特に産卵場及び感受性の高い幼稚子等の時期に利用する水域については、より厳しい目標をあてはめることがあり得る。目標値の検討が、水生生物の成長段階毎に分けて行われることを考慮し、成長段階毎の影響内容と試験法の整理を行う。

また、水生生物保全に係る水質環境基準の目的は個体群の存続に対する影響（慢性影響）を防止することであるから、慢性影響を生じない濃度（無影響濃度）が得られる試験法を「水生生物保全に係る水質環境基準の標準試験法」として位置付け、これら試験法により得られた無影響濃度を優先する。なお、それ以外の試験法については「その他の試験法」として位置付け、試験法の信頼性及び目標値導出への利用可能性を個別に検討することとする。

各成長段階で用いる試験法を下表に示した。なお、表に示した影響内容や試験法は目標値の導出に用いるデータを検討する際の基本情報となるが、目標値導出手順の見直し等により改訂があり得るものである。

「水生生物保全に係る水質環境基準の標準試験法」

水域	生物	成長段階	影響内容	試験法
淡水	魚介類	胚～稚魚	死亡、ふ化、成長、繁殖 死亡、ふ化、成長、繁殖	OECD TG210 : Fish, Early-life Stage toxicity Test ISO 12890 : Water quality - Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish Semi-static method
		成体	死亡、成長・生長、行動（忌避を含む）、繁殖	-
		全成長段階 成熟・産卵個体		-
	餌生物	全成長段階	藻類の生長	OECD TG201 : Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test
		幼生～成熟・産卵個体	藻類の生長 ミジンコ類の繁殖 ミジンコ類の繁殖	ISO 8692 : Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae OECD TG211 : <i>Daphnia magna</i> Reproduction Test ISO 10706 : Water quality - Determination of long term toxicity of substances to <i>Daphnia magna</i> Straus (Cladocera, Crustacea)
海水	魚介類	胚～幼稚子	死亡、ふ化、成長・生長、繁殖への有害影響	-
		成体	死亡、成長・生長、成熟への有害影響	-
		成熟・産卵個体、全成長段階		-
	餌生物	全成長段階	藻類の生長	ISO10253: Water quality. Marine algal growth inhibition test with <i>Skeletonema costatum</i> and <i>Phaeodactylum tric rnutum</i>

幼稚子：成体と同じ体形や機能等を有しない成長段階（例えば、魚類では後期仔魚まで）

成体：幼稚子以後で性成熟前まで、魚類では稚魚期から抱卵していない成魚の期間

「その他の試験法」

水域	生物	成長段階	影響内容	試験法
淡水	魚介類	胚～前期仔魚	ふ化しない	OECD TG212 : Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-Fry Stages
		稚魚～未成熟魚	死亡 死亡、成長 成長 成長	OECD TG203 : Fish, Acute Toxicity Test, OECD TG204 : Fish, Prolonged Toxicity Test, OECD TG215 : Fish, Juvenile Growth Test, ISO 10229 : Water quality - Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish - Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout [<i>Oncorhynchus mykiss</i> Walbaum (Teleostei, Salmonidae)]
	餌生物	幼生	遊泳阻害 遊泳阻害	OECD TG202 : Daphnia sp., Acute Immobilisation Test ISO 6341 : Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test
海水	魚介類	後期仔魚	死亡	海産魚類及び海産エビ類の急性毒性試験法 (魚類仔魚期、エビ類ミシス期 第1版) (環境省) 同上
		ミシス(エビ類)	死亡	
		稚魚	死亡	海産魚類及び海産エビ類の急性毒性試験法 (案) (第1版) (環境省) 同上
	ポストラバーバ(エビ類)	死亡		
	餌生物	幼生 成体	死亡 死亡 死亡	海産動物プランクトン急性毒性試験 (環境省検討中) ISO 14669 : Water quality - Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (Copepoda, Crustacea)

注) OECD TG204 で得られた毒性値の採用については、対象物質の毒性の作用機序等を踏まえて、専門家による判断とする。

(参考9) 毒性値の信頼性評価について

1. 毒性データを収集する文献範囲

水生生物の毒性評価を行う毒性データを取得するための生態毒性情報源として、生態毒性データベース、有害性評価書及びその他の生態毒性情報源(一般的な検索システム)を用いる。

【生態毒性データベース】

米国環境保護庁(US EPA)生態毒性データベース「AQUIRE」(AQUatic toxicity Information REtrieval)
欧州連合(EU)「IUCLID」(International Union Chemical Information Database)
欧州産業界 ECETOC の水生生物毒性データベース (ECETOC Aquatic Toxicity : EAT)
環境省(庁)生態影響試験報告書

【有害性評価書等】

環境省 化学物質の環境リスク評価(生態リスク初期評価)
(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) 化学物質の初期リスク評価
(独)産業技術総合研究所 詳細リスク評価書
OECD(経済協力開発機構)HPVCプロジェクト「SIDS」(Screening Information Data Set)
欧州連合リスク評価書「EU-RAR」(European Union Risk Assessment Report)
世界保健機関(WHO)「EHC」(Environmental Health Criteria)
カナダ環境保護法優先物質評価書(Canadian Environmental Protection Act Priority Substances List Assessment Report)

【その他の生態毒性情報源】

上述した生態毒性データベースや評価書に掲載されていない情報については、以下に示す一般の検索システムや資料も利用することとする。

科学技術振興機構(JST)文献検索システム(JDream, 検索データベース: JSTPlus, JST7580, JMEDPlus, MEDLINE)
国立情報学研究所 NII 論文情報ナビゲーター(CiNii)
国立環境研究所所蔵マイクロフィッシュ資料
その他のインターネット検索 (Science Direct, BlackWell Synergy, SpringerLink 等)

原文における記載内容あるいは情報源に示されている供試生物や試験条件の情報を利用して毒性値の一次スクリーニングを行う。

2. 毒性データの一次スクリーニング

毒性値の信頼性は試験物質が妥当であるか、適切な試験方法を用いているかについて検討した上で、目標値導出への利用可能性を判断する。収集した毒性値の中には、信頼性の確認に必要な試験条件等の情報が少ないもの、要約あるいは引用として記載されているもの、明らかに試験条件がテストガイドラインあるいは実水域での状況から逸脱しているものがある。これらの毒性値

は、その後の水質目標値の検討に用いることができないと考えられるため、信頼性が確認できないものとして評価の対象としない。

毒性データの一次スクリーニングは、試験物質と試験方法の観点から原文記載内容に基づき以下の項目で行う。

(1) 試験物質

純度、成分等の記載の有無：記載が無いものは用いない。

成分：調剤や混合物の場合は用いない。水質目標値の検討対象物質そのものが混合物の場合はこの限りではない。

純度：80%未満で不純物等の成分が不明の場合は用いない。

検討対象物質が混合物の場合、含まれる成分による毒性の相違や野外環境での分析法等を十分考慮して、被験物質の妥当性を判断する。

(2) 試験方法

環境省が実施する環境リスク初期評価において信頼性が低いとされたデータは用いない。

テストガイドライン(別添)またはそれに準じた方法で行われた試験である場合：試験条件が標準的な試験条件から大きく逸脱しているものは用いない。

テストガイドライン(別添)またはそれに準じた方法でない試験である場合：実水域での状況から極端に逸脱していると考えられるデータは用いない。

試験物質の毒性に関与する条件が明らかな場合は、その条件(例えば、金属類での硬度、アンモニアでのpH等)が記載されていない毒性値は用いない。

情報が極端に少ないあるいは米国環境保護庁生態毒性データベース「AQUIRE」に収録されている毒性データは、試験方法、条件等の情報量を考慮して分類されたスコア(Document code¹)が、「中程度」(Moderate)、「不十分」(Incomplete)に該当するデータは用いない。

4. 毒性値の信頼性等の評価について

毒性値の評価は、その信頼性と水質目標値の検討への利用の適否について行う。

(1) 毒性値の信頼性

毒性値の信頼性は、答申参考資料に記載された「毒性試験結果の評価項目及び留意事項」を踏まえて検討を行う。具体的には、テストガイドライン(別添)に準じた試験についてはガイドラインの記載内容と比較して判断することとし、それ以外の試験については試験の妥当性や毒性値の再

¹Document Code：毒性データを得る上で重要と考えられる項目(淡水16、海水15)について、それぞれスコアが付けられており、それらの合計値が51未満の場合は「不十分」(Incomplete)、51～85は「中程度」(Moderate)、86以上の場合は「全て満たす」(Complete)の3段階に分類されている。なお、スコアが最も大きな項目はばく露期間・エンドポイント(各スコア20)である。

現性、実水域での生息状況等から個別に判断する。

毒性値の信頼性評価は、一次スクリーニングを通過した毒性試験結果全てに対して、以下の判定基準で行う。

A 信頼性が高い

国際的なテストガイドライン（別添）に準拠した試験（GLPによる試験であることが望ましい）で、ガイドラインが定める試験の妥当性基準を満たし、試験条件等の逸脱はなく、再現性のよい試験で、試験結果は科学的に信頼できる。

国あるいは公的な機関により定められたテストガイドライン（別添）あるいはそれに準じた方法で行われた試験であり、試験条件はガイドラインと一部異なるものの、試験結果の算出法等信頼性を確認するために必要な情報は揃っており、再現性のよい試験が行われ、試験結果は科学的に信頼できる。

B 条件付きで信頼できる

B1 毒性値として信頼できる

テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験では無いが、試験方法、試験結果の算出法等信頼性を確認するために必要な情報は揃っており、また、対象物質の物理化学的特性を考慮して行われているなど、試験の再現性がある（あるいは、科学的に妥当である）と判断できる。

界面活性作用のある助剤を用いる試験については、テストガイドライン（別添）またはそれに準じた方法で行われた試験であり、毒性値が試験溶液の溶解度に比べて低く、かつ、使用量はテストガイドラインの規定値未満であり、そして助剤対照区において供試生物への影響がないと判断される。

B2 毒性を示す定性情報としては信頼できる

対象生物への毒性を表していると考えられるが、毒性値の不確実性は高い。（テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験であるが、助剤濃度がOECDの試験法に関するガイダンス文書での許容濃度を超過している等、試験方法に問題がある場合が該当する。）

C 信頼性は低い

テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験であるがガイドラインの妥当性クライテリアを満たさない。

テストガイドラインの推奨種以外の種を用いた試験で、試験条件やばく露方法が当該種の我が国での生息環境（実水域）の状況から大きく逸脱している。

試験対象物質の水中安定性や物理化学的特性を考慮していないなど、試験の手順が不適切である。

D 試験の信頼性を判断できる十分な情報がない

(2) 水質目標値の検討における利用の適否

利用の適否は、信頼性が確認された毒性値(A又はB1)から、答申参考資料改訂版の内容に基づき、該当する水域と類型における毒性値の利用可能性を試験方法、エンドポイント、ばく露期間、成長段階、試験物質の観点から、下記の判断基準により行う。

A：利用できる

試験物質は水質目標値を検討する対象物質として妥当である。かつ、テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験であり、エンドポイント、ばく露期間、成長段階等は該当する水域と類型における利用に適切である(表1)。又は、テストガイドラインまたはそれに準じた方法で行われた試験でない試験であるが、用いられている条件(水温、水質等)は我が国の実水域の状況と大きな相違はなく、エンドポイント、ばく露期間、成長段階等は、該当する水域と類型における利用に適切である(表1)。

B：条件付きで利用できる

試験物質は水質目標値を検討する対象物質の一部であるが、対象そのものではない。試験生物種あるいはその成長段階が検討対象として適当か否か十分判断できない。急性影響と慢性影響の区別が明確にできない試験内容であり、水域と類型における利用には考慮が必要である。

C：利用できない

エンドポイント、ばく露期間、成長段階等が水域と類型における利用に適切でない。試験物質は水質目標項目の対象ではない。

なお、信頼性が「B1」と判定された毒性試験結果は、「A(利用できる)」とはしない。

水質目標値導出に用いることができる毒性値は、「A(利用できる)」と「B(条件付きで利用できる)」と判断されたものとする。

表1 一次スクリーニングの目安

生物等	項目	魚類	甲殻類	藻類	その他の生物
全生物	魚介類	我が国に生息している生物			
	餌生物	我が国に生息している魚類以外の生物とその同属種または通常の実験等に供される魚類以外の種類			
標準的な試験法*での推奨種	成長段階（試験魚の全長、体重等）	急性（短期）毒性） OECD 試験法等で定められた試験魚の推奨全長の 1 / 2 ~ 2 倍の範囲 例： コイ：1.5 ~ 8.0cm ヒメダカ：1.0 ~ 4.6cm ニジマス：2.5 ~ 10cm 慢性（長期）毒性）テストガイドラインに記載された成長段階	テストガイドラインに記載された成長段階 例）ミジンコ 幼体：生後 24 時間令以内 成体（未成熟個体）：ばく露期間中に産仔することがない成長段階であること	初期細胞数密度： OECD 試験法等で定められた初期細胞数密度の 5 倍以内（ばく露期間が 4 日の場合は、初期細胞数密度）	-
	試験環境（水温）	設定温度がテストガイドラインで定められた温度範囲から 3 以内の水温である 例）コイ：17 ~ 27 ヒメダカ：18 ~ 28 ニジマス：10 ~ 20	設定温度がテストガイドラインで定められた温度範囲から 3 以内の水温である 例）ミジンコ：15 ~ 25	設定温度がテストガイドラインで定められた温度範囲から 3 以内の水温である 藻類：18 ~ 27	-
	試験環境（pH）	6 ~ 9		-	-
	試験環境（DO）	飽和度で 60% 以上（ミジンコについては 3 mg/L 以上）		-	-
	エンドポイント/影響内容	参考 6【慢性影響について】に準ずる			-
	ばく露期間	参考 6【慢性影響について】に準ずる 急性（短期）毒性）48 ~ 96 時間	参考 6【慢性影響について】に準ずる 急性（短期）毒性）48 ~ 96 時間	72 ~ 96 時間	-
	密度（供試生物数）	試験物質の濃度低下が無く、DO が確保されるのであれば可	例）ミジンコ 幼体：1 頭未満/ 2 mL、成体 1 頭未満/ 4 mL	-	-

生物等	項目	魚類	甲殻類	藻類	その他の生物
	毒性値	内挿により求められた毒性値であること。			-
それ以外	成長段階	幼稚仔：仔魚期まで（Early life 試験を含む） 未成魚：稚魚期（ライフサイクル試験を含む）	テストガイドラインに記載された成長段階	初期細胞数密度：試験期間中に十分増殖できる初期細胞数密度	テストガイドラインに記載された成長段階
	試験環境（水温）	当該生物或いはその同属種の我が国での生息水温 ± 3			
	試験環境（pH）	6 ~ 9		-	6 ~ 9
	試験環境（DO）	飽和度で 60%以上		-	飽和度で 60%以上
	エンドポイント/影響内容	参考 6【慢性影響について】に準ずる			
	ばく露期間	参考 6【慢性影響について】に準ずる 急性（短期）毒性）48 ~ 96 時間	参考 6【慢性影響について】に準ずる 急性（短期）毒性）48 ~ 96 時間	72 ~ 96 時間	参考 6【慢性影響について】に準ずる
	密度	試験物質の濃度低下が無く、DO が確保されるのであれば可	試験物質の濃度低下が無く、DO が確保されるのであれば可	-	試験物質の濃度低下が無く、DO が確保されるのであれば可
	毒性値	内挿により求められた毒性値であること。			

*：ここでの標準的な試験法とは、別添に示した試験法を指す。

水生生物を用いた主な毒性試験法

基本とするガイドライン（国際的なガイドライン等）

（１）経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）

1. OECD TG201：Freshwater Alga and Cyanobacteria, Growth Inhibition Test
2. OECD TG202：Daphnia sp., Acute Immobilisation Test
3. OECD TG203：Fish, Acute Toxicity Test
4. OECD TG210：Fish, Early-life Stage toxicity Test
5. OECD TG211：Daphnia magna Reproduction Test
6. OECD TG212：Fish, Short-term Toxicity Test on Embryo and Sac-fry Stages
7. OECD TG215：Fish, Juvenile Growth Test
8. OECD TG221：Lemna sp. Growth Inhibition Test

（２）国際標準化機構（International Organization for Standardization：ISO）

9. ISO 6341：Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of Daphnia magna Straus (*Cladocera, Crustacea*) - Acute toxicity test
10. ISO 8692：Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae
11. ISO 10229：Water quality - Determination of the prolonged toxicity of substances to freshwater fish - Method for evaluating the effects of substances on the growth rate of rainbow trout [*Oncorhynchus mykiss* Walbaum (*Teleostei, Salmonidae*)
12. ISO 10253：Water quality - Marine algal growth inhibition test with *Skeletonema costatum* and *Phaeodactylum tricornutum*
13. ISO 10706：Water quality - Determination of long term toxicity of substances to *Daphnia magna* Straus (*Cladocera, Crustacea*)
14. ISO 12890：Water quality - Determination of toxicity to embryos and larvae of freshwater fish –Semi-static method
15. ISO 14442：Water quality - Guidelines for algal growth inhibition tests with poorly soluble materials, volatile compounds, metals and waste water
16. ISO 14669：Water quality - Determination of acute lethal toxicity to marine copepods (*Copepoda, Crustacea*)

（３）海生生物テストガイドライン検討会

17. 海産魚類及び海産エビ類の急性毒性試験法（案）（第１版）

参考とするガイドライン（国あるいは公的な機関により定められたテストガイドライン）

（４）経済協力開発機構（Organisation for Economic Co-operation and Development：OECD）

18. OECD TG204：Fish, Prolonged Toxicity Test

（５）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

19. 藻類生長阻害試験
20. ミジンコ急性遊泳阻害試験
21. 魚類急性毒性試験
22. ミジンコの繁殖に及ぼす影響に関する試験（ミジンコ繁殖試験）

（ 6 ） 農薬取締法

23. 魚類急性毒性試験
24. 魚類（ふ化仔魚）急性毒性試験
25. ミジンコ類急性遊泳阻害試験
26. ミジンコ類（成体）急性遊泳阻害試験
27. ミジンコ類繁殖試験
28. ナマエビ・ヌカエビ急性毒性試験
29. ヨコエビ急性毒性試験
30. コスリカ幼虫急性毒性試験
31. 藻類生長阻害試験

（ 7 ） 米国

1) Toxic Substances Control Act (TSCA) 及び Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)

- | | |
|--------------------|--|
| 32. OPPTS 850.1010 | Aquatic invetebrate acute toxicity, test, freshhwater daphnids |
| 33. OPPTS 850.1020 | Gammarid acute toxicity test |
| 34. OPPTS 850.1025 | Oyster acute toxicity test (shell deposition) |
| 35. OPPTS 850.1035 | Mysid acute toxicity test |
| 36. OPPTS 850.1045 | Penaeid acute toxicity test |
| 37. OPPTS 850.1055 | Bivalve acute toxicity test (embryo larval) |
| 38. OPPTS 850.1075 | Fish acute toxicity test, freshwater and marine |
| 39. OPPTS 850.1085 | Fish acute toxicity mitigated by humic acid |
| 40. OPPTS 850.1300 | Daphnid chronic toxicity test |
| 41. OPPTS 850.1350 | Mysid chronic toxicity test |
| 42. OPPTS 850.1400 | Fish early-life stage toxicity test |
| 43. OPPTS 850.1500 | Fish life cycle toxicity |

（ 850 シリーズに統合以前 ）

a) Toxic Substances Control Act (TSCA) :

Code of Federal Regulations Title 40 Protection of Environment

44. § 797.1050 Algal acute toxicity test.
45. § 797.1300 Daphnid acute toxicity test.
46. § 797.1330 Daphnid chronic toxicity test.
47. § 797.1400 Fish acute toxicity test.
48. § 797.1600 Fish early life stage toxicity test.
49. § 797.1930 Mysid shrimp acute toxicity test.

50. § 797.1950 Mysid shrimp chronic toxicity test.

b) Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act (FIFRA)

51. OPP 72-1 Freshwater Fish Acute-warm and coldwater species with TGAI or TEP(FIFRA 158.490)

52. OPP 72-2 Freshwater Invertebrate Acute TGAI or TEP(FIFRA 158.490)

53. OPP 72-3 Estuarine/ Marine Fish, Shellfish, Shrimp Acute using TGAI or TEP(FIFRA 158.490)

54. OPP 72-4a Freshwater or Marine/Estuarine Fish Early Life Stage Chronic Toxicity using TGAI or TEP(FIFRA 158.490)

55. OPP 72-4b Freshwater Invertebrate Life Cycle Chronic Toxicity using TGAI or TEP(FIFRA 158.490)

56. OPP 72-5 Full Fish Life Cycle TGAI(FIFRA 158.490)

* TGAI= Technical Grade Active Ingredient TEP=Typical End-Use Product

57. SEP: Acute Toxicity Test for Freshwater Invertebrates (EPA-540/9-85-005;1985)

58. SEP: Acute Toxicity Test for Freshwater Fish (EPA-540/9-85-006; 1985)

59. SEP: Fish Life-Cycle Toxicity Tests (EPA-540/9-86-137; 1986)

60. SEP: Fish Early Life-Stage Test (EPA-540/9-86-138; 1986)

61. SEP: Daphnia magna Life-Cycle (21-Day Renewal) Chronic Toxicity Test (EPA-540/9-86-141; 1986)

62. SEP: Non target Plants: Growth and Reproduction of Aquatic Plants-Tiers 1 and 2 (EPA-540/9-86-134;1986)

63. SEP: Acute Toxicity Test for Estuarine and Marine Organisms (Estuarine Fish 96-Hour Acute Toxicity) (EPA-540/9-85-009, 1985)

64. SEP: Acute Toxicity Test for Estuarine and Marine Organisms (Shrimp 96-Hour Acute Toxicity Test) (EPA-540/9-85-010, 1985).

65. SEP: Acute Toxicity Test for Estuarine and Marine Organisms (Mollusc 96-Hour Flow Through Shell Deposition Study) (EPA-540/9-85-011, 1985) /

66. SEP: Acute Toxicity Test for Estuarine and Marine Organisms (Mollusc 48-Hour Embryo Larvae Study) (EPA-540/1-85-012, 1985)

*SEP : Standard Evaluation Procedure

2) 米国材料試験協会 (American Society for Testing and Materials : ASTM)

近年公表されているガイドライン

67. E724-98 : Standard Guide for Conducting Static Acute Toxicity Tests Starting with Embryos Four Species of Saltwater Bivalve Molluscs

68. E729-96 : Standard Guid for Conducting Acute Toxicity Tests on Test Materials with Fishes, Macroinvertebrates, and Amphibians

69. E1191-97 : Standard guide for conducting life-cycle toxicity tests with saltwater rmysids

70. E1193-97 : Standard Guid for Conducting *Daphnia magna* Life-cycle Toxicity Tests

71. E1218-97a : Standard guide for conducting static 96-h toxicity tests with microalgae

72. E1241-98 : Standard guide for conducting early life-stage toxicity tests with fishes

73. E1295-01 : Standard guide for conducting three-brood, renewal toxicity test with *Ceriodaphnia dubia*

74. E1415-91 : Standard guide for conducting static toxicity tests with *Lemma gibba* G3

75. E1440-91 : Standard guide for acute toxicity test with the rotifer *Barchionus*

76. E1463-92 : Standard guide for conducting static and flow-through acute toxicity tests with mysids from the west coast of the United States
77. E1562-00 : Standard guide for conducting acute, chronic, and life-cycle aquatic toxicity tests with polychaetous annelids
78. E1563-98 : Standard guide for conducting static acute toxicity tests with echinoid embryos

(8) カナダ

79. EPS1/RM/ 9 : Biological Test Method: Acute Lethality Test Using Rainbow Trout
80. EPS1/RM/ 10 : Biological Test Method: Acute Lethality Test Using Threespine Stickleback (*Gasterosteus aculeatus*)
81. EPS1/RM/ 11 : Biological Test Method: Acute Lethality Test Using *Daphnia* spp.
82. EPS1/RM/21 : Biological Test Method: Test of Reproduction and Survival Using the Cladoceran *Ceriodaphnia dubia*
83. EPS1/RM/24 : Biological Test Method: Toxicity Test Using Luminescent Bacteria
84. EPS1/RM/25 : Biological Test Method: Growth Inhibition using a Freshwater Alga
85. EPS1/RM/26 : Biological Test Method: Acute Test for Sediment Toxicity Using Marine or Estuarine Amphipods.
86. EPS1/RM/27 : Biological Test Method: Fertilization Assay Using Echinoids(Sea Urchins and Sand Dollars)
87. EPS1/RM/28 : Biological Test Method: Toxicity Tests Using Early Life Stages of Salmonid Fish (Rainbow Trout)
88. EPS1/RM/37 : Biological Test Method: Test for Measuring the Inhibition of Growth Using the Freshwater Macrophyte, *Lemna minor*

(9) ドイツ連邦規格(Deutsche Normen)²

89. DIN 38412-11 : German standard methods for the examination of water, waste water and sludge; Test methods using water organisms (group L); Determination of the effect on microcrustacea of substances contained in water (Daphnia short-time test) (L 11)
90. DIN 38412-33: German standard methods for the examination of water, waste water and sludge; bio-assays (group L); determining the tolerance of green algae to the toxicity of waste water (*Scenedesmus* chlorophyll fluorescence test) by way of dilution series (L 33)
91. DIN 38412-37 : German standard methods for the examination of water, waste water and sludge - Bio-assays (group L) - Part 37: Determination of the inhibitory effect of water on the growth of bacteria (*Photobacterium phosphoreum* cell multiplication inhibition test) (L 37)
92. DIN EN ISO 10253 : Water quality - Marine algal growth inhibition test with *Skeletonema costatum* and *Phaeodactylum tricornerutum* (ISO 10253:2006); German version EN ISO 10253:2006
93. DIN EN ISO 10712 : Water quality - *Pseudomonas putida* growth inhibition test (*Pseudomonas* cell multiplication inhibition test) (ISO 10712:1995); German version EN ISO 10712:1995

² ドイツ連邦規格(Deutsche Normen)には、DIN(国家規格)、DIN EN(欧州規格のドイツ版)、DIN EN ISO(国家規格、欧州規格および国際規格の組合せ)、DIN ISO(DIN協会が変更を加えずに採用したISO規格)、DIN VDE(ドイツ電気技術者協会のVDE規格と全く同一内容のDIN規格)、DIN IEC(DINが変更を加えずに採用した国際電気標準会議のIEC規格)がある。


(日本貿易振興機構HPより、http://www.jetro.go.jp/world/japan/qa/export_12/04S-040009)

94. DIN EN ISO 20079 : Water quality - Determination of the toxic effect of water constituents and waste water on duckweed (*Lemna minor*) - Duckweed growth inhibition test (ISO 20079:2005); German version EN ISO 20079:2006
95. DIN EN ISO 6341 : Water quality - Determination of the inhibition of the mobility of *Daphnia magna* Straus (Cladocera, Crustacea) - Acute toxicity test (ISO 6341:1996); German version EN ISO 6341:1996
96. DIN EN ISO 7346-2 : Water quality - Determination of the acute lethal toxicity of substances to a freshwater fish [*Brachydanio rerio* Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)] - Part 2: Semi-static method (ISO 7346-2:1996); German version EN ISO 7346-2:1997
97. DIN EN ISO 8692 : Water quality - Freshwater algal growth inhibition test with unicellular green algae (ISO 8692:2004); German version EN ISO 8692:2004


(参考10) 水質目標値の導出手順について

水質目標値の導出は、専門家による科学的な妥当性の判断を踏まえて、以下の手順により行う。

手順1 水質目標値の導出に用いる無影響濃度の選定



手順2 無影響導出値（類型毎）の算出及び水質目標値の導出



(参考11)「無影響導出値(魚介類)」の算出について

「無影響導出値(魚介類)」は、種別無影響濃度*の算出に用いた試験法の種類、試験の生物種、試験結果のばらつき、生物への作用特性や対象物質の蓄積性等を総合的に勘案し算出する。

1. 無影響導出値は、それぞれの水域での代表種(ニジマス、コイまたはメダカ、マダイ)の種別無影響濃度と他種の種別無影響濃度を比較して求める。また、複数の代表種の種別無影響濃度があった場合は最小値を代表種の種別無影響濃度として採用する。
2. 種別無影響濃度が当該水域の代表種のみであった場合は、他の生物との感受性の相違(種比)として、係数「10」を適用する。
3. 代表種を含めた複数種の種別無影響濃度があり、かつ、代表種と他種の最小値の比が10未満(代表種の種別無影響濃度/他種の種別無影響濃度の最小値 $<$ 10)の場合は、代表種の種別無影響濃度に係数「10」を適用する
4. 代表種を含めた複数種の種別無影響濃度があり、かつ、代表種と他種の最小値の比が10以上(代表種の種別無影響濃度/他種の種別無影響濃度の最小値 \geq 10)の場合は、他種の種別無影響濃度の最小値に係数「1」を適用する。
5. 代表種の種別無影響濃度がなく、他種のみである場合は、さらに毒性データ等の検討を行い、専門家の判断により係数を決定する。

なお、係数については各種データが蓄積された段階で適宜見直すこととする。

(参考12) 無影響濃度(慢性影響を生じない濃度)の推定

水生生物保全に係る水質目標値の導出は、信頼できる試験より得られた慢性影響を生じない濃度(以下、「無影響濃度」という。)を捉えることを基本とするが、信頼できる毒性値が得られない場合は、原則として、参考7の「水生生物保全に係る水質環境基準の標準試験法(以下、「標準試験法」という。)」を実施して毒性値を得ることとする。

現時点で標準試験法が確立されていない場合は、参考7に示した「その他の試験法」から得られた毒性値から無影響濃度を推定する。

この判断は専門家により行うこととし、判断に際しては以下に示す事項に沿って検討を行う。

無影響濃度を推定する際には、魚介類や餌生物への毒性の作用特性を踏まえる。

「その他の試験法」から得られた毒性値から無影響濃度を推定する際には、国内外に生息する近縁種(生物分類学的に科あるいは目)の無影響濃度とその他の試験法での毒性値の比を利用することができる。

また、近縁種の毒性値が得られない場合は、「その他の試験法」で得られた毒性値を「10」で除して無影響濃度を得ることができる。