

大きな頭部以外は鮮やかなオレンジ色に染まる

ナミヘビ科 オオガシラ属 *Boiga*

ボウシオオガシラ

学名 *Boiga nigriceps*

分布 インドネシア（ジャワ島）、カンボジア、シンガポール、タイ、中国（壮族自治区より以南）、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス

全長 80~1.75m

食性 マウスなどの哺乳類や鳥類、カエル、トカゲ

頭部から頸部にかけてオリーブグリーン色でそれ以外は鮮やかな赤色やオレンジ色に染まる。オオガシラの名のとおり頭部はとて大きく猫のような眼をしている。オオガシラ属の中では比較的マウスに餌付きやすい種類

性格 気が荒い。ハンドリング不可

飼育温度 26~30℃

飼育難易度：★★★★☆ 入手難易度：★★★★☆

飼育スタイル：C

備考：本種は後牙類で生命には危険を及ぼさないが弱毒を持つため、長時間噛まれないように気をつける。2005年6月から施行される「外来生物法」により2005年3月の時点では本種は「特定外来生物」には指定されていないが「未判定外来生物」に指定されている。

である。マウスに餌付かない場合はウズラのヒナやヒヨコなどを与え、それでも餌付かない場合はヤモリやトカゲやカエルを与えてみる。本種は樹上性のヘビだが枝が細いと登らないので太い枝を設置する。

ナミヘビ科 オオガシラ属 *Boiga*

イヌバオオガシラ

学名 *Boiga cynodon*

分布 インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア

全長 80~1.75m

食性 マウスなどの哺乳類や鳥類、カエル、トカゲ

性格 気が荒い。ハンドリング不可


飼育温度 1.2~1.7m 最大 2.7m

飼育難易度：★★★★☆ 入手難易度：★★★★☆

飼育スタイル：C

備考：本種は後牙類で生命には危険を及ぼさないが弱毒を持つため、長時間噛まれないように気をつける。2005年6月から施行される「外来生物法」により2005年3月の時点では本種は「特定外来生物」には指定されていないが「未判定外来生物」に指定されている

頭部はオオガシラ属のなかでも特に大きく体色などから思わずハブと見間違えてしまうほどである。非常に気が荒い個体が多いので取り扱いには十分注意したい。マウスに餌付かない場合はウズラのヒナやヒヨコなどを与えそれでも餌付かない場合はヤモリやトカゲやカエル



気が荒く瞬時に威嚇のポーズをとる

を与えてみる。本種は樹上性のヘビだが枝が細いと登らないので太い枝を設置する。オオガシラ属は体が硬いため他の樹上性のヘビよりも広いケージで飼育したい。またケージが狭いと脱皮不全になりやすくそこから皮膚病に二次感染していく。