

「平成 16 年度から平成 18 年度の大気汚染に係る環境保健サーベイランス調査結果について」の「2. (2) ③オッズ比による検討」の「6 歳児調査における生後 3 ヶ月までの栄養方法」欄の訂正について

環境省では、本調査のオッズ比による検討において、ぜん息症状有症率についてどのような要因が関連するか検討した結果（オッズ比）を公表してきた。

今般、平成 16 年度から平成 18 年度の 6 歳児調査における「生後 3 か月までの栄養方法」のオッズ比を推定する解析プログラムに誤りあることが判明したため年度ごとに再検討した。

再検討結果（オッズ比の訂正）については以下の正誤表により示す。

ぜん息有症率に係るオッズ比による検討結果（平成 16 年度）

《誤》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	0.90
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.88 *
	母乳のみ	1.00

《正》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	1.12
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.98~0.99
	母乳のみ	1.00

ぜん息有症率に係るオッズ比による検討結果（平成 17 年度）

《誤》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	0.92
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.90~0.91
	母乳のみ	1.00

《正》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	1.08~1.09
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.98~0.99
	母乳のみ	1.00

ぜん息有症率に係るオッズ比による検討結果（平成 18 年度）

《誤》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	0.85~0.86 *
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.84~0.85 *
	母乳のみ	1.00

《正》

		6 歳児調査
生後 3 か月までの	ミルクのみ	1.17~1.18 *
栄養方法	混合(母乳とミルク)	0.99
	母乳のみ	1.00