

特定農薬（特定防除資材）として指定された資材（天敵以外）に関して情報提供すべき留意事項の内容（案）

改正後の告示において規定する各資材（天敵を除く。）の範囲及び参考となる対象病害虫等、使用方法及び使用する際の注意点は別紙 1 から別紙 5 のとおりとする。

## 1 エチレンの範囲について

労働安全衛生規則（昭和47年律第57号）第24条の14に則った表示又は工業標準化法（昭和24年法律第185号）第11条に基づく日本工業規格（以下「JIS」という。）Z7253に規定する安全データシート（SDS）等により製品規格が確認できるもの（エチレンとその他の化学物質との混合物を除く。）

## 2 参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点

品目	種類	薬効が認められる対象病虫害等	参考となる使用方法	使用する際の注意点等
エチレン	発芽抑制剤及び成長促進剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ばれいしょの萌芽抑制</li> <li>・バナナ、キウイフルーツ等の果実の追熟促進</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ばれいしょ：エチレン濃度 4～20ppm、貯蔵期間中、常時所定の濃度を保つ（貯蔵庫内の温度は 8 程度）。</li> <li>・バナナ：エチレン濃度 300～1,000ppm、処理時間 24 時間（貯蔵庫内の温度は 13～19 程度）。</li> <li>・キウイフルーツ：エチレン濃度 10ppm 程度、処理時間 10～12 時間程度（貯蔵庫内の温度は 15～20 程度）。</li> </ul> （使用場所はいずれの作物も貯蔵庫内）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・エチレンやエチレンの入ったボンベを取扱う際には、他法令（高圧ガス保安関係法令、労働安全衛生法令等）による規制を遵守すること。</li> </ul>

1 次亜塩素酸水（塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限る。以下「電解次亜塩素酸水」という。）の範囲について

次に掲げる水溶液であって、pH 6.5以下、有効塩素10～60 mg/kgのものとする。

- 一 0.2%以下の塩化カリウム水溶液（99%以上の塩化カリウムを飲用適の水に溶解したものを）を有隔膜電解槽（隔膜で隔てられた陽極及び陰極により構成されたものをいう。）内で電気分解して、陽極側から得られる水溶液
- 二 2～6%の塩酸を無隔膜電解槽（隔膜で隔てられていない陽極及び陰極により構成されたものをいう。）内で電気分解し、飲用適の水で希釈して得られる水溶液

2 参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点

品目	種類	薬効が認められる対象病害	参考となる使用方法	使用する際の注意点等
電解次亜塩素酸水	殺菌剤（散布用）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・きゅうりのうどんこ病</li> <li>・いちごの灰色かび病</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生成直後の電解次亜塩素酸水を 200 L/10a 散布。</li> <li>・生成直後の電解次亜塩素酸水を 1.5～2 L/株 散布。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・電解次亜塩素酸水中の有効塩素は、時間の経過とともに減少し、有害物質である亜塩素酸や塩素酸が生成されるので、使用の度に製造し、製造後は速やかに使用すること。</li> <li>・有隔膜電解槽を用いて電解次亜塩素酸水を生成する際に発生する陰極側の水溶液の排水処理は、日本電解水協会で作成予定の使用マニュアル等を参考に、他法令を踏まえ適切に実施すること。</li> <li>・酸性の強い電解次亜塩素酸水を使用すると農作物に酸焼けが生じたり、皮膚等に刺激が生じる事例が分かっているので、日本電解水協会で作成予定の電解次亜塩素酸水の使用マニュアルに従って使用すること。</li> </ul>

電解次亜塩素酸水については、別途パブリックコメントを実施（本年10月21日～11月19日）。

## 1 焼酎の範囲について

酒税法（昭和28年法律第6号）第3条第9号に規定する「連続式蒸留しようちゆう」及び同条第10号に規定する「単式蒸留しようちゆう」であって、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（昭和28年法律第7号）に則った表示がされたもの

## 2 参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点

品目	種類	薬効が認められる対象病虫害等	参考となる使用方法	使用する際の注意点等
焼酎	殺虫剤及び殺菌剤（散布用）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・きゅうりのうどんこ病</li> <li>・きゅうり、トマト、なし、もものアブラムシ等病虫害全般</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・アルコール分 0.4%<sup>(注)</sup>程度に薄めたものを 100 ~ 500L/10a 散布。</li> <li>食酢、糖類と混合したものを使用している事例もある。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・有害な成分が抽出されるおそれがあるので、食用に供しない物を漬け込んだ焼酎の使用はさけること。</li> </ul>

（注）アルコール分の単位である「度」 = 「%」

## 1 重曹の範囲について

- 一 食品、添加物等の規格基準（昭和34年12月28日厚生省告示第370号）に適合する炭酸水素ナトリウム、重炭酸ナトリウム又は重炭酸ソーダであって、食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令（平成23年内閣府令第45号）に則った表示がされたもの
- 二 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和51年農林省令第35号）に適合する炭酸水素ナトリウムであって、同令に則った表示がされたもの
- 三 薬事法（昭和35年法律第145号）に基づく日本薬局方（平成23年3月24日厚生労働省告示第65号）医薬品各条に規定する炭酸水素ナトリウム、重曹又は重炭酸ナトリウムであり、同法及び同告示に則った表示がされたもの
- 四 雑貨工業品品質表示規程（平成9年12月1日通商産業省告示第672号）に則った表示がされた住宅又は家具用の洗剤であって主要な成分が炭酸水素ナトリウム、重曹又は重炭酸ナトリウムであることが確認できるもの
- 五 JIS K8622に規定する「炭酸水素ナトリウム（試薬）」であって、同規格に則った表示がされたもの
- 六 JIS Z7253に規定する安全データシート（SDS）その他の表示により製品規格が確認できるもの

## 2 参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点

品目	種類	薬効が認められる対象病害虫等	参考となる使用方法	使用する際の注意点等
重曹	殺菌剤（散布用）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 野菜類、ばら、ホップの灰色かび病</li> <li>・ 野菜類、ばら、ホップのうどんこ病</li> <li>・ 野菜類のさび病</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 重曹濃度 0.1%程度に薄めたものを 150 ~ 500L/10a 散布。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ にがうりに使用する場合、えらぶ、か交5号、チャンピオン、久留米百成2号又は吉田系の品種では、薬害が生じた事例がある。</li> </ul>

（注）登録農薬である炭酸水素ナトリウム剤の登録内容を参考に「薬効が認められる対象病害等」を記載。

## 1 食酢の範囲について

農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律（昭和25年法律第175号）第19条の13に基づく「加工食品品質表示基準（平成12年3月31日農林水産省告示第513号）」及び「食酢品質表示基準（平成12年12月19日農林水産省告示第1668号）」に則った表示がされたもの

## 2 参考となる対象病害、使用方法及び使用する際の注意点

品目	種類	薬効が認められる対象病害虫等	参考となる使用方法	使用する際の注意点等
食酢	殺菌剤 （種子消毒用）	・ 稲のもみ枯細菌病 ばか苗病 ごま葉枯病	・ 酸度 0.1～0.25%程度に薄めたものに 24 時間もみを浸漬。  焼酎、糖類と混合したものを使用している事例もある。	・ 有害な成分が抽出されるおそれがあるので、食用に供しない物を漬け込んだ食酢の使用はさけること。

（注）過去登録のあった酢酸液剤の登録内容を参考に「薬効が認められる対象病害等」を記載。