


水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

カフェンストロール

. 評価対象農薬の概要

1. 物質概要

化学名	N, N - ジエチル - 3 - メシチルスルホニル - 1 H - 1, 2, 4 - トリアゾール - 1 - カルボキサミド				
分子式	C ₁₆ H ₂₂ N ₄ O ₃ S	分子量	350.4	CAS NO.	125306-83-4
構造式					

2. 開発の経緯等

カフェンストロールは、超長鎖脂肪酸生合成阻害作用により雑草を枯死させるトリアゾール環骨格を有する除草剤であり、本邦では現在水稻及び芝に対して適用がある。

原体の国内生産量は、104.1 t (18年度)、90.0 t (19年度)、112.0 t (20年度)であった。

年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧-2009-（（社）日本植物防疫協会）

3. 各種物性等

外観・臭気	白色針状結晶、無臭	土壌吸着係数	$K_{F^{ads}OC} = 350 \sim 7690$ (25)
密度	1.30 g/cm ³ (30)	オクタノール / 水分配係数	$\log P_{ow} = 3.21$ (20)
融点	117.5 ~ 119.3		
沸点	測定不能 (320 で固化)	生物濃縮性	112 (計算値)
蒸気圧	1.013×10^{-4} Pa (25)	水溶解度	2.5 mg/L (20)

. 安全性評価

許容一日摂取量（ADI）	0.003 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 20 年 2 月 21 日付で、カフェンストロールの ADI を 0.003 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値はイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量0.3 mg/kg体重/日を安全係数100で除して設定された。</p>	

. 水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

水田使用及び非水田使用のいずれの場面においても使用されるため、それぞれの使用場面について水濁 PEC を算出し、両者を合算する。

（ 1 ）水田使用時の水濁 PEC

水濁 PEC が最も高くなる以下の使用方法の場合について、以下のパラメーターを用いて算出する。

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	6 %水和剤 50 %水和剤 3 %粒剤 1 %粒剤 7.5 %ジャンボ剤	I ：単回の農薬使用量（有効成分 g /ha）	300
使用場面	水田	N_{app} ：総使用回数（回）	1
適用作物	水稻	A_p ：農薬使用面積（ha）	50
農薬使用量	500 mL/10a 60 g/10a 1 kg/10a 3 kg/10a 10 個(400g)/10a		
総使用回数	1 回		
地上防除 /航空防除	地 上		
施 用 法	～ 灌水散布 パック投げ入れ		

(2) 非水田使用時の水濁 PEC

水濁 PEC が最も高くなる以下の使用方法の場合について、以下のパラメーターを用いて算出する。

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	50 %水和剤	I : 単回の農薬使用量(有効成分 g/ha)	2000
使用場面	非水田	N_{app} : 総使用回数(回)	2
適用作物	日本芝	A_p : 農薬使用面積(ha)	37.5
農薬使用量	400 g/10a		
総使用回数	2回		
地上防除/航空防除	地 上		
施 用 法	全面土壌散布		

(3) 水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC _{Tier1} (mg/L)
水田使用時	0.0039936 ...
非水田使用時	0.0000681 ...
うち地表流出寄与分	0.0000679 ...
うち河川ドリフト寄与分	0.0000002 ...
合 計 ¹⁾	0.00406 ... ≒ <u>0.0041 (mg/L)</u>

¹⁾ 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

総合評価

1. 水質汚濁に係る登録保留基準値（案）

公共用水域の水中における予測濃度 に対する基準値	0.007 mg/L
以下の算出式により登録保留基準値を算出した。 ¹⁾	
$0.003 \text{ (mg/kg 体重/日)} \times 53.3 \text{ (kg)} \times 0.1 / 2 \text{ (L/人/日)} = 0.0079\dots \text{ (mg/L)}$ <p style="text-align: center;">ADI 平均体重 10%配分 飲料水摂取量</p>	

¹⁾ ADI及びその根拠試験であるイヌを用いた1年間慢性毒性試験における無毒性量の有効数字桁数がともに1桁であることから、登録保留基準値は有効数字1桁とし、2桁目を切り捨てて算出した。

<参考> 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 ¹⁾	0.08 mg/L
水質要監視項目 ²⁾	なし
水質管理目標設定項目 ³⁾	0.008 mg/L
ゴルフ場暫定指導指針 ⁴⁾	0.07 mg/L
WHO飲料水水質ガイドライン ⁵⁾	なし

¹⁾ 平成17年8月3日改正前の「農薬取締法第3条第1項第4号から第7号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和46年3月2日農林省告示346号）第4号に基づき設定された基準値。

²⁾ 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

³⁾ 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値。

⁴⁾ 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針について」（平成2年5月24日付け環水土77号環境庁水質保全局長通知）において設定された指針値。平成22年3月12日開催の中央環境審議会土壤農薬部会農薬小委員会における指針値案を示す（参考資料12を参照）。

⁵⁾ Guidelines for Drinking-water Quality (First addendum to 3rd edition)

2. リスク評価

水濁 $PEC_{Tier1} = 0.0041 \text{ (mg/L)}$ であり、登録保留基準値 0.007 (mg/L) を下回っている。

3. 農薬理論最大摂取量と対 ADI 比

農薬理論最大摂取量 (mg/人/日) ¹⁾		備考				
食品経由 ²⁾	小計 0.0225 mg					
水質経由	飲料水 0.014 mg	0.007 mg/L × 2L/人/日 (基準値案) (飲料水摂取量)				
農薬理論最大摂取量 0.0365 mg						
ADI (mg/人/日) ³⁾ 0.1599 mg						
対 ADI 22.8 %						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">(うち食品経由)</td> <td style="border: 1px dashed black;">14.1 %</td> </tr> <tr> <td style="border: 1px dashed black;">(うち水質経由)</td> <td style="border: 1px dashed black;">8.8 %</td> </tr> </table>		(うち食品経由)	14.1 %	(うち水質経由)	8.8 %	
(うち食品経由)	14.1 %					
(うち水質経由)	8.8 %					

¹⁾ 表中の数値の一部は、計算過程において算出された値を機械的に記載したものであり、必ずしも有効数字桁数に対応した数値ではない。

²⁾ 食品規格については、各食品群毎の基準値を基に算出した理論最大摂取量を示す。

³⁾ 平均体重 53.3 kg で計算。