

平成17年度 SO₄²⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	45.6	14.5	22.7	19.9	15.3	12.9	37.7	53.8	26.4	39.8	30.8	83.4	27.9	497	1.6
札幌	67.1	26.6	22.9	14.8	10.4	10.9	29.7	18.5	18.3	27.4	27.7	41.5	22.8	147	6.8
落石岬	31.3	28.4	14.0	13.5	16.6	20.8	20.0	40.1	26.5	*	151	42.6	23.9	406	5.3
竜飛岬	78.5	58.1	28.0	14.1	17.6	23.9	19.3	136	93.1	70.9	104	64.7	31.6	626	4.0
八幡平	55.8	17.3	8.3	13.1	11.6	12.1	8.7	32.6	10.0	21.4	24.0	36.0	19.1	154	0.5
籠岳	32.2	40.9	29.5	20.5	23.2	8.8	7.4	31.1	17.2	12.9	24.2	19.3	21.3	202	1.8
尾花沢	49.5	40.4	8.6	16.8	12.2	11.3	7.1	23.9	16.7	21.2	21.9	24.0	18.5	161	2.6
筑波	72.8	19.4	26.7	15.3	16.9	14.6	12.3	24.2	31.9	15.0	12.4	17.4	17.1	181	2.9
赤城	73.6	30.1	18.8	13.0	*	*	*	20.5	31.5	*	32.1	19.0	21.0	189	0.6
小笠原	13.7	9.7	12.1	25.4	9.5	16.9	7.2	8.0	28.9	19.2	4.2	12.4	12.5	123	0.6
佐渡関岬	40.3	46.9	22.6	19.2	9.7	15.8	17.5	49.8	51.9	69.2	146	69.8	31.2	1370	2.7
新潟巻	40.3	34.8	14.5	20.5	19.3	22.2	16.5	48.1	42.5	43.4	44.9	45.2	30.8	342	4.5
八方尾根	62.5	25.7	5.5	7.2	10.8	7.3	7.0	22.3	12.4	14.5	18.7	31.3	13.3	255	0.4
越前岬	36.9	18.8	13.3	19.1	21.1	9.8	19.9	46.6	58.7	57.9	52.7	43.1	37.3	280	0.5
伊自良湖	31.8	34.0	8.6	24.6	21.1	25.4	13.1	15.8	25.0	27.4	11.7	28.9	20.0	207	4.3
犬山	30.2	25.1	14.6	19.9	21.4	9.9	16.9	18.2	10.7	12.1	10.7	30.4	18.7	395	3.0
潮岬	18.6	19.5	17.6	40.8	42.4	98.4	18.2	18.0	28.5	19.5	21.7	35.6	23.8	282	0.0
京都八幡	17.4	30.0	11.6	24.1	23.4	14.1	18.1	17.3	16.0	*	*	*	21.2	117	5.2
尼崎	14.8	32.1	22.1	26.4	20.6	9.6	14.0	12.8	31.8	9.3	15.0	29.7	20.7	303	2.4
倉橋島	17.8	22.4	33.0	27.5	14.8	11.5	23.1	14.4	55.3	13.7	26.4	33.0	21.9	109	3.8
隠岐	60.7	24.4	11.9	26.0	20.9	15.5	87.9	47.6	142	58.6	68.5	70.4	53.0	619	2.2
蟠竜湖	19.9	31.1	16.0	15.4	13.6	10.4	48.9	24.3	81.1	22.4	39.7	76.5	28.4	730	5.3
栲原	16.6	8.9	13.0	22.4	14.5	3.4	19.3	9.0	29.2	10.4	14.2	29.0	12.2	192	0.7
筑後小郡	15.4	25.0	27.9	*	15.1	7.8	34.7	23.3	108	23.5	24.7	55.3	25.6	333	1.5
大分久住	7.7	65.1	27.8	16.8	19.5	9.9	16.4	14.5	58.7	3.5	28.7	39.6	19.9	153	1.1
対馬	*	*	13.6	37.4	28.0	19.7	47.1	18.0	50.5	*	16.1	41.2	25.9	164	1.2
五島	25.7	24.0	18.8	34.3	*	147.3	32.6	40.9	80.3	26.7	15.1	36.5	33.4	320	4.9
えびの	15.1	21.7	12.1	24.3	14.9	1.4	7.7	19.6	40.1	27.4	18.7	23.3	17.1	374	0.0
屋久島	19.3	27.6	7.4	17.0	14.3	22.2	16.7	29.6	62.9	25.6	26.1	21.9	21.0	155	4.4
辺戸岬	32.8	19.7	7.4	17.1	12.4	326	22.5	21.9	88.8	41.4	31.1	21.3	30.9	1290	2.6
最大値 ¹⁾	78.5	65.1	33.0	40.8	42.4	326	87.9	136	142	70.9	151	83.4	53.0	1370	6.8
最小値 ¹⁾	7.7	8.9	5.5	7.2	9.5	1.4	7.0	8.0	10.0	3.5	4.2	12.4	12.2	109.3	0.0
全国平均	36.0	28.4	17.0	20.9	17.5	31.7	22.3	30.0	45.8	28.2	36.6	38.7	24.1		
標準偏差	20.9	12.7	7.6	7.5	6.8	63.8	16.9	23.8	32.1	18.5	36.7	18.8	8.3		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 nss-SO₄²⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	27.9	12.7	21.7	18.7	14.4	8.2	28.3	19.0	7.3	23.0	13.8	56.3	16.4	459	0.7
札幌	52.7	24.3	22.7	14.4	10.2	8.8	14.3	11.1	8.7	15.1	16.8	30.6	16.4	144	6.1
落石岬	16.0	20.9	12.3	10.6	14.7	6.1	4.5	8.5	4.9	*	35.1	17.6	11.3	145	0.0
竜飛岬	64.9	31.9	25.2	11.2	14.9	14.5	13.3	11.1	11.3	25.8	55.2	30.5	17.9	235	0.0
八幡平	54.4	16.6	8.3	13.0	11.5	11.5	7.6	21.9	7.5	17.8	21.7	34.0	17.2	150	0.5
籠岳	31.5	39.8	29.4	19.3	22.4	8.5	7.1	28.5	11.8	11.3	17.4	17.8	19.9	190	1.8
尾花沢	46.7	39.9	8.5	16.6	12.0	10.9	6.6	20.2	8.5	14.0	17.6	20.8	15.3	154	2.5
筑波	72.1	18.1	26.5	14.6	16.4	14.0	11.5	23.0	31.3	14.3	9.3	16.0	16.1	176	2.7
赤城	72.7	29.8	18.6	12.7	*	*	*	20.2	31.0	*	31.6	18.2	20.6	185	0.6
小笠原	11.1	8.3	10.8	11.0	8.2	1.0	2.8	3.9	15.0	11.1	1.4	8.0	7.1	86.6	0.0
佐渡関岬	33.3	39.1	16.7	16.8	8.1	10.2	11.1	35.7	10.5	26.7	36.2	55.7	17.8	365	0.0
新潟巻	35.2	33.1	11.6	19.6	16.7	20.5	11.2	30.9	13.4	33.8	32.5	38.9	21.4	204	1.9
八方尾根	61.4	25.5	5.4	7.1	10.7	7.2	6.9	19.8	11.4	14.2	18.3	30.2	12.9	248	0.4
越前岬	34.0	17.3	12.7	18.3	17.9	6.3	12.7	35.3	14.6	30.3	31.5	28.4	21.0	268	0.0
伊自良湖	31.2	33.2	8.5	24.3	20.8	24.1	12.6	15.4	22.0	22.6	11.3	28.0	19.4	205	4.2
犬山	29.5	24.3	14.3	19.8	21.1	8.7	16.2	17.6	8.6	11.1	10.3	29.4	18.2	391	2.0
潮岬	15.9	15.8	13.9	32.2	35.7	88.6	16.1	12.5	24.9	14.4	9.2	19.0	17.0	262	0.0
京都八幡	16.8	29.4	11.4	23.7	23.0	13.4	17.2	16.3	13.0	*	*	*	20.6	116	5.1
尼崎	14.0	31.3	21.5	25.8	20.2	8.9	13.4	12.5	27.4	9.0	14.7	28.7	20.0	295	2.2
倉橋島	13.6	21.4	31.8	27.0	14.4	5.9	22.4	14.0	46.3	13.2	25.8	32.3	20.0	107	3.0
隠岐	45.8	21.5	10.1	23.9	19.5	8.4	18.6	22.2	20.4	25.7	28.0	40.2	19.9	204	2.0
蟠竜湖	19.0	29.4	15.7	14.8	12.9	7.5	39.6	21.2	47.9	12.0	31.2	65.8	23.5	693	1.6
梶原	15.8	8.7	12.7	22.2	14.2	1.5	17.6	8.9	19.2	9.5	12.2	27.5	10.6	188	0.7
筑後小郡	14.8	24.5	27.8	*	14.7	7.4	30.6	22.5	75.2	20.8	22.5	51.0	22.9	270	0.8
大分久住	7.6	64.7	26.9	16.1	19.2	9.8	16.1	14.3	52.1	3.2	28.4	39.0	19.3	151	1.0
対馬	*	*	12.7	33.3	26.1	1.5	43.6	16.1	41.9	*	12.8	38.9	21.2	164	0.0
五島	18.1	12.4	11.1	32.3	*	140	30.6	35.7	42.7	18.4	12.9	31.3	24.0	314	4.1
えびの	14.5	21.2	11.5	23.2	14.6	1.1	7.4	18.5	27.4	26.2	16.9	22.6	16.0	354	0.0
屋久島	17.6	24.4	6.1	14.4	13.0	9.4	13.3	21.8	31.9	18.0	21.6	15.3	14.7	108	2.2
辺戸岬	20.2	14.3	4.1	11.5	7.9	1.5	10.2	12.6	17.8	7.3	9.4	10.0	9.4	284	0.0
最大値 ¹⁾	72.7	64.7	31.8	33.3	35.7	140	43.6	35.7	75.2	33.8	55.2	65.8	24.0	693	6.1
最小値 ¹⁾	7.6	8.3	4.1	7.1	7.9	1.0	2.8	3.9	4.9	3.2	1.4	8.0	7.1	86.6	0.0
全国平均	31.3	25.3	15.7	18.9	16.3	16.1	16.0	19.0	23.5	17.3	20.9	30.4	17.6		
標準偏差	19.4	11.6	7.7	6.9	6.1	28.6	10.0	8.1	16.7	7.6	11.3	14.0	4.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 NO₃⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	22.3	10.9	24.4	17.8	8.3	5.5	23.9	17.0	4.7	12.7	13.1	80.9	13.8	1030	0.5
札幌	34.2	22.8	18.9	7.3	8.4	6.4	11.8	8.9	7.7	10.8	16.7	25.9	12.8	110	2.7
落石岬	15.7	16.1	13.8	7.5	8.0	7.6	4.1	9.5	7.2	*	58.4	21.7	10.3	262	0.0
竜飛岬	88.9	45.4	29.0	7.8	16.1	11.8	17.7	24.4	24.7	36.1	62.9	38.6	20.4	588	1.8
八幡平	48.0	15.0	5.5	8.1	6.0	10.8	9.3	22.3	15.6	23.3	21.1	29.9	15.2	277	0.4
籠岳	24.3	43.2	29.3	14.8	19.4	8.7	9.9	20.5	11.0	21.0	25.9	18.3	18.7	155	2.3
尾花沢	39.2	37.6	9.9	12.5	10.2	11.5	7.1	15.8	8.1	14.4	16.6	17.2	13.9	129	2.4
筑波	75.6	21.1	36.6	17.5	13.8	28.3	16.5	17.9	29.6	20.7	13.7	22.3	19.1	267	1.5
赤城	89.3	46.8	27.7	16.1	*	*	*	14.2	52.1	*	45.9	36.7	27.7	286	0.8
小笠原	2.9	3.3	1.4	2.0	5.2	0.9	4.9	2.5	9.2	8.1	4.4	8.9	3.2	122	0.0
佐渡関岬	36.5	55.3	19.1	16.9	7.4	14.3	15.2	35.6	10.2	28.6	49.3	59.5	20.0	641	1.4
新潟巻	35.8	35.7	11.6	17.1	20.9	18.1	15.5	33.0	16.6	28.0	27.3	43.5	22.9	220	3.0
八方尾根	45.6	19.2	4.2	5.3	8.5	7.6	5.5	16.6	9.6	5.9	14.0	36.2	10.6	337	0.0
越前岬	48.0	17.2	16.9	15.0	20.2	11.1	13.3	45.6	17.9	31.5	31.3	23.9	22.9	293	0.0
伊自良湖	29.1	39.4	13.1	33.6	24.4	37.1	22.0	13.1	30.6	21.4	12.0	27.1	23.6	266	3.8
犬山	41.1	35.3	25.3	22.6	37.4	10.6	22.6	12.6	16.3	15.1	11.3	27.1	25.4	439	0.0
潮岬	14.5	8.9	6.5	15.7	13.8	50.5	21.5	14.9	20.9	14.6	9.9	15.9	12.5	193	0.0
京都八幡	34.6	33.5	19.6	27.7	34.3	26.5	31.3	37.8	21.3	*	*	*	29.8	227	7.2
尼崎	16.0	33.1	22.5	23.7	28.0	11.4	19.6	16.2	43.6	10.9	16.3	30.0	22.2	229	2.6
倉橋島	11.7	20.0	19.0	18.3	21.6	3.5	35.8	18.9	114	16.8	27.1	27.2	17.6	163	0.0
隠岐	76.9	29.9	12.6	18.9	18.3	6.8	21.6	36.3	31.7	27.5	22.5	47.6	22.5	517	0.2
蟠竜湖	16.8	30.9	11.6	13.0	17.1	7.6	57.4	30.4	83.5	14.0	26.6	66.9	25.1	529	2.1
栲原	13.0	6.2	7.7	13.0	8.4	0.4	16.2	6.5	39.3	10.0	11.2	24.9	8.9	163	0.0
筑後小郡	13.5	23.2	25.6	*	14.9	11.2	49.7	23.2	169	34.5	24.8	34.9	27.4	475	2.4
大分久住	3.8	24.6	14.1	9.3	10.5	2.8	11.9	7.8	77.0	3.5	8.8	24.8	11.3	93.9	0.3
対馬	*	*	11.7	30.1	26.9	2.6	54.6	11.1	33.7	*	18.2	28.2	19.4	83.5	1.0
五島	16.6	12.6	7.2	28.3	*	82.9	33.2	35.4	49.8	17.4	11.8	24.8	23.3	360	2.8
えびの	8.1	12.6	5.4	15.4	7.4	0.9	6.3	11.1	24.4	10.1	9.7	13.4	9.6	541	0.0
屋久島	16.7	21.9	4.8	9.7	11.4	12.8	13.4	22.2	23.2	13.4	18.6	7.7	12.5	141	1.8
辺戸岬	15.8	10.6	3.5	3.6	8.8	21.6	10.3	12.4	18.7	6.1	11.0	11.5	9.2	251	0.5
最大値 ¹⁾	89.3	55.3	36.6	33.6	37.4	82.9	57.4	45.6	169	36.1	62.9	80.9	29.8	1030	7.2
最小値 ¹⁾	2.9	3.3	1.4	2.0	5.2	0.4	4.1	2.5	4.7	3.5	4.4	7.7	3.2	83.5	0.0
全国平均	32.2	25.2	15.3	15.5	15.6	14.9	20.1	19.8	34.0	17.5	22.1	30.2	17.7		
標準偏差	24.4	13.4	9.2	8.0	8.6	17.2	14.3	10.7	35.6	9.1	14.8	16.7	6.7		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 Cl⁻濃度 月・年平均値単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	335	30.8	16.2	23.7	16.9	91.3	182	673	370	315	326	520	221	4980	1.6
札幌	283	43.3	6.7	11.0	6.8	42.3	316	142	190	238	210	214	126	1220	3.9
落石岬	268	153	33.3	54.7	33.6	266	298	602	413	*	2170	461	235	6820	8.4
竜飛岬	268	540	43.1	57.6	46.9	183	114	2420	1410	801	920	620	261	10300	3.0
八幡平	23.0	16.0	2.6	3.1	3.0	11.9	22.1	196	48.7	66.5	43.0	34.2	35.1	1850	0.5
籠岳	16.2	26.5	3.8	25.6	18.7	9.0	9.6	53.2	100	20.0	139	28.1	31.0	1010	0.5
尾花沢	48.3	11.7	3.0	2.4	3.4	6.8	8.0	73.7	163	143	85.1	61.4	63.9	505	0.8
筑波	17.9	27.6	8.6	16.1	10.7	11.7	15.8	21.8	12.5	14.9	60.5	26.0	18.8	1280	2.0
赤城	34.4	14.0	8.2	3.0	*	*	*	9.6	16.5	*	12.8	12.2	8.0	144	0.4
小笠原	57.7	28.8	26.3	272	26.0	325	81.6	78.0	279	153	53.5	84.6	109	2270	6.3
佐渡関岬	135	151	117	50.6	29.3	107	119	270	799	822	2100	254	257	25300	3.5
新潟巻	96.9	36.0	53.0	18.2	46.4	32.4	102	333	566	185	238	119	181	5270	2.6
八方尾根	19.4	4.5	2.0	1.6	2.2	2.6	2.3	54.5	21.2	7.0	13.2	21.0	8.4	445	0.7
越前岬	46.4	24.1	11.0	14.8	53.8	60.5	124	203	856	496	396	267	308	2600	1.6
伊自良湖	12.3	16.9	2.8	7.2	7.9	25.3	11.1	8.3	62.6	96.2	10.3	19.5	12.3	106	1.6
犬山	11.4	12.6	8.8	7.2	7.4	23.4	11.6	8.5	41.2	19.8	6.4	16.8	12.2	163	0.3
潮岬	49.9	71.2	77.8	180	124	199	36.8	113	70.1	99.6	254	293	131	1380	3.5
京都八幡	13.5	13.1	7.6	9.0	8.8	15.6	18.4	23.1	63.4	*	*	*	13.3	107	3.2
尼崎	15.5	14.2	13.9	12.3	8.3	13.4	11.0	5.1	87.2	9.1	6.4	18.1	13.7	641	1.6
倉橋島	76.4	20.0	27.8	11.1	9.0	138	15.4	8.7	177	11.6	13.5	13.5	43.0	442	1.9
隠岐	268	48.2	29.5	33.9	24.7	125	1340	458	2350	583	732	556	627	7250	3.6
蟠竜湖	19.9	35.6	6.5	11.3	15.3	57.4	176	63.0	685	194	164	198	96.3	891	3.3
栲原	16.0	4.9	6.3	3.6	7.0	35.8	34.9	2.1	194	16.3	36.8	28.9	31.1	793	0.8
筑後小郡	16.3	18.3	14.6	*	14.3	13.4	88.9	15.5	711	60.1	45.9	88.0	60.5	5350	3.2
大分久住	10.0	67.1	21.0	11.6	8.8	7.1	10.1	10.3	136	5.2	9.6	14.0	13.6	257	2.5
対馬	*	*	18.4	60.1	29.8	327	70.1	27.1	151	*	59.0	42.8	81.1	550	3.7
五島	135	212	130	38.6	*	125	38.8	89.7	675	149	40.5	91.5	169	2550	7.5
えびの	10.7	9.7	9.4	20.2	8.3	6.1	4.6	20.8	241	22.0	32.7	14.1	20.5	1720	0.5
屋久島	32.2	58.6	26.2	48.0	24.6	238	63.9	151	600	145	89.2	127	120	1970	8.2
辺戸岬	225	106	64.9	112	85.7	8180	227	167	1370	644	411	217	463	38100	13.5
最大値 ¹⁾	335	540	130	272	124	8180	1340	2420	2350	822	2170	620	627	38100	13.5
最小値 ¹⁾	10.0	4.5	2.0	1.6	2.2	2.6	2.3	2.1	12.5	5.2	6.4	12.2	8.0	106	0.3
全国平均	88.3	62.6	26.7	38.6	24.3	368	123	210	429	204	299	154	126		
標準偏差	103	105	32.4	58.7	27.2	1506	250	452	526	251	554	180	146		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 NH₄⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	27.6	14.7	30.8	32.4	14.4	10.4	33.7	28.2	7.9	23.0	17.2	65.5	19.8	426	0.5
札幌	56.0	35.4	37.3	22.3	13.0	13.2	23.9	16.2	16.2	20.9	24.9	40.3	23.3	187	8.2
落石岬	15.1	17.1	20.2	6.2	2.3	9.2	3.4	7.7	6.8	*	76.3	18.9	9.3	1420	0.0
竜飛岬	83.5	24.5	23.2	12.6	11.0	11.7	16.2	23.3	12.2	16.1	45.0	35.6	17.3	199	0.3
八幡平	65.9	17.3	15.8	18.8	14.5	13.2	8.9	26.1	10.0	15.6	21.4	39.6	21.2	218	0.1
籠岳	26.5	38.9	32.2	20.7	18.7	8.8	7.2	26.6	13.6	13.2	21.1	22.6	20.3	217	1.6
尾花沢	47.2	45.4	12.5	28.8	11.8	10.4	5.7	21.0	7.9	12.5	17.2	26.8	17.0	170	2.2
筑波	112	21.9	47.4	21.3	20.5	36.4	16.8	25.1	37.2	14.4	10.8	26.1	23.0	229	2.4
赤城	133	54.6	37.6	16.0	*	*	*	15.2	53.8	*	67.8	45.8	34.1	487	0.0
小笠原	4.2	2.5	1.3	3.5	4.3	3.4	4.0	3.6	9.2	8.8	2.5	10.3	3.6	118	0.2
佐渡関岬	47.7	58.6	17.3	18.2	5.4	8.8	11.2	37.7	8.9	19.4	36.8	49.9	17.8	502	0.3
新潟巻	37.9	37.0	14.4	27.7	18.8	19.8	12.2	31.1	10.6	30.4	28.1	43.1	22.3	281	3.0
八方尾根	65.9	23.7	5.3	8.4	9.4	7.2	4.6	16.9	8.0	9.0	14.0	29.6	12.0	370	0.2
越前岬	35.9	17.5	14.4	22.0	12.3	8.9	15.5	38.8	17.1	30.8	32.1	34.3	23.4	332	0.0
伊自良湖	37.2	37.9	12.3	31.4	22.0	27.5	10.9	8.0	22.2	41.7	14.8	28.6	22.0	254	3.4
犬山	31.7	24.7	30.3	35.3	30.9	21.0	26.9	13.5	15.1	11.8	14.8	31.2	26.6	461	5.1
潮岬	12.0	8.6	3.9	16.0	58.8	54.4	8.8	10.4	12.2	9.0	8.3	14.6	12.1	478	0.2
京都八幡	25.3	34.5	19.4	35.8	24.2	18.9	18.1	22.0	24.9	*	*	*	26.9	170	8.0
尼崎	21.9	37.8	18.0	30.0	15.5	7.0	19.0	11.3	28.4	11.1	13.1	22.4	20.7	161	3.4
倉橋島	16.2	19.3	16.2	33.9	13.7	6.5	15.8	10.8	51.8	8.5	23.3	31.9	20.8	123	1.0
隠岐	49.8	19.2	5.5	27.4	12.8	4.2	16.2	21.2	12.5	15.7	18.5	34.6	15.9	300	0.0
蟠竜湖	15.0	23.1	18.7	17.1	7.5	4.1	32.5	22.7	35.9	6.5	26.2	53.6	20.7	356	0.6
栲原	16.3	7.7	7.0	22.8	6.9	0.5	9.3	5.7	17.2	5.4	7.6	26.2	8.7	194	0.0
筑後小郡	10.6	32.5	11.2	*	19.1	12.4	45.3	23.9	91.5	30.5	24.2	52.8	25.8	266	2.4
大分久住	11.9	35.9	28.2	18.4	13.6	5.7	24.3	11.1	47.3	3.8	12.4	34.3	19.1	171	1.1
対馬	*	*	11.1	43.1	37.4	7.0	84.9	26.9	44.1	*	18.7	47.3	29.3	144	2.5
五島	22.1	13.0	6.5	52.7	*	94.8	33.8	38.1	33.8	11.9	19.8	47.4	28.1	506	1.9
えびの	15.6	21.6	8.9	23.7	14.1	1.6	12.2	16.5	21.8	15.8	17.6	15.7	15.1	363	0.1
屋久島	20.7	22.2	3.7	9.5	6.8	3.7	6.4	14.4	44.4	15.0	19.1	11.5	12.4	122	0.0
辺戸岬	27.3	17.2	2.4	3.8	6.8	85.2	9.0	12.4	23.4	8.1	10.7	15.0	12.6	263	0.9
最大値 ¹⁾	133	58.6	47.4	52.7	58.8	94.8	84.9	38.8	91.5	41.7	76.3	65.5	34.1	1420	8.2
最小値 ¹⁾	4.2	2.5	1.3	3.5	2.3	0.5	3.4	3.6	6.8	3.8	2.5	10.3	3.6	118	0.0
全国平均	37.7	26.4	17.1	22.8	15.9	17.8	18.5	19.5	24.9	15.7	22.9	32.9	19.4		
標準偏差	30.4	13.5	11.8	11.6	11.5	23.0	16.5	9.6	19.2	9.1	16.3	14.0	6.8		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 Na⁺濃度 月・年平均値単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	294	29.4	15.4	19.8	15.3	79.0	156	577	317	277	282	450	191	4230	0.9
札幌	239	37.8	2.9	6.2	3.6	35.4	256	121	159	204	180	182	106	1030	1.3
落石岬	253	125	28.0	47.3	30.9	244	258	528	366	*	1940	414	209	6320	7.5
竜飛岬	226	435	46.9	48.0	43.9	157	101	2090	1420	748	807	568	230	11000	1.6
八幡平	22.1	11.4	0.9	1.4	1.7	9.7	19.4	178	41.2	59.9	39.3	33.1	31.0	1720	0.0
籠岳	11.0	19.5	2.8	19.2	13.0	4.8	5.6	44.1	90.5	26.4	112	24.3	24.4	900	0.0
尾花沢	46.3	8.2	2.1	2.5	3.8	6.7	7.4	61.1	136	119	70.0	52.9	53.7	436	1.3
筑波	11.5	25.5	3.2	12.3	8.6	9.7	13.2	19.1	9.6	11.9	50.8	24.1	15.4	1090	0.3
赤城	15.4	4.2	2.7	4.4	*	*	*	5.4	8.1	*	8.4	13.9	5.4	170	0.0
小笠原	43.2	22.3	20.9	239	20.7	273	71.5	67.3	230	133	46.7	72.2	91.3	1920	3.9
佐渡関岬	117	130	98.8	40.4	26.4	92.8	106	234	692	707	1820	235	223	21400	2.7
新潟巻	84.3	29.2	47.8	14.9	41.9	28.3	88.6	284	483	160	205	106	156	4540	0.5
八方尾根	18.9	2.8	1.8	1.1	1.4	1.7	1.7	41.8	17.0	4.9	8.2	17.1	6.6	313	0.4
越前岬	47.6	23.6	10.7	13.7	52.9	57.0	120	186	754	459	351	244	276	2740	0.8
伊自良湖	11.0	13.7	2.0	5.4	6.3	21.1	8.1	5.7	49.8	80.5	7.4	16.0	9.8	92.1	1.1
犬山	10.8	12.4	4.6	2.9	4.7	20.3	10.5	9.7	35.7	15.6	5.9	17.0	9.7	125	0.7
潮岬	44.9	61.8	62.6	143	111	162	34.3	91.0	60.2	83.8	208	275	113	1400	1.9
京都八幡	9.9	9.5	4.2	5.8	5.5	11.1	14.2	16.8	50.7	*	*	*	9.4	66.3	0.9
尼崎	13.9	11.9	9.5	8.9	6.7	12.1	9.0	4.6	73.1	5.7	4.5	15.4	10.9	557	0.4
倉橋島	70.3	16.4	18.9	8.8	7.2	93.9	12.5	6.8	150	8.8	10.4	11.6	31.7	371	1.4
隠岐	247	48.1	29.6	34.4	22.6	107	1150	423	2010	515	671	502	546	6120	2.9
蟠竜湖	16.1	29.2	4.2	8.9	12.2	48.4	155	52.7	550	172	140	177	81.7	715	2.0
梶原	13.4	3.7	4.1	3.0	4.8	30.9	28.1	2.2	165	13.3	32.0	24.8	26.5	700	0.4
筑後小郡	10.3	8.2	2.6	*	6.5	6.0	69.2	13.3	540	45.7	36.0	70.9	44.6	3840	1.5
大分久住	1.8	6.0	16.1	10.5	4.5	2.1	4.2	4.5	108	4.3	5.3	10.9	9.7	201	0.8
対馬	*	*	14.7	66.7	31.4	313	58.0	30.5	142	*	55.4	38.9	78.9	557	2.4
五島	126	192	128	33.5	*	113	31.9	86.5	623	137	36.2	85.3	156	2300	6.7
えびの	9.2	8.8	8.8	18.0	4.8	5.8	4.3	18.0	210	19.3	30.4	10.9	18.1	1540	0.4
屋久島	28.4	52.5	22.5	43.1	20.8	213	57.0	129	514	126	74.8	110	104	1760	4.8
辺戸岬	208	89.5	55.8	93.3	73.6	7870	204	153	1180	566	362	188	424	36000	13.1
最大値 ¹⁾	294	435	128	239	111	7870	1150	2090	2010	748	1940	568	546	36000	13.1
最小値 ¹⁾	1.8	2.8	0.9	1.1	1.4	1.7	1.7	2.2	8.1	4.3	4.5	10.9	5.4	66.3	0.0
全国平均	77.6	50.6	22.4	33.0	21.0	346	105	183	373	181	262	138	110		
標準偏差	92.8	86.4	30.3	50.6	25.0	1450	214	391	466	225	489	162	130		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 K⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	8.2	1.3	1.5	1.4	0.7	1.9	6.2	13.6	6.2	7.1	6.8	14.2	4.9	92.7	0.1
札幌	9.1	1.9	1.4	0.7	0.7	1.0	5.4	3.0	3.8	5.2	4.8	5.9	3.1	24.7	0.2
落石岬	7.2	3.7	2.6	2.0	1.1	6.0	5.8	12.2	8.8	*	56.9	9.0	5.5	200	0.3
竜飛岬	9.9	11.8	1.9	1.3	1.8	3.5	3.0	43.2	17.2	15.9	21.4	13.4	5.4	130	0.2
八幡平	4.5	0.6	0.4	0.5	0.2	0.3	0.6	4.5	1.7	1.9	1.8	2.8	1.4	29.0	0.0
籠岳	1.6	1.4	0.6	0.6	0.3	0.4	0.4	2.4	2.7	0.6	1.5	1.0	0.9	34.1	0.0
尾花沢	4.6	2.7	1.0	1.3	1.2	1.2	1.2	4.6	4.0	3.8	2.7	2.3	2.6	12.0	0.4
筑波	6.3	2.0	1.6	0.3	0.2	0.3	0.5	2.1	2.4	1.9	2.3	2.6	1.0	25.1	0.0
赤城	6.5	2.1	1.1	0.7	*	*	*	0.8	2.7	*	2.9	2.0	1.4	28.9	0.0
小笠原	1.3	0.6	0.6	4.8	0.6	6.6	2.5	1.7	5.8	3.7	1.3	2.4	2.3	43.2	0.0
佐渡関岬	4.0	6.4	2.3	1.6	0.7	2.0	2.7	7.7	13.7	16.4	50.8	9.2	5.7	411	0.0
新潟巻	3.5	2.5	1.2	0.7	1.0	0.9	2.1	8.1	10.4	5.0	5.2	4.6	4.1	102	0.1
八方尾根	4.2	1.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	2.0	0.8	0.5	0.7	2.0	0.8	20.9	0.0
越前岬	6.6	1.8	0.8	1.0	1.3	2.0	3.7	7.2	20.6	13.1	11.1	6.7	8.3	68.6	0.1
伊自良湖	1.6	0.9	0.4	0.7	0.6	1.1	0.5	0.6	9.6	8.6	1.4	1.9	1.1	16.4	0.1
犬山	2.2	1.3	0.9	0.5	0.8	0.9	0.9	0.8	1.4	0.8	0.4	1.9	0.9	9.8	0.0
潮岬	2.1	1.8	1.8	3.9	7.6	6.2	1.0	2.2	2.0	2.0	4.4	6.3	3.1	49.9	0.0
京都八幡	4.3	4.0	2.4	1.2	1.1	1.9	1.2	6.4	2.6	*	*	*	2.1	20.5	0.5
尼崎	1.6	2.2	0.4	1.9	0.4	0.0	0.4	0.0	2.2	0.2	0.5	2.1	1.1	13.9	0.0
倉橋島	2.5	1.1	0.8	1.0	0.5	2.2	0.8	1.0	7.4	0.8	1.5	1.7	1.4	12.7	0.0
隠岐	10.7	3.9	1.4	2.0	0.9	3.6	26.6	11.7	49.2	14.9	16.3	14.7	14.3	259	0.2
蟠竜湖	1.2	1.8	0.6	0.6	0.5	1.0	14.9	6.5	14.8	4.1	4.5	8.4	3.5	121	0.4
栲原	1.5	0.4	0.3	0.6	0.3	0.8	1.1	0.4	4.2	0.5	1.1	2.4	1.0	21.0	0.0
筑後小郡	2.1	2.0	1.4	*	2.2	1.9	6.6	2.1	20.9	7.6	2.4	3.0	3.3	104	0.1
大分久住	0.6	1.8	0.8	0.6	0.3	0.3	0.3	0.5	6.5	0.0	0.4	1.8	0.7	10.3	0.0
対馬	*	*	2.1	3.7	1.8	11.0	7.0	7.7	6.1	*	1.7	3.1	4.8	25.6	0.4
五島	4.3	5.1	3.1	2.8	*	11.3	2.7	4.4	17.0	3.4	1.8	4.1	5.1	56.3	0.3
えびの	0.9	1.4	0.7	1.0	0.5	1.0	0.6	1.3	6.5	1.3	2.0	1.5	1.3	115	0.2
屋久島	0.8	1.1	0.1	0.7	0.3	4.0	0.6	2.3	13.7	2.9	2.5	2.9	2.2	58.8	0.0
辺戸岬	7.2	3.4	1.5	2.2	2.0	165	5.0	4.5	19.1	12.4	8.1	5.1	9.4	760	0.4
最大値 ¹⁾	10.7	11.8	3.1	4.8	7.6	165	26.6	43.2	49.2	16.4	56.9	14.7	14.3	760	0.5
最小値 ¹⁾	0.6	0.4	0.1	0.3	0.2	0.0	0.2	0.0	0.8	0.0	0.4	1.0	0.7	9.8	0.0
全国平均	4.2	2.5	1.2	1.4	1.1	8.2	3.6	5.5	9.5	5.2	7.6	4.8	3.4		
標準偏差	3.0	2.3	0.8	1.1	1.4	30.3	5.4	8.0	9.7	5.2	13.7	4.0	3.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 Ca²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	20.0	6.6	4.9	2.1	1.0	2.5	7.9	16.7	6.9	8.2	8.9	56.0	8.3	477	0.2
札幌	41.3	7.1	4.8	2.0	1.4	2.6	9.6	5.9	5.4	6.5	11.1	17.6	7.3	111	1.0
落石岬	12.8	8.4	3.2	2.1	2.0	13.6	6.7	13.9	11.1	*	67.7	22.9	8.6	701	0.4
竜飛岬	54.7	49.4	3.4	1.7	2.7	4.5	3.9	54.9	27.6	20.9	33.4	24.6	11.6	441	0.3
八幡平	34.0	4.4	1.1	1.5	0.9	1.2	1.7	8.7	3.3	8.9	10.0	25.6	6.4	138	0.0
籠岳	8.2	7.9	3.5	2.8	2.1	1.7	1.5	7.2	4.4	3.8	7.3	8.9	4.3	65.6	0.4
尾花沢	20.3	3.7	0.6	0.5	0.3	0.6	0.5	8.0	3.9	4.6	5.0	15.8	4.2	87.0	0.0
筑波	10.3	4.5	4.2	1.2	0.6	0.7	0.9	4.8	6.2	4.0	4.5	6.0	2.3	101	0.0
赤城	23.2	6.3	3.2	1.8	*	*	*	3.1	8.7	*	10.3	10.1	4.6	123	0.0
小笠原	1.5	0.6	0.6	6.0	1.6	7.3	2.6	1.9	9.0	5.3	1.7	3.6	2.8	47.6	0.0
佐渡関岬	13.3	15.8	3.8	2.8	1.1	3.7	3.8	13.3	18.9	30.9	57.7	49.7	10.6	1010	0.5
新潟巻	21.6	7.0	2.1	1.7	1.8	2.0	2.5	11.7	11.6	9.0	8.1	30.2	7.9	142	0.3
八方尾根	45.7	5.9	1.8	1.4	1.7	1.6	1.2	6.2	2.9	4.8	1.6	24.4	5.1	173	0.0
越前岬	13.7	3.0	2.1	1.2	2.0	2.0	3.5	12.0	22.0	22.6	11.3	15.2	10.9	144	0.0
伊自良湖	7.6	2.5	0.8	1.6	2.0	3.4	1.1	1.8	9.3	4.6	1.4	12.2	3.4	86.7	0.3
犬山	11.9	5.8	2.0	1.7	3.2	2.0	3.1	2.4	3.0	4.2	2.2	13.3	3.9	45.2	0.1
潮岬	4.4	2.2	2.3	5.1	3.9	4.9	1.3	3.0	8.6	4.8	5.2	13.5	4.6	100	0.6
京都八幡	9.8	6.5	4.2	3.0	4.4	3.4	4.3	9.3	9.7	*	*	*	4.7	69.4	1.2
尼崎	5.9	6.9	6.1	3.1	4.0	3.0	2.2	2.9	15.9	3.0	2.7	19.2	5.7	318	0.5
倉橋島	5.1	2.1	2.4	2.0	1.7	2.4	1.4	2.0	46.1	3.0	2.9	11.8	3.3	109	0.4
隠岐	32.3	7.9	1.9	2.1	1.3	3.9	30.3	19.0	55.3	23.0	19.9	37.4	18.4	285	0.1
蟠竜湖	3.1	7.7	1.3	0.8	1.0	1.2	5.6	7.4	24.5	22.2	9.3	58.1	11.1	779	0.6
栲原	4.6	1.1	1.0	2.1	1.1	1.1	1.8	1.6	10.0	3.9	2.2	14.1	2.8	147	0.2
筑後小郡	11.0	7.2	16.9	*	8.7	2.9	16.4	7.2	76.2	21.4	6.9	35.6	13.6	312	1.3
大分久住	0.7	5.9	1.8	1.1	0.1	0.0	0.4	0.8	30.1	1.1	2.3	13.3	2.5	33.5	0.0
対馬	*	*	3.9	5.1	3.2	6.0	16.3	4.1	12.8	*	3.7	9.6	5.7	110	0.0
五島	6.0	4.8	4.2	4.8	*	20.8	5.5	9.5	27.5	10.8	3.8	12.4	8.8	120	2.4
えびの	1.4	1.3	0.9	2.2	0.9	1.0	0.8	2.1	8.8	7.2	2.4	7.6	2.3	396	0.2
屋久島	3.6	2.9	1.3	3.1	1.8	5.8	2.3	5.3	15.8	5.2	5.4	6.2	4.2	64.9	1.0
辺戸岬	11.9	5.3	1.9	3.0	2.7	187	6.1	4.9	35.3	15.1	9.3	6.6	12.0	803	0.6
最大値 ¹⁾	54.7	49.4	16.9	6.0	8.7	187	30.3	54.9	76.2	30.9	67.7	58.1	18.4	1010	2.4
最小値 ¹⁾	0.7	0.6	0.6	0.5	0.1	0.0	0.4	0.8	2.9	1.1	1.4	3.6	2.3	33.5	0.0
全国平均	15.2	6.9	3.1	2.4	2.1	10.1	5.0	8.4	17.7	10.0	11.0	20.0	6.7		
標準偏差	14.1	8.7	3.0	1.3	1.7	34.2	6.4	10.0	17.0	8.2	15.8	14.7	4.0		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 nss-C a²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	13.6	6.0	4.6	1.7	0.7	0.8	4.5	4.2	0.3	2.2	2.8	46.2	4.2	465	0.0
札幌	36.1	6.2	4.7	1.9	1.4	1.9	4.0	3.3	1.9	2.1	7.2	13.6	5.0	110	0.9
落石岬	7.4	5.7	2.6	1.1	1.3	8.4	1.1	2.6	3.2	*	25.7	13.9	4.1	564	0.0
竜飛岬	49.8	40.0	2.4	0.7	1.8	1.1	1.7	9.7	2.8	4.7	16.0	12.3	6.7	375	0.0
八幡平	33.5	4.2	1.1	1.5	0.8	1.0	1.3	4.9	2.4	7.6	9.2	24.9	5.7	134	0.0
籠岳	7.9	7.5	3.4	2.4	1.8	1.6	1.4	6.3	2.5	3.2	4.9	8.4	3.8	63.8	0.4
尾花沢	19.3	3.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	6.7	1.0	2.0	3.5	14.7	3.0	84.5	0.0
筑波	10.1	4.0	4.1	1.1	0.5	0.5	0.6	4.4	6.0	3.8	3.4	5.4	1.9	98.2	0.0
赤城	22.9	6.2	3.2	1.8	*	*	*	3.0	8.5	*	10.1	9.8	4.5	121	0.0
小笠原	0.6	0.2	0.2	0.8	1.1	1.4	1.1	0.5	4.0	2.4	0.7	2.0	0.8	35.6	0.0
佐渡関岬	10.8	13.0	1.7	1.9	0.5	1.7	1.5	8.3	4.0	15.6	18.4	44.6	5.8	546	0.0
新潟巻	19.8	6.4	1.1	1.3	0.9	1.4	0.6	5.6	1.3	5.6	3.7	27.9	4.5	140	0.0
八方尾根	45.3	5.9	1.7	1.4	1.7	1.6	1.1	5.3	2.5	4.7	1.4	24.0	5.0	172	0.0
越前岬	12.7	2.5	1.8	0.9	0.8	0.8	0.9	8.0	6.0	12.7	4.0	9.9	5.0	140	0.0
伊自良湖	7.4	2.2	0.7	1.5	1.9	3.0	0.9	1.7	8.2	2.8	1.3	11.8	3.2	85.6	0.3
犬山	11.7	5.5	1.9	1.7	3.1	1.6	2.9	2.2	2.2	3.9	2.1	13.0	3.7	44.6	0.1
潮岬	3.4	0.9	0.9	2.0	1.5	1.6	0.6	1.1	7.3	3.0	0.7	7.5	2.2	77.9	0.0
京都八幡	9.6	6.3	4.1	2.9	4.2	3.2	4.0	9.0	8.6	*	*	*	4.5	68.6	1.1
尼崎	5.6	6.6	5.9	2.9	3.8	2.7	2.0	2.8	14.3	2.8	2.6	18.8	5.4	315	0.5
倉橋島	3.6	1.7	2.0	1.8	1.5	0.4	1.2	1.9	42.8	2.8	2.6	11.5	2.6	108	0.1
隠岐	26.9	6.9	1.2	1.4	0.8	1.3	5.5	9.8	11.8	11.3	5.4	26.5	6.5	198	0.1
蟠竜湖	2.8	7.1	1.2	0.6	0.8	0.2	2.2	6.3	12.6	18.4	6.3	54.3	9.3	765	0.0
栲原	4.3	1.0	0.9	2.0	1.0	0.5	1.2	1.5	6.4	3.7	1.5	13.6	2.2	146	0.2
筑後小郡	10.8	7.0	16.8	*	8.6	2.8	14.9	6.9	64.6	20.4	6.2	34.1	12.7	292	0.9
大分久住	0.7	5.8	1.5	0.9	0.0	0.0	0.4	0.8	27.8	1.0	2.2	13.1	2.3	33.0	0.0
対馬	*	*	3.6	3.7	2.5	0.1	15.0	3.5	9.7	*	2.5	8.7	4.1	102	0.0
五島	3.2	0.6	1.5	4.1	*	18.3	4.8	7.6	14.1	7.9	3.1	10.5	5.5	105	0.0
えびの	1.2	1.1	0.7	1.9	0.8	0.9	0.8	1.8	4.2	6.8	1.8	7.4	1.9	389	0.2
屋久島	3.0	1.7	0.8	2.1	1.3	1.2	1.1	2.5	4.7	2.5	3.8	3.9	2.0	58.3	0.5
辺戸岬	7.4	3.4	0.7	1.0	1.1	16.6	1.7	1.6	9.9	2.9	1.5	2.5	2.9	276	0.0
最大値 ¹⁾	49.8	40.0	16.8	4.1	8.6	18.3	15.0	9.8	64.6	20.4	25.7	54.3	12.7	765	1.1
最小値 ¹⁾	0.6	0.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.3	0.5	0.3	1.0	0.7	2.0	0.8	33.0	0.0
全国平均	13.5	5.8	2.6	1.7	1.7	2.7	2.7	4.5	9.9	6.0	5.3	17.1	4.4		
標準偏差	13.3	7.2	3.1	0.9	1.7	4.4	3.7	2.8	13.5	5.3	5.8	13.3	2.4		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 Mg²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	34.3	3.7	2.9	2.7	1.7	8.4	18.3	66.5	35.7	31.7	31.5	55.5	21.9	506	0.1
札幌	29.7	4.7	1.1	1.1	0.5	4.0	29.6	13.4	17.3	22.6	20.2	21.4	12.2	116	0.3
落石岬	30.1	15.4	4.2	5.2	3.7	20.3	29.8	58.7	40.6	*	226	48.0	23.2	598	0.9
竜飛岬	32.3	52.5	5.9	5.6	5.7	17.4	11.6	235	97.5	81.9	91.8	64.0	25.1	713	0.5
八幡平	6.7	2.9	0.6	0.5	0.5	1.3	2.3	17.2	5.3	7.9	5.4	6.2	4.0	146	0.0
籠岳	3.0	4.1	1.4	3.2	2.5	1.8	1.2	7.5	10.4	2.4	13.6	4.4	3.9	91.6	0.2
尾花沢	8.1	1.9	1.9	3.4	1.0	1.3	1.1	9.0	16.3	14.2	8.0	6.3	7.2	50.0	0.4
筑波	3.0	3.1	1.3	1.2	0.6	0.7	1.1	2.9	2.5	2.2	6.6	3.8	1.8	113	0.0
赤城	6.1	2.0	1.2	0.6	*	*	*	1.1	2.7	*	2.6	3.0	1.4	30.1	0.0
小笠原	4.8	2.2	2.4	27.0	2.5	29.0	8.0	7.5	27.2	14.7	5.4	8.6	10.0	200	0.4
佐渡関岬	15.0	17.1	11.1	5.0	2.8	10.6	12.2	26.8	77.0	79.8	198	30.8	25.3	2320	0.5
新潟巻	11.9	4.4	6.0	2.3	5.3	3.5	10.4	32.7	54.5	18.6	23.1	14.0	18.2	518	0.3
八方尾根	7.0	1.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	5.3	2.1	1.0	1.0	3.8	1.1	36.9	0.0
越前岬	7.6	2.9	1.5	1.6	5.4	5.6	11.1	21.2	73.7	47.4	38.1	27.5	28.2	224	0.0
伊自良湖	1.7	1.7	0.4	0.6	0.6	2.5	0.9	0.8	8.2	11.3	1.1	3.6	1.5	13.9	0.0
犬山	2.8	2.3	0.6	0.5	0.9	2.3	1.5	1.4	4.2	2.4	0.7	3.2	1.5	23.1	0.0
潮岬	5.2	6.3	6.7	15.8	13.1	16.8	4.0	10.1	7.7	9.5	23.2	31.9	12.6	158	0.7
京都八幡	3.1	2.6	1.3	1.3	1.1	1.5	2.2	3.2	5.0	*	*	*	1.8	15.2	0.3
尼崎	2.9	2.5	2.5	2.6	2.1	2.0	2.1	1.9	11.1	1.2	1.4	4.7	2.6	67.9	0.0
倉橋島	8.4	2.0	2.5	1.1	0.8	10.2	1.5	1.0	22.1	1.3	1.5	2.7	3.8	46.7	0.2
隠岐	20.1	5.9	3.3	3.6	2.4	14.4	131	45.0	236	64.2	76.8	61.8	64.0	1180	0.3
蟠竜湖	2.4	3.9	0.5	1.0	1.3	4.6	17.7	6.7	65.7	21.0	17.1	24.4	10.0	92.9	0.4
梶原	2.3	0.6	1.0	0.4	1.3	3.3	3.6	0.2	19.4	2.1	3.9	4.5	3.2	78.2	0.0
筑後小郡	1.6	1.5	0.9	*	1.2	0.8	7.8	4.0	73.8	11.5	6.0	8.7	6.7	451	0.1
大分久住	0.3	1.3	1.5	0.8	0.7	0.0	0.2	0.2	12.7	0.7	0.9	2.8	1.0	22.0	0.0
対馬	*	*	3.1	7.6	3.7	23.0	10.7	3.4	14.8	*	4.6	6.9	7.8	60.0	0.0
五島	12.6	13.9	9.1	4.6	*	21.0	4.5	9.5	63.8	15.2	4.0	10.0	15.5	177	1.8
えびの	1.2	1.1	1.0	2.2	0.7	0.9	0.7	2.3	25.2	3.0	3.6	2.5	2.3	173	0.1
屋久島	3.8	6.5	2.8	5.3	2.8	24.8	6.8	15.2	58.9	14.0	9.0	13.1	12.2	201	0.8
辺戸岬	17.2	9.1	6.4	10.6	8.6	741	16.8	17.3	135	63.5	41.8	22.0	43.4	4110	0.7
最大値 ¹⁾	34.3	52.5	11.1	27.0	13.1	741	131	235	236	81.9	226	64.0	64.0	4110	1.8
最小値 ¹⁾	0.3	0.6	0.2	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	2.1	0.7	0.7	2.5	1.0	13.9	0.0
全国平均	9.8	6.2	2.8	4.1	2.6	33.6	12.0	20.9	40.9	21.0	29.9	17.2	12.4		
標準偏差	10.1	9.9	2.7	5.6	2.9	136.3	24.3	43.9	49.6	25.0	55.2	18.7	14.2		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 H⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	19.6	8.2	24.2	21.0	26.3	13.2	37.2	19.4	11.1	24.2	18.1	28.4	18.8	309	1.1
札幌	11.8	26.4	27.1	16.6	20.0	14.3	21.1	15.9	14.4	24.8	19.5	27.4	19.8	61.7	4.0
落石岬	11.6	15.3	11.2	18.2	27.5	14.7	8.4	14.2	9.0	*	50.8	10.4	15.3	184	2.9
竜飛岬	19.5	20.5	33.3	19.3	30.4	29.2	20.7	22.9	28.1	42.4	84.4	32.3	26.0	148	0.6
八幡平	24.4	25.4	10.6	14.3	17.3	16.7	13.4	24.5	17.3	23.5	22.9	13.3	17.8	120	0.3
籠岳	36.5	60.3	46.9	26.7	40.4	14.1	15.1	29.8	18.3	19.8	27.2	14.5	28.7	251	1.7
尾花沢	49.1	68.6	12.4	16.6	22.6	22.5	16.5	22.4	17.5	24.9	23.8	10.2	22.5	135	0.3
筑波	100	23.4	29.7	27.2	31.9	26.8	26.9	25.6	34.7	23.8	14.5	18.3	27.5	282	3.2
赤城	68.0	50.5	31.6	24.8	*	*	*	29.2	45.7	*	35.7	4.4	31.2	186	0.5
小笠原	20.0	20.0	21.2	20.9	13.9	2.5	4.4	6.0	29.2	21.3	5.4	17.7	14.5	112	0.6
佐渡関岬	37.6	63.3	32.9	25.5	18.5	24.7	21.1	51.8	20.6	17.8	21.8	23.2	25.8	170	0.1
新潟巻	28.7	55.0	17.9	26.7	35.8	39.1	25.3	46.0	27.5	47.3	49.7	29.5	33.5	238	0.1
八方尾根	22.4	31.2	9.4	13.6	19.1	14.3	14.7	24.6	20.4	14.8	36.0	15.3	16.4	141	0.2
越前岬	43.4	29.7	24.7	29.2	36.4	16.8	26.9	51.6	24.6	33.8	57.3	29.9	32.4	251	0.1
伊自良湖	33.0	57.9	15.4	44.3	34.3	42.6	31.4	30.1	25.7	17.8	16.0	22.1	29.5	331	6.2
犬山	37.3	44.8	24.2	24.7	53.2	14.0	26.8	30.1	17.7	20.1	16.9	22.8	31.6	646	1.1
潮岬	27.5	30.2	31.8	66.4	56.3	187	44.7	29.1	36.9	28.0	20.2	19.9	32.5	288	0.1
京都八幡	20.8	37.5	15.5	34.2	45.7	25.5	38.2	28.4	7.6	*	*	*	33.8	155	1.0
尼崎	10.4	44.1	35.6	33.9	43.5	16.7	20.9	22.1	41.2	12.9	26.4	16.8	27.5	178	0.2
倉橋島	21.1	39.9	57.8	29.2	30.5	14.8	59.7	32.5	40.3	26.2	48.4	31.5	30.4	162	4.3
隠岐	47.2	35.1	22.6	37.9	36.7	14.9	38.2	29.0	24.6	28.7	37.4	33.6	28.2	224	0.1
蟠竜湖	28.8	46.4	20.7	23.0	31.0	17.5	83.6	24.5	81.9	7.3	42.5	26.8	28.1	186	0.3
梶原	23.7	18.2	30.8	41.2	36.4	5.9	48.5	20.2	39.2	21.8	26.7	23.0	21.3	275	3.1
筑後小郡	17.5	37.9	48.5	*	11.3	15.9	28.9	19.7	45.7	0.8	25.4	22.2	21.5	224	0.5
大分久住	14.7	145	37.2	23.1	33.8	20.1	22.0	22.7	42.1	3.3	43.7	32.8	26.4	214	3.2
対馬	*	*	18.3	46.5	42.8	4.8	42.5	6.7	25.1	*	17.6	30.2	24.0	93.3	1.3
五島	21.0	18.6	17.7	36.0	*	*	43.4	43.6	49.8	16.0	15.7	17.2	27.3	141	0.5
えびの	23.9	37.5	20.3	36.3	27.8	2.8	10.8	30.1	40.0	38.4	24.3	30.9	25.6	288	0.2
屋久島	24.8	41.3	9.9	22.7	26.7	24.2	32.1	50.6	69.6	35.6	43.6	21.4	28.6	158	3.1
辺戸岬	12.5	13.6	9.8	23.0	20.5	2.7	18.9	18.9	21.9	8.3	14.6	10.4	13.1	200	0.2
最大値 ¹⁾	100	145	57.8	66.4	56.3	187	83.6	51.8	81.9	47.3	84.4	33.6	33.8	646	6.2
最小値 ¹⁾	10.4	8.2	9.4	13.6	11.3	2.5	4.4	6.0	7.6	0.8	5.4	4.4	13.1	61.7	0.1
全国平均	29.5	39.5	25.0	28.4	31.1	23.5	29.0	27.4	30.9	22.4	30.6	21.9	25.3		
標準偏差	18.8	25.7	12.2	11.4	11.2	33.5	16.7	11.7	16.9	11.3	16.8	8.0	6.0		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 pH 月・年平均値

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	4.71	5.09	4.62	4.68	4.58	4.88	4.43	4.71	4.95	4.62	4.74	4.55	4.73	5.95	3.51
札幌	4.93	4.58	4.57	4.78	4.70	4.85	4.68	4.80	4.84	4.60	4.71	4.56	4.70	5.40	4.21
落石岬	4.94	4.81	4.95	4.74	4.56	4.83	5.07	4.85	5.04	*	4.29	4.98	4.82	5.54	3.74
竜飛岬	4.71	4.69	4.48	4.71	4.52	4.53	4.68	4.64	4.55	4.37	4.07	4.49	4.59	6.21	3.83
八幡平	4.61	4.59	4.97	4.85	4.76	4.78	4.87	4.61	4.76	4.63	4.64	4.87	4.75	6.56	3.92
籠岳	4.44	4.22	4.33	4.57	4.39	4.85	4.82	4.53	4.74	4.70	4.57	4.84	4.54	5.76	3.60
尾花沢	4.31	4.16	4.91	4.78	4.65	4.65	4.78	4.65	4.76	4.60	4.62	4.99	4.65	6.54	3.87
筑波	4.00	4.63	4.53	4.57	4.50	4.57	4.57	4.59	4.46	4.62	4.84	4.74	4.56	5.50	3.55
赤城	4.17	4.30	4.50	4.60	*	*	*	4.53	4.34	*	4.45	5.35	4.51	6.27	3.73
小笠原	4.70	4.70	4.67	4.68	4.86	5.60	5.36	5.22	4.54	4.67	5.27	4.75	4.84	6.21	3.95
佐渡関岬	4.42	4.20	4.48	4.59	4.73	4.61	4.68	4.29	4.69	4.75	4.66	4.63	4.59	7.02	3.77
新潟巻	4.54	4.26	4.75	4.57	4.45	4.41	4.60	4.34	4.56	4.32	4.30	4.53	4.47	6.93	3.62
八方尾根	4.65	4.51	5.03	4.87	4.72	4.84	4.83	4.61	4.69	4.83	4.44	4.82	4.78	6.75	3.85
越前岬	4.36	4.53	4.61	4.53	4.44	4.77	4.57	4.29	4.61	4.47	4.24	4.52	4.49	6.87	3.60
伊自良湖	4.48	4.24	4.81	4.35	4.46	4.37	4.50	4.52	4.59	4.75	4.79	4.66	4.53	5.21	3.48
犬山	4.43	4.35	4.62	4.61	4.27	4.85	4.57	4.52	4.75	4.70	4.77	4.64	4.50	5.95	3.19
潮岬	4.56	4.52	4.50	4.18	4.25	3.73	4.35	4.54	4.43	4.55	4.69	4.70	4.49	6.93	3.54
京都八幡	4.68	4.43	4.81	4.47	4.34	4.59	4.42	4.55	5.12	*	*	*	4.47	5.98	3.81
尼崎	4.98	4.36	4.45	4.47	4.36	4.78	4.68	4.65	4.39	4.89	4.58	4.77	4.56	6.61	3.75
倉橋島	4.68	4.40	4.24	4.53	4.52	4.83	4.22	4.49	4.39	4.58	4.32	4.50	4.52	5.37	3.79
隠岐	4.33	4.45	4.65	4.42	4.44	4.83	4.42	4.54	4.61	4.54	4.43	4.47	4.55	7.12	3.65
蟠竜湖	4.54	4.33	4.68	4.64	4.51	4.76	4.08	4.61	4.09	5.14	4.37	4.57	4.55	6.55	3.73
梶原	4.63	4.74	4.51	4.38	4.44	5.23	4.31	4.70	4.41	4.66	4.57	4.64	4.67	5.51	3.56
筑後小郡	4.76	4.42	4.31	*	4.95	4.80	4.54	4.71	4.34	6.08	4.60	4.65	4.67	6.30	3.65
大分久住	4.83	3.84	4.43	4.64	4.47	4.70	4.66	4.64	4.38	5.48	4.36	4.48	4.58	5.50	3.67
対馬	*	*	4.74	4.33	4.37	5.32	4.37	5.18	4.60	*	4.75	4.52	4.62	5.88	4.03
五島	4.68	4.73	4.75	4.44	*	*	4.36	4.36	4.30	4.80	4.80	4.76	4.56	6.26	3.85
えびの	4.62	4.43	4.69	4.44	4.56	5.56	4.97	4.52	4.40	4.42	4.61	4.51	4.59	6.72	3.54
屋久島	4.61	4.38	5.00	4.64	4.57	4.62	4.49	4.30	4.16	4.45	4.36	4.67	4.54	5.51	3.80
辺戸岬	4.90	4.87	5.01	4.64	4.69	5.57	4.72	4.72	4.66	5.08	4.83	4.98	4.88	6.74	3.70
最大値 ¹⁾	4.98	5.09	5.03	4.87	4.95	5.60	5.36	5.22	5.12	6.08	5.27	5.35	4.88	7.12	4.21
最小値 ¹⁾	4.00	3.84	4.24	4.18	4.25	3.73	4.08	4.29	4.09	4.32	4.07	4.47	4.47	5.21	3.19
全国平均	4.59	4.47	4.65	4.58	4.54	4.81	4.61	4.61	4.57	4.74	4.58	4.70	4.61		
標準偏差	0.23	0.25	0.22	0.16	0.17	0.39	0.27	0.22	0.24	0.37	0.24	0.20	0.11		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成17年度 電気伝導率 月・年平均値

単位：mS m⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	6.55	1.28	1.95	1.75	1.54	2.00	4.85	10.5	5.87	6.04	5.74	10.8	4.33	67.0	0.28
札幌	6.37	2.63	1.95	1.21	0.91	1.43	5.56	2.98	3.54	4.66	4.29	5.13	3.05	18.7	0.65
落石岬	5.02	3.04	1.36	1.78	1.82	4.23	4.59	8.75	6.16	*	25.5	6.81	3.96	89.7	0.64
竜飛岬	7.23	4.21	2.48	1.92	2.27	4.23	2.97	32.5	8.17	13.9	16.9	10.7	4.35	96.6	0.86
八幡平	3.21	1.59	0.75	0.87	0.90	1.24	1.09	4.11	1.60	2.30	2.15	2.42	1.68	23.5	0.19
籠岳	2.61	4.01	2.77	1.96	2.41	0.91	0.98	2.87	2.57	1.60	3.40	1.62	2.16	15.2	0.36
尾花沢	3.68	3.57	0.83	1.17	1.21	1.26	0.87	2.67	3.25	3.52	2.80	2.15	2.24	8.90	0.36
筑波	6.43	2.15	2.30	1.65	1.94	1.93	1.68	1.82	2.76	1.45	1.31	1.96	1.86	13.7	0.35
赤城	5.64	3.26	2.06	1.47	*	*	*	1.70	2.90	*	2.89	1.41	2.08	11.5	0.21
小笠原	1.72	1.39	1.41	4.69	1.11	4.41	1.52	1.50	5.54	3.37	1.12	2.15	2.23	29.4	0.25
佐渡関岬	4.42	6.41	3.38	2.22	1.35	2.92	3.15	6.45	10.2	6.71	8.43	6.34	4.13	54.6	0.64
新潟巻	3.75	3.50	1.83	1.87	2.61	2.48	2.71	7.12	9.01	5.09	5.97	4.35	4.40	70.2	0.69
八方尾根	3.31	2.03	0.60	0.77	1.06	0.82	0.79	2.15	1.39	0.98	1.99	2.12	1.16	15.2	0.09
越前岬	3.75	2.08	1.56	1.98	2.83	1.81	3.30	6.39	13.4	9.47	7.88	5.86	6.31	43.6	0.27
伊自良湖	2.56	3.57	0.98	2.70	2.24	3.02	1.86	1.76	2.88	3.00	1.20	2.21	2.05	19.6	0.49
犬山	2.84	2.87	1.69	1.83	2.59	1.30	1.81	1.63	1.65	1.47	1.08	2.16	2.00	34.3	0.29
潮岬	2.18	2.48	2.43	5.46	5.13	11.1	2.71	3.00	3.04	2.89	4.33	5.81	3.49	25.0	0.56
京都八幡	1.72	2.55	1.23	2.38	2.64	1.70	2.37	2.36	1.97	*	*	*	2.26	9.57	0.68
尼崎	1.27	3.01	2.31	2.39	2.61	1.19	1.52	1.41	3.32	0.97	1.61	2.05	1.99	13.3	0.34
倉橋島	2.46	2.42	3.14	1.84	1.61	2.06	3.15	1.74	6.29	1.59	2.86	2.40	2.17	10.9	0.48
隠岐	7.48	2.67	1.58	2.61	2.16	2.42	21.1	7.86	34.2	10.1	12.6	10.3	10.4	118	0.42
蟠竜湖	1.95	3.17	1.40	1.52	1.81	1.68	6.86	3.32	13.3	3.71	4.76	6.47	3.26	38.1	0.66
栲原	1.67	1.03	1.51	2.08	1.82	0.79	2.76	1.11	5.17	1.38	1.82	2.32	1.57	18.4	0.24
筑後小郡	1.22	2.08	2.33	*	1.10	0.80	3.62	1.93	15.4	2.07	2.22	3.58	2.37	67.3	0.35
大分久住	0.92	7.32	2.49	1.51	1.93	1.06	1.42	1.30	5.41	0.34	2.48	2.69	1.74	12.2	0.21
対馬	*	*	1.41	3.80	2.95	5.25	4.11	1.35	4.96	*	2.15	3.19	2.92	11.2	0.51
五島	3.36	4.29	3.03	3.04	*	*	3.39	4.19	13.3	3.50	1.68	3.12	4.36	37.0	0.65
えびの	1.37	2.01	1.07	2.15	1.43	0.20	0.74	1.93	5.66	2.36	1.75	1.94	1.60	36.0	0.09
屋久島	1.99	3.08	0.95	1.94	1.68	4.53	2.39	4.38	11.7	3.76	3.42	3.03	3.14	32.1	0.75
辺戸岬	4.73	2.55	1.35	2.60	1.95	105	4.03	3.36	18.6	9.00	4.53	3.51	6.68	304	0.54
最大値 ¹⁾	7.48	7.32	3.38	5.46	5.13	105	21.1	32.5	34.2	13.9	25.5	10.8	10.4	304	0.86
最小値 ¹⁾	0.92	1.03	0.60	0.77	0.90	0.20	0.74	1.11	1.39	0.34	1.08	1.41	1.16	8.90	0.09
全国平均	3.50	2.97	1.80	2.18	1.99	6.13	3.38	4.47	7.44	4.05	4.79	4.09	3.20		
標準偏差	1.95	1.37	0.74	1.02	0.86	19.46	3.73	5.85	6.83	3.34	5.35	2.75	1.92		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値を含む。