

泉南地域抜粋

A表：平成21年度受診者

症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT	最新の所見	ア. 直接職歴有 イ. 間接職歴有 ウ. 家庭内ばく露あり エ. 立入・屋内環境ばく露あり オ. その他					ばく露歴分類案	備考(その他所見)	備考(終了理由)
									ア	イ	ウ	エ	オ			
1	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
2	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
3	男	1930年代	なし	なし	なし	新所見	—	②疑	●					ア		
4	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
5	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア	大動脈石灰化	
6	男	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
7	男	1930年代	なし	受診せず	なし	不変	—	なし	●					ア	左CPA鈍化・右肺尖石灰化	
8	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
9	女	1930年代	なし	受診せず	なし	不変	—	なし	●					ア		
10	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
11	男	1930年代	なし	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
12	男	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
13	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
14	男	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
15	女	1930年代	なし	受診せず	なし	不変	—	なし	●					ア		
16	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア	心肥大	
17	女	1940年代	なし	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
18	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
19	男	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
20	男	1940年代	⑩	⑩	⑩	新所見	—	②疑⑩	●					ア	右側大動脈	
21	女	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
22	女	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
23	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
24	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●					ア	右胸郭形成術後・右胸膜石灰化・両肺尖胸膜	
25	男	1930年代	⑨⑩	受診せず	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
26	女	1930年代	⑨	⑨	⑨	不変	—	⑨	●					ア	左中肺野索状影	
27	男	1940年代	②⑩	②⑩	②⑩	不変	—	②	●					ア		
28	男	1930年代	②⑩	②⑩	②⑩	不変	—	②⑩	●					ア	右上肺野陰影	
29	男	1950年代	②⑩	②⑩	②⑩	不変	—	②⑩	●					ア	両肺尖ブラ・胸膜肥厚	
30	男	1950年代	②⑩	②⑩	②⑩	不変	—	②⑩	●					ア	両肺尖胸膜肥厚	
31	男	1930年代	②③⑩	②③⑩	②③⑩	不変	—	②③⑩	●					ア		
32	男	1930年代	②③⑩	②③⑩	②③⑩	不変	—	②③⑩	●					ア		
33	男	1930年代	②③⑩	受診せず	②③⑩	不変	—	②③⑩	●					ア		
34	男	1940年代	②③⑩	②③⑩	②③⑩	不変	—	②③⑩	●					ア		
35	男	1930年代	②③⑩	②③⑩	②③⑩	不変	—	②③⑩	●					ア		
36	女	1940年代	②③	②③	②③	不変	—	②③	●					ア		
37	男	1930年代	②③⑩	②③⑩	②③⑩	不変	—	②⑩	●					ア		
38	男	1940代	②③⑩	受診せず	受診せず	不変	—	②③	●					ア		
39	男	1940年代	②③⑩	②③⑩	②⑩	不変	—	②⑩	●					ア		
40	男	1930年代	②③④⑤	②③④⑤	②③④⑤	新所見	—	②⑩	●					ア	右下肺野plate like atelec	
41	男	1930年代	②③	②③	②③	不変	—	②③	●					ア		
42	男	1940年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
43	男	1940年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
44	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②⑩	●					ア	横隔膜ヘルニア	
45	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
46	男	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
47	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
48	男	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
49	女	1940年代	②	②	②	不変	—	②	●					ア		
50	男	1930年代	②	②	受診せず	不変	—	②	●					ア	側窩	
51	男	1930年代	—	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
52	女	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし	●					ア		
53	女	1930年代	—	②	②	不変	—	②	●					ア		
54	男	1960年代	—	—	なし	不変	—	なし	●					ア		
55	女	1930年代	—	—	なし	不変	—	なし	●					ア		
56	男	1940年代	—	—	なし	不変	—	なし	●					ア		
57	男	1960年代	—	—	なし	不変	—	なし	●					ア		
58	男	1950年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●					ア	肺気腫	
59	男	1930年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●					ア	左索状影	
60	男	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
61	女	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●					ア	右下肺野胸膜肥厚・左下肺野小結状影・索状影	
62	女	1950年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●					ア		
63	男	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし	●					ア		
64	男	1950年代	—	—	—	なし	⑩	⑩	●					ア	肺気腫・両肺尖ブラ	
65	男	1940年代	—	—	—	なし	⑩	⑩	●					ア	胸膜肥厚	
66	女	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし	●					ア		
67	女	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし	●					ア		
68	女	1930年代	—	—	—	なし	⑩	⑩	●					ア	右中葉小結節影	

症例番号	性別	生年 (西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の 所見	ア. 直接職歴有 イ. 間接職歴有 ウ. 家庭内ばく露あり エ. 立入・屋内環境ばく露あり オ. その他					ばく 露 歴 分 類 案	備考 (その他所見)	備考 (終了 理由)	
									ア	イ	ウ	エ	オ				
69	男	1970年代	—	—	—	⑩	⑩	⑩	●						ア	左肺尖陳旧性変化	
70	男	1930年代	—	—	—	⑥,⑩	⑥,⑩	⑥,⑩	●						ア	左上肺野結節影	
71	女	1930年代	—	—	—	⑥	⑥	⑥	●						ア		
72	男	1920年代	—	—	—	②,⑩	②,⑩	②,⑩	●						ア	左下肺野線状影	
73	男	1930年代	—	—	—	②,⑩	②,⑩	②,⑩	●						ア	左上肺野結節影	
74	男	1920年代	—	—	—	②	②	②	●						ア		
75	男	1940年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②	●	●					ア		
76	男	1940年代	②,⑥,⑩	受診せず	②,⑥,⑩	不変	—	②,⑥,⑩	●	●					ア		
77	男	1940年代	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	不変	—	②,⑥,⑨,⑩	●	●					ア	左下肺結節影	
78	男	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし	●	●					ア		
79	男	1930年代	—	—	—	⑥,⑩	⑥,⑩	⑥,⑩	●	●					ア	右肺尖ぶら	
80	男	1930年代	—	—	—	⑩	②,⑩	②,⑩	●	●					ア	右下肺野結節影	
81	男	1930年代	なし	なし	なし	新所見	—	⑧	●	●					ア		
82	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
83	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
84	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
85	女	1930年代	②,⑩	②,⑩	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア	左下肺野結節影・大動脈石灰	
86	女	1930年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	増悪	—	②	●	●					ア		
87	女	1950年代	②,⑩	②,⑩	受診せず	不変	—	②,⑩	●	●					ア		
88	男	1930年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	不変	—	②,⑨	●	●					ア		
89	女	1930年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	不変	—	②,⑨	●	●					ア		
90	男	1940年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	不変	—	②,⑨	●	●					ア		
91	女	1930年代	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	不変	—	②,⑥	●	●					ア		
92	男	1920年代	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	不変	—	②,⑥,⑩	●	●					ア	肋膜肥厚・肺臓 維症	
93	女	1930年代	②,⑥	②,⑥	②,⑥	不変	—	②,⑥	●	●					ア	胸膜肥厚	
94	男	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●	●					ア		
95	女	1940年代	—	—	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
96	女	1940年代	—	—	⑩	増悪	—	②疑	●	●					ア		
97	女	1920年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア		
98	男	1940年代	—	—	⑩	不変	不変	⑩	●	●					ア	右下肺野小結節影	
99	女	1940年代	—	—	②,⑩	不変	—	②,⑩	●	●					ア	胸膜肥厚	
100	男	1940年代	—	—	②	不変	—	②	●	●					ア		
101	女	1930年代	—	—	なし	なし	⑩	⑩	●	●					ア	右肺野小結節影	
102	女	1920年代	—	—	—	②	②	②	●	●					ア		
103	男	1930年代	—	—	—	②	②	②	●	●					ア		
104	男	1930年代	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	不変	—	②,⑥,⑩	●	●		●			ア	左肋横膈膜角消失	
105	男	1940年代	②	②	②	不変	—	②	●	●		●			ア		
106	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●			●		ア		
107	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●			●		ア		
108	男	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●			●		ア	心肥大	
109	男	1940年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア		
110	男	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア		
111	男	1940年代	⑧,⑨,⑩	⑧,⑨,⑩	⑧,⑨,⑩	不変	—	⑨,⑩	●	●					ア		
112	男	1930年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩	●	●					ア		
113	男	1930年代	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	不変	—	②,⑨,⑩	●	●					ア		
114	女	1940年代	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	不変	—	②,⑥,⑨,⑩	●	●					ア		
115	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②	●	●					ア		
116	女	1950年代	—	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
117	男	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア	索状影	
118	男	1940年代	—	—	②,⑩	不変	—	②,⑩	●	●					ア		
119	男	1930年代	—	—	②,⑥	不変	—	②,⑥	●	●					ア		
120	男	1950年代	—	—	—	なし	なし	なし	●	●					ア		
121	男	1930年代	—	—	—	②	②	②	●	●					ア		
122	男	1940年代	—	—	—	②,⑩	②,⑩	②,⑩	●	●					ア	右肺尖腫瘍影	
123	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア		
124	女	1950年代	②,⑧,⑩	②,⑧,⑩	②,⑧,⑩	不変	—	②	●	●		●			ア		
125	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
126	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩	●	●					ア	両肺尖硬化像	
127	女	1920年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩	●	●					ア	右下肺野小結節影・大動脈石灰 左肋横膈膜角消失	
128	男	1930年代	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	不変	—	②,⑨,⑩	●	●					ア		
129	男	1930年代	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	不変	—	⑩	●	●					ア	両肺尖胸膜肥厚	
130	女	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
131	男	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
132	女	1930年代	—	⑥	⑥	不変	—	⑥	●	●					ア	両肺尖胸膜肥厚	
133	女	1930年代	—	—	なし	不変	—	なし	●	●					ア		
134	女	1930年代	—	—	⑩	増悪	—	②疑	●	●					ア		
135	男	1930年代	—	—	②,⑩	不変	—	②,⑩	●	●					ア		
136	男	1940年代	⑩	⑩	⑩	増悪	—	⑩	●	●		●			ア	左下肺野結節影	
137	男	1940年代	—	②	②	不変	—	②	●	●		●			ア		
138	男	1940年代	②	②	②	不変	—	②	●	●		●			ア		
139	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					イ		
140	男	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	⑩	●	●					イ		
141	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし	●	●					イ	両肺尖胸膜肥厚	

症例番号	性別	生年 (西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の 所見	ア. 直接職歴有 イ. 間接職歴有 ウ. 家庭内ばく露あり エ. 立入・屋内環境ばく露あり オ. その他					ばく 露歴 分類 案	備考 (その他所見)	備考 (終了 理由)	
									ア	イ	ウ	エ	オ				
142	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
143	男	1930年代	なし	なし	なし	新所見	—	⑩									右下肺野索状影
144	男	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
145	女	1960年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									
146	男	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									
147	男	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									両肺尖硬化像
148	男	1950年代	②,④	②,④	②,④	不変	—	②,④									胸膜肥厚
149	男	1930年代	②,③,⑥,⑨	②,③,⑥,⑨	②,③	不変	—	②,③									
150	男	1950年代	—	なし	なし	不変	—	なし									
151	女	1960年代	②,④	②,④	②,④	不変	—	②,④									両肺尖胸膜肥厚
152	男	1960年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									
153	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
154	男	1940年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									左肺尖ブラ
155	男	1940年代	⑨,⑩	⑨,⑩	⑨,⑩	不変	—	⑨,⑩									
156	男	1940年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩									右CPA純化・両 肺尖胸膜肥厚
157	男	1930年代	②,④,⑩	②,④,⑩	②,④,⑩	不変	—	②,④,⑩									
158	男	1930年代	②,④	②,④	②,④	不変	—	②,④									
159	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②									
160	男	1940年代	②	②	②	不変	—	②									
161	男	1950年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									
162	女	1930年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									左下肺野索状影
163	男	1930年代	—	—	—	なし	⑩	⑩									両肺野陈旧性変 化
164	女	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
165	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
166	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
167	女	1930年代	なし	なし	受診せず	不変	—	なし									
168	男	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
169	女	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									
170	男	1940年代	⑨	受診せず	⑨	不変	—	⑨									
171	女	1960年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩									
172	女	1930年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩									
173	女	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし									
174	男	1930年代	—	—	なし	不変	—	なし									
175	女	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし									
176	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
177	女	1940年代	②,④	②,④	②,④	不変	—	②,④									
178	男	1960年代	②	②	②	不変	—	②									
179	男	1960年代	④	④	④	不変	—	④									
180	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
181	男	1950年代	②,④	②,④	②,④	不変	—	②,④									
182	男	1930年代	—	—	—	②,⑥	②,⑥	②,⑥									
183	女	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									両肺尖胸膜肥厚
184	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
185	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
186	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									右肺尖胸膜肥厚
187	女	1940年代	なし	なし	⑩	不変	—	⑩									
188	男	1950年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩									
189	女	1940年代	②,⑥	②,⑥	②,⑥	不変	—	②,⑥									両肺尖胸膜肥厚
190	男	1960年代	②	②	②	不変	—	②									右肺尖石灰化 両肺尖胸膜肥 厚・点状影
191	男	1950代	②	受診せず	受診せず	不変	—	②,⑩									
192	女	1930年代	②	受診せず	②	不変	—	②									
193	男	1950年代	②	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩									
194	女	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									
195	女	1950年代	—	—	—	なし	なし	なし									
196	女	1960年代	—	なし	なし	不変	—	なし									
197	男	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
198	男	1920年代	②,④,⑩	②,④,⑩	②,④,⑩	不変	—	②,④,⑩									両肺尖ブラ・肺炎 腫
199	女	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									
200	男	1950年代	—	—	なし	不変	—	なし									
201	男	1950年代	—	—	—	なし	②	②									
202	女	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
203	女	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩									両肺尖胸膜肥厚
204	男	1950年代	②	②	②	不変	—	②									
205	男	1940年代	—	—	なし	不変	—	なし									
206	男	1960年代	—	—	⑩	不変	—	⑩									右肺野胸膜肥 厚・結節影
207	女	1940年代	—	—	②	不変	—	②									
208	男	1950年代	—	—	—	なし	なし	なし									
209	男	1950年代	なし	なし	受診せず	不変	—	なし									
210	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
211	男	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
212	女	1940年代	なし	なし	受診せず	不変	—	なし									
213	女	1960年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									両肺尖胸膜肥厚
214	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
215	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし									
216	女	1940年代	なし	⑩	⑩	不変	—	⑩									胸膜肥厚・線状 影

症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT	最新の所見	ア.直接職歴有 イ.間接職歴有 ウ.家庭内ばく露あり エ.立入・屋内環境ばく露あり オ.その他					備考(他所見)	備考(終了理由)	
									ア	イ	ウ	エ	オ			
217	男	1920年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ	右肺野石灰化影	
218	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
219	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
220	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
221	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
222	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
223	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
224	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
225	男	1940年代	なし	なし	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
226	女	1930年代	なし	なし	受診せず	不変	—	なし					●	オ		
227	女	1930年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
228	女	1940年代	なし	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ	左上肺野小粒状影	
229	男	1930年代	なし	なし	⑩	不変	—	⑩					●	オ	左肺野粒状、小結節影	
230	女	1950年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ	両下肺野小結節影	
231	女	1940年代	なし	なし	なし	不変	—	なし					●	オ	両肺尖胸膜肥厚	
232	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
233	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
234	女	1950年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
235	男	1920年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ	左横隔膜挙上	
236	女	1960年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
237	女	1940年代	⑩	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
238	女	1920年代	⑨,⑩	⑨,⑩	⑨,⑩	不変	—	⑨,⑩					●	オ	左肺野小結節影	
239	女	1940年代	⑨,⑩	⑨,⑩	⑨,⑩	不変	—	⑨,⑩					●	オ		
240	女	1930年代	⑨,⑩	⑨,⑩	⑨,⑩	不変	—	⑨,⑩					●	オ		
241	女	1940年代	⑧,⑩	⑧,⑩	⑧,⑩	不変	—	⑧,⑩					●	オ		
242	女	1930年代	⑧,⑩	⑧,⑩	⑧,⑩	不変	—	⑩					●	オ		
243	女	1930年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	不変	—	②,⑩					●	オ	左肺野影	
244	男	1930年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	不変	—	②,⑨					●	オ		
245	男	1940年代	②,⑧,⑩	②,⑧,⑩	②,⑧,⑩	不変	—	②,⑩					●	オ	索状影	
246	男	1930年代	②,⑧	受診せず	②,⑧	不変	—	②					●	オ		
247	女	1950年代	②,⑦	②,⑦	②,⑦	不変	—	②,⑦					●	オ		
248	男	1920年代	②,⑥,⑦	②,⑥,⑦	②,⑥,⑦	不変	—	②,⑥,⑦					●	オ		
249	女	1940年代	②	②	②	不変	—	②					●	オ		
250	男	1930年代	②	②	②	不変	—	②					●	オ	右肺尖胸膜肥厚・右肺野陰	
251	女	1930年代	②	②	②	不変	—	②					●	オ		
252	女	1940年代	②	②	②	不変	—	②					●	オ		
253	男	1930年代	②	②	②	不変	—	②					●	オ		
254	男	1930年代	—	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
255	女	1960年代	—	なし	受診せず	不変	—	なし					●	オ		
256	女	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
257	女	1940年代	—	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
258	男	1950年代	—	なし	なし	新所見	—	⑩					●	オ	右下葉粒状影	
259	女	1950年代	—	なし	なし	不変	—	なし					●	オ		
260	女	1940年代	—	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
261	男	1930年代	—	⑩	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
262	女	1940年代	—	—	⑩	不変	—	⑩					●	オ		
263	女	1930年代	—	—	②,⑩	不変	—	②					●	オ		
264	女	1930年代	—	—	—	なし	⑩	⑩					●	オ	陳旧性炎症性変化	
265	女	1950年代	—	—	—	なし	⑩	⑩					●	オ	左乳線結節影	
266	男	1940年代	—	—	—	なし	なし	なし					●	オ		
267	男	1960年代	—	—	—	なし	なし	なし					●	オ		
268	男	1950年代	—	—	—	なし	②	②					●	オ		
計268名(男性:144名、女性:124名)									138	33	71	26	125			

A表(別表):平成21年度受診していない者(過去に受診歴のある者)(泉南地域抜粋)

症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度所見	2007年度所見	2008年度所見	2009年度X線所見	2009年度CT	最新の所見	ア.直接職歴有 イ.間接職歴有 ウ.家庭内ばく露あり エ.立入・屋内環境ばく露あり オ.その他					備考(他所見)	備考(終了理由)
									ア	イ	ウ	エ	オ		
1	女	1940年代	②	②	②	受診せず	—	②	●					ア	
2	女	1930年代	②	②	②	受診せず	—	②	●					ア	
3	男	1930年代	②	②	②	受診せず	—	②	●					ア	
4	女	1920年代	②,⑩	②,⑩	②	受診せず	—	②	●					ア	
5	男	1930年代	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	②,⑥,⑨,⑩	受診せず	—	②,⑥,⑨,⑩	●					ア	気管支拡張
6	男	1920年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	受診せず	—	②,⑨	●					ア	
7	男	1920年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	受診せず	—	②,⑩	●					ア	肺気腫
8	男	1930年代	②,⑩	②,⑩	②,⑩	受診せず	—	②,⑩	●					ア	胸膜肥厚
9	男	1940年代	なし	なし	②,⑩	受診せず	—	②,⑩	●					ア	左肺尖陰影
10	男	1930年代	⑨	⑨	⑨	受診せず	—	⑨	●					ア	
11	男	1930年代	②	②	⑩	受診せず	—	⑩	●					ア	左下野索状影
12	男	1930年代	⑩	⑩	⑩	受診せず	—	⑩	●					ア	肺気腫

症例番号	性別	生年 (西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の 所見	ア. 直接職歴有 イ. 間接職歴有 ウ. 家庭内ばく露あり エ. 立入・屋内環境ばく露あり オ. その他					ばく 露 歴 分 類 案	備考 (その他所見)	備考 (終了 理由)
									ア	イ	ウ	エ	オ			
13	男	1930年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし								
14	男	1950年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし								
15	女	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし								
16	女	1940年代	②,⑦,⑩	①,②,⑦,⑩	受診せず	受診せず	—	①,②,⑦,⑩								炎症後変化
17	女	1940年代	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑩								気腫性変化
18	女	1920年代	②,⑧,⑩	②,⑧,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑧,⑩								気管支拡張
19	男	1940年代	②,⑨	②,⑨	受診せず	受診せず	—	②,⑨								
20	男	1940年代	②	②,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑩								左胸水疑い
21	女	1930年代	⑨,⑩	⑨,⑩	受診せず	受診せず	—	⑨,⑩								気腫性変化
22	男	1950年代	⑩	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩								右中野、左下野 不整形陰影
23	女	1940年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし								
24	男	1930年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし								
25	女	1940年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし								
26	女	1930年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし								
27	女	1930年代	②,③	受診せず	②,③	受診せず	—	②,③								
28	男	1950年代	なし	受診せず	なし	受診せず	—	なし								
29	男	1940年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								
30	女	1930年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								
31	女	1930年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								
32	女	1930年代	⑦,⑨,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑦,⑨,⑩								
33	女	1930年代	②,⑨,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑨,⑩								気管支拡張、肺気腫
34	女	1940年代	②,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑨								
35	男	1940年代	②,③	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,③								
36	男	1930年代	②,⑥,⑧,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑧,⑨								
37	男	1940年代	②,③,⑦,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,③,⑦,⑨								
38	女	1920年代	②	受診せず	受診せず	受診せず	—	②								
39	男	1930年代	②	受診せず	受診せず	受診せず	—	②								
40	女	1930年代	②	受診せず	受診せず	受診せず	—	②								
41	男	1940年代	—	—	②	受診せず	—	②								
42	男	1940年代	—	—	⑩	受診せず	—	⑩								両肺に多発する 結節影・浸潤影・ 空洞影
43	男	1940年代	—	②,⑥	②,⑥	受診せず	—	②,⑥								
44	男	1930年代	—	⑩	⑩	受診せず	—	⑩								肺気腫
45	女	1920年代	—	②,③	受診せず	受診せず	—	②,③								
46	女	1930年代	—	なし	受診せず	受診せず	—	なし								
47	男	1940年代	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	②,⑥,⑩	受診せず	—	②,⑥,⑩								斑状影
48	男	1940年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	受診せず	—	②,⑨								
49	男	1930年代	⑩	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩								右中野野結節、 右下野内側肺紋 理増強
50	男	1930年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし								
51	男	1950年代	—	②	受診せず	受診せず	—	②								
52	女	1940年代	②	②	受診せず	受診せず	—	②								
53	男	1940年代	②,③,⑥	②,③,⑥	受診せず	受診せず	—	②,③,⑥								
54	男	1930年代	②,⑥	受診せず	⑩	受診せず	—	⑩								CPO
55	女	1940年代	②,⑥,⑧,⑩	②,⑥,⑧,⑩	②,⑥,⑧,⑩	受診せず	—	②,⑥,⑧,⑩								両肺野肺壁下小 結節散在
56	女	1940年代	②,⑥,⑨	②,⑥,⑨	②,⑥,⑨	受診せず	—	②,⑥,⑨								
57	男	1940年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	受診せず	—	②,⑨								
58	男	1930年代	②,⑨	②,⑨	②,⑨	受診せず	—	②,⑨								
59	女	1920年代	②,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑨								
60	女	1930年代	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	受診せず	—	②,⑨,⑩								気腫性変化
61	女	1940年代	②,⑩	②,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑩								斑状影
62	男	1940年代	⑧,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑧,⑩								無気肺
63	女	1940年代	⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑩								気管支拡張
64	女	1940年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								
65	男	1940年代	②,⑥	②,⑥	②,⑥	受診せず	—	②,⑥								
66	女	1910年代	②,⑥,⑨,⑩	受診せず	②,⑥,⑨,⑩	受診せず	—	②,⑥,⑨,⑩								気管支拡張、気 腫性変化
67	男	1920年代	②,⑥,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑩								気管支拡張
68	女	1930年代	②,⑨	②,⑨	②,⑩	受診せず	—	②,⑩								右下野不整形陰 影
69	男	1940年代	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	受診せず	—	②,⑨,⑩								結節影、気腫性 変化
70	女	1940年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								
71	女	1930年代	②,⑨,⑩	受診せず	②,⑨,⑩	受診せず	—	②,⑨,⑩								気腫性変化
72	女	1940年代	なし	受診せず	なし	受診せず	—	なし								
73	女	1930年代	—	②,⑩	②,⑩	受診せず	—	②,⑩								肋骨横断角鈍 化
74	女	1930年代	②	②	受診せず	受診せず	—	②								
75	男	1910年代	②,③,⑥,⑧	②,③,⑥,⑧	受診せず	受診せず	—	②,③,⑥,⑧								
76	女	1940年代	②,⑥,⑧	②,⑥,⑧	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑧								
77	男	1930年代	②,⑦,⑩	②,⑦,⑩	②,⑦,⑩	受診せず	—	②,⑦,⑩								左横断角鈍化
78	男	1940年代	②,⑧,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑧,⑨								
79	男	1930年代	⑥,⑨,⑩	⑥,⑨,⑩	受診せず	受診せず	—	⑥,⑨,⑩								心肥大
80	女	1940年代	⑧	⑧	受診せず	受診せず	—	⑧								
81	男	1930年代	⑧,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑧,⑨								
82	女	1930年代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし								

症例番号	性別	生年 (西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の 所見	ア. 直接職歴有 イ. 間接職歴有 ウ. 家庭内ばく露あり エ. 立入・屋内環境ばく露あり オ. その他					ばく 露 歴 分 類 案	備考 (その他所見)	備考 (終了 理由)
									ア	イ	ウ	エ	オ			
83	女	1930年代	—	—	⑩	受診せず	—	⑩	●	●	●		●	ア	粒状影、右胸膜肥厚、右術後変	
84	男	1920年代	②,⑩	②,⑧,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑧,⑩	●		●	●	●	ア	気腫性変化	
85	女	1920年代	—	—	②,⑩	受診せず	—	②,⑩		●				イ	石灰化像	
86	男	1930年代	—	—	②,⑥	受診せず	—	②,⑥		●				イ		
87	男	1940代	②,⑨,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑨,⑩		●				イ	上葉切除後	
88	女	1950代	⑧,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑥,⑩		●				イ	気腫性変化	
89	女	1920年代	⑨	⑨	⑨	受診せず	—	⑨		●				イ		
90	男	1960年代	なし	⑩	⑩	受診せず	—	⑩		●				イ	左上肺野結節	
91	男	1930年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●				イ		
92	女	1940年代	—	—	⑩	受診せず	—	⑩		●	●			イ	胸膜肥厚	
93	男	1920代	②,⑥,⑦	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑦		●	●			イ		
94	男	1950代	⑨,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑨,⑩		●	●			イ	気腫性変化	
95	男	1950年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●		●		イ		
96	男	1930代	②,⑥,⑧,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑥,⑧,⑨		●			●	イ		
97	女	1940年代	②,⑨,⑩	②,⑨,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑨,⑩		●			●	イ	右中肺野結節	
98	女	1950年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●			●	イ		
99	男	1960年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし		●			●	イ		
100	男	1940年代	—	—	⑩	受診せず	—	⑩			●			ウ	左乳房石灰化	
101	男	1950代	⑧,⑨,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑧,⑨,⑩		●				ウ	肺気腫	
102	女	1940年代	なし	受診せず	⑩	受診せず	—	⑩		●				ウ	結節影	
103	女	1960代	⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑩		●	●			ウ	プラ	
104	女	1960年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●	●			ウ		
105	女	1950年代	②	②	受診せず	受診せず	—	②		●			●	ウ		
106	女	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●			●	ウ		
107	女	1950年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●			●	ウ		
108	女	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●			●	ウ		
109	女	1950年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし		●			●	ウ		
110	女	1930年代	②	②	受診せず	受診せず	—	②		●	●			ウ		
111	女	1940年代	②,⑨	受診せず	②,⑨	受診せず	—	②,⑨		●	●		●	ウ		
112	女	1950年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし		●			●	ウ		
113	男	1960年代	⑩	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩			●			エ	気管支拡張	
114	女	1940年代	なし	なし	受診せず	受診せず	—	なし			●			エ		
115	女	1960年代	⑩	⑩	⑩	受診せず	—	⑩			●		●	エ	肺気腫・肋骨骨折	
116	男	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし			●			エ		
117	男	1930年代	—	—	②,⑩	受診せず	—	②,⑩					●	オ	右腎萎縮	
118	女	1950年代	—	—	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
119	女	1960年代	—	—	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
120	男	1930年代	①	①	①,④	受診せず	—	①,④					●	オ		
121	女	1930年代	②	②	②	受診せず	—	②					●	オ		
122	女	1930年代	②,⑧,⑨	②,⑧,⑨	②,⑧,⑨	受診せず	—	②,⑧,⑨					●	オ		
123	女	1930年代	⑩	⑩	②,⑩	受診せず	—	②,⑩					●	オ	無気肺	
124	女	1940年代	⑩	⑩	⑩	受診せず	—	⑩					●	オ	気腫性変化	
125	男	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
126	女	1930年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
127	女	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
128	女	1940年代	なし	なし	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
129	男	1930年代	②	②	受診せず	受診せず	—	②					●	オ		
130	女	1940年代	②,⑨	②,⑨	受診せず	受診せず	—	②,⑨					●	オ		
131	男	1930年代	②,⑩	②,⑩	受診せず	受診せず	—	②,⑩					●	オ	肋骨横隔膜角鈍化	
132	男	1950年代	⑨,⑩	⑨,⑩	受診せず	受診せず	—	⑨,⑩					●	オ	プラ	
133	女	1940年代	⑩	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩					●	オ	気管支拡張	
134	男	1950年代	⑩	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩					●	オ	OP後	
135	男	1930年代	なし	⑩	受診せず	受診せず	—	⑩					●	オ	斑状影	
136	女	1960年代	なし	受診せず	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
137	女	1930年代	なし	受診せず	なし	受診せず	—	なし					●	オ		
138	女	1940代	②,⑧,⑨	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑧,⑨					●	オ		
139	女	1920代	②,⑩	受診せず	受診せず	受診せず	—	②,⑩					●	オ	気管支拡張	
140	女	1920代	⑥	受診せず	受診せず	受診せず	—	⑥					●	オ		
141	女	1950代	なし	受診せず	受診せず	受診せず	—	なし					●	オ		
計141名(男性:65名、女性:76名)									71	13	42	12	46			

B表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴集計表

	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	小計	うち女性
●						74	26
●		●				6	0
●			●			23	16
●				●		2	0
●					●	17	4
●		●	●			0	0
●		●		●		0	0
●		●			●	1	0
●			●	●		1	1
●			●		●	11	6
●			●	●	●	2	0
●		●	●	●		0	0
●		●	●		●	0	0
●		●		●	●	0	0
●			●	●	●	1	0
●		●	●	●	●	0	0
		●				12	1
		●	●			2	1
		●		●		0	0
		●			●	11	3
		●	●	●		0	0
		●	●		●	1	1
		●	●	●	●	0	0
		●	●	●	●	0	0
			●	●		11	8
			●	●		7	3
			●		●	13	9
			●	●	●	1	1
				●		5	1
				●	●	7	3
					●	60	40
計*	138	33	71	26	125	268	124
うち女性*	53	6	46	9	67		

* 縦計については重複計上

B-2表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者のばく露歴及び年齢階層別分類表

年齢別	計	うち女性	ア.主に直接職歴	うち女性	イ.主に間接職歴	うち女性	ウ.主に家庭内ばく露	うち女性	エ.主に立入・屋内環境ばく露	うち女性	オ.その他	うち女性
40歳未満	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40~49歳	20	10	2	0	5	3	6	3	3	1	4	3
50~59歳	45	18	15	6	6	0	10	5	5	1	9	6
60~69歳	95	50	51	19	7	0	11	10	3	2	23	19
70~79歳	96	42	63	25	8	3	5	3	0	0	20	11
80~89歳	11	4	6	3	0	0	0	0	1	0	4	1
90~99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	268	124	138	53	26	6	32	21	12	4	60	40

C表:平成2年以前に泉南地域に居住していた者に関するばく露歴と医学的所見のクロス集計表
(C-1 所見について)

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	115	40	72	23	9	2	14	5	4	1	16	9
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	102 (4)	33 (2)	65 (4)	19 (2)	8	2	12	5	4	1	13	6
③びまん性胸膜肥厚	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
④中皮腫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥肺野の間質影	17	6	14	5	0	0	2	1	0	0	1	0
⑦円形無気肺	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
⑧肺がん	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
⑨リンパ節の腫大	29	9	15	4	5	1	4	1	1	0	4	3

※①～⑨は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

⑥肺野の間質影の詳細分類

	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
肺野の間質影実人数	17	6	14	5	0	0	2	1	0	0	1	0
胸膜下曲線様陰影	13	5	11	4	0	0	1	1	0	0	1	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	13	5	11	4	0	0	1	1	0	0	1	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小葉中心性粒状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
すりガラス様陰影	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
網状影	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
蜂窩肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は計上していない。

③びまん性胸膜肥厚、⑥肺野の間質影の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い												

※()は所見疑いを再掲

⑥肺野の間質影	計	うち女性	ア.主に 直接職 歴	うち女性	イ.主に 間接職 歴	うち女性	ウ.主に家 庭内ばく 露	うち女性	エ.主に立 入・屋内 環境ばく 露	うち女性	オ.その他	うち女性
強く疑う	17	6	14	5	0	0	2	1	0	0	1	0
疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
可能性がある	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17	6	14	5	0	0	2	1	0	0	1	0
他の原因である可能性が高い												

※()は所見疑いを再掲

(C-2 胸水貯留、胸膜ブランク、びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見が見られた者の年齢階層別分類表)

①胸水貯留

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に 立入・屋 内環境ば く露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

②胸膜ブランク

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に 立入・屋 内環境ば く露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	4	2	0	0	1	1	3	1	0	0	0	0
50～59歳	13	3	4	2	1	0	4	0	2	0	2	1
60～69歳	30 (2)	10 (1)	22 (2)	5 (1)	2	0	2	2	1	1	3	2
70～79歳	48 (2)	16 (1)	34 (2)	10 (1)	4	1	3	2	0	0	7	3
80～89歳	7	2	5	2	0	0	0	0	1	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	102 (4)	33 (2)	65 (4)	19 (2)	8	2	12	5	4	1	13	6

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に 立入・屋 内環境ば く露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

④肺野の間質影

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に 立入・屋 内環境ば く露	うち女性	オ.その 他	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	5	2	4	1	0	0	1	1	0	0	0	0
70～79歳	10	4	9	4	0	0	1	0	0	0	0	0
80～89歳	2 (1)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	17 (1)	6	14	5	0	0	2	1	0	0	1	0

※()は所見疑いを再掲

(C-3 調査対象者の状況)

	計	うち女性	ア.主に 直接職歴	うち女性	イ.主に 間接職歴	うち女性	ウ.主に 家庭内ば く露	うち女性	エ.主に 立入・屋 内環境ば く露	うち女性	オ.その 他	うち女性
経過観察者	268	124	138	53	26	6	32	21	12	4	60	40
調査終了者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	268	124	138	53	26	6	32	21	12	4	60	40