

表1 指定医療機関別受診者数

指定医療機関名	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
兵庫県立尼崎病院	165	28.5%	87	27.7%	78	29.5%
兵庫医科大学病院	107	18.5%	50	15.9%	57	21.6%
関西労災病院	103	17.8%	59	18.8%	44	16.7%
尼崎市保健所	203	35.1%	118	37.6%	85	32.2%
合 計	578	100.0%	314	100.0%	264	100.0%

※平成22年3月31日現在

表2-1 年齢階層別受診者数

	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	5	0.9%	3	1.0%	2	0.8%
40～49歳	33	5.7%	17	5.4%	16	6.1%
50～59歳	100	17.3%	50	15.9%	50	18.9%
60～69歳	219	37.9%	115	36.6%	104	39.4%
70～79歳	188	32.5%	110	35.0%	78	29.5%
80～89歳	33	5.7%	19	6.1%	14	5.3%
90～99歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合 計	578	100.0%	314	100.0%	264	100.0%

※平成22年3月31日現在

表2-2 検査項目別受診者数

受診内容	合計	
	(人)	(%)
問診＋胸部X線＋胸部CT	345	59.7%
問診＋胸部X線のみ	203	35.1%
問診＋胸部CTのみ	30	5.2%
問診のみ	0	0.0%
合 計	578	100%

※平成22年3月31日現在

ばく露歴と医学的所見に係る集計表

A表：2009年度受診者（昭和30から50年に尼崎市に居住していた協力者）

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド あり	イデックス あり	ウエスタン あり	エコーあり	その他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
1	1237	男	1930代						⑩	●	●			●	ア		
2	700	男	1940代			なし	不変		なし	●	●			●	ア		
3	1353	男	1930代						なし	●	●			●	ア		
4	1349	男	1930代						なし	●	●			●	ア		
5	1352	男	1930代						②・⑩	●	●			●	ア		
6	1245	男	1930代						②	●	●				ア		
7	146	女	1930代	なし	なし	なし	不変		なし	●		●		●	ア		
8	1078	男	1940代						⑩	●		●			ア		
9	659	男	1940代			⑩	不変		⑩	●		●			ア		
10	1091	男	1960代						なし	●			●	●	ア		
11	1270	男	1940代						⑩	●			●	●	ア		
12	1254	男	1940代						②・⑩	●			●	●	ア		
13	431	男	1960代		⑥	⑩		○	⑩	●			●	●	ア		
14	815	男	1940代			なし	不変		なし	●			●	●	ア		
15	859	男	1940代			②・③・⑦	不変		②・③・⑦	●			●	●	ア		
16	877	男	1930代						⑩	●				●	ア		
17	813	男	1940代						なし	●				●	ア		
18	827	男	1940代						②・⑩	●				●	ア		
19	828	男	1930代						②	●				●	ア		
20	834	男	1930代						なし	●				●	ア		
21	883	女	1930代						⑩	●				●	ア		
22	888	男	1930代						⑩	●				●	ア		
23	929	男	1950代						②	●				●	ア		
24	961	男	1940代						⑩	●				●	ア		
25	963	男	1930代						②・⑥	●				●	ア	石綿手帳 取得	
26	1037	男	1930代						②・⑩	●				●	ア		
27	1059	男	1940代						⑩	●				●	ア		
28	1171	男	1940代						②	●				●	ア		
29	1213	男	1940代						⑩	●				●	ア		
30	1309	男	1940代						②	●				●	ア		
31	993	男	1930代						②・⑩	●				●	ア		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド あり	イデロイド あり	ウエーラー あり	エラスター あり	その他 あり	はく離 分類	経過観察 終了	備考
32	1305	男	1940代						⑩	●				●	ア		
33	1264	女	1930代						②	●				●	ア		
34	1275	男	1960代						なし	●				●	ア		
35	892	男	1930代						②・③・⑦・⑧	●				●	ア		採血
36	1284	男	1940代						②・⑤・⑩	●				●	ア		
37	1057	男	1930代						⑩	●				●	ア		
38	1198	男	1930代						なし	●				●	ア		
39	1234	男	1940代						なし	●				●	ア		
40	1235	男	1940代						②	●				●	ア		
41	387	男	1940代		②	⑩	不変		⑩	●				●	ア		
42	39	男	1940代	②疑	②	⑩	不変		⑩	●				●	ア		
43	115	男	1940代	なし	なし	なし	不変		なし	●				●	ア		
44	458	男	1930代		②	②	不変		②	●				●	ア		
45	377	男	1940代		なし	なし	不変		なし	●				●	ア		
46	99	男	1930代	⑩	⑩	⑩	不変		⑩	●				●	ア		
47	106	男	1930代	②・⑩		②・⑩	不変		②・⑩	●				●	ア		
48	97	男	1920代	⑩	⑩	⑩	不変		⑩	●				●	ア		
49	481	男	1930代		②	②	新所見	○	⑩	●				●	ア		
50	28	男	1930代	②	②	②	不変		②	●				●	ア		
51	159	男	1950代	⑩	⑩	⑩	不変		⑩	●				●	ア		
52	277	男	1930代		なし	なし	不変		なし	●				●	ア		
53	29	男	1940代	なし	なし	なし	不変		なし	●				●	ア		
54	506	男	1920代			⑩	不変		⑩	●				●	ア		
55	612	男	1930代			⑩	不変		⑩	●				●	ア		
56	614	男	1960代			なし	不変		なし	●				●	ア		
57	638	男	1930代			⑩・⑩	不変		⑩	●				●	ア		
58	737	男	1940代			②	不変		②	●				●	ア		
59	449	男	1950代			なし	不変		なし	●				●	ア		
60	752	男	1950代			なし	不変		なし	●				●	ア		
61	765	男	1930代			⑩		○	②・⑩	●				●	ア		
62	802	男	1930代			⑩	不変		⑩	●				●	ア		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド病 あり	イ型過敏症 あり	ウエーラー症 あり	エリス入り あり	その他	経過観察・ 終了	備考
63	283	男	1930代		㊸		不変		㊸	●				●	ア	
64	393	男	1950代		㊸		不変		㊸	●				●	ア	
65	1211	男	1940代						㊸	●				●	ア	
66	1321	男	1940代						㊸	●				●	ア	
67	1307	男	1930代						㊸・㊹	●				●	ア	
68	1351	男	1920代						㊸・㊹・㊺	●				●	ア	
69	1202	男	1930代						なし	●				●	ア	
70	391	男	1940代		㊸	㊹	不変		㊸	●				●	ア	
71	1157	男	1950代						なし	●				●	ア	
72	1225	男	1940代						㊸	●				●	ア	
73	874	男	1930代						㊸	●					ア	
74	854	女	1940代						㊸	●					ア	
75	242	男	1940代						㊸	●					ア	
76	988	男	1930代						㊸	●					ア	
77	1017	男	1950代						㊸	●					ア	
78	1026	男	1930代						㊸・㊹	●					ア	
79	1050	男	1940代						㊸	●					ア	
80	1083	男	1930代						㊸	●					ア	
81	1119	男	1930代						なし	●					ア	
82	1131	女	1950代						なし	●					ア	
83	1151	女	1940代						㊸	●					ア	
84	1161	男	1940代						㊸	●					ア	
85	1185	男	1920代						㊸	●					ア	
86	1205	男	1950代						㊸	●					ア	
87	716	男	1920代						㊸	●					ア	
88	1118	男	1940代						㊸	●					ア	
89	1163	男	1960代						㊸	●					ア	
90	1177	男	1940代						㊸・㊹	●					ア	肺がん 要医療
91	1219	男	1930代						㊸・㊹	●					ア	採血・造影・ 経気管肺生検法
92	1318	男	1930代						㊸	●					ア	
93	460	男	1930代		㊸	㊹	不変		㊸	●					ア	

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2008年度 CT	最新の所見	アラスカ あり	イリノイ あり	ウエスタン あり	エドモント あり	その他の あり	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
94	31	男	1920代	なし	②・③・④	④		○	⑧・⑨	●					ア		
95	293	男	1940代		④	④	不変		⑩	●					ア		
96	420	男	1950代		なし	なし	不変		なし	●					ア		
97	43	男	1930代	②	②	②	不変	○	②・④	●					ア		
98	183	男	1960代	なし	なし	なし	不変		なし	●					ア		
99	188	男	1930代		④	④	不変		⑩	●					ア		
100	715	男	1940代			⑥		○	なし	●					ア		
101	683	男	1930代			②・③	不変		②・④	●					ア		
102	682	女	1930代			④	不変		⑩	●					ア		
103	317	男	1930代		なし		不変		なし	●					ア		
104	390	男	1940代		なし		不変		なし	●					ア		
105	1294	男	1930代						②	●					ア		
106	1291	男	1940代						なし	●					ア		
107	1336	男	1930代						⑩	●					ア		
108	1361	女	1930代						④	●					ア		
109	1269	男	1940代						なし	●					ア		
110	510	男	1930代		④	④	不変		④	●					ア		
111	517	男	1940代		②・④		不変		②・④	●					ア		
112	1073	男	1960代						なし	●					ア		
113	1362	女	1930代						なし	●	●	●			イ		
114	1042	女	1940代						なし	●	●		●		イ		
115	191	男	1940代	④		④	不変		④	●	●		●		イ		
116	94	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし	●	●				イ		
117	86	女	1940代	なし	なし	なし		○	なし	●	●				イ		
118	900	男	1960代						なし	●		●	●		イ		
119	743	男	1940代						なし	●		●	●		イ		
120	566	男	1930代						②・④・⑩	●		●	●		イ		
121	809	男	1930代			④	不変		④	●		●	●		イ		
122	1143	男	1930代						②・④	●		●	●		イ		
123	1274	男	1930代						④	●		●	●		イ		
124	927	男	1960代						なし	●		●			イ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2005年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド あり	イ型過剰 あり	ウ型過剰 あり	エ型過剰 あり	その他の あり	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
125	1233	男	1930代						⑤		●		●		イ		
126	1231	男	1940代						⑤		●		●		イ		
127	808	女	1930代						なし		●			●	イ		
128	841	男	1930代						②・⑤		●			●	イ		
129	880	男	1940代						⑤		●			●	イ		
130	943	男	1940代						⑤		●			●	イ		
131	949	男	1950代						⑤		●			●	イ		
132	938	男	1930代						⑤		●			●	イ		
133	947	女	1940代						なし		●			●	イ		
134	909	男	1930代						⑤		●			●	イ		
135	895	女	1930代						なし		●			●	イ		
136	1086	女	1920代						⑤		●			●	イ		
137	1106	男	1940代						なし		●			●	イ		
138	1170	男	1960代						なし		●			●	イ		
139	1176	男	1930代						⑤		●			●	イ		
140	1210	女	1920代						⑤		●			●	イ		
141	1223	男	1940代						なし		●			●	イ		
142	1244	男	1940代						⑤		●			●	イ		
143	1182	男	1930代						②		●			●	イ		
144	1286	男	1950代						なし		●			●	イ		
145	434	男	1940代		⑤	②		○	⑤		●			●	イ		
146	319	女	1940代		②	②	不変		②		●			●	イ		
147	438	男	1930代		なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
148	85	男	1940代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤		●			●	イ		
149	122	女	1930代	⑤		⑤	不変		⑤		●			●	イ		
150	51	男	1930代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤		●			●	イ		
151	55	男	1940代	②	②	②	不変	○	②		●			●	イ		
152	373	男	1930代		⑤	⑤	不変		⑤		●			●	イ		
153	116	男	1940代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤		●			●	イ		
154	156	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
155	328	男	1940代		なし	なし	不変		なし		●			●	イ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア変位所見 あり	イ変位所見 あり	ウ変位所見 あり	エ変位所見 あり	オその他	ばく露 分類	経過観察- 終了	備考
156	252	男	1950代		②	②	不変		②		●			●	イ		
157	254	男	1940代		なし	なし	不変		なし		●			●	イ		
158	226	男	1950代	②・③・⑤	②・③・⑤	②・③・⑤		○	②		●			●	イ		
159	137	男	1940代	②	②	②	不変		②		●			●	イ		
160	216	男	1930代	②	②	②	不変		②		●			●	イ		
161	548	男	1930代			②・⑤	不変	○	②		●			●	イ		
162	291	男	1920代			⑤・⑨・⑩	不変		⑨・⑨・⑩		●			●	イ		
163	588	男	1930代			⑥		○	⑥		●			●	イ		
164	580	男	1940代			⑩	不変		⑩		●			●	イ		
165	636	男	1930代			なし	不変		なし		●			●	イ		
166	605	男	1930代			②・⑤		○	⑤		●			●	イ		
167	631	女	1930代			なし	不変		なし		●			●	イ		
168	649	男	1940代			なし	不変		なし		●			●	イ		
169	653	男	1940代			なし	不変		なし		●			●	イ		
170	678	男	1940代			⑩	不変		⑩		●			●	イ		
171	725	男	1940代			⑤	不変		⑤		●			●	イ		
172	407	男	1940代			なし	不変		なし		●			●	イ		
173	775	女	1940代			なし	不変		なし		●			●	イ		
174	818	女	1920代			②	不変		②		●			●	イ		
175	751	男	1930代			⑩・⑩・⑩		○	⑩		●			●	イ		
176	20	男	1940代		なし		不変	○	なし		●			●	イ		
177	403	男	1920代		⑩		不変		⑩		●			●	イ		
178	1123	女	1930代						②		●			●	イ		
179	1242	男	1940代						②・⑩		●			●	イ		
180	1248	女	1930代						②		●			●	イ		
181	1310	男	1950代						⑤・⑩		●			●	イ		
182	1279	男	1930代						⑩		●			●	イ		
183	1333	男	1940代						⑧		●			●	イ		
184	1076	男	1950代						⑩		●			●	イ		
185	312	男	1930代		②・⑤	②・⑩	不変		②・⑤		●			●	イ		
186	526	男	1940代		⑩	⑩	不変		⑩		●			●	イ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド症 あり	イソ硝子症 あり	今更症 あり	エコー入り あり	本患の他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
187	889	男	1940代						⑩		●				イ		
188	974	男	1920代						なし		●				イ		
189	1005	男	1930代						⑩		●				イ		
190	1014	女	1940代						なし		●				イ		
191	1035	男	1930代						なし		●				イ		
192	1074	男	1950代						なし		●				イ		
193	1095	男	1930代						②・⑩		●				イ		
194	1145	男	1940代						②・⑩		●				イ		
195	1148	男	1950代						⑤		●				イ		
196	1003	男	1920代						⑩		●				イ		
197	1189	男	1950代						なし		●				イ		
198	1232	男	1930代						⑧		●				イ		
199	1207	男	1950代						⑥		●				イ		
200	1120	男	1940代						②		●				イ		
201	343	男	1940代		②	②	不変		②		●				イ		
202	421	女	1950代		なし	なし	不変		なし		●				イ		
203	556	男	1940代			⑩	不変		⑩		●				イ		
204	672	男	1930代			なし	不変		なし		●				イ		
205	1313	男	1920代						②		●				イ		
206	1331	男	1940代						⑩		●				イ		
207	1355	男	1930代						②		●				イ		
208	493	男	1930代		⑤・⑧	⑤・⑥・⑧・ ⑩	不変		⑤・⑧・⑩		●				イ		
209	513	女	1950代			なし	不変		なし		●				イ		
210	1209	男	1940代						なし		●				イ		
211	396	男	1930代		⑩	⑩	不変		⑩		●				イ		
212	266	男	1940代			⑤・⑩	不変		⑤・⑩		●				イ		
213	294	男	1930代		⑩		不変		⑩		●				イ		
214	1061	女	1950代						②			●	●	●	ウ		
215	1325	女	1960代						⑩			●	●	●	ウ		
216	1152	女	1930代						⑩			●	●		ウ		
217	907	女	1930代						⑩			●		●	ウ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド あり	イシ化 あり	ウエー あり	エー あり	オ あり	はく 分類	経過観察 終了	備考
218	1044	女	1940代						⑮			●		●	ウ		
219	1036	女	1940代						⑮			●		●	ウ		
220	1056	女	1940代						なし			●		●	ウ		
221	711	女	1950代						②			●		●	ウ		採血
222	1080	女	1940代						②			●		●	ウ		
223	1214	女	1940代						⑮			●		●	ウ		
224	1158	女	1950代						⑮			●		●	ウ		
225	1226	女	1940代						なし			●		●	ウ		
226	1314	女	1950代						⑮			●		●	ウ		
227	1326	女	1950代						⑮			●		●	ウ		
228	57	女	1950代	⑮	⑮	⑮	不変		⑮			●		●	ウ		
229	113	女	1940代	なし	なし	⑮		○	⑮			●		●	ウ		
230	571	女	1930代			②・⑮	不変	○	②			●		●	ウ		
231	634	女	1930代			⑮		○	⑮			●		●	ウ		
232	811	女	1930代			⑮		○	⑮			●		●	ウ		
233	348	女	1930代		②		不変		②			●		●	ウ		
234	470	女	1930代		②		不変		②			●		●	ウ		
235	992	女	1930代						なし			●		●	ウ		
236	1149	女	1930代						なし			●		●	ウ		
237	1272	女	1960代						なし			●		●	ウ		
238	485	女	1940代		⑮	⑮	不変		⑮			●		●	ウ		
239	914	女	1940代						なし			●			ウ		
240	677	男	1960代						なし			●			ウ		
241	361	女	1940代		なし	なし	不変		なし			●			ウ		
242	2	女	1930代	なし		なし	不変		なし			●			ウ		
243	1136	男	1940代						②			●			ウ		
244	1228	女	1960代						なし			●			ウ		
245	511	女	1940代		なし	なし	不変		なし			●			ウ		
246	971	男	1930代						なし				●	●	エ		
247	972	女	1930代						⑮				●	●	エ		
248	979	女	1950代						なし				●	●	エ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア.造影剤 あり	イ.拡張期 あり	ウ.収縮期 あり	エ.心入り あり	オ.その他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
249	1038	女	1950代						⑩				●	●	工		
250	978	女	1950代						②・⑩				●	●	工		
251	1022	男	1960代						なし				●	●	工		
252	1111	男	1950代						⑩				●	●	工		
253	545	男	1940代						⑩				●	●	工		
254	671	男	1940代						なし				●	●	工		
255	996	女	1940代						⑩				●	●	工		
256	882	男	1940代						②				●	●	工		
257	413	女	1950代		なし	⑩		○	②・⑩				●	●	工		
258	424	女	1950代		②	②		○	②				●	●	工		
259	243	男	1950代		なし	なし	不変		なし				●	●	工		
260	425	男	1940代		なし	なし	不変		なし				●	●	工		
261	120	女	1950代	なし	なし	なし	不変		なし				●	●	工		
262	486	男	1950代		②	②	不変		②				●	●	工		
263	75	男	1940代	なし	⑩	⑩	不変		⑩				●	●	工		
264	174	男	1960代		②	②	不変		②				●	●	工		
265	228	男	1940代		なし	なし	不変		なし				●	●	工		
266	76	男	1950代	②	②	②	不変		②				●	●	工		
267	353	女	1950代			②・⑩	不変		②・⑩				●	●	工		
268	632	男	1950代			②	不変	○	②				●	●	工		
269	315	男	1950代			なし	不変		なし				●	●	工		
270	642	男	1970代			⑩	不変		⑩				●	●	工		
271	835	男	1930代			⑥	不変		⑥				●	●	工		
272	244	女	1940代		なし		不変		なし				●	●	工		
273	495	女	1940代		なし		不変		なし				●	●	工		
274	1058	女	1920代						なし				●		工		
275	746	男	1940代			⑩	不変		⑩				●		工		
276	1201	男	1950代						なし				●		工		
277	221	男	1930代		②	②	不変		②				●		工		
278	872	女	1940代						⑩					●	オ		
279	794	男	1920代						なし					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2008年度 CT	最新の所見	アミロイド病 あり	心臓病 あり	うつ病 あり	エリス入 あり	その他の あり	ばく露 分類	経過観察 終了	備考
280	796	女	1930代						⑩					●	オ		
281	847	女	1940代						⑩					●	オ		
282	860	女	1950代						⑤					●	オ		
283	862	女	1930代						なし					●	オ		
284	884	男	1950代						なし					●	オ		
285	869	女	1950代						⑩					●	オ		
286	870	女	1950代						なし					●	オ		
287	906	女	1930代						⑤-⑩					●	オ		
288	911	男	1930代						⑩					●	オ		
289	937	男	1930代						⑩					●	オ		
290	904	男	1940代						⑩					●	オ	終了 肺がん	
291	903	女	1940代						なし					●	オ		
292	624	男	1950代						⑩					●	オ		
293	768	男	1950代						⑩					●	オ		
294	807	女	1950代						なし					●	オ		
295	843	女	1950代						⑩					●	オ		
296	852	女	1950代						なし					●	オ		
297	879	女	1950代						⑩					●	オ		
298	891	女	1940代						⑩					●	オ		
299	896	女	1940代						なし					●	オ		
300	908	女	1960代						⑩					●	オ		
301	913	男	1950代						⑩					●	オ		
302	926	女	1930代						⑤					●	オ		
303	942	女	1940代						なし					●	オ		
304	951	女	1950代						なし					●	オ		
305	539	女	1940代						⑩					●	オ		
306	858	男	1950代						⑩					●	オ		
307	861	女	1940代						なし					●	オ		
308	867	女	1950代						なし					●	オ		
309	873	女	1960代						なし					●	オ		
310	890	男	1950代						②					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド病 あり	イシカサ病 あり	ウミカサ病 あり	エリス入 あり	その他の あり	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
311	893	女	1960代						なし					●	オ		
312	898	女	1940代						⑩					●	オ		
313	912	女	1920代						⑩					●	オ		
314	939	女	1930代						なし					●	オ		
315	940	男	1930代						⑩					●	オ		
316	944	男	1940代						なし					●	オ		
317	945	女	1940代						なし					●	オ		
318	946	女	1940代						なし					●	オ		
319	955	男	1930代						⑩					●	オ		
320	957	男	1930代						⑩					●	オ		
321	967	女	1940代						⑩					●	オ		
322	969	女	1950代						②					●	オ		
323	980	女	1960代						なし					●	オ		
324	100	男	1930代						⑩					●	オ		
325	161	女	1930代						⑩					●	オ		
326	826	女	1940代						なし					●	オ		
327	921	女	1940代						なし					●	オ		
328	923	男	1940代						⑩					●	オ		
329	958	女	1960代						なし					●	オ		
330	973	女	1940代						なし					●	オ		
331	1004	女	1920代						⑩					●	オ		
332	1007	男	1940代						なし					●	オ		
333	1015	男	1940代						⑩					●	オ		
334	964	女	1950代						⑩					●	オ		
335	976	女	1960代						なし					●	オ		
336	987	女	1920代						⑩					●	オ		
337	1018	男	1950代						⑩					●	オ		
338	1021	女	1930代						⑩					●	オ		
339	1028	女	1940代						なし					●	オ		
340	1039	男	1930代						②					●	オ		
341	1080	女	1930代						⑩					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2008年度 CT	最新の所見	ア変位 あり	イ変位 あり	ウ変位 あり	エ変位 あり	オその他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
342	1084	女	1920代						⑩					●	オ		
343	894	男	1940代						なし					●	オ		
344	950	女	1930代						⑩					●	オ		
345	982	男	1940代						なし					●	オ		
346	1030	男	1930代						⑥					●	オ		
347	1033	男	1930代						⑤・⑩					●	オ		
348	1034	女	1930代						⑩					●	オ		
349	1049	女	1940代						⑩					●	オ		
350	1052	女	1930代						⑩					●	オ		
351	1054	男	1930代						②					●	オ		
352	1055	女	1950代						なし					●	オ		
353	668	女	1940代						なし					●	オ		
354	1043	女	1930代						なし					●	オ		
355	1069	男	1950代						⑩					●	オ		
356	1087	女	1960代						⑩					●	オ		採血
357	457	女	1940代						⑩					●	オ		
358	744	女	1940代						⑩					●	オ		
359	897	女	1930代						②・⑩					●	オ		
360	982	女	1930代						②					●	オ		
361	1046	女	1940代						なし					●	オ		
362	1068	女	1940代						⑩					●	オ		
363	1103	男	1950代						なし					●	オ		
364	1096	女	1940代						⑩					●	オ		
365	551	男	1930代						⑩					●	オ		
366	1064	女	1930代						⑩					●	オ		
367	1070	男	1940代						なし					●	オ		
368	1082	女	1940代						なし					●	オ		
369	1089	男	1940代						なし					●	オ		
370	1090	女	1940代						なし					●	オ		
371	1087	女	1930代						②					●	オ		
372	1088	男	1950代						なし					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド病 あり	心臓病 あり	うっ血性肺病 あり	エコー入り あり	オスの性	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
373	1114	男	1940代						②・④					●	オ		
374	1117	女	1930代						②					●	オ		
375	1126	男	1930代						なし					●	オ		
376	1134	女	1940代						⑤・⑥					●	オ		
377	1116	女	1920代						②					●	オ		
378	1128	女	1930代						④					●	オ		
379	1133	女	1940代						④					●	オ		
380	1144	男	1940代						④					●	オ		
381	1147	男	1940代						なし					●	オ		
382	1153	女	1940代						④					●	オ		
383	1167	男	1970代						なし					●	オ		
384	1186	男	1960代						なし					●	オ		
385	1142	女	1950代						④					●	オ		
386	1155	男	1940代						なし					●	オ		
387	1164	女	1950代						なし					●	オ		
388	1169	男	1940代						②・⑤					●	オ		
389	1173	女	1940代						なし					●	オ		
390	1184	女	1950代						②					●	オ		
391	1194	女	1930代						⑥					●	オ		
392	1195	女	1940代						なし					●	オ		
393	1196	女	1940代						なし					●	オ		
394	1199	女	1940代						④					●	オ		
395	1212	男	1930代						⑤・⑥					●	オ		
396	1216	女	1930代						②					●	オ		
397	1217	女	1950代						②					●	オ		
398	1221	男	1940代						⑤・⑥					●	オ		
399	1243	女	1940代						なし					●	オ		
400	1259	女	1930代						②・④					●	オ		
401	1266	男	1960代						なし					●	オ		
402	1281	男	1930代						なし					●	オ		
403	1285	女	1940代						⑤					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド病 あり	心筋症候群 あり	腎臓病 あり	肝臓病 あり	その他の 病	ばく露 分類	経過観察- 終了	備考
404	1290	男	1930代						なし					●	オ		
405	917	女	1950代						②-⑩					●	オ		
406	918	女	1950代						②-⑩					●	オ		
407	919	女	1950代						②-⑩					●	オ		
408	1094	女	1940代						⑩					●	オ		
409	1110	男	1950代						なし					●	オ		
410	1203	男	1950代						なし					●	オ		
411	1255	男	1950代						⑩					●	オ		
412	1265	男	1940代						⑩					●	オ		
413	1273	女	1950代						②					●	オ		
414	1278	男	1950代						⑤-⑩					●	オ		
415	1282	女	1940代						なし					●	オ		
416	1289	男	1940代						⑩					●	オ		
417	1293	男	1940代						なし					●	オ		
418	1188	男	1930代						なし					●	オ		
419	1218	女	1940代						なし					●	オ		
420	1251	女	1950代						②					●	オ		
421	1174	女	1920代						なし					●	オ		
422	1178	女	1930代						⑩					●	オ		
423	1215	男	1940代						⑩					●	オ		
424	1311	女	1950代						なし					●	オ		
425	1127	女	1940代						⑩					●	オ		
426	1306	女	1950代						⑩					●	オ		
427	1316	男	1950代						なし					●	オ		
428	1187	女	1940代						②					●	オ		
429	1263	女	1930代						③-⑩					●	オ		
430	119	男	1940代	⑩	⑩	⑩	不変		⑩					●	オ		
431	307	男	1950代		②	②		○	②					●	オ		
432	450	男	1930代		②	②		○	②					●	オ		
433	73	女	1940代	②	②	②		○	②					●	オ		採血
434	348	女	1930代		⑩	②-⑩	不変		②-⑩					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アミロイド症 あり	イデオパソ あり	ウエーラー症 あり	エリスミア あり	その他の 所見	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
435	34	女	1940代	②	②・③・④	②		○	②・④					●	オ		
436	331	男	1930代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
437	169	女	1940代	②		⑤	不変		⑤					●	オ		
438	300	女	1940代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
439	308	女	1930代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
440	363	女	1950代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
441	355	男	1940代		②	②	不変		②					●	オ		
442	409	女	1960代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
443	381	男	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
444	365	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
445	362	男	1950代		②	②	不変		②					●	オ		
446	309	男	1920代		②・⑤・⑥	②・⑤・⑥	不変		②・⑤					●	オ		
447	15	女	1950代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
448	84	女	1940代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
449	422	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
450	414	女	1950代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
451	92	男	1940代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
452	47	女	1930代	⑤		⑤	不変		⑤					●	オ		
453	340	男	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
454	445	女	1940代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
455	468	男	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
456	65	女	1960代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
457	254	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
458	255	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
459	102	男	1950代	なし		なし	不変		なし					●	オ		
460	270	男	1960代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
461	452	女	1920代		⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
462	482	女	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
463	129	女	1950代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
464	131	女	1950代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
465	374	女	1930代		②	②	不変		②					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア変位所見 あり	イ両側所見 あり	ウ変位所見 あり	エ変位入り あり	オその他	ばく露 分類	経過観察 終了	備考
466	168	女	1940代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
467	415	男	1930代		②	②	不変		②					●	オ		
468	182	女	1980代	なし	なし	なし	不変		なし					●	オ		
469	139	女	1950代	なし	なし	なし	不変	○	⑩					●	オ		
470	329	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
471	489	男	1930代		⑩	⑩	不変		⑩					●	オ		
472	368	男	1950代		⑩	⑩	不変		⑩					●	オ		
473	188	男	1950代		②	②	不変		②					●	オ		
474	269	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
475	462	男	1930代		②・⑤	②・⑤	不変		②・⑤					●	オ		
476	388	女	1930代		②	②	不変		②					●	オ		
477	213	女	1930代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
478	95	女	1930代	⑤	⑤	⑤	不変		⑥					●	オ		
479	30	女	1940代	⑤	⑤	⑤	不変		⑤					●	オ		
480	275	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
481	136	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
482	111	女	1930代	②	②	②	不変		②					●	オ		
483	364	男	1940代		②	②	不変		②					●	オ		
484	529	女	1930代			⑩	不変		⑩					●	オ		
485	547	女	1950代			⑩		○	⑩					●	オ		
486	316	女	1950代			なし	不変		なし					●	オ		
487	562	女	1940代			なし	不変		なし					●	オ		
488	564	女	1920代			②	不変		②					●	オ		
489	565	男	1960代			なし	不変		なし					●	オ		
490	576	女	1930代			⑩		○	⑩					●	オ		
491	592	女	1930代			⑩	不変	○	⑩					●	オ		
492	603	男	1930代			②・⑤	不変		②・⑤					●	オ		
493	620	男	1950代			⑩	不変		⑩					●	オ		
494	608	女	1930代			②		○	⑩					●	オ		
495	609	男	1930代			⑤・⑩	不変		⑤・⑩					●	オ		
496	615	男	1930代			⑩	不変		⑩					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア.血腫形成 あり	イ.石灰化 あり	ウ.骨質破壊 あり	エ.圧入あり あり	オ.その他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
497	249	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
498	640	女	1940代			⑩		○	なし					●	オ		
499	637	女	1930代			⑩		○	⑩					●	オ		
500	651	男	1940代			②	不変		②					●	オ		
501	662	女	1930代			⑤		○	⑤・⑩					●	オ		
502	664	男	1940代			②・⑩	不変		②・⑩					●	オ		
503	621	男	1970代			なし	不変		なし					●	オ		
504	656	男	1930代			②	不変		②					●	オ		
505	682	男	1950代			なし	不変		なし					●	オ		
506	719	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
507	727	男	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
508	735	女	1950代			なし	不変		なし					●	オ		
509	726	女	1930代			⑤・⑩	不変		⑤・⑩					●	オ		
510	731	女	1930代			②		○	②					●	オ		
511	732	男	1940代			②	不変		②					●	オ		
512	734	男	1940代			②・⑤		○	②					●	オ		
513	742	女	1940代			②	不変		②					●	オ		
514	757	男	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
515	758	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
516	760	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
517	167	男	1920代			②・⑩	不変		②・⑩					●	オ		
518	227	女	1940代			⑤	不変		⑤					●	オ		
519	766	女	1930代			⑤・⑩	不変		⑤・⑩					●	オ		
520	788	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
521	285	女	1950代			なし		○	②					●	オ		
522	797	女	1930代			②	不変		②					●	オ		
523	829	女	1940代			⑩	不変		⑩					●	オ		
524	806	女	1950代			②・⑩	不変		②・⑩					●	オ		
525	729	女	1940代			なし		○	②					●	オ		採血
526	850	女	1940代			⑩		○	なし					●	オ		
527	519	女	1920代			⑩	不変		⑩					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2008年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	アクリル樹脂 あり	インプラント あり	ウレタン樹脂 あり	エポキシ入り あり	その他	ばく露 分類	経過観察・ 終了	備考
528	848	男	1930代			②・⑤・⑧・ ⑩	不変		②・⑤・⑧・⑩					●	オ		
529	816	女	1950代			なし	不変		なし					●	オ		
530	58	女	1940代	②・⑩	②・⑩		不変		②・⑩					●	オ		
531	223	男	1930代		なし		不変		なし					●	オ		
532	322	女	1930代		なし		不変		なし					●	オ		
533	53	男	1940代		なし		不変		なし					●	オ		
534	54	女	1940代		⑤		不変		なし					●	オ		
535	245	男	1930代		なし		不変		なし					●	オ		
536	246	女	1970代		なし		不変		なし					●	オ		
537	281	男	1940代		⑩		不変		⑩					●	オ		
538	469	女	1930代		②		不変		②					●	オ		
539	184	女	1940代		⑩		不変	○	なし					●	オ		
540	464	女	1940代		②・⑤		不変		②・⑤					●	オ		
541	152	女	1940代	なし			不変		なし					●	オ		
542	1303	女	1930代						②					●	オ		
543	1324	女	1950代						②					●	オ		
544	1298	女	1920代						②・⑩					●	オ		
545	1302	男	1930代						⑩					●	オ		
546	1312	男	1940代						⑩					●	オ		
547	1345	女	1940代						⑩					●	オ		
548	1348	男	1940代						なし					●	オ		
549	1100	男	1950代						⑩					●	オ		
550	1249	女	1960代						なし					●	オ		
551	1334	男	1940代						⑥					●	オ		
552	1342	女	1940代						⑩					●	オ		
553	1301	女	1930代						⑩					●	オ		
554	1330	女	1940代						⑩					●	オ		
555	1260	女	1940代						⑩					●	オ		
556	1262	男	1950代						⑩					●	オ		
557	1339	女	1960代						なし					●	オ		
558	1344	女	1930代						⑩					●	オ		

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア液腔形成 あり	イ液腔形成 あり	ウ液腔形成 あり	エ液腔入り あり	オその他	ばく露 分類	経過観察- 終了	備考
559	1253	女	1930代						⑩					●	オ		
560	1299	男	1930代						⑤-⑩					●	オ		
561	1350	女	1950代						なし					●	オ		
562	1356	男	1950代						なし					●	オ		
563	1358	女	1970代						⑩					●	オ		
564	1013	女	1930代						⑩					●	オ		
565	1258	女	1950代						⑩					●	オ		
566	1329	女	1960代						⑩					●	オ		
567	1363	女	1930代						②					●	オ		
568	1240	男	1940代						⑩					●	オ		
569	531	男	1930代		⑩	②・⑤	不変		②・⑤					●	オ		
570	141	女	1930代		②	②	不変		②					●	オ		
571	527	女	1940代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
572	507	女	1950代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
573	508	男	1950代		なし	なし	不変		なし					●	オ		
574	163	女	1940代		⑩		不変		⑩					●	オ		
575	512	女	1950代		なし		不変		なし					●	オ		
576	1220	男	1940代						⑩					●	オ		
577	13	男	1920代	②・⑤・⑨・ ⑩	②・⑤・⑨・ ⑩	②・⑤・⑨・ ⑩	不変		②・⑤・⑩					●	オ		
578	96	男	1920代	なし	なし	なし	不変	○	なし					●	オ		

ばく露歴と医学的所見に係る集計表

A表：2009年度対象外受診者（昭和30から50年に尼崎市に居住していなかった者）

NO	症例番号	性別	生年(西暦)	2006年度 所見	2007年度 所見	2008年度 所見	2009年度 X線所見	2009年度 CT	最新の所見	ア.遠隔転移 あり	イ.局所転移 あり	ウ.家族転移 あり	エ.立ち入り あり	ホ.その他	ばく露歴 分類	経過観察・ 終了	備考
1	27	女	1940代		㊦	㊦	不変		㊦					●	オ		
2	453	女	1950代		㊦	㊦	不変		㊦					●	オ		
3	18	男	1940代		㊡	㊡	不変		㊡		●			●	イ		
4	496	男	1940代		㊡	㊡	不変		㊡	●					ア		
5	271	男	1940代			㊦	不変		㊦		●				イ		
6	345	女	1940代		なし		不変		なし			●			ウ		
7	542	男	1950代						なし			●	●		ウ		
8	1009	男	1940代						なし		●				イ		
9	966	女	1960代						なし					●	オ		
10	975	男	1950代						なし					●	オ		
11	981	男	1940代						㊦					●	オ		
12	1071	男	1940代						なし		●				イ		
13	1135	男	1960代						㊦	●	●			●	ア		
14	1066	男	1940代						なし					●	オ		
15	1093	男	1930代						㊦		●				イ		
16	1206	男	1950代						㊡		●				イ		
17	1053	男	1960代						なし		●				イ		
18	1222	男	1940代						㊦	●					イ		
19	1139	男	1950代						㊦		●				イ		
20	1296	男	1960代						㊦	●					ア		
21	1315	男	1950代						㊦					●	オ		
22	849	女	1940代						㊦					●	オ		
23	1336	女	1950代						なし				●		エ		
24	1108	女	1940代						なし					●	オ		
25	1267	男	1930代						㊡		●			●	イ		

注1: 医学的所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性がある①～⑨及びその他の所見⑩(石綿ばく露に関連しない)を確認する(重複含む)。総合所見欄は、複数年の医学的所見を踏まえて決定する。

- ①胸水貯留
- ②胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚斑)
- ③びまん性胸膜肥厚
- ④胸膜腫瘍の疑い
- ⑤肺野の間質影
- ⑥円形無気肺
- ⑦肺野の腫瘍状陰影
- ⑧リンパ節の腫大
- ⑨その他の所見

※③または⑥の所見が見られ石綿以外の原因である可能性が高いと判断した場合は⑩としている。

※H20以前の⑤胸膜下曲線陰影については、H21から⑥の肺野の間質影に統一している。

※H21から所見が疑いとされた場合は所見番号の後ろに「疑」を記載している。

注2: ばく露歴については、該当するものにすべて●を記入(ア～オは重複可)

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
 - イ. 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
 - ウ. 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
 - エ. 職域以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
 - オ. 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱い施設がある場合も含む)
- (「具体的なばく露歴」の記入例)

例1 幼少期(S25-27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた → ウとエ

例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30-35の6年間通学 → オ

例3 S28-40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入出入りしていた。かつ、住居が石綿工場に近接(S28-50に〇〇1丁目に居住)していた → イとオ
イとエの分類が紛らわしいものの例: 業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。

ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限っては「エ」とする。

注3: ばく露歴分類案については、各事案のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
 - イ. 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
 - ウ. 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者や作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
 - エ. 上記ア～ウに該当せず、職域以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
 - オ. 上記ア～エに該当しないもの
- 上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

注4: 経過観察・終了の欄については、調査終了の場合に「終」とその理由を記入する

注5: 備考欄については、特記事項を記入する

(例1: X線・CT以外の検査を実施した場合の検査項目の記入、例2: 石綿救済制度や労災制度の認定や申請中である旨の記入等)