

The Exposure to chemical compounds in the Japanese People

-Survey of the Exposure to
chemical compounds
in Human (2011～)-

日本人における 化学物質の ばく露量について

—化学物質の人へのばく露量
モニタリング調査(2011～)—



2013

Environmental Risk Assessment Office
Environmental Health Department
Ministry of the Environment, Japan
環境省環境保健部環境リスク評価室

はじめに

環境省環境保健部環境リスク評価室では、ダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積量や摂取量を明らかにするため、平成23年度より「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への曝露量モニタリング調査」を始めました（平成24年度は「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」と改名）。

平成23、24年度の二か年の調査結果をとりまとめました。

「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」のまとめ

調査目的について

- ・日本人の体内中のダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積状況を把握すること
- ・過去、調査を行った対象者に対して再び化学物質の測定を行い、経年変化を把握すること
- ・POPs（残留性有機汚染物質）について、ストックホルム条約で各国に義務付けられている生体試料におけるモニタリング調査を行うこと

調査対象と方法について

- ・平成14年～22年度に行われた「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」の調査地域より3地域選定して、本調査の調査対象地域としました。
- ・調査対象地域内において、40～59歳で調査対象地域内の居住が長い住民を選定し、調査対象者としました。
- ・調査対象者の血液、尿を採取し、ダイオキシン類をはじめとする化学物質を測定しました。
- ・調査対象者にアンケート聞き取りによる生活状況調査を行いました。
- ・調査対象者の一部については、3日間の食事を回収し、食事中化学物質濃度を測定して、食事経由の化学物質摂取量を算定しました。

ダイオキシン類の調査結果について

- ・170人（平成23年度：86人、平成24年度：84人）についての血液中ダイオキシン類濃度の平均値は14pg-TEQ/g-fat、範囲は0.42～56pg-TEQ/g-fatでした。また、これらの結果は、これまでに報告されている他の調査結果と同じ程度の濃度でした。
- ・過去に調査に参加された26人（前回の調査時から8～9年経過）のうち、24人の血液中ダイオキシン類の濃度が下がっていました。
- ・30人（平成23年度：15人、平成24年度：15人）についての食事経由のダイオキシン類摂取量の平均値は0.68pg-TEQ/kg体重/日、範囲は0.035～2.4pg-TEQ/kg体重/日であり、耐容一日摂取量(TDI)である4.0pg-TEQ/kg体重/日を超過した人はいませんでした。

フッ素化合物の調査結果について

- 86人についての血液中PFOS濃度の平均値は5.8ng/mL、PFOAが2.2ng/mL、範囲はPFOSが1.6～17ng/mL、PFOAが0.66～9.6ng/mLでした。また、これらの結果は、これまでに報告されている他の調査結果と同じ程度の濃度でした。
- 15人についての食事経由のPFOS摂取量は0.57ng/kg体重/日、PFOAが0.69ng/kg体重/日、範囲はPFOSがN.D.～1.7ng/kg体重/日、PFOAがN.D.～2.9ng/kg体重/日でした。

重金属の調査結果について

- 170人（平成23年度：86人、平成24年度：84人）についての血液中総水銀濃度の平均値は11ng/mL、範囲は1.7～41ng/mLでした。また、鉛、カドミウム、ヒ素、銅、セレン、亜鉛の血液中濃度の測定も行いました。
- 99人（平成23年度：15人、平成24年度：84人）についての尿中カドミウムの平均値は0.89μg/g cr範囲は0.20～3.9μg/g crでした。また、尿中の形態別ヒ素についての測定も行いました。
- 30人（平成23年度：15人、平成24年度：15人）について、総水銀、メチル水銀、鉛、カドミウム、ヒ素、銅、セレン、亜鉛の食事経由の摂取量の測定も行いました。

農薬類・可塑剤等の調査について

- 99人（平成23年度：15人、平成24年度：84人）について、尿中の農薬類（農薬代謝物を含む）や可塑剤などの化学物質を測定しました。

POPsの調査結果について

- 86人について、ストックホルム条約で定められたPOPs物質及び候補物質の血液中濃度を測定しました。また、15人について、食事経由の摂取量も算定しました（平成23年度のみ）。

放射性物質の調査結果について

- 84人について、血液中や尿中の放射性物質（セシウム134、セシウム137、カリウム40、ヨウ素131）を測定しました。また、15人について、食事中の放射性物質濃度の測定も行いました（平成24年度から）。

目 次

はじめに	
1 「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」の概要	1
2 調査方法	2
2-1 調査対象地域と調査対象者	2
2-2 調査方法	3
3 調査結果と考察	5
3-1 ダイオキシン類調査結果	5
3-1-1 血液調査（塩素系ダイオキシン類）	5
3-1-2 食事調査（塩素系ダイオキシン類）	6
3-1-3 血液調査（臭素系ダイオキシン類）	7
3-2 フッ素化合物調査結果	8
3-2-1 血液調査	8
3-2-2 食事調査	9
3-3 重金属類調査	10
3-3-1 血液調査	10
3-3-2 尿調査	11
3-3-3 食事調査	12
3-4 農薬類・可塑剤等調査	13
3-4-1 尿調査	13
3-5 POPs 類調査	15
3-5-1 血液・食事調査	15
3-6 放射性物質調査	17
3-6-1 血液調査・尿調査・食事調査	17
<委員名簿>	18
<参考資料>	19

1. 「化学物質の人へのばく露量モニタリング調査」の概要

環境省環境保健部環境リスク評価室では、平成14年度より22年度まで、「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」を実施いたしました。この調査では、日本各地の一般的な環境に居住している住民2,264人の血液中ダイオキシン類濃度の測定を行うとともに、625人については食事中ダイオキシン類濃度の測定を行って、食事経由のダイオキシン類摂取量を算定しました（巻末の参考資料を参照）。

平成23年度より新たに、「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への曝露量モニタリング調査」を開始し、過去に対象地域とした地域を再び選定して、住民の方々の血液や尿を採取し、ダイオキシン類をはじめとする化学物質の蓄積量等を調査しています。

また、一部の調査対象者の方々については、食事調査（陰膳方式）を実施し、食事中の化学物質を測定し、食事から体内に取り込む化学物質の量（摂取量）についても算定しています。

平成23、24年度の2か年については、6地域の170人の血液中化学物質を測定し、また、そのうち30人については食事経由の化学物質摂取量も算定しました。

化学物質の人へのばく露量モニタリング調査

調査主体	環境省環境保健部環境安全課環境リスク評価室
調査時期	平成23年度から
調査地域	各年3地域
調査内容	血液調査（化学物質の体内蓄積量把握） 尿調査（代謝が早い物質について体外排出量把握） 食事調査（化学物質の摂取量把握）
対象人数	170人（平成23年度：86人、平成24年度：84人） (うち30人は食事調査も参加)

2. 調査方法

2-1 調査対象地域と調査対象者

平成 14～22 年度まで行われた「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」では、日本全国を 5 つのブロックに分け、ブロックごとに毎年度一つの都道府県を選定しました。さらに都道府県内で都市、農村、漁村の 3 つの市町村を選定し、調査を行いました。

平成 23 年度からの調査では、過去に調査した地域の中から、3 地域を再び調査対象地域として選定し調査を行いました。

調査対象地域では、下記に示す条件により対象者を選定いただきました。選定は、自治体や地元機関にお願いいたしました。

また、過去の調査で対象者となった住民で、下記の条件にあてはまる方についても調査参加を呼び掛けています。

調査対象者の条件

- ・年齢 40 歳以上～60 歳未満
- ・調査対象地域に 10 年以上居住していること
- ・仕事などで調査対象地域を離れることが少ないとこと
- ・貧血等により血液採取に支障を来さないこと

2-2 調査方法

●血液調査（全員）

調査対象者に対する血液の採取は医師の立会いのもと、看護師や臨床検査技師により行われました。原則として空腹時採血としました。



血液調査の分析項目		
分析項目	H23年度	H24年度
塩素系ダイオキシン類	○	○
臭素系ダイオキシン類		○
有機フッ素化合物	○	
重金属類	○	○
水酸化 PCB		○
POPS	○	
放射性物質		○
一般健康診査項目（血球算定、肝機能、腎機能、糖代謝、血中脂質など）	○	○
健康影響指標項目（甲状腺機能、アレルギー機能、脂肪酸分画など）	○	○

●尿調査（採取は全員、分析は一部）

採血日の早朝尿を容器に保管いただきました。



尿調査の分析項目		
分析項目	H23年度	H24年度
農薬類（有機リン化合物代謝物、ビレスロイド系農薬代謝物など）	○	○
可塑剤等（フタル酸モノエステル類、ビスフェノールA類）	○	○
重金属類（カドミウム、ヒ素）	○	○
その他の化学物質（PAH、コチニン、カフェインなど）		○
水酸化 PCB		○
POPS	○	
放射性物質		○
一般健康診査項目（尿比重、尿糖、尿蛋白など）	○	○

●食事調査（一部）

食事調査は、調査対象者が調査期間中の3日間に食べた食事をすべて容器に保管し、後日回収する「陰膳方式」により行いました。回収する際には、栄養士が食材の内容と重量をチェックしました。

回収した食事は、3日間分を混合し、化学物質を測定して、調査対象者の一日体重1kgあたりの摂取量を算定しました。

食事調査の分析項目

分析項目	H23年度	H24年度
塩素系ダイオキシン類	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
有機フッ素化合物	<input type="radio"/>	
重金属類	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
POPS	<input type="radio"/>	
放射性物質		<input type="radio"/>




●生活状況調査（アンケート聞き取り）

あらかじめ調査対象者に書いていただいた質問票（アンケート）に基づいて、保健師や栄養士が一対一で調査対象者と面談し、調査対象者の生活状況を調べました。

質問票の項目

- 既往歴、居住歴、職業歴、喫煙歴、食事歴、生活スタイル、出産歴等



3. 調査結果と考察

3-1 ダイオキシン類調査結果

3-1-1 血液調査（塩素系ダイオキシン類）

●結果概要

この調査における血液中ダイオキシン類濃度を表1に示します。対象者170人の平均値は14pg-TEQ/g-fatでした。また濃度の範囲は0.42～56pg-TEQ/g-fatでした。

□表1 血液中ダイオキシン類濃度の統計値

(単位: pg-TEQ/g-fat)

	H23年度 (n=86)	H24年度 (n=84)	全対象者 (n=170)
血液中ダイオキシン類濃度 PCDDs+PCDFs +Co-PCBs			
平均値	17	10	14
標準偏差	10	6.9	9.6
中央値	14	9.0	11
範 囲	0.83～56	0.42～40	0.42～56

●これまで行われた調査との比較

平成14年～22年度に行われた「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」の2,264人の測定結果との比較を表2に示します。対象者の平均年齢や人数が異なるため、単純に比較することは難しいですが、本調査の結果は過去の調査の範囲内にあると考えられます。

□表2 これまでに行われた調査結果との比較

(単位: pg-TEQ/g-fat)

調査名	ダイオキシン類をはじめとする 化学物質の人への蓄積量調査	本調査
調査年度	H14～22年度	H23,24年度
対象者	一般住民	一般住民
対象者数	2,264	170
年齢		
平均(歳)	44.5	49.7
範囲	15～76	36～63
PCDDs+PCDFs +Co-PCBs		
平均値	19	14
標準偏差	14	9.6
中央値	16	11
範 囲	0.10～130	0.42～56

●同一対象者の濃度比較

今回の調査の対象者のうち 26 人は、過去（平成 14 年度から平成 16 年度）の調査にも参加しています。

26 人について、過去の調査時と今回の測定結果との血液中ダイオキシン類の比較を表 3 に示します。多くの対象者の血液中ダイオキシン類濃度が減少していました。

□表 3 同一対象者の血液中ダイオキシン類濃度の比較
(単位 : pg-TEQ/g-fat)

調査名	過去の調査 (n=26)	本調査 (n=26)
調査年度	H14,15,16 年度	H23,24 年度
PCDDs+PCDFs +Co-PCBs		
平均値	25	14
標準偏差	22	11
中央値	23	11
範 囲	0.96 ~ 95	3.0 ~ 56

3-1-2 食事調査（塩素系ダイオキシン類）

●調査結果の概要

食事経由のダイオキシン類摂取量を表 4 に示します。平均値は 0.68pg-TEQ/kg 体重 / 日、範囲は 0.035 ~ 2.4pg-TEQ/kg 体重 / 日でした。

我が国ではダイオキシン類対策特別措置法により、耐容一日摂取量（TDI：長期にわたり体内に取り込むことにより健康影響が懸念される化学物質について、その量までは人が一生涯にわたり摂取しても健康に対する有害な影響が現れないと判断される 1 日体重 1kg当たりの摂取量）が 4pg-TEQ/kg 体重 / 日に設定されていますが、この TDI を超過した対象者はいませんでした。

□表 4 食事経由のダイオキシン類摂取量の統計値

(単位 : pg-TEQ/kg 体重 / 日)

	H23 年度 (n=15)	H24 年度 (n=15)	全対象者 (n=30)
PCDDs+PCDFs +Co-PCBs			
平均値	0.65	0.72	0.68
標準偏差	0.71	0.55	0.62
中央値	0.39	0.57	0.48
範 囲	0.035 ~ 2.4	0.071 ~ 2.3	0.035 ~ 2.4

●これまで行われた調査との比較

平成 14～22 年に行われた「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」の 625 人の測定結果との比較を表 5 に示します。本調査の結果は過去の調査の範囲内にあると考えられます。

□表 5 これまで行われた調査との比較

(単位：pg-TEQ/kg 体重 / 日)

調査名	ダイオキシン類をはじめとする 化学物質の人への蓄積量調査	本調査
調査年度	H14～22 年度	H23,24 年度
対象者	一般住民	一般住民
対象者数	625	30
PCDDs+PCDFs +Co-PCBs		
平均値	0.82	0.68
標準偏差	0.86	0.62
中央値	0.56	0.48
範 囲	0.031～6.2	0.035～2.4

3-1-3 血液調査（臭素系ダイオキシン類）

●調査結果の概要

平成 24 年度調査における血液中臭素系ダイオキシン類濃度を表 6 に示します。対象者 84 人の血液中臭素系ダイオキシン類濃度は、全て N.D.（検出下限以下）でした。

□表 6 血液中臭素系ダイオキシン類濃度の統計値
(単位：pg/g-fat)

	H24 年度 (n=84)
PBDDs+PBDFs	
平均値	
標準偏差	
中央値	全て N.D.
範 囲	

3-2 フッ素化合物調査結果

3-2-1 血液調査

●結果概要

この調査における血液中フッ素化合物濃度を表7に示します。対象者86人の平均値はPFOSが5.8ng/mL、PFOAが2.2ng/mLでした。また濃度の範囲はPFOSが1.5～17ng/mL、PFOAが0.66～9.6ng/mLでした。

□表7 血液中フッ素化合物濃度の統計値
(単位: ng/mL)

	H23年度 (n=86)
PFOS	
平均値	5.8
標準偏差	3.1
中央値	4.8
範 囲	1.5～17
PFOA	
平均値	2.2
標準偏差	1.4
中央値	1.8
範 囲	0.66～9.6

●これまで行われた調査との比較

平成20～22年に測定された「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査」の609人の測定結果との比較を表8に示します。対象者の平均年齢や人数が異なるため、単純に比較することは難しいですが、本調査の結果は過去の調査の範囲内にあると考えられます。

□表8 これまで行われた調査との比較

(単位: ng/mL)

調査名	ダイオキシン類をはじめとする 化学物質の人への蓄積量調査	本調査
調査年度	H20～22年度	H23年度
対象者	一般住民	一般住民
対象者数	609	86
PFOS		
平均値	7.8	5.8
標準偏差	9.2	3.1
中央値	5.8	4.8
範 囲	0.73～150	1.5～17
PFOA		
平均値	3.0	2.2
標準偏差	2.9	1.4
中央値	2.1	1.8
範 囲	0.37～25	0.66～9.6

3-2-2 食事調査

15人の食事経由のフッ素化合物摂取量を表9に示します。平均値はPFOSが0.57ng/kg 体重/日、範囲はN.D.～1.7ng/kg 体重/日でした。

フッ素化合物について、我が国では耐容一日摂取量は設定されていません。

□表9 食事経由のフッ素化合物摂取量の統計値
(単位: ng/kg 体重 / 日)

	H23年度 (n=15)
PFOS	
平均値	0.57
標準偏差	0.51
中央値	0.53
範 囲	N.D.～1.7
PFOA	
平均値	0.69
標準偏差	0.70
中央値	0.62
範 囲	N.D.～2.9

3-3 重金属類調査

3-3-1 血液調査

●結果概要

血液中の重金属類として総水銀、鉛、カドミウム、ヒ素、銅、セレン、亜鉛を測定しました（鉛、カドミウム、ヒ素、銅、セレン、亜鉛は平成24年度から）。この調査における血液中重金属濃度を表10に示します。

□表10 血液中重金属類濃度の統計値

(単位: ng/mL)

	H23 年度 (n=86)	H24 年度 (n=84)	全対象者
総水銀			
中央値	9.1	9.0	9.0
範 囲	2.4～29	1.7～41	1.7～41
鉛			
中央値	—	12	12
範 囲	—	5.0～28	5.0～28
カドミウム			
中央値	—	1.6	1.6
範 囲	—	0.38～5.4	0.38～5.4
ヒ素			
中央値	—	5.2	5.2
範 囲	—	1.4～35	1.4～35
銅			
中央値	—	800	800
範 囲	—	590～1,100	590～1,100
セレン			
中央値	—	260	260
範 囲	—	150～750	150～750
亜鉛			
中央値	—	6,300	6,300
範 囲	—	4,700～7,800	4,700～7,800

3-3-2 尿調査

●結果概要

尿中の重金属として、本調査ではカドミウムと形態別ヒ素（五価ヒ素、三価ヒ素、モノメチルアルソン酸、ジメチルアルシン酸、アルセノベタイン）を測定しました。結果を表11に示します。

□表11 尿中重金属類濃度の統計値

(単位： $\mu\text{g/g cr}$)

化学物質名		統計値	H23 年度 (n=15)	H24 年度 (n=84)	全対象者 (n=99)
ヒ素	カドミウム	中央値	0.97	0.89	0.90
		範 囲	0.25～3.9	0.20～3.8	0.20～3.9
	五価ヒ素	中央値	0.30	N.D.	N.D.
		範 囲	N.D.～2.5	N.D.～2.9	N.D.～2.9
	三価ヒ素	中央値	1.5	1.7	1.7
		範 囲	N.D.～6.2	N.D.～6.6	N.D.～6.6
	MMA (モノメチルアルソン酸)	中央値	2.0	2.1	2.1
		範 囲	0.89～5.1	0.38～8.5	0.38～8.5
	DMA (ジメチルアルシン酸)	中央値	42	33	36
		範 囲	12～170	6.7～110	6.7～170
	AB (アルセノベタイン)	中央値	73	40	42
		範 囲	15～300	2.8～640	2.8～640

3-3-3 食事調査

●結果概要

食事中の重金属として、総水銀、メチル水銀、鉛、カドミウム、ヒ素、銅、セレン、亜鉛を測定しました（ヒ素、銅、セレン、亜鉛は平成 24 年度から）。結果を表 12 に示します。

今回測定した重金属のうち、我が国ではメチル水銀 ($0.29 \mu\text{g}/\text{kg}$ 体重 / 日) とカドミウム ($7 \mu\text{g}/\text{kg}$ 体重 / 週) に耐容摂取量が定められています。今回の調査では、この耐容摂取量を上回る人はいませんでした。

□表 12 食事経由の重金属類摂取量の統計値

(単位 : $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重 / 日)

	H23 年度 (n=15)	H24 年度 (n=15)	全対象者
総水銀			
中央値	0.063	0.079	0.071
範 囲	N.D. ~ 0.16	0.025 ~ 0.30	N.D. ~ 0.30
メチル水銀			
中央値	0.063	0.078	0.066
範 囲	N.D. ~ 0.14	0.022 ~ 0.29	N.D. ~ 0.29
鉛			
中央値	0.094	0.11	0.097
範 囲	0.024 ~ 0.17	0.031 ~ 0.28	0.024 ~ 0.28
カドミウム			
中央値	0.24	0.25	0.25
範 囲	0.059 ~ 0.39	0.11 ~ 0.57	0.059 ~ 0.57
ヒ素			
中央値	—	2.8	2.8
範 囲	—	1.0 ~ 14	1.0 ~ 14
銅			
中央値	—	16	16
範 囲	—	8.2 ~ 26	8.2 ~ 26
セレン			
中央値	—	1.3	1.3
範 囲	—	0.90 ~ 1.8	0.90 ~ 1.8
亜鉛			
中央値	—	140	140
範 囲	—	80 ~ 170	80 ~ 170

3-4 農薬類・可塑剤等調査

3-4-1 尿調査

尿中の農薬類（代謝物を含む）・可塑剤等の測定結果を表 13-1～2 に示します。

□表 13-1 尿中農薬類・可塑剤等濃度の統計値（その 1）

(単位: $\mu\text{g/g cr}$)

分類	化学物質名		統計値	H23 年度 (n=15)	H24 年度 (注)	全対象者
農薬等	有機リン化合物代謝物	DMP	中央値	5.6	2.4	3.3
			範 囲	1.8～14	0.60～11	0.60～14
		DEP	中央値	5.8	5.6	5.7
			範 囲	N.D.～32	N.D.～520	N.D.～520
		DMTP	中央値	12	7.7	8.1
			範 囲	N.D.～62	N.D.～82	N.D.～82
	ピレスロイド系農薬代謝物	DETP	中央値	N.D.	N.D.	N.D.
			範 囲	N.D.～2.7	N.D.～8.3	N.D.～8.3
		PBA	中央値	0.22	0.22	0.22
	カーバメート系農薬代謝物	DCCA	範 囲	N.D.～3.4	N.D.～1.6	N.D.～3.4
			中央値	N.D.	N.D.	N.D.
		範 囲	N.D.～13	N.D.～3.1	N.D.～13	N.D.～13
	イミダクロブリド等代謝物	エチレンチオ尿素	中央値	N.D.	N.D.	N.D.
			範 囲	N.D.～0.23	N.D.～0.50	N.D.～0.50
	フェニトロチオニン代謝	6- クロロニコチン酸	中央値	—	N.D.	N.D.
			範 囲	—	N.D.～1.8	N.D.～1.8
	パラチオン代謝物	3-メチル-4-ニトロフェノール	中央値	—	N.D.	N.D.
			範 囲	—	N.D.～2.8	N.D.～2.8
	アセフェート	p-ニトロフェノール	中央値	—	0.67	0.67
			範 囲	—	0.23～4.6	0.23～4.6
	メタミドホス		中央値	—	N.D.	N.D.
			範 囲	—	N.D.～0.30	N.D.～0.30
			中央値	—	N.D.	N.D.
			範 囲	—	N.D.～0.058	N.D.～0.058
可塑剤	フタル酸エステル代謝物類	MBP	中央値	20	17	18
			範 囲	11～670	6.6～540	6.6～670
		MEHP	中央値	4.2	2.9	3.0
			範 囲	0.98～8.1	0.61～21	0.61～21
		MEHHP	中央値	15	9.9	10
			範 囲	5.7～44	2.7～59	2.7～59
		MEOHP	中央値	9.6	6.3	6.6
			範 囲	4.6～18	1.6～31	1.6～31
		MBzP	中央値	0.59	0.68	0.67
			範 囲	0.25～10	N.D.～38	N.D.～38

注：H24 年度の対象者数は、フタル酸エステル代謝物のみ 84 人、その他の項目は 30 人

□表 13-2 尿中農薬類・可塑剤濃度の統計値（その 2）

(単位: μg/g cr)

分類	化学物質名	統計値	H23 年度 (n=15)	H24 年度 (注)	全対象者
PAH 代謝物類	ヨウ素	中央値 範 囲	— —	310 110～3,000	310 110～3,000
	過塩素酸	中央値 範 囲	— —	3.5 1.2～10	3.5 1.2～10
	トリクロサン	中央値 範 囲	1.3 0.27～79	1.3 0.15～120	1.3 0.15～120
	ビスフェノールA	中央値 範 囲	0.76 0.23～1.4	0.44 N.D.～31	0.47 N.D.～31
	ディート	中央値 範 囲	— —	全て N.D.	全て N.D.
	1-ヒドロキシ ピレン	中央値 範 囲	— —	0.19 0.045～0.76	0.19 0.045～0.76
	1&9-ヒドロキシ フェナントレン	中央値 範 囲	— —	0.15 0.038～0.60	0.15 0.038～0.60
	2-ヒドロキシ フェナントレン	中央値 範 囲	— —	0.14 0.031～0.39	0.14 0.031～0.39
	3-ヒドロキシ フェナントレン	中央値 範 囲	— —	0.24 0.077～0.65	0.24 0.077～0.65
	4-ヒドロキシ フェナントレン	中央値 範 囲	— —	N.D. N.D.～0.20	N.D. N.D.～0.20
その他	パラベン類	メチルパラベン	中央値 範 囲	— —	55 1.3～870
		エチルパラベン	中央値 範 囲	— —	2.5 N.D.～120
		プロピルパラ ベン	中央値 範 囲	— —	1.0 N.D.～71
		ブチルパラベン	中央値 範 囲	— —	N.D. N.D.～25
		ベンジルパラ ベン	中央値 範 囲	— —	全て N.D. 全て N.D.
	ベンゾフェノン3	中央値 範 囲	— —	N.D. N.D.～120	N.D. N.D.～120
		コチニン	中央値 範 囲	— —	0.92 0.060～1,600
		カフェイン	中央値 範 囲	— —	1,100 0.36～9,100
	植物エストロゲ ン類	ゲニステイン	中央値 範 囲	— —	1,700 360～5,700
		ダイゼイン	中央値 範 囲	— —	2,700 240～7,800
		エクオール	中央値 範 囲	— —	690 6.1～28,000

注：H24 年度の対象者数は、ビスフェノール A のみ 84 人、他の項目は 30 人

3-5 POPs 類調査

3-5-1 血液・食事調査

平成 23 年度調査における、血液中 POPs 濃度及び食事経由の POPs 摂取量を表 14-1～2 に示します。

□表 14-1 血液中 POPs 濃度・食事経由の POPs 類摂取量の統計値（その 1）

分類	化学物質名	統計値	血液中 POPs 濃度 H23 年度 (n=86)	食事経由の POPs 摂取量 H23 年度 (n=15)
		単位	pg/g-fat	pg/kg 体重 / 日
PCB 類	MoCBs	中央値	N.D.	7.4
	MoCBs	範 囲	N.D. ~ 430	3.0 ~ 89
	DiCBs	中央値	100	200
	DiCBs	範 囲	N.D. ~ 800	100 ~ 620
	TrCBs	中央値	920	400
	TrCBs	範 囲	210 ~ 3700	180 ~ 1400
	TeCBs	中央値	6400	750
	TeCBs	範 囲	650 ~ 33000	230 ~ 4100
	PeCBs	中央値	18000	930
	PeCBs	範 囲	1900 ~ 140000	130 ~ 8200
	HxCBs	中央値	87000	980
	HxCBs	範 囲	12000 ~ 670000	100 ~ 14000
DDT 類	HpCBs	中央値	62000	420
	HpCBs	範 囲	10000 ~ 520000	37 ~ 7500
	OcCBs	中央値	13000	71
	OcCBs	範 囲	2600 ~ 110000	4.1 ~ 1100
	NoCBs	中央値	1300	11
	NoCBs	範 囲	370 ~ 6600	1.1 ~ 91
クロルデン類	DeCB	中央値	630	6.0
	DeCB	範 囲	220 ~ 2500	0.74 ~ 50
	Total PCB 類	中央値	190000	5100
	Total PCB 類	範 囲	31000 ~ 1400000	820 ~ 35000
	o,p'-DDD	中央値	N.D.	39
	o,p'-DDD	範 囲	N.D. ~ 500	4.1 ~ 550
ドリン類	p,p'-DDD	中央値	730	380
	p,p'-DDD	範 囲	N.D. ~ 5000	19 ~ 4900
	o,p'-DDE	中央値	200	27
	o,p'-DDE	範 囲	N.D. ~ 1100	4.8 ~ 210
	p,p'-DDE	中央値	120000	1600
	p,p'-DDE	範 囲	17000 ~ 1000000	240 ~ 8200
ヘキサクロロベンゼン	o,p'-DDT	中央値	600	66
	o,p'-DDT	範 囲	N.D. ~ 4500	8.5 ~ 1400
	p,p'-DDT	中央値	6100	300
	p,p'-DDT	範 囲	1100 ~ 29000	28 ~ 7600
	cis- クロルデン	中央値	100	490
	cis- クロルデン	範 囲	N.D. ~ 800	63 ~ 1400
trans- クロルデン	trans- クロルデン	中央値	N.D.	170
	trans- クロルデン	範 囲	N.D. ~ 400	41 ~ 800
	オキシクロルデン	中央値	10000	95
	オキシクロルデン	範 囲	1600 ~ 43000	22 ~ 340
	cis- ノナクロル	中央値	3700	130
エンドリン類	cis- ノナクロル	範 囲	600 ~ 29000	10 ~ 950
	trans- ノナクロル	中央値	23000	440
	trans- ノナクロル	範 囲	3000 ~ 110000	59 ~ 2100
	アルドリン	中央値	全て N.D.	N.D. ~ 5.2
	アルドリン	範 囲		
デイルドリン	デイルドリン	中央値	3200	510
	デイルドリン	範 囲	1300 ~ 40000	71 ~ 1800
	エンドリン	中央値	全て N.D.	69
ヘキサクロロベンゼン	エンドリン	範 囲		0 ~ 200
	ヘキサクロロベンゼン	中央値	14000	630
	ヘキサクロロベンゼン	範 囲	3400 ~ 39000	160 ~ 2100

□表 14-2 血液中 POPs 濃度・食事経由の POPs 類摂取量の統計値（その 2）

分類	化学物質名	統計値	血液中 POPs 濃度 H23 年度 (n=86)	食事経由の POPs 摂取量 H23 年度 (n=15)
		単位	pg/g-fat	pg/kg 体重 / 日
ヘプタクロル類	ヘプタクロル	中央値	全て N.D.	13
		範 囲	4.5 ~ 47	
	cis- ヘプタクロルエボキシド	中央値	1800	110
		範 囲	600 ~ 6500	63 ~ 430
トキサフェン類	trans- ヘプタクロルエボキシド	中央値	全て N.D.	全て N.D.
		範 囲		
	parlar-26	中央値	790	52
		範 囲	N.D. ~ 3500	N.D. ~ 340
マイレックス	parlar-50	中央値	1100	98
		範 囲	N.D. ~ 4300	1.5 ~ 550
	parlar-62	中央値	0	73
		範 囲	N.D. ~ 3400	N.D. ~ 430
PBDE 類	中央値	1800	14	
	範 囲	400 ~ 6600	2.2 ~ 190	
	TeBDEs 類	中央値	520	290
		範 囲	180 ~ 1100	160 ~ 1500
	PeBDEs 類	中央値	210	150
		範 囲	N.D. ~ 870	63 ~ 710
	HxBDEs 類	中央値	800	36
		範 囲	0 ~ 2600	8.9 ~ 510
ペンタクロロベンゼン	HpBDEs 類	中央値	全て N.D.	N.D.
		範 囲		N.D. ~ 40
	OcBDEs 類	中央値	300	25
		範 囲	N.D. ~ 3400	N.D. ~ 110
	NoBDEs 類	中央値	N.D.	36
		範 囲	N.D. ~ 2000	N.D. ~ 120
	DeBDEs 類	中央値	700	230
		範 囲	N.D. ~ 5100	72 ~ 980
HCH 類	Total PBDEs 類	中央値	2600	780
		範 囲	500 ~ 8600	530 ~ 3000
	中央値	300	63	
	範 囲	40 ~ 1500	31 ~ 220	
	α -HCH	中央値	120	160
		範 囲	N.D. ~ 1200	64 ~ 1000
	β -HCH	中央値	27000	250
		範 囲	2800 ~ 240000	48 ~ 2000
クロルデコン	γ -HCH	中央値	N.D.	47
		範 囲	N.D. ~ 1000	23 ~ 430
	δ -HCH	中央値	全て N.D.	14
		範 囲		3.7 ~ 29
	中央値	N.D.	全て N.D.	
	範 囲	N.D. ~ 1.0		
	中央値	N.D.	N.D.	
	範 囲	N.D. ~ 700	N.D. ~ 6.3	
エンドスルファン	α - エンドスルファン	中央値	1300	570
		範 囲	0 ~ 3700	390 ~ 1300
	β - エンドスルファン	中央値	N.D.	280
		範 囲	N.D. ~ 1200	130 ~ 810
HBCD 類	α - HBCD	中央値	N.D.	N.D.
		範 囲	N.D. ~ 10	N.D. ~ 9.0
	β - HBCD	中央値	全て N.D.	全て N.D.
		範 囲		
	γ - HBCD	中央値	N.D.	全て N.D.
		範 囲	N.D. ~ 3.4	
	δ - HBCD	中央値	全て N.D.	全て N.D.
		範 囲		
ε - HBCD	中央値	全て N.D.	全て N.D.	
	範 囲			

3-6 放射性物質調査

3-6-1 血液調査・尿調査・食事調査

平成 24 年度調査における放射性物質濃度の測定結果を表 15 に示します。

□表 15 放射性物質濃度の統計値

(単位 : Bq/kg)

分類	化学物質名	統計値	血液中放射性物質濃度 H24 年度 (n=84)	尿中放射性物質濃度 H24 年度 (n=84)	食事中放射性物質濃度 H24 年度 (n=15)
セシウム	セシウム 134	平均値	全て N.D.	全て N.D.	全て N.D.
		標準偏差			
		中央値			
		範 囲			
セシウム	セシウム 137	平均値	全て N.D.	0.027	全て N.D.
		標準偏差		0.18	
		中央値		N.D.	
		範 囲		N.D. ~ 1.2	
ヨウ素	ヨウ素 131	平均値	全て N.D.	全て N.D.	全て N.D.
		標準偏差			
		中央値			
		範 囲			
カリウム	カリウム 40	平均値	67	42	32
		標準偏差	12	20	8.0
		中央値	67	41	29
		範 囲	41 ~ 95	12 ~ 120	22 ~ 48

注：尿中放射性物質濃度のセシウム 137 の検出は 84 検体中 2 検体のみであった

また、カリウム 40 は血液、尿、食事ともすべての検体で検出された

ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への曝露量 モニタリング調査検討会 委員名簿

有澤 孝吉	徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部社会環境医学講座 予防医学分野教授
門上 希和夫	北九州市立大学大学院教授
香山 不二雄	自治医科大学保健科学講座主任教授
柴田 康行	独立行政法人国立環境研究所環境計測研究センター上級主席研究員
島 正之	兵庫医科大学公衆衛生学講座教授
鈴木 隆一郎	関西医療技術専門学校長
鈴木 規之	独立行政法人国立環境研究所環境リスク研究センター 曝露評価研究室長
遠山 千春	東京大学大学院医学系研究科疾患生命工学センター 健康・環境医工学部門教授
永井 正規	埼玉医科大学公衆衛生学教授
福島 哲仁	福島県立医科大学衛生学・予防医学講座教授
宮田 秀明	摂南大学・大阪工業大学客員教授
吉永 淳	東京大学新領域創成科学研究科准教授

(敬称略 五十音順 所属は平成25年3月時点)

參 考 資 料

「ダイオキシン類をはじめとする化学物質の人への蓄積量調査 (平成 14 年～22 年度)」の概要

(1) 全国調査の概要

●調査年ごとの統計値（血液調査）

□表 16 血液中ダイオキシン類濃度の年度別の推移


(単位 : pg-TEQ/g-fat)

調査年	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	9ヶ年平均
対象者数(人)	259	272	264	288	291	282	257	178	175	計2,264
年齢(歳)										44.5
平均	44.4	41.7	45.2	44.3	43.0	44.2	47.6	46.3	44.4	
範囲	16～72	15～69	15～70	15～70	15～72	15～69	17～70	18～76	16～70	15～76
PCDDs+PCDFs Co-PCBs										
平均値	22	19	19	22	17	20	21	17	14	19
標準偏差	14	12	13	15	12	15	15	12	13	14
中央値	19	17	16	17	14	16	17	14	11	16
範囲	0.96～95	2.7～97	0.64～85	1.5～75	0.82～67	1.6～120	0.43～130	1.1～59	0.10～82	0.10～130


(WHO-2006 TEF を使用)

●年齢との関係（血液調査）

□図 1 年齢と血液中ダイオキシン類濃度の関係



□図 2 年齢階級別の血液中ダイオキシン類濃度




(WHO-2006 TEF を使用)

●地区間の比較（血液調査）

□表 17 地区別の血液中ダイオキシン類濃度

	都市地区	農村地区	漁村地区
対象者数(人)	938	675	651
平均年齢(歳)	43.5	45.4	44.8
血液中ダイオキシン類濃度(pg-TEQ/g-fat)			
平均値	17	18	24
標準偏差	11	12	17
中央値	15	15	19
範囲	0.11~77	0.10~97	0.43~130

(WHO-2006 TEF を使用)




●性別による比較（血液調査）

□表 18 性別による血液中ダイオキシン類濃度

	男 性	女 性
対象者数(人)	1,063	1,201
平均年齢(歳)	43.5	45.3
血液中ダイオキシン類濃度(pg-TEQ/g-fat)		
平均値	20	19
標準偏差	15	13
中央値	16	16
範囲	0.64~130	0.10~95

(WHO-2006 TEF を使用)



●調査年ごとの統計値（食事調査）

□表 19 各年度の食事経由のダイオキシン類摂取量

調査年	H14年度	H15年度	H16年度	H17年度	H18年度	H19年度	H20年度	H21年度	H22年度	9ヶ年平均
対象者数(人)	75	75	75	75	75	75	75	50	50	計625
PCDDs+PCDFs Co-PCBs										
平均値	1.1	1.1	0.89	0.89	0.57	0.75	0.68	0.79	0.44	0.82
標準偏差	1.1	0.92	0.66	0.89	0.44	0.90	0.75	1.2	0.42	0.86
中央値	0.75	0.91	0.68	0.59	0.41	0.46	0.39	0.43	0.34	0.56
範囲	0.058~5.6	0.14~5.6	0.16~3.7	0.13~5.2	0.099~2.2	0.060~6.2	0.054~4.8	0.055~6.2	0.031~2.0	0.031~6.2


(WHO-2006 TEF を使用)

●地区間の比較（食事調査）


□表 20 地区別の食事経由のダイオキシン類摂取量

	都市地区	農村地区	漁村地区
対象者数（人）	229	201	195
食事経由のダイオキシン類摂取量 (pg-TEQ/kg/日)			
平均値	0.66	0.82	1.0
標準偏差	0.65	0.86	1.0
中央値	0.46	0.53	0.71
範囲	0.031~6.2	0.080~5.6	0.054~6.2

(WHO-2006 TEF を使用)




□図 3 脂肪酸と血液中ダイオキシン類濃度の関係




●血液濃度と摂取量との関係

□図 4 食事経由のダイオキシン類摂取量と血液中ダイオキシン類濃度との関係




(2) 繼続調査の概要

□図5 大阪府能勢町地域における血液中ダイオキシン類濃度の年次推移



□図6 埼玉県地域における血液中ダイオキシン類濃度の年次推移




本調査で測定した化学物質について

1. ダイオキシン類

1.1 塩素系ダイオキシン類の構造について

一般にポリ塩化ジベンゾー パラーディオキシン (PCDD) とポリ塩化ジベンゾフラン (PCDF) をまとめてダイオキシン類と呼び、コプラナーポリ塩化ビフェニル（コプラナー PCB、またはダイオキシン様 PCB とも呼ばれています。）のようなダイオキシン類と同様の毒性を示す物質をダイオキシン類似化合物と呼んでいます。

ダイオキシン類は下図のように、基本的には炭素で構成されるベンゼン環（下図の○の部分）2つが、酸素（下図の O）で結合し、それに塩素がついた構造をしています。下図の 1～9 及び 2'～6' の位置には塩素又は水素がついていますが、塩素の数やつく位置によっても形が変わるので、PCDD は 75 種類、PCDF は 135 種類、そしてコプラナー PCB は 12 種類の仲間があります（これらのうち 2,3,7,8-TCDD と類似の毒性を示すものは 29 種類です）。



1.2 塩素系ダイオキシン類の性質について

ダイオキシン類は、通常は無色の固体で、水に溶けにくく、蒸発しにくい反面、脂肪などには溶けやすいという性質を持っています。また、ダイオキシン類は他の化合物質や酸、アルカリにも簡単に反応せず、安定した状態を保つことが多いのですが、太陽光の紫外線で徐々に分解されるといわれています。

1.3 塩素系ダイオキシン類の毒性について

ダイオキシン類の毒性による健康リスク評価のために、長らく発がんや慢性毒性が用いられてきました。発がん性については、ラットにおいて肝細胞がん、甲状腺ろ胞腺腫、リンパ腫等の発がん性が報告されています。発がんのメカニズムについては、ダイオキシンは直接遺伝子に作用するのではなく、他の発がん物質による発がん作用を促進する作用(プロモーション作用)を有すると考えられています。現在、世界保健機関の国際がん研究機関(IARC)はダイオキシン類のうち、2,3,7,8-TCDDを人においても発がん作用を有する物質として分類しています。肝毒性については、肝酵素の上昇や高脂血症が認められています。一方、1998年におけるWHOのダイオキシン類のリスク評価の見直しの際、そしてこれ以降の日本はじめ内外のリスク評価の際には、胎仔期にダイオキシンにばく露し出生後に観察される悪影響として、生殖器官、中枢神経系、免疫系における毒性が着目され、毒性評価の指標として用いられることになりました。影響指標として、雄における肛門生殖突起間距離の短縮、腟における先天異常、学習機能の低下、ウィルス感染抵抗性の低下などが用いられています。今日では、ダイオキシン類の影響は、細胞内にあるアリール炭化水素受容体(Ahレセプター; arylhydrocarbon receptor)を介して内分泌かく乱が生じ、これらの影響が発現することが広く認められています。しかしながら、何故、これらの多様な毒性が現れるかはまだほとんど分かっていないため、さらなる調査研究が必要とされています。


1.4 塩素系ダイオキシン類の発生と環境中挙動について

ダイオキシン類は分析のための標準品の作製などの研究目的で作られる以外には、意図的に作られることはできません。ダイオキシン類は、炭素・酸素・水素・塩素が熱せられるような過程で自然にできてしまう副生成物です。

ダイオキシン類の現在の主な発生源は、ごみ焼却による燃焼ですが、その他に、製鋼用電気炉、たばこの煙、自動車排出ガスなどのさまざまな発生源があります。ダイオキシン類は、主としてプラスチック類など化石燃料を原料として作られたものを燃やすところから発生し、処理施設で取りきれなかった部分が大気中に出ます。また、かつて使用されていた PCB や一部の農薬に不純物として含まれていたものが底泥などの環境中に蓄積している可能性があるとの研究報告があります。

環境中に出た後の動きの詳細はよくわかつていませんが、例えば、大気中の粒子などにくついたダイオキシン類は、地上に落ちてきて土壤や水を汚染し、また、様々な経路から長い年月の間に、底泥など環境中に既に蓄積されているものも含めて、プランクトンや魚介類に食物連鎖を通して取り込まれていくことで、生物にも蓄積されていくと考えられています。

ダイオキシン類は人為的に発生するものがほとんどですが、少量ながら自然界でも発生することがあり、例えば、森林火災、火山活動などでも生じるといわれています。



1.5 臭素系ダイオキシン類について

臭素系ダイオキシン類は、塩素系ダイオキシン類の塩素の一部が臭素に置換されたものであり、塩素系ダイオキシン類と似た構造を持っています。

塩素系ダイオキシンと同様、研究目的以外に意図的に作られることはなく、有機臭素化合物の過熱や燃焼によって副生成物として生成されます。特に、有機臭素系難燃剤を含むプラスチック等の過熱を伴う製造・加工プロセスで多く発生するとされています。

毒性や健康影響については、塩素系ダイオキシンほどにはわかつていません。

2. フッ素化合物

PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）、PFOA（ペルフルオロオクタン酸）は、炭素（C）にフッ素（F）が結合した有機フッ素化合物であり、炭素とフッ素の結合力が非常に強く、熱や化学物質に対して強い化合物です。

水にも油にも溶けやすい「界面活性剤」として利用され、最近まで撥水スプレー、泡状消火剤、フライパン等の焦げ付き防止コーティング剤など、幅広く用いられていましたが、環境中や生体内で分解されにくく、また生体内で蓄積性があることがわかつてきました。

なお、PFOSはPOPs条約の対象物質となっております。

本調査では、血液中及び食事中のPFOS、PFOAを測定いたしました。

□表21 フッ素化合物の概要

化学物質名	用途等	我が国の測定事例 (平均値)	基準・ 耐容摂取量
PFOS PFOA	界面活性剤として、撥水スプレー、消火剤等に使用	<血液> PFOS: 6.3ng/mL PFOA: 2.1ng/mL (609人 環境省 H20-22) <食事> PFOS: 0.98ng/kg 体重 / 日 (検出下限値以下の数値を0とした場合) 12.1ng/kg 体重 / 日 (検出下限値以下の数値を検出下限の1/2とした場合) (米谷ら H19 マーケットバスケット法) PFOA: 0.06ng/kg 体重 / 日 (検出下限値以下の数値を0とした場合) 11.5ng/kg 体重 / 日 (検出下限値以下の数値を検出下限の1/2とした場合) (米谷ら H19 マーケットバスケット法)	※耐容摂取量は設定されていない

3. 重金属類

重金属は地球上に広く分布している元素で、いろいろな目的に使用されていますが、中には生物体内で有害になる物質もあります。

我が国では過去、メチル水銀が原因となった水俣病や、カドミウムが原因となったイタイイタイ病など、重金属が原因となった公害被害も出ています。

□表22 本調査で対象とした重金属の概要

化学物質名	用途等	我が国の測定事例 (平均値)	基準・ 耐容摂取量
総水銀 メチル水銀	金属水銀は蛍光 灯、アマルガム、 電池材料、触媒等 に使用。メチル水 銀は金属水銀のメ チル化によって生 成される。 メチル水銀の毒性 が高い。	<総水銀・血液> 5.4ng/mL (母親 600 人 島田ら H20) 5.18ng/mL (母親 115 人 坂本ら H19) 18.2ng/mL (女性 56 人 山内ら H6) <総水銀・食事> 0.225 μg/kg 体重 / 日 (東京都 H17 隠膳法 10 検体) 0.238 μg/kg 体重 / 日 (東京都 H22 マーケットバスケット法) <メチル水銀・食事> 0.198 μg/kg / 日 (東京都 H17 隠膳法 10 検体) 0.152 μg/kg / 日 (東京都 H22 マーケットバスケット法)	<メチル水銀> 0.29 μg/kg 体重 / 日 2.0 μg/kg 体重 / 週
カドミウム	ボタン電池や、 めつき材料等に使 用されている。ま た、亜鉛とともに 産出し亜鉛精錬の 際に回収される。	<尿> 3.46 μg/g cr ^注 (女性 1243 人 香山ら H12-13) 1.26 μg/g cr ^注 (女性 10753 人 池田ら H12-13) <食事> 0.320 μg/kg 体重 / 日 (東京都 H17 隠膳法 10 検体) 0.317 μg/kg 体重 / 日 (東京都 H22 マーケットバスケット法)	7 μg/kg / 週
ヒ素	過去、ヒ素化合物 を殺鼠剤等に使用 有機ヒ素は海産物 (海藻、えび、かに) に多く含まれるが 基本的には無害 無機ヒ素の毒性が 高い	<各態ヒ素・尿> MMA : 2.01 μg/g cr DMA : 40 μg/g cr (都市近郊居住者 248 人 千葉ら H13) 三価ヒ素 : 4.0 μg/g cr 五価ヒ素 : 0.2 μg/g cr MMA : 3.2 μg/g cr DMA : 38.5 μg/g cr AB : 71.4 μg/g cr (男性 142 人 中嶋ら H13)	※耐容摂取量は設定さ れていない
鉛	電極、おもり、ガ ラス製造、はんだ 等、幅広く使用	<食事> 0.154 μg/kg 体重 / 日 (東京都 H22 マーケットバスケット法) 4.5 μg/kg 体重 / 週 (厚生労働省 H19 マーケットバスケット法)	※耐容摂取量は設定さ れていない

注：尿中カドミウムの測定事例の数値は幾何平均値である

4. 農薬類・可塑剤等

農薬や可塑剤等に使用される化学物質のうち、生物に有害な影響を与えると考えられるものを測定しました。特に生体内での分解が早いものに対しては、尿に含まれる代謝物を測定しています。

□表 23 本調査で対象とした農薬類・可塑剤等の概要

化学物質名	用途等	我が国の測定事例 (平均値)
有機リン化合物代謝物	農薬、殺菌剤、木材防腐剤等に使用(代謝物を測定)	<尿> DMP : 1.5 µg/L (富山県 73 人) : 3.1 µg/L (東京都 60 人) DMTP : 3.2 µg/L (富山県 73 人) : 5.8 µg/L (東京都 60 人) DEP : 0.8 µg/L (富山県 73 人) : 1.2 µg/L (東京都 60 人) DETP : <0.5 µg/L (富山県 73 人) : <0.5 µg/L (東京都 60 人) (富山県衛生研究所)
ピレスロイド系農薬代謝産物	農薬、殺虫剤等に使用(代謝物を測定)	<尿> PBA : 0.40 µg/g cr (男性 42 人 登島ら H22) PBA : 0.73 µg/g cr (448 人 上山ら H21)
カーバメート系農薬代謝物	農薬、殺虫剤等に使用(代謝物を測定)	—
トリクロサン	殺菌剤として使用	—

プラスチックの製造に使用されるフタル酸エステルやビスフェノールAは、内分泌かく乱作用（生体内でホルモン作用を示したり、ホルモン作用を阻害する）が疑われています。

両物質とも体内での排出時間が短いため、本調査では尿中の濃度を測定しました。

□表 24 本調査で対象とした農薬類・可塑剤等の概要

化学物質名	用途等	我が国の測定事例 (平均値)
フタル酸モノエスチル類	プラスチックの可塑剤、接着剤等に使用	<尿> MBP : 52.2 μg/g cr (48.1 ng/mL) MEHP : 5.84 μg/g cr (4.44 ng/mL) MEHHP : 10.1 μg/g cr (8.61 ng/mL) MEOHP : 11.0 μg/g cr (9.2 ng/mL) MBzP : 4.70 μg/g cr (3.46 ng/mL) 妊婦 149 人 鈴木ら H22
ビスフェノール A	プラスチックを製造する際のモノマーや原料として使用	<尿> 24.1 μg/L (大学生 H4) 21.5 μg/L (大学生 H11) (川本ら H11)

5. POPs 及び POPs 候補物質

POPs とは、残留性有機汚染物質 (Persistent Organic Pollutants) の略であり、

- 環境中で分解しにくい
 - 生物体内に蓄積しやすく、生物濃縮性がある
 - 長距離を移動して、地球全体に広範囲に移動拡散する。
 - 生物体内に有害な影響を及ぼす
- 等の特徴を持った物質です。

国際条約である「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 (POPs 条約)」により当初 12 物質 (群) が定められ、規制対象となりましたが、その後、見直しにより 22 物質 (群) に増えています。

農薬等として意図的に製造・使用された物質や、ダイオキシン類のように、燃焼や他物質の製造工程中に意図せず生成してしまう物質もあります。

条約では、POPs の製造・使用・輸出入を禁じるとともに、意図せず生成してしまう物質については出来る限り廃絶することを目標としています。また、各国での POPs 対策計画の策定をうたっており、それに基づいて、我が国でも環境省により環境中や生体中のモニタリング調査が行われています。

本調査では、血液及び食事中の全 POPs を測定いたしました。

□表 25 本調査で対象とした POPs の概要

化学物質名	用途等
ダイオキシン類	物を燃やしたり、塩素を含む有機化合物を製造する工程などで副生成物として生成
PCB 類	過去にトランスなどの絶縁油や熱交換器の熱媒体、感圧複写紙等に使用
DDT 類	過去に衛生害虫の駆除剤、殺虫剤として使用
クロルデン類	過去にシロアリ駆除剤や農薬等として使用
アルドリン	過去に農薬等として使用
ディルドリン	過去に農薬、殺虫剤、シロアリ駆除剤等として使用
エンドリン	過去に農薬等として使用
ヘキサクロロベンゼン	過去に除草剤の原料等として使用
ヘプタクロル類	過去に農薬やシロアリ駆除剤等として使用
トキサフェン類	過去に農薬等として使用（海外）
マイレックス	過去に農薬等として使用（海外）
PBDE 類	過去に難燃剤として使用
ペンタクロロベンゼン	過去に農業用殺菌剤等の製造中間体として使用
HCH 類	過去に農薬等として使用
クロルデコン	過去に殺虫剤として使用（海外）
ヘキサブロモビフェニル	過去に難燃剤として使用
エンドスルファン	過去に農薬、殺虫剤等として使用
HBCD	難燃剤として使用

6. 放射性物質

放射性物質とは、時間とともに崩壊しながら放射線を出す物質です。天然に存在するとともに、原子爆弾の爆発や原子力発電所の事故などで環境中に放出されます。本調査では、カリウム 40、セシウム 134、セシウム 137、ヨウ素 131 を測定しました。

7. ダイオキシン類の摂取量について

わが国では、最新の科学的知見をもとに、平成11年6月にダイオキシン類の耐容一日摂取量を4pg-TEQと設定しています。

私たちが体内に取り込んでいるダイオキシン類の総量の安全性の評価は、この数値との比較により行います。

日本人が1日に平均的に摂取するダイオキシン類の量は、合計で体重1kgあたり約0.69pg-TEQと推定されています。欧米諸国においては、この数値とほぼ同様の数値が報告されています。摂取経路としては、食事からの摂取、呼吸による空気からの摂取、土壌からの摂取などが考えられ、食事からの摂取が大部分を占めています。厚生労働省の調査（平成23年度食品からのダイオキシン類一日摂取量調査）では、約0.68pg-TEQ/kg/日と推定されており、環境省の調査（平成23年度ダイオキシン類に係る環境調査）では、呼吸による空気からの摂取量が約0.0082pg-TEQ/kg/日、土壌からの摂取が約0.0039pg-TEQ/kg/日と推定されております。この水準は、耐容一日摂取量（TDI）を下回っており、健康に影響を与えるものではありません。

また、ダイオキシン類がひとたび体内に入ると、その大部分は脂肪に蓄積されて体内にとどまります。分解されたり、体外に排出される速度は非常に遅く、人の場合は半分の量になるのに（半減期）、約7年かかるとされています。

□図7 日本人が一日に摂取するダイオキシン類の平均的な摂取量の内訳（平成23年度）^{注1}

■体重1kg当たりに換算

計 約0.69pg-TEQ/kg/日



毎年実施している厚生労働省の調査（食品からのダイオキシン類一日摂取量調査）や環境省の調査（ダイオキシン類に係る環境調査）により推定された、日本人が1日に摂取するダイオキシン類の平均的な量の経年推移を表26、図8に示します。

平成12年1月に施行された「ダイオキシン類対策特別措置法」により、環境へのダイオキシン類の排出量は大きく減少し、食品中のダイオキシン類濃度や、環境中（大気や土壤）のダイオキシン類濃度も減少しました。これに伴い、日本人が1日に摂取するダイオキシン類の平均的な量も減少傾向にあります。

今後も、ダイオキシン類の排出削減対策の推進により、さらに減っていくと考えられます。


□表26 日本人が一日に摂取するダイオキシン類の平均的な摂取量の年次推移^{注1、注5}

(単位: pg-TEQ/kg/日)

		平成14年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度
大気 ^{注2}		0.028	0.019	0.018	0.015	0.015	0.012	0.011	0.0093	0.0093	0.0082
土壤 ^{注3}		0.0068	0.0052	0.0044	0.0040	0.0038	0.0054	0.0056	0.0042	0.0042	0.0039
食品 ^{注4}	魚介類	1.290	1.147	1.245	1.090	0.9400	1.033	0.8634	0.7840	0.7626	0.6308
	肉・卵	0.150	0.141	0.101	0.0686	0.0704	0.0422	0.0396	0.0398	0.0416	0.0416
	乳・乳製品	0.0346	0.0322	0.0468	0.0328	0.0212	0.0226	0.0076	0.013	0.0028	0.0008
	有色野菜	0.0030	0.002	0.0028	0.0028	0.001	0.0006	0.0008	0.0004	0.0006	0.0002
	雑穀・芋	0.001	0.001	0.0026	0.0022	0.0054	0.001	0.0008	0.001	0.0004	0.0006
	その他	0.010	0.0070	0.010	0.0064	0.0064	0.0058	0.0030	0.0042	0.0054	0.0034
摂取量（計）		1.52	1.36	1.43	1.22	1.06	1.13	0.93	0.86	0.83	0.69

(平成14～19年度はWHO-1998 TEFを使用。平成20～23年度はWHO-2006 TEFを使用)

□図8 日本人が一日に摂取するダイオキシン類の平均的な摂取量の年次推移^{注1、注5}



注1：環境省「ダイオキシン類に係る環境調査結果」及び厚生労働省「食品からのダイオキシン類一日摂取量調査（厚生労働科学研究）」に基づき環境省作成

注2：一般環境及び沿道の平均値として、各平均値に地点数を乗じた値を足し、総地点数で除した値を用いている。

注3：一般環境の平均値を用いている。

注4：有効桁数は、ダイオキシン類の食品群別1日摂取量及び食品1日総摂取量の各値に基づいています。

注5：有効数字の桁数の取り扱い等を変更したため最終桁をはじめ、数値が平成21年度以前と異なる場合があります。

Please address opinions and inquiries to:

**Environmental Risk Assessment Office
Environmental Health Department
Ministry of the Environment, Japan**

1-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975 JAPAN
Tel (main) : +81-3-3581-3351 (extension 6343)
Tel (direct): +81-3-5521-8262
Fax: +81-3-3581-3578
<http://www.env.go.jp/en>

このパンフレットに関するご意見及びお問い合わせ先

環境省環境保健部環境リスク評価室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
TEL (03) 3581-3351 (内線6343)
直通(03) 5521-8262
FAX (03) 3581-3578
<http://www.env.go.jp/>