

平成 22 年度 モニタリング調査結果

1 . 調査目的	141
2 . 調査対象物質	141
3 . 調査地点及び実施方法	151
(1) 試料採取機関	151
(2) 調査地点	152
(3) 調査対象生物種	185
(4) 試料の採取方法	185
(5) 分析法	185
4 . モニタリング調査としての継続性に関する考察	190
(1) 調査対象物質及び媒体の推移	190
(2) 調査地点の推移	197
(3) 定量（検出）下限値の推移	206
(4) まとめ	216
5 . 調査結果の概要.....	218
[1] PCB 類	233
[2] HCB（ヘキサクロロベンゼン）.....	238
[3] アルドリノ（参考）	243
[4] ディルドリン（参考）	247
[5] エンドリン（参考）	251
[6] DDT 類	255
[7] クロルデン類	279
[8] ヘプタクロル類	300
[9] トキサフェン類（参考）	310
[10] マイレックス（参考）	316
[11] HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン）類	320
[12] クロルデコン.....	335
[13] ヘキサブロモビフェニル類	337
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）.....	339
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）.....	345
[16] ペルフルオロオクタン酸（PFOA）.....	347
[17] ペンタクロロベンゼン	349
[18] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類.....	352
[19] トリブチルスズ化合物.....	353
[20] トリフェニルスズ化合物	356
6 . モニタリング調査対象物質の分析法概要.....	361

1．調査目的

モニタリング調査は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和48年法律第117号）（以下「化審法」という。）の特定化学物質について、一般環境中の残留状況を監視することを目的とする。また、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下「POPs条約」という。）に対応するため、条約対象物質等の一般環境中及び人体中における残留状況の経年変化を把握することを目的とする。

POPs（Persistent Organic Pollutants: 残留性有機汚染物質）

2．調査対象物質

平成22年度のモニタリング調査は、従前の POPs 条約対象物質のうち PCB 類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、DDT 類、クロルデン類及びヘプタクロル類の5物質（群）並びに平成21年5月に開催された同条約の第4回条約締約国会議（以下「COP4」という。）において新規に POPs 条約対象物質として採択された HCH 類、クロルデコン、ヘキサブROMOビフェニル類、ポリブROMOジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンの6物質（群）を加えた11物質（群）に、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類、トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物の4物質（群）を加えた計15物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との組合せは次のとおりである。

平成21年度までは、従前の POPs 条約対象物質のうちポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランを除く10物質（群）について各物質とも毎年度の調査を行っていた。平成22年度以降の調査においては、調査頻度の見直し、一部の物質については隔年度の調査とすることとし、平成22年度の調査ではアルドリノ、ディルドリン、エンドリン、トキサフェン類及びマイレックスの5物質（群）の調査を行わなかった。なお、平成22年度に調査を行わなかった5物質（群）についても平成21年度までの調査結果を参考として本書に掲載している。





POPs 条約では、HCH 類のうち、 α -HCH、 β -HCH 及び γ -HCH（別名：リンデン）が COP4で POPs 条約対象物質とすることとされたが、本調査では δ -HCH も含めて HCH 類として調査を行った。

POPs 条約では、ポリブROMOジフェニルエーテル類のうち、テトラブROMOジフェニルエーテル類、ペンタブROMOジフェニルエーテル類、ヘキサブROMOジフェニルエーテル類及びヘプタブROMOジフェニルエーテル類が COP4で POPs 条約対象物質とすることとされたが、本調査ではそれらを含む臭素数が4から10のものについてポリブROMOジフェニルエーテル類として調査を行った。

物質 調査 番号	調査対象物質	調査媒体			
		水 質	底 質	生 物	大 気
[1]	PCB 類				
	[1-1] モノクロロビフェニル類				
	[1-2] ジクロロビフェニル類				
	[1-3] トリクロロビフェニル類				
	[1-4] テトラクロロビフェニル類				
	[1-4-1] 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)				
	[1-4-2] 3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)				
	[1-5] ペンタクロロビフェニル類				
	[1-5-1] 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)				
	[1-5-2] 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#114)				
	[1-5-3] 2,3',4,4'-5-ペンタクロロビフェニル (#118)				
	[1-5-4] 2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123)				
	[1-5-5] 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#126)	○	○	○	○
	[1-6] ヘキサクロロビフェニル類				
	[1-6-1] 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156)				
	[1-6-2] 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)				
	[1-6-3] 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)				
	[1-6-4] 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)				
	[1-7] ヘプタクロロビフェニル類				
	[1-7-1] 2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170)				
	[1-7-2] 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)				
	[1-7-3] 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)				
	[1-8] オクタクロロビフェニル類				
	[1-9] ノナクロロビフェニル類				
	[1-10] デカクロロビフェニル				
[2]	HCB (ヘキサクロロベンゼン)	○	○	○	○
[3]	アルドリン (参考)				
[4]	ディルドリン (参考)				
[5]	エンドリン (参考)				
[6]	DDT 類				
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT				
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE				
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	○	○	○	○
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT				
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE				
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD				
[7]	クロルデン類				
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン				
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	○	○	○	○
	[7-3] オキシクロルデン				
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル				
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル				
[8]	ヘプタクロル類				
	[8-1] ヘプタクロル	○	○	○	○
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド				
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド				
[9]	トキサフェン類 (参考)				
	[9-1] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン (Parlar-26) (参考)				
	[9-2] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-50) (参考)				
	[9-3] 2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-62) (参考)				
[10]	マイレックス (参考)				
[11]	HCH (ヘキサクロロシクロヘキサン) 類				
	[11-1] α -HCH	○	○	○	○
	[11-2] β -HCH				
	[11-3] γ -HCH (別名 : リンデン)				
	[11-4] δ -HCH				
[12]	クロルデコン	○	○	○	○

物質 調査 番号	調査対象物質	調査媒体			
		水 質	底 質	生 物	大 気
[13]	ヘキサブロモビフェニル類				
	[13-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル (#153)				
	[13-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモビフェニル (#154)	○	○	○	○
	[13-3] 2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル (#155)				
	[13-4] 2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモビフェニル (#156)				
	[13-5] 3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル (#169)				
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)				
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類				
	[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)				
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル (#99)				
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類				
	[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	○	○	○	○
	[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)				
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175)				
	[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183)				
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類				
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	○	○	○	○
	[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	○	○	○	○
	[17] ペンタクロロベンゼン	○	○	○	○
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類				
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン				○
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン				
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン				
[19]	トリブチルスズ化合物	○	○	○	
[20]	トリフェニルスズ化合物	○	○	○	


モニタリング調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。

[1] PCB 類 Polychlorinated biphenyls  $i = m+n = 1 \sim 10$	分子式 : $C_{12}H_{(10-i)}Cl_i$ ($i = m+n = 1 \sim 10$) CAS : 27323-18-8 (1 塩化物)、22512-42-9 (2 塩化物)、25323-68-6 (3 塩化物)、26914-33-0 (4 塩化物)、25429-29-2 (5 塩化物)、26601-64-9 (6 塩化物)、28655-71-2 (7 塩化物)、31472-83-0 (8 塩化物)、53742-07-7 (9 塩化物)、5051-24-3 (10 塩化物) 既存化 : 該当なし MW : 188.65 ~ 498.66 mp : 種類によって異なる。 bp : 種類によって異なる。 sw : 種類によって異なる。 比重 : 種類によって異なる。 logPow : 種類によって異なる。
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン) Hexachlorobenzene 	分子式 : C_6Cl_6 CAS : 118-74-1 既存化 : 3-0076 MW : 284.78 mp : 230 ¹⁾ bp : 325 ¹⁾ sw : 0.0000096g/kg (25 ²⁾) 比重 : 2.044 (23 ¹⁾) logPow : 5.73³⁾
[3] アルドリン (参考) Aldrin (reference) 	分子式 : $C_{12}H_8Cl_6$ CAS : 309-00-2 既存化 : 4-0303 MW : 364.91 mp : 103.8 ¹⁾ bp : 145 (0.27kPa ⁴⁾) sw : 0.0002g/kg (25 ²⁾) 比重 : 1.6g/cm³ ⁵⁾ logPow : 6.50³⁾
[4] ディルドリン (参考) Dieldrin (reference) 	分子式 : $C_{12}H_8Cl_6O$ CAS : 60-57-1 既存化 : 4-0299 MW : 380.91 mp : 178.8 ¹⁾ bp : 330 ⁵⁾ sw : 0.00020g/kg (25 ²⁾) 比重 : 1.75 (25 ²⁾) logPow : 5.40³⁾

(注) 「CAS」とはCAS登録番号を、「既存化」とは既存化学物質名簿における番号を、「MW」とは分子量を、「mp」とは融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「logPow」とは*n*-オクタノール/水分分配係数をそれぞれ指す。

[5] エンドリン (参考)

Endrin (reference)



分子式 : $C_{12}H_8Cl_6O$

CAS : 72-20-8

既存化 : 4-0299

MW : 380.91

mp : 200⁶⁾

bp : 245 (分解)⁶⁾

sw : 0.00025g/kg²⁾


比重 : 1.7g/cm³⁶⁾

logPow : 5.20³⁾

[6] DDT 類

DDTs

[6-1] *p,p'*-DDT



分子式 : $C_{14}H_9Cl_5$

CAS : 50-29-3

既存化 : 4-0910

MW : 354.49

mp : 108.5²⁾


bp : 260²⁾

sw : ほとんど溶けない¹⁾

比重 : 1.6g/cm³⁷⁾

logPow : 6.91³⁾

[6-2] *p,p'*-DDE



分子式 : $C_{14}H_8Cl_4$

CAS : 72-55-9

既存化 : 該当なし

MW : 318.03

mp : 89²⁾


bp : 336⁵⁾

sw : 0.12mg/L (25⁵⁾)

比重 : 不詳

logPow : 6.51³⁾

[6-3] *p,p'*-DDD



分子式 : $C_{14}H_{10}Cl_4$

CAS : 72-54-8

既存化 : 該当なし

MW : 320.04

mp : 109¹⁾


bp : 193 (1mmHg)²⁾

sw : 0.09mg/L (25⁵⁾)

比重 : 不詳

logPow : 6.02³⁾

[6-4] *o,p'*-DDT



分子式 : $C_{14}H_9Cl_5$

CAS : 789-02-6

既存化 : 該当なし

MW : 354.49

mp : 不詳


bp : 不詳

sw : 不詳

比重 : 不詳

logPow : 不詳

[6-5] *o,p'*-DDE



分子式 : $C_{14}H_8Cl_4$

CAS : 3424-82-6

既存化 : 該当なし

MW : 318.03

mp : 不詳


bp : 不詳

sw : 不詳

比重 : 不詳

logPow : 不詳

[6-6] *o,p'*-DDD



分子式 : $C_{14}H_{10}Cl_4$

CAS : 53-19-0

既存化 : 該当なし

MW : 320.04

mp : 76.2¹⁾

bp : 不詳

sw : 不詳


比重 : 不詳

logPow : 不詳


[7] クロルデン類

Chlordanes

[7-1] *cis*-クロルデン
cis-Chlordane




[7-2] *trans*-クロルデン
trans-Chlordane



以下は *cis* 体と *trans* 体に
共通した物性情報


分子式: $C_{10}H_6Cl_8$
CAS: 5103-71-9 (*cis* 体)、
5103-74-2 (*trans* 体)
既存化: 4-637
MW: 409.78
mp: 101.1¹⁾
bp: 175 (1mmHg)¹⁾
sw: 0.0006g/kg (25)¹⁾
比重: 1.59 ~ 1.63 (25)²⁾
logPow: 6.16³⁾

[7-3] オキシクロルデン
Oxychlordane




分子式: $C_{10}H_4Cl_8O$
CAS: 26880-48-8
既存化: 該当なし
MW: 423.76
mp: 100¹⁾
bp: 不詳
sw: 不詳
比重: 不詳
logPow: 4.76³⁾

[7-4] *cis*-ノナクロル
cis-Nonachlor



分子式: $C_{10}H_5Cl_9$
CAS: 5103-73-1
既存化: 該当なし
MW: 444.22
mp: 不詳
bp: 不詳
sw: 不詳
比重: 不詳
logPow: 5.21³⁾

[7-5] *trans*-ノナクロル
trans-Nonachlor




分子式: $C_{10}H_5Cl_9$
CAS: 39765-80-5
既存化: 該当なし
MW: 444.22
mp: 不詳
bp: 不詳
sw: 不詳
比重: 不詳
logPow: 5.08³⁾

[8] ヘブタクロル類


Heptachlors

[8-1] ヘブタクロル
Heptachlor




分子式: $C_{10}H_5Cl_7$
CAS: 76-44-8
既存化: 4-637、9-1646
MW: 373.32
mp: 95 ~ 96²⁾
bp: 不詳
sw: 0.00018g/kg (25)¹⁾
比重: 1.57 (9)¹⁾
logPow: 6.10³⁾

[8-2] *cis*-ヘブタクロルエポキシド
cis-Heptachlor epoxide



[8-3] *trans*-ヘブタクロルエポキシド
trans-Heptachlor epoxide



以下は *cis* 体と *trans* 体に
共通した物性情報


分子式: $C_{10}H_5Cl_7O$
CAS: 1024-57-3
既存化: 該当なし
MW: 389.32
mp: 162.8¹⁾
bp: 不詳
sw: 不詳
比重: 不詳
logPow: 5.40³⁾

[9] トキサフェン類 (参考)

Toxaphenes (reference)


[9-1]

2-endo,3-exo,5-endo,6-
-exo,8,8,10,10- オクタ
クロロボルナン
(Parlar-26)




[9-2]

2-endo,3-exo,5-endo,6-
-exo,8,8,9,10,10- ノナ
クロロボルナン
(Parlar-50)



[9-3]

2,2,5,5,8,9,9,10,10- ノ
ナクロロボルナン
(Parlar-62)



分子式: $C_{10}H_{10}Cl_8$ (8塩素化物),
 $C_{10}H_9Cl_9$ (9塩素化物)

CAS: 8001-35-2

既存化: 該当なし

MW: 413.81 (8塩素化物),
448.26 (9塩素化物)

mp: 65 ~ 90²⁾

bp: 不詳


sw: 3mg/L²⁾

比重: 1.630 (25²⁾)²⁾

logPow: 6.44²⁾

[10] マイレックス (参考)

Mirex (reference)



分子式: $C_{10}Cl_{12}$

CAS: 2385-85-5

既存化: 該当なし

MW: 545.54

mp: 485 (分解)²⁾

bp: 不詳

sw: 0.000085g/kg (25¹⁾)¹⁾


比重: 不詳

logPow: 5.28³⁾

[11] HCH (ヘキサクロロシクロヘキサン) 類

Hexachlorohexanes

[11-1] α -HCH



分子式: $C_6H_6Cl_6$

CAS: 319-84-6

既存化: 3-2250、9-1652

MW: 290.83

mp: 157.4¹⁾


bp: 288⁹⁾

sw: 0.00018g/kg (25²⁾)²⁾

比重: 1.87 (20¹⁰⁾)¹⁰⁾

logPow: 3.80³⁾

[11-2] β -HCH



分子式: $C_6H_6Cl_6$

CAS: 319-85-7

既存化: 3-2250、9-1652

MW: 290.83

mp: 309¹¹⁾


bp: 60 (0.50mmHg)¹⁾

sw: 0.0002g/kg (25²⁾)²⁾

比重: 1.87 (20¹⁰⁾)¹⁰⁾

logPow: 3.78¹⁾

[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)



分子式: $C_6H_6Cl_6$

CAS: 58-89-9

既存化: 3-2250、9-1652

MW: 290.83

mp: 115¹⁾


bp: 311¹⁾

sw: 0.0078g/kg (25¹⁾)¹⁾

比重: 1.85 (20¹⁰⁾)¹⁰⁾

logPow: 3.72³⁾

[11-4] δ -HCH



分子式: $C_6H_6Cl_6$

CAS: 319-86-8

既存化: 3-2250、9-1652

MW: 290.83

mp: 141.5¹⁾

bp: 60 (0.36mmHg)¹⁾


sw: 不詳

比重: 1.87 (20¹⁰⁾)¹⁰⁾

logPow: 4.14³⁾

[12] クロルデコン


Chlordecone



分子式 : $C_{10}Cl_{10}O$
 CAS : 143-50-0
 既存化 : 該当なし
 MW : 490.64
 mp : 350 (分解)²⁾
 bp : 不詳
 sw : 7.6mg/L (24)⁵⁾
 比重 : 1.61 (25)¹⁾
 logPow : 3.45¹²⁾

[13] ヘキサブロモビフェニル類


Hexabromobiphenyls



分子式 : $C_{12}H_4Br_6$
 CAS : 36355-01-8
 既存化 : 該当なし
 MW : 627.58
 mp : 種類によって異なる。
 bp : 種類によって異なる。
 sw : 種類によって異なる。
 比重 : 種類によって異なる。
 logPow : 種類によって異なる。

[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)


Polybromodiphenyl ethers ($Br_4 \sim Br_{10}$)



分子式 : $C_{12}H_{(10-i)}Br_iO$ ($i = m+n = 4 \sim 10$)
 CAS : 40088-47-9 (4 臭素化物) 32534-81-9 (5 臭素化物)、36483-60-0 (6 臭素化物)、68928-80-3 (7 臭素化物)、32536-52-0 (8 臭素化物) 63936-56-1 (9 臭素化物)、1163-19-5 (10 臭素化物)
 既存化 : 3-61 (4 臭素化物)、3-2845 (6 臭素化物)
 MW : 485.79 ~ 959.17
 mp : 種類によって異なる。
 bp : 種類によって異なる。
 sw : 種類によって異なる。
 比重 : 種類によって異なる。
 logPow : 種類によって異なる。

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)


Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS)



分子式 : $C_8HF_{17}O_3S$
 CAS : 1763-23-1
 既存化 : 2-1595
 MW : 500.13
 mp : >400 (カリウム塩)¹³⁾
 bp : 不詳
 sw : 519mg/L (20、カリウム塩)¹³⁾
 比重 : 不詳
 logPow : 不詳

[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)


Perfluorooctanoic acid (PFOA)



分子式 : $C_8HF_{15}O_2$
 CAS : 335-67-1
 既存化 : 2-1182、2-2659
 MW : 414.07
 mp : 54.3¹⁾
 bp : 192¹⁾
 sw : 9.5g/L (20)¹⁴⁾
 比重 : 1.79g/cm³¹⁵⁾
 logPow : 6.3¹⁵⁾

[17] ペンタクロロベンゼン

Pentachlorobenzene




分子式 : C_6HCl_5
 CAS : 608-93-5
 既存化 : 3-76
 MW : 250.34
 mp : 84.2 ¹⁾
 bp : 279 ¹⁾
 sw : 0.00050g/kg (25) ¹⁾
 比重 : 1.8342g/cm³ (16) ¹⁾
 logPow : 5.17³⁾

[18] *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類

N,N'-Diphenyl-*p*-phenylenediamines

[18-1] *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン


N,N'-Diphenyl-*p*-phenylenediamine



分子式 : $C_{18}H_{16}N_2$
 CAS : 74-31-7
 既存化 : 3-145
 MW : 260.33
 mp : 150 ~ 151 ²⁾
 bp : 220 ~ 225 (0.5mmHg) ²⁾
 sw : 不詳
 比重 : 1.2²⁾
 logPow : 不詳

[18-2] *N,N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン


N,N'-Ditolyl-*p*-phenylenediamine



分子式 : $C_{20}H_{20}N_2$
 CAS : 27417-40-9
 既存化 : 3-146、3-365、4-332
 MW : 288.39
 mp : 不詳
 bp : 不詳
 sw : 不詳
 比重 : 不詳
 logPow : 不詳

[18-3] *N,N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン


N,N'-Dixylyl-*p*-phenylenediamine



分子式 : $C_{22}H_{24}N_2$
 CAS : 28726-30-9
 既存化 : 3-146
 MW : 316.44
 mp : 不詳
 bp : 不詳
 sw : 不詳
 比重 : 不詳
 logPow : 不詳

[19] トリブチルスズ化合物


Tributyltin compounds



分子式 : 種類によって異なる。
 CAS : 種類によって異なる。
 既存化 : 種類によって異なる。
 MW : 種類によって異なる。
 mp : 種類によって異なる。
 bp : 種類によって異なる。
 sw : 種類によって異なる。
 比重 : 種類によって異なる。
 logPow : 種類によって異なる。

[20] トリフェニルスズ化合物

Triphenyltin compounds



分子式： 種類によって異なる。
 CAS： 種類によって異なる。
 既存化： 種類によって異なる。
 MW： 種類によって異なる。
 mp： 種類によって異なる。
 bp： 種類によって異なる。
 sw： 種類によって異なる。
 比重： 種類によって異なる。
 logPow： 種類によって異なる。

参考文献

- 1) Haynes, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 92nd Edition, CRC Press LLC (2011)
- 2) O'Neil, The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals 14th Edition, Merck Co. Inc. (2006)
- 3) Hansch et al., Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic and Steric Constants, American Chemical Society (1995)
- 4) IPCS, International Chemical Safety Cards, Aldrin, ICSC0774 (1998)
- 5) Howard et al., Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals, CRC Press Inc. (1996)
- 6) IPCS, International Chemical Safety Cards, Endrin, ICSC1023 (2000)
- 7) IPCS, International Chemical Safety Cards, DDT, ICSC0034 (2004)
- 8) Biggar et al., Apparent solubility of organochlorine insecticides in water at various temperatures, Hilgardia, 42, 383-391 (1974)
- 9) IPCS, International Chemical Safety Cards, alpha-Hexachlorocyclohexane, ICSC0795 (1998)
- 10) ATSDR, Toxicological Profile for alpha-, beta-, gamma- and delta-Hexachlorocyclohexane (2005)
- 11) IPCS, International Chemical Safety Cards, beta-Hexachlorocyclohexane, ICSC0796 (1998)
- 12) IPCS, International Chemical Safety Cards, Chlordane, ICSC1432 (2003)
- 13) United Nations Environment Programme (UNEP), Risk profile on perfluorooctane sulfonate, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its second meeting (2006)
- 14) OECD, Perfluorooctanoic Acid & Ammonium Perfluorooctanoate, SIDS Initial Assessment Profile for 26th SIAM (2008)
- 15) IPCS, International Chemical Safety Cards, Perfluorooctanoic acid, ICSC1613 (2005)

3. 調査地点及び実施方法

モニタリング調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取を委託し、民間分析機関において分析を実施した。

(1) 試料採取機関

試料採取機関名	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
地方独立行政法人北海道立総合研究機構 環境・地質研究本部環境科学研究センター	○	○	○	○
札幌市衛生研究所				○
青森県環境保健センター	○	○		
青森県三八地域県民局地域連携部八戸環境管理事務所			○	
岩手県環境保健研究センター	○	○	○	○
宮城県保健環境センター	○	○	○	○
仙台市衛生研究所		○		
秋田県健康環境センター	○	○		
山形県環境科学研究センター	○	○		
福島県環境センター	○	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	○	○
栃木県保健環境センター	○	○		
群馬県衛生環境研究所				○
埼玉県環境科学国際センター	○			
千葉県環境研究センター		○		○
千葉市環境保健研究所	○	○		
東京都環境局環境改善部	○	○	○	○
神奈川県環境科学センター				○
横浜市環境科学研究所	○	○	○	○
川崎市環境局環境対策部公害研究所	○	○	○	
新潟県保健環境科学研究所	○	○		○
富山県環境科学センター	○	○		○
石川県保健環境センター	○	○		○
福井県衛生環境研究センター	○	○		
山梨県衛生環境研究所		○		○
長野県環境保全研究所	○	○		○
岐阜県保健環境研究所				○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○		
愛知県環境調査センター	○	○		

(注) 名称は平成22年度当時のものである。

試料採取機関名	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
名古屋市環境局環境科学研究所			○	○
三重県保健環境研究所	○	○		○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○	○	
京都府保健環境研究所	○	○		○
京都市衛生環境研究所	○	○		
大阪府環境農林水産総合研究所	○	○	○	○
大阪市立環境科学研究所	○	○		
兵庫県農政環境部環境管理局水質課	○	○	○	○
神戸市環境局環境創造部環境評価共生推進室	○	○		○
奈良県保健環境研究センター		○		○
和歌山県環境衛生研究センター	○	○		
鳥取県衛生環境研究所			○	
島根県保健環境科学研究所			○	○
岡山県環境保健センター	○	○		
広島県立総合技術研究所保健環境センター	○	○		
広島市衛生研究所			○	○
山口県環境保健センター	○	○		○
徳島県保健環境センター	○	○	○	○
香川県環境保健研究センター	○	○	○	○
愛媛県立衛生環境研究所		○		○
高知県環境研究センター	○	○	○	
福岡県保健環境研究所				○
北九州市環境局環境科学研究所	○	○	○	
福岡市保健環境研究所		○		
佐賀県環境センター	○	○		○
長崎県環境部環境政策課	○	○		
熊本県保健環境科学研究所	○			○
大分県生活環境部衛生環境研究センター		○	○	
宮崎県衛生環境研究所	○	○		○
鹿児島県環境保健センター	○	○	○	○
沖縄県衛生環境研究所	○	○	○	○

(2) 調査地点

水質については表1-1、図1-1及び図1-2に、底質については表1-2、図1-3及び図1-4に、生物については表1-3、図1-5及び図1-6、大気については表1-4、図1-7及び図1-8に示した。その数量は以下のとおりである。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質(群)数	調査地点(・生物種)数	調査地点ごとの検体数
水質	43	14	49	1
底質	48	14	64	1又は3
生物(貝類)	6	14	6	1又は3
生物(魚類)	15	14	18	1又は3
生物(鳥類)	2	14	2	1又は3
大気(温暖期)	35	13	37	1又は3
大気(寒冷期)	35	12	37	1
全媒体	59	15	120	

(注 1) : 底質については各調査地点とも3試料/地点の採取を行い、[19] トリブチルスズ化合物及び[20] トリフェニルスズ化合物については3検体/地点の測定を行い、その他の物質については調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。

(注 2) : 生物については各調査地点とも5試料/地点の採取を行い、[19] トリブチルスズ化合物及び[20] トリフェニルスズ化合物については3検体/地点の測定を行い、その他の物質については調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。

(注 3) : [18] *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類については温暖期のみに3検体/地点の測定を行った。その他の物質は温暖期及び寒冷期に1検体/地点の測定を行った。

表1-1 平成22年度モニタリング調査地点一覧（水質）


地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）	平成 22 年 10 月 7 日
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	平成 22 年 10 月 6 日
青森県	十三湖	平成 22 年 10 月 14 日
岩手県	豊沢川（花巻市）	平成 22 年 10 月 13 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	平成 22 年 10 月 20 日
秋田県	八郎湖	平成 22 年 9 月 28 日
山形県	最上川河口（酒田市）	平成 22 年 11 月 8 日
福島県	小名浜港	平成 23 年 2 月 2 日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	平成 22 年 11 月 6 日
栃木県	田川（宇都宮市）	平成 22 年 11 月 11 日
埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	平成 22 年 11 月 18 日
千葉県	花見川河口（千葉市）	平成 22 年 11 月 12 日
東京都	荒川河口（江東区）	平成 22 年 11 月 15 日
	隅田川河口（港区）	平成 22 年 11 月 15 日
横浜市	横浜港	平成 22 年 11 月 24 日
川崎市	川崎港京浜運河	平成 22 年 11 月 8 日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	平成 22 年 9 月 29 日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	平成 22 年 11 月 18 日
石川県	犀川河口（金沢市）	平成 22 年 10 月 13 日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	平成 22 年 11 月 17 日
長野県	諏訪湖湖心	平成 22 年 10 月 21 日
静岡県	天竜川（磐田市）	平成 22 年 10 月 5 日
愛知県	名古屋港	平成 22 年 10 月 28 日
三重県	四日市港	平成 22 年 10 月 26 日
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	平成 22 年 11 月 16 日
京都府	宮津港	平成 22 年 10 月 6 日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	平成 22 年 11 月 11 日
大阪府	大和川河口（堺市）	平成 22 年 11 月 19 日
大阪市	大阪港	平成 22 年 9 月 27 日
兵庫県	姫路沖	平成 22 年 10 月 8 日
神戸市	神戸港中央	平成 22 年 10 月 27 日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	平成 22 年 10 月 27 日
岡山県	水島沖	平成 22 年 10 月 27 日
広島県	呉港	平成 22 年 11 月 4 日
	広島湾	平成 22 年 11 月 4 日
山口県	徳山湾	平成 22 年 10 月 21 日
	宇部沖	平成 22 年 10 月 13 日
	萩沖	平成 22 年 10 月 20 日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	平成 22 年 10 月 7 日
香川県	高松港	平成 22 年 10 月 12 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	平成 22 年 10 月 18 日
北九州市	洞海湾	平成 22 年 10 月 27 日
佐賀県	伊万里湾	平成 22 年 10 月 5 日
長崎県	大村湾	平成 22 年 11 月 18 日
熊本県	緑川（宇土市）	平成 22 年 10 月 18 日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	平成 22 年 11 月 5 日
鹿児島県	天降川（霧島市）	平成 22 年 10 月 27 日
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	平成 22 年 11 月 16 日
沖縄県	那覇港	平成 22 年 11 月 5 日




図1-1 平成22年度モニタリング調査地点(水質)



十勝川すずらん大橋(帯広市) N 42° 56' 45" E 143° 11' 08" (世界測地系)



石狩川河口石狩河口橋(石狩市) N 43° 13' 43" E 141° 21' 07" (世界測地系)



十三川 N 41° 01' 20" E 140° 21' 10" (世界測地系)



豊沢川(花巻市) N 39° 22' 54" E 141° 07' 09" (世界測地系)



仙台湾(松島湾) N 38° 21' 18" E 141° 05' 52" (世界測地系)




八郎湖 N 39° 55' 22" E 139° 59' 56" (世界測地系)



最上川河口(酒田市) N 38° 53' 14" E 139° 50' 36" (世界測地系)




小名浜港 N 36° 55' 29" E 140° 52' 31" (世界測地系)



利根川河口かもめ大橋(神栖市) N 35° 46' 35" E 140° 45' 20" (世界測地系)

図 1-2 (1/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点(水質)詳細



田川(宇都宮市) N 36° 31' 41" E 139° 53' 11" (世界測地系)



荒川秋ヶ瀬取水堰(志木市) N 35° 50' 26" E 139° 36' 16" (世界測地系)



花見川河口(千葉市) N 35° 38' 06" E 140° 02' 53" (世界測地系)



荒川河口(江東区) N 35° 38' 31" E 139° 50' 59" (世界測地系)



隅田川河口(港区) N 35° 39' 25" E 139° 46' 27" (世界測地系)




横浜港 N 35° 27' 20" E 139° 39' 49" (世界測地系)



川崎港京浜運河 N 35° 29' 43" E 139° 43' 40" (世界測地系)



信濃川下流(新潟市) N 37° 52' 59" E 139° 00' 56" (世界測地系)



神通川河口萩浦橋(富山市) N 36° 44' 42" E 137° 13' 05" (世界測地系)

図 1-2 (2/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点(水質)詳細




図 1-2 (3/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (4/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点(水質)詳細




図 1-2 (5/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点(水質)詳細




図 1-2 (6/6) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細

表1-2 平成22年度モニタリング調査地点一覧（底質）

地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）	平成 22 年 10 月 18 日
	十勝川すずらん大橋（帯広市）	平成 22 年 10 月 7 日
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	平成 22 年 10 月 6 日
	苫小牧港	平成 22 年 9 月 14 日
青森県	十三湖	平成 22 年 10 月 14 日
岩手県	豊沢川（花巻市）	平成 22 年 10 月 13 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	平成 22 年 10 月 20 日
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	平成 22 年 11 月 17 日
秋田県	八郎湖	平成 22 年 9 月 28 日
山形県	最上川河口（酒田市）	平成 22 年 11 月 8 日
福島県	小名浜港	平成 23 年 2 月 2 日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	平成 22 年 11 月 6 日
栃木県	田川（宇都宮市）	平成 22 年 11 月 11 日
千葉県	市原・姉崎海岸	平成 22 年 10 月 27 日
千葉市	花見川河口（千葉市）	平成 22 年 11 月 12 日
東京都	荒川河口（江東区）	平成 22 年 11 月 15 日
	隅田川河口（港区）	平成 22 年 11 月 15 日
横浜市	横浜港	平成 22 年 11 月 24 日
川崎市	多摩川河口（川崎市）	平成 22 年 11 月 8 日
	川崎港京浜運河	平成 22 年 11 月 8 日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	平成 22 年 9 月 29 日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	平成 22 年 11 月 18 日
石川県	犀川河口（金沢市）	平成 22 年 10 月 13 日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	平成 22 年 11 月 17 日
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）	平成 22 年 10 月 26 日
長野県	諏訪湖湖心	平成 22 年 10 月 21 日
静岡県	清水港	平成 22 年 10 月 13 日
	天竜川（磐田市）	平成 22 年 10 月 5 日
愛知県	衣浦港	平成 22 年 10 月 28 日
	名古屋港	平成 22 年 10 月 28 日
三重県	四日市港	平成 22 年 10 月 26 日
	鳥羽港	平成 22 年 10 月 19 日
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	平成 22 年 11 月 16 日
	琵琶湖唐崎沖中央	平成 22 年 11 月 16 日
京都府	宮津港	平成 22 年 10 月 6 日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	平成 22 年 11 月 11 日
大阪府	大和川河口（堺市）	平成 22 年 11 月 19 日
大阪市	大阪港	平成 22 年 9 月 27 日
	大阪港外	平成 22 年 9 月 27 日
	淀川河口（大阪市）	平成 22 年 9 月 27 日
	淀川（大阪市）	平成 22 年 10 月 6 日
兵庫県	姫路沖	平成 22 年 10 月 8 日
神戸市	神戸港中央	平成 22 年 10 月 27 日
奈良県	大和川（王寺町）	平成 22 年 11 月 8 日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	平成 22 年 10 月 27 日
岡山県	水島沖	平成 22 年 10 月 27 日
広島県	呉港	平成 22 年 11 月 4 日
	広島湾	平成 22 年 11 月 4 日
山口県	徳山湾	平成 22 年 10 月 21 日
	宇部沖	平成 22 年 10 月 13 日
	萩沖	平成 22 年 10 月 20 日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	平成 22 年 10 月 7 日
香川県	高松港	平成 22 年 10 月 12 日
愛媛県	新居浜港	平成 22 年 11 月 16 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	平成 22 年 10 月 18 日
北九州市	洞海湾	平成 22 年 10 月 27 日

地方公共団体	調査地点	採取日
福岡市	博多湾	平成 22 年 10 月 19 日
佐賀県	伊万里湾	平成 22 年 10 月 5 日
長崎県	大村湾	平成 22 年 11 月 18 日
大分県	大分川河口（大分市）	平成 22 年 11 月 19 日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	平成 22 年 11 月 5 日
鹿児島県	天降川（霧島市）	平成 22 年 10 月 27 日
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	平成 22 年 11 月 16 日
沖縄県	那覇港	平成 22 年 11 月 5 日



図1-3 平成22年度モニタリング調査地点(底質)




図 1-4 (1/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (3/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点(底質)詳細



天竜川(駿田市) N 34° 40' 54"
E 137° 47' 39"
(世界測地系)



衣浦港 N 34° 50' 30"
E 136° 56' 55"
(世界測地系)



名古屋港 N 35° 01' 26"
E 136° 50' 49"
(世界測地系)



四日市港 N 34° 56' 58"
E 136° 39' 11"
(世界測地系)



鳥羽港 N 34° 28' 51"
E 136° 50' 55"
(世界測地系)




琵琶湖南比良沖中央 N 35° 11' 07"
E 135° 58' 24"
(世界測地系)



琵琶湖唐崎沖中央 N 35° 02' 46"
E 135° 53' 44"
(世界測地系)



宮津港 N 35° 34' 59"
E 135° 12' 50"
(世界測地系)



桂川宮前橋(京都市) N 34° 54' 18"
E 135° 42' 45"
(世界測地系)

図 1-4 (4/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点(底質)詳細




図 1-4 (5/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (6/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (7/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (8/8) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細

表1-3 平成22年度モニタリング調査地点一覧（生物）

地方公共団体	調査地点	生物種	採取日
北海道	釧路沖	ウサギアイナメ	平成 22 年 9 月 1 日
	釧路沖	シロサケ	平成 22 年 10 月 18 日
	日本海沖（岩内沖）	アイナメ	平成 22 年 11 月 1 日
青森県	蕪島（八戸市）	ウミネコ	平成 22 年 7 月 8 日
岩手県	山田湾	ムラサキイガイ	平成 22 年 11 月 24 日
	山田湾	アイナメ	平成 22 年 12 月 1 日
	盛岡市郊外	ムクドリ	平成 22 年 8 月 11 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	スズキ	平成 22 年 9 月 6 日
茨城県	常磐沖	サンマ	平成 22 年 12 月 1 日
東京都	東京湾	スズキ	平成 22 年 8 月 26 日
横浜市	横浜港	ミドリイガイ	平成 22 年 10 月 19 日
川崎市	川崎港扇島沖	スズキ	平成 22 年 10 月 12 日
名古屋市	名古屋港	ボラ	平成 22 年 8 月 18 日
滋賀県	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	平成 22 年 4 月 2 日
大阪府	大阪湾	スズキ	平成 22 年 8 月 23 日
兵庫県	姫路沖	スズキ	平成 22 年 11 月 25 日
鳥取県	中海	スズキ	平成 22 年 10 月 17 日
島根県	島根半島沿岸七瀬湾	ムラサキイガイ	平成 22 年 10 月 11 日
広島市	広島湾	スズキ	平成 22 年 11 月 18 日
徳島県	鳴門	イガイ	平成 22 年 10 月 12 日
香川県	高松港	イガイ	平成 22 年 9 月 1 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	スズキ	平成 22 年 10 月 18 日
北九州市	洞海湾	ムラサキイガイ	平成 22 年 7 月 27 日
大分県	大分川河口（大分市）	スズキ	平成 22 年 11 月 29 日
鹿児島県	薩摩半島西岸	スズキ	平成 22 年 11 月 29 日
沖縄県	中城湾	ミナミクロダイ	平成 22 年 12 月 13 日



図1-5 平成22年度モニタリング調査地点（生物）




図 1-6 (1/3) 平成 22 年度モニタリング調査地点(生物)詳細




図 1-6 (2/3) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (生物) 詳細




図 1-6 (3/3) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (生物) 詳細

表1-4 平成22年度モニタリング調査地点一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	採取日（温暖期）	採取日（寒冷期）
北海道	北海道上川合同庁舎（旭川市）	平成22年9月14日～21日 又は平成22年9月14日～17日 、	平成22年11月15日～22日 又は平成22年11月15日～17日、18日～19日
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）	平成22年9月27日～30日	平成22年11月16日～17日、18日～19日、平成23年1月6日～7日
岩手県	網張スキー場（雫石町）	平成22年8月30日～9月2日 、 又は平成22年9月13日～16日	平成22年11月8日～11日
宮城県	宮城県保健環境センター（仙台市）	平成22年9月27日～10月4日 、平成22年9月28日～10月1日 又は平成22年9月28日～10月2日	平成22年12月6日～13日 又は平成22年12月6日～8日、14日～15日
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	平成22年9月9日～16日 又は平成22年9月9日～12日 、	平成22年12月7日～14日 又は平成22年12月7日～10日
群馬県	群馬県衛生環境研究所（前橋市）	平成22年10月12日～19日 又は平成22年10月12日～15日 、	平成22年11月29日～12月6日 又は平成22年11月29日～12月2日
千葉県	市原松崎一般環境大気測定局（市原市）	平成22年9月27日～10月4日 又は平成22年9月27日～30日 、	平成22年11月29日～12月6日 又は平成22年11月29日～12月2日
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	平成22年9月3日～10日 、平成22年9月6日～9日 又は平成22年9月6日～8日、9日～10日	平成22年11月4日～11日 又は平成22年11月8日～11日
	小笠原父島	平成22年9月27日～30日	平成22年11月21日～28日 又は平成22年11月21日～24日
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	平成22年9月6日～9日	平成22年11月15日～18日
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）	平成22年9月10日～17日 、平成22年9月14日～17日 又は平成22年9月7日～10日	平成22年12月10日～17日 又は平成22年12月14日～17日
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）	平成22年9月28日～10月1日	平成22年12月13日～16日
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）	平成22年9月7日～10日 、又は平成22年9月14日～17日	平成22年12月6日～9日
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	平成22年9月28日～10月1日	平成22年12月14日～17日
山梨県	山梨県衛生環境研究所（甲府市）	平成22年9月14日～17日	平成22年11月30日～12月3日
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	平成22年9月7日～14日 、平成22年9月7日～10日 又は平成22年9月13日～16日	平成22年11月8日～15日 又は平成22年11月9日～12日
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）	平成22年10月12日～15日	平成22年11月29日～12月2日
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	平成22年9月22日～29日 又は平成22年9月27日～30日 、	平成22年12月7日～14日 又は平成22年12月7日～10日
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	平成22年9月13日～16日	平成22年12月13日～16日
京都府	京都府立城陽高校（城陽市）	平成22年10月12日～15日	平成22年12月14日～17日
大阪府	大阪府環境農林水産総合研究所（大阪市）	平成22年9月27日～30日	平成22年11月29日～12月2日
兵庫県	兵庫県環境研究センター（神戸市）	平成22年8月30日～9月2日 、又は平成22年10月13日～15日、26日～27日	平成22年11月29日～12月2日
神戸市	葺合一般環境大気測定局（神戸市）	平成22年9月27日～30日 、又は平成22年10月4日～7日	平成22年11月29日～12月2日
奈良県	天理一般環境大気観測局（天理市）	平成22年9月27日～30日 、又は平成22年9月27日～29日、30日～10月1日	平成22年12月13日～16日 又は平成22年12月14日～17日

地方 公共団体	調査地点	採取日（温暖期）	採取日（寒冷期）
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）	平成 22 年 9 月 14 日～17 日	平成 22 年 11 月 22 日～25 日
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）	平成 22 年 9 月 13 日～16 日	平成 22 年 11 月 16 日～19 日
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	平成 22 年 9 月 14 日～21 日、平成 22 年 9 月 14 日～17 日 又は平成 22 年 9 月 15 日～18 日	平成 22 年 11 月 26 日～12 月 3 日 又は平成 22 年 11 月 30 日～12 月 3 日
	萩市役所見島支所（萩市）	平成 22 年 9 月 14 日～21 日 又は平成 22 年 9 月 14 日～17 日、	平成 22 年 11 月 26 日～12 月 3 日 又は平成 22 年 11 月 30 日～12 月 3 日
徳島県	徳島県保健環境センター（徳島市）	平成 22 年 9 月 27 日～30 日、又は平成 22 年 10 月 4 日～7 日	平成 22 年 12 月 6 日～9 日
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市） （対照地点：香川県立総合水泳プール（高松市））	平成 22 年 9 月 8 日～15 日、平成 22 年 9 月 8 日～11 日 又は平成 22 年 9 月 10 日～13 日	平成 22 年 11 月 17 日～24 日 又は平成 22 年 11 月 17 日～20 日
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）	平成 22 年 10 月 5 日～8 日	平成 22 年 11 月 8 日～11 日
福岡県	大牟田市役所（大牟田市）	平成 22 年 9 月 27 日～30 日	平成 22 年 11 月 29 日～12 月 2 日
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	平成 22 年 9 月 7 日～14 日、平成 22 年 9 月 7 日～10 日 又は平成 22 年 9 月 14 日～17 日	平成 22 年 11 月 9 日～16 日 又は平成 22 年 11 月 9 日～12 日
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）	平成 22 年 9 月 27 日～30 日	平成 22 年 12 月 13 日～16 日
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	平成 22 年 9 月 7 日～14 日 又は平成 22 年 9 月 7 日～10 日、	平成 22 年 11 月 22 日～29 日 又は平成 22 年 11 月 22 日～25 日
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）	平成 22 年 9 月 6 日～8 日、9 日～10 日、又は平成 22 年 9 月 13 日～16 日	平成 22 年 12 月 6 日～7 日、8 日～9 日、9 日～10 日
沖縄県	辺戸岬（国頭村）	平成 22 年 9 月 27 日～30 日	平成 22 年 11 月 29 日～12 月 2 日

（注） は[17] ペンタクロロベンゼン及び[18] *N,N*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類以外の物質を採取したことを、
は[17] ペンタクロロベンゼンを採取したことを、 は[18] *N,N*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類を採取したことをそれぞれ意味する。



図1-7 平成22年度モニタリング調査地点(大気)




図 1-8 (1/5) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (大気) 詳細



神奈川県環境科学センター(平塚市)
N 35° 20' 51"
E 139° 21' 05"
(世界測地系)



横浜市環境科学研究所(横浜市)
N 35° 25' 22"
E 139° 37' 04"
(世界測地系)




大山一般環境大気測定局(新潟市)
N 37° 56' 10"
E 139° 04' 46"
(世界測地系)




砺波一般環境大気測定局(砺波市)
N 36° 37' 44"
E 136° 59' 19"
(世界測地系)



石川県保健環境センター(金沢市)
N 36° 31' 38"
E 136° 42' 20"
(世界測地系)



山梨県衛生環境研究所(甲府市)
N 35° 40' 19"
E 138° 32' 59"
(世界測地系)



長野県環境保全研究所(長野市)
N 36° 38' 08"
E 138° 10' 42"
(世界測地系)



岐阜県保健環境研究所(各務原市)
N 35° 24' 27"
E 136° 50' 41"
(世界測地系)



千種区平和公園(名古屋市)
N 35° 10' 14"
E 136° 58' 44"
(世界測地系)

図 1-8 (2/5) 平成 22 年度モニタリング調査地点(大気)詳細




図 1-8 (3/5) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (大気) 詳細




図 1-8 (4/5) 平成 22 年度モニタリング調査地点(大気)詳細




図 1-8 (5/5) 平成 22 年度モニタリング調査地点 (大気) 詳細

（３）調査対象生物種

生物媒体において調査対象とする種は、指標としての有意性、実用性のほか、国際的な比較の可能性も考慮し、スズキ及びムラサキイガイを中心に貝類3種、魚類8種及び鳥類2種の計13種とした。

平成22年度において調査対象となった生物種の特性等を表2に示す。また、表3-1から表3-3には、分析に供した検体の概要をまとめた。なお、ウミネコは巣立ち前の幼鳥（斃死）を検体とした。

（４）試料の採取方法

試料の採取及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（平成20年度版）」（平成21年3月、環境省環境保健部環境安全課）に従うこととした。

（５）分析法

分析法の概要は、「６．モニタリング調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

表2 調査対象生物種の特性等

	生物種	生物種の特性等	調査地点	調査目的	備考
貝類	ムラサキイガイ (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	熱帯を除き、世界的に分布する。 内湾岩礁、橋脚等に付着する。	山田湾 島根半島沿岸七類湾 洞海湾	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる3地点で調査を実施
	イガイ (<i>Mytilus coruscus</i>)	北海道南部以南の日本各地に分布する。 1～10m/sの潮流の急な岩礁に付着する。	鳴門 高松港	特定地域の残留実態の把握	
	ミドリイガイ (<i>Perna viridis</i>)	本州南部以南の日本各地に分布する。 内湾の岩礁や岸壁に足糸で付着する。	横浜港	特定地域の残留実態の把握	
魚類	アイナメ (<i>Hexagrammos otakii</i>)	北海道から南日本、朝鮮半島、中国に分布する。 5～50mの浅海域に生息する。	日本海沖（岩内沖） 山田湾	特定地域の残留実態の把握	
	ウサギアイナメ (<i>Hexagrammos lagocephalus</i>)	北海道、日高以東の寒流域に生息する。 アイナメより大きく、生息海底にて、口に入る大きさの魚を食べる。	釧路沖	特定地域の残留実態の把握	
	サンマ (<i>Cololabis saira</i>)	北部太平洋に広く分布する。 日本列島周辺を回遊し、千島（秋）、北九州（冬）に至る。 化学物質濃縮性は中位といわれている。	常磐沖	日本列島周辺の残留実態の把握	
	シロサケ (<i>Oncorhynchus keta</i>)	北太平洋、日本海、ベーリング海、オホーツク海、アラスカ湾全体、北極海の一部に分布する。 日本では、太平洋側では利根川、日本海側では山口県以北の河川に遡上する。 化学物質濃縮性は中位といわれている。	釧路沖	地球規模での残留実態の把握	
	スズキ (<i>Lateolabrax japonicus</i>)	日本各地、朝鮮半島、中国の沿岸部に分布する。 成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。 化学物質濃縮性は高位といわれている。	仙台湾（松島湾） 東京湾 川崎港扇島沖 大阪湾 姫路沖 中海 広島湾 四万十川河口（四万十市） 大分川河口（大分市） 薩摩半島西岸	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる10地点で調査を実施
	ボラ (<i>Mugil cephalus</i>)	ほぼ全世界の熱帯・温帯に広く分布する。 成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。	名古屋港	特定地域の残留実態の把握	
	ミナミクロダイ (<i>Acanthopagrus sivicolus</i>)	南西諸島に分布する。 サンゴ礁海域及び河川水の流入する湾内に生息する。	中城湾	特定地域の残留実態の把握	
	ウグイ (<i>Tribolodon hakonensis</i>)	日本各地の淡水域に広く分布する。 主として昆虫類を捕食する。	琵琶湖安曇川（高島市）	特定地域の残留実態の把握	
鳥類	ムクドリ (<i>Sturnus cineraceus</i>)	極東域に広く分布、近種は世界的に分布する。 虫類を主食とする。	盛岡市郊外	北日本地域の残留実態の把握	
	ウミネコ (<i>Larus crassirostris</i>)	主として日本近海で繁殖する。 沿岸の島の岩礁、草原などに集団繁殖する。	蕪島（八戸市）	特定地域の残留実態の把握	

表3-1 平成22年度モニタリング調査（生物 貝類）検体の概要

生物種（調査地点）	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体重（g） （ ）内は算術平均値			体長（cm） （ ）内は算術平均値			水分 （％）	脂質分 （％）
ムラサキイガイ （山田湾）	1	平成 22 年 11 月	不明	148	32.1 ~	88.2 (	45.7)	8.1 ~	10.7 (	8.8)	79.2	2.2
	2		不明	197	25.3 ~	57.1 (	36.0)	7.7 ~	8.3 (	8.0)	79.8	2.3
	3		不明	258	18.4 ~	46.5 (	30.1)	7.1 ~	8.0 (	7.5)	80.1	2.1
	4		不明	381	16.8 ~	33.6 (	24.6)	6.7 ~	7.3 (	7.0)	81.1	2.0
	5		不明	468	8.5 ~	27.4 (	13.5)	5.2 ~	6.8 (	6.0)	81.3	1.9
ミドリイガイ （横浜港）	1	平成 22 年 10 月	混合	583	1.5 ~	3.7 (	2.4)	2.6 ~	3.7 (	3.1)	82	1.5
	2		混合	663	1.2 ~	4.0 (	2.1)	2.6 ~	3.5 (	3.0)	83	1.5
	3		混合	762	1.2 ~	3.0 (	1.9)	2.5 ~	3.4 (	2.9)	83	1.1
	4		混合	692	1.3 ~	3.0 (	2.1)	2.6 ~	3.5 (	3.0)	84	1.2
	5		混合	680	1.2 ~	3.0 (	2.1)	2.7 ~	3.3 (	3.0)	83	1.1
ムラサキイガイ （島根半島沿岸七類湾）	1	平成 22 年 10 月	不明	40	130.8 ~	298.9 (	190.7)	9.6 ~	14.2 (	11.4)	71.6	2.0
	2		不明	80	98.0 ~	177.1 (	133.5)	9.1 ~	12.1 (	10.5)	72.3	2.5
	3		不明	400	53.6 ~	150.4 (	91.6)	7.3 ~	10.4 (	9.1)	80.9	1.4
	4		不明	510	14.1 ~	108.3 (	60.2)	3.8 ~	9.7 (	7.0)	81.6	1.4
	5		不明	600	12.7 ~	21.1 (	16.5)	3.2 ~	4.2 (	3.8)	80.5	1.6
イガイ （鳴門）	1	平成 22 年 19 月	混合	21	268.0 ~	437.5 (	345)	13.2 ~	16.5 (	15.0)	72.4	1.6
	2		混合	20	347.1 ~	533.2 (	436)	15.0 ~	18.5 (	16.3)	71.6	1.3
	3		混合	19	364.1 ~	517.2 (	428)	14.5 ~	18.0 (	16.5)	73.4	1.3
	4		混合	18	363.2 ~	591.7 (	471)	15.3 ~	19.2 (	17.3)	64.4	1.2
	5		混合	17	391.9 ~	671.6 (	524)	17.0 ~	19.6 (	18.1)	60.7	0.7
イガイ （高松港）	1	平成 22 年 9 月	不明	28	72.2 ~	266.1 (	155.3)	8.5 ~	14.5 (	11.6)	67.6	2.8
	2		不明	32	74.4 ~	311.0 (	156.2)	9.1 ~	15.6 (	11.3)	69.3	2.0
	3		不明	25	79.9 ~	313.0 (	185.5)	8.5 ~	15.5 (	12.4)	71.9	3.0
	4		不明	42	35.3 ~	280.1 (	96.3)	7.6 ~	14.5 (	10.0)	74.5	2.7
	5		不明	42	76.4 ~	256.7 (	138.8)	9.5 ~	14.0 (	11.3)	76.1	2.4
ムラサキイガイ （洞海湾）	1	平成 22 年 7 月	混合	1,100	1.6 ~	8.2 (	2.8)	2.4 ~	4.0 (	3.1)	82	2.3

表 3-2 (1/2) 平成 22 年度モニタリング調査 (生物 魚類) 検体の概要

生物種 (調査地点)	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体重 (g) () 内は算術平均値	体長 (cm) () 内は算術平均値	水分 (%)	脂質分 (%)
ウサギアイナメ (釧路沖)	1	平成 22 年 9 月	混合	6	615 ~ 855 (741)	36 ~ 41 (38)	74.5	1.5
	2		混合	7	525 ~ 785 (628)	35 ~ 39 (36)	75.5	1.2
	3		混合	7	545 ~ 755 (616)	35 ~ 38 (36)	74.8	0.2
	4		混合	7	545 ~ 745 (642)	34 ~ 38 (36)	74.8	1.7
	5		混合	7	545 ~ 675 (612)	34 ~ 37 (36)	74.7	2.7
シロサケ (釧路沖)	1	平成 22 年 10 月	雌	1	4,500	70	72.3	1.6
	2		雌	1	4,900	71	71.9	2.0
	3		雌	1	4,300	71	72.4	1.1
	4		雄	1	3,800	68	68.2	4.0
	5		雌	1	4,500	69	72.4	1.5
アイナメ (日本海沖 (岩内沖))	1	平成 22 年 11 月	混合	4	815 ~ 1,535 (1,100)	41 ~ 47 (44)	72.4	1.8
	2		混合	6	465 ~ 1,325 (768)	34 ~ 45 (38)	71.6	2.1
	3		混合	5	625 ~ 1,275 (879)	38 ~ 46 (41)	72.4	1.8
	4		混合	6	345 ~ 1,595 (800)	30 ~ 47 (38)	73.3	2.0
	5		混合	6	485 ~ 1,835 (823)	33 ~ 48 (37)	73.3	1.8
アイナメ (山田湾)	1	平成 22 年 12 月	不明	6	608.0 ~ 744.5 (681.6)	35.4 ~ 37.1 (36.4)	72.4	2.8
	2		不明	8	435.1 ~ 695.0 (541.3)	33.6 ~ 35.0 (34.2)	73.1	3.4
	3		不明	11	402.5 ~ 547.9 (455.5)	31.8 ~ 33.4 (32.3)	74.0	3.6
	4		不明	12	338.8 ~ 593.2 (431.4)	30.3 ~ 31.6 (31.0)	73.4	3.8
	5		不明	17	204.0 ~ 449.8 (329.2)	24.8 ~ 29.9 (28.3)	74.0	3.6
スズキ (仙台湾 (松島湾))	1	平成 22 年 9 月	混合	28	142 ~ 219 (185)	20.5 ~ 23.7 (22.3)	73.6	1.9
	2		混合	25	159 ~ 307 (196)	21.3 ~ 27.6 (22.6)	74.4	1.7
	3		混合	31	159 ~ 255 (187)	20.8 ~ 26.0 (22.4)	73.7	1.3
	4		混合	30	159 ~ 322 (202)	21.3 ~ 28.0 (23.3)	73.7	1.5
	5		混合	30	140 ~ 333 (190)	20.3 ~ 27.7 (22.9)	74.3	1.3
サンマ (常磐沖)	1	平成 22 年 12 月	不明	35	69 ~ 115 (101)	24 ~ 29 (27)	67.2	9.5
	2		不明	25	116 ~ 125 (121)	21 ~ 30 (28)	66.9	8.9
	3		不明	25	126 ~ 135 (131)	28 ~ 32 (29)	65.1	11.0
	4		不明	25	135 ~ 166 (143)	28 ~ 32 (30)	63.0	12.3
	5		不明	25	83 ~ 158 (125)	25 ~ 31 (28)	66.0	12.5
スズキ (東京湾)	1	平成 22 年 8 月	混合	2	1,900 ~ 2,000 (1,950)	51.8 ~ 52.2 (52.0)	75.5	4.7
	2		混合	3	1,406 ~ 1,642 (1,493)	44.2 ~ 46.0 (45.0)	74.7	3.2
	3		混合	3	1,308 ~ 1,396 (1,341)	48.4 ~ 50.8 (43.5)	75.8	2.9
	4		混合	4	1,093 ~ 1,261 (1,153)	42.8 ~ 44.4 (43.6)	75.3	2.8
	5		混合	5	990 ~ 1,086 (1,025)	39.0 ~ 44.2 (40.9)	75.6	2.7
スズキ (川崎港扇島沖)	1	平成 22 年 10 月	雄	12	352 ~ 409 (391)	26.5 ~ 31.6 (30.0)	71.8 (平均)	1.7 (平均)
	2		雄	11	410 ~ 450 (434)	31.0 ~ 33.5 (31.6)		
	3		雄	9	450 ~ 600 (524)	31.5 ~ 36.0 (33.8)		
	4		雌	11	345 ~ 675 (416)	27.5 ~ 35.0 (29.6)		
	5		雌	10	360 ~ 768 (466)	29.5 ~ 39.6 (32.0)		
ボラ (名古屋市)	1	平成 22 年 8 月	不明	5	1,182 ~ 1,224 (1,182)	38.7 ~ 41.6 (40.1)	72.6 (平均)	4.0 (平均)
	2		不明	5	1,073 ~ 1,101 (1,085)	38.3 ~ 40.5 (39.6)		
	3		不明	5	1,014 ~ 1,062 (1,044)	38.8 ~ 40.0 (39.3)		
	4		不明	5	952 ~ 1,011 (973)	37.5 ~ 38.5 (38.0)		
	5		不明	5	839 ~ 894 (874)	36.0 ~ 37.5 (36.7)		
ウグイ (琵琶湖安曇川 (高島市))	1	平成 22 年 4 月	雌	21	247 ~ 470 (314)	25.0 ~ 30.0 (26.4)	70.8	4.0
	2		雄	25	215 ~ 321 (271)	24.1 ~ 29.0 (26.0)	68.7	4.2
	3		雌	22	273 ~ 453 (330)	24.8 ~ 29.0 (26.8)	68.9	4.5
	4		雄	24	188 ~ 338 (250)	23.5 ~ 27.6 (25.4)	70.1	4.0
	5		雌	20	253 ~ 313 (279)	24.8 ~ 27.6 (25.8)	69.6	3.8
スズキ (大阪湾)	1	平成 22 年 8 月	不明	7	682.2 ~ 816.3 (767.0)	37.0 ~ 38.0 (37.6)	74.8 (平均)	3.9 (平均)
	2		不明	8	553.5 ~ 733.0 (674.1)	33.0 ~ 36.0 (34.9)		
	3		不明	5	789.7 ~ 916.1 (862.1)	38.0 ~ 38.5 (38.2)		
	4		不明	6	644.6 ~ 770.7 (734.1)	34.0 ~ 37.0 (35.6)		
	5		不明	7	500.8 ~ 657.1 (611.1)	30.5 ~ 35.0 (32.6)		

表 3-2 (2/2) 平成 22 年度モニタリング調査 (生物 魚類) 検体の概要

生物種 (調査地点)	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体重 (g) () 内は算術平均値	体長 (cm) () 内は算術平均値	水分 (%)	脂質分 (%)
スズキ (姫路沖)	1	平成 22 年 11 月	雄	2	1,642 ~ 1,938 (1,790)	47.5 ~ 49.0 (48.3)	72.7 (平均)	3.9 (平均)
	2		雄	2	1,962 ~ 2,074 (2,018)	49.0 ~ 49.5 (49.1)		
	3		雄	2	1,842 ~ 1,873 (1,858)	49.5 ~ 50.0 (49.8)		
	4		雄	2	1,985 ~ 2,001 (1,993)	50.0 ~ 50.5 (50.3)		
	5		雄	2	2,059 ~ 2,262 (2,161)	52.0 ~ 52.5 (52.3)		
スズキ (中海)	1	平成 22 年 10 月	雌	9	790 ~ 1,170 (929)	40.2 ~ 47.2 (42.7)	79.2	1.3
	2		混合	11	717 ~ 845 (778)	38.0 ~ 40.5 (39.0)	77.8	1.7
	3		混合	12	595 ~ 760 (689)	35.4 ~ 39.7 (37.8)	78.7	1.1
	4		混合	14	440 ~ 690 (527)	32.5 ~ 39.2 (34.3)	79.0	1.1
	5		混合	16	430 ~ 560 (486)	30.1 ~ 34.8 (32.9)	79.0	1.1
スズキ (広島湾)	1	平成 22 年 11 月	雌	6	624 ~ 763 (697)	35 ~ 38 (37)	77.4	1.4
	2		雌	8	444 ~ 586 (499)	30 ~ 35 (32)	78.0	1.2
	3		雌	7	432 ~ 608 (514)	30 ~ 35 (32)	78.1	1.4
	4		雄	7	447 ~ 628 (536)	32 ~ 37 (34)	77.6	1.5
	5		雄	7	425 ~ 631 (521)	31 ~ 35 (34)	77.6	1.4
スズキ (四万十川河口 (四万十市))	1	平成 22 年 10 月	混合	8	322 ~ 495 (398)	25.4 ~ 29.1 (27.3)	75.8	1.1
	2		混合	10	92 ~ 410 (318)	18.0 ~ 27.1 (25.2)	76.2	0.9
	3		混合	10	229 ~ 381 (316)	22.5 ~ 26.8 (25.4)	76.4	1.3
	4		混合	11	134 ~ 372 (292)	19.2 ~ 27.3 (24.9)	75.8	1.0
	5		混合	40	39 ~ 115 (82)	12.9 ~ 18.8 (16.0)	77.6	0.9
スズキ (大分川河口 (大分市))	1	平成 22 年 11 月	不明	1	2,595	57.2	66.1	1.8
	2		不明	2	1,852 ~ 1,876 (1,864)	54.0 ~ 57.0 (55.5)	70.1	2.2
	3		不明	2	1,679 ~ 1,891 (1,785)	52.8 ~ 53.8 (53.3)	69.1	2.4
	4		不明	2	1,638 ~ 1,915 (1,777)	52.0 ~ 52.5 (52.3)	71.1	1.7
	5		不明	2	1,554 ~ 1,850 (1,702)	51.5 ~ 53.1 (52.3)	70.6	1.8
スズキ (薩摩半島西岸)	1	平成 22 年 11 月	雄	5	738.4 ~ 860.2 (787.2)	34.0 ~ 35.0 (34.5)	75.7	2.2
	2		雌	6	681.3 ~ 817.8 (750.6)	33.5 ~ 34.5 (33.9)	76.1	1.8
	3		雌	6	572.0 ~ 714.7 (638.3)	32.0 ~ 33.0 (32.6)	76.3	1.8
	4		雄	6	611.8 ~ 658.5 (636.0)	31.5 ~ 32.5 (31.8)	75.4	2.1
	5		雄	6	561.6 ~ 634.6 (607.3)	30.5 ~ 31.5 (31.1)	75.7	2.0
ミナミクロダイ (中城湾)	1	平成 22 年 12 月	雌	3	760 ~ 1,160 (1,000)	28.5 ~ 32.5 (30.7)	77	1.5
	2		雌	3	960 ~ 980 (973)	30.0 ~ 31.0 (30.5)	78	1.4
	3		雌	3	840 ~ 1,300 (1,107)	30.5 ~ 35.0 (32.7)	70	1.3
	4		雄	4	580 ~ 1,000 (770)	28.0 ~ 32.0 (29.6)	78	1.5
	5		雌	3	940 ~ 1,580 (1,180)	31.0 ~ 36.5 (33.0)	79	1.0

表 3-3 平成 22 年度モニタリング調査 (生物 鳥類) 検体の概要

生物種 (調査地点)	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体重 (g) () 内は算術平均値	体長 (cm) () 内は算術平均値	水分 (%)	脂質分 (%)
ウミネコ (蕪島 (八戸市))	1	平成 22 年 7 月	混合	82	219.2 ~ 502.7 (346.4)	14 ~ 30 (20)	64.2 (平均)	3.0 (平均)
	2		混合	40	294.8 ~ 625.2 (406.1)	20 ~ 27 (23)		
	3		混合	35	324.6 ~ 541.6 (425.9)	22 ~ 28 (25)		
	4		混合	25	323.2 ~ 588.7 (433.0)	23 ~ 29 (27)		
	5		混合	20	375.9 ~ 585.1 (451.5)	27 ~ 33 (30)		
ムクドリ (盛岡市郊外)	1	平成 22 年 8 月	雄	55	77.0 ~ 115.0 (90.2)	13.5 ~ 14.5 (13.8)	69.4	2.9
	2		雄	66	73.0 ~ 100.6 (85.4)	11.0 ~ 14.0 (13.2)	70.6	3.3
	3		雌	55	77.1 ~ 102.3 (87.9)	13.0 ~ 14.3 (13.7)	69.1	3.2
	4		雌	65	69.1 ~ 102.3 (84.0)	12.9 ~ 13.5 (13.2)	70.0	3.1
	5		不明	59	77.8 ~ 115.2 (88.2)	12.9 ~ 14.4 (13.6)	70.4	3.3

4. モニタリング調査としての継続性に関する考察

昭和49年度に「化学物質環境実態調査」が実施されて以降、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的として、種々の対象物質が選定され、調査が実施されてきており、平成22年度においては「初期環境調査」及び「詳細環境調査」として実施されている。こうした年度別の調査とは別に、一定の調査対象物質を経年的に追う継続的調査として、昭和53年度に開始した「生物モニタリング」をはじめ、「水質・底質モニタリング」、「指定化学物質等検討調査」、「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」及び「指定化学物質等検討調査」等が実施され、平成14年度より「モニタリング調査」として実施されるに至った。こうした継続的調査の実施経過の概要は次のとおりである。

調査名称 ^(注)	実施期間	媒体	調査対象物質
生物モニタリング	昭和53年度～平成13年度	生物（貝類、魚類、鳥類）	PCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、HCH類等
水質・底質モニタリング	昭和61年度～平成13年度	水質、底質	HCB、ディルドリン、DDT類、クロルデン類、HCH類等
非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査	昭和60年度～平成13年度	水質、底質、生物（魚類、貝類）、大気	PCB類等
指定化学物質等検討調査	昭和63年度～平成13年度	水質、底質等	トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物等
モニタリング調査	平成14年度～	水質、底質、生物（貝類、魚類、鳥類）、大気	PCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、ヘプタクロル類、トキサフェン類、マイレックス、HCH類等

（注）調査名称は実施期間中の代表的なものであり、年度によって異なる場合がある。

（1）調査対象物質及び媒体の推移

平成22年度モニタリング調査対象物質の継続的調査における年度別実施状況は表4のとおりである。

平成14年度から新規にモニタリングを開始したのは、全媒体のヘプタクロルのほか、水質・底質ではアルドリン、エンドリン、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE及び*o,p'*-DDD、大気ではHCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE、*o,p'*-DDD、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び*trans*-ノナクロルである。平成15年度からは、*cis*-ヘプタクロルエポキシド、*trans*-ヘプタクロルエポキシド、トキサフェン類（3物質）、マイレックス、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHについても全媒体の調査を開始した。平成16年度には、その他の調査対象物質としてHBB（全媒体）及びジオクチルスズ化合物（水質、底質及び生物）について調査を実施した。平成17年度には、その他の調査対象物質としてBHT（底質、生物及び大気）並びにジベンゾチオフェン及び有機スズ化合物（水質、底質及び生物）について調査を実施した。平成18年度は、その他の調査対象物質として2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール（生物及び大気）、2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン（別名：アトラジン）、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）、フタル酸ジ-*n*-ブチル、ポリ塩化ナフタレン類、ジオクチルスズ化合物及びりん酸トリ-*n*-ブチル（生物）について調査を実施した。平成19年度には、その他の調査対象物質としてアクリルアミド、テトラプロモビスフェノールA、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン及びヘキサプロモベン（水質、底質及び生物）、トリクロロベンゼン類及びテトラクロロベンゼン類（大気）並びにペンタクロロベンゼン（全媒体）について調査を実施した。平成20年度には、その他の物質としてクロルデコン、ジオクチルスズ化合物、ジベンゾチオフェン、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）、フタル酸ジ-*n*-ブチル及び

りん酸トリ-*n*-ブチル（水質、底質及び生物）、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）（生物）、2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン（別名：アトラジン）（水質及び底質）、*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類（水質）並びに2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール（別名：BHT）、2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール及びポリ塩化ナフタレン類（全媒体）について調査を実施した。平成21年度には、その他の物質としてヘキサブロモビフェニル類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（水質、底質及び生物）、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）（水質、底質及び大気）並びにペンタクロロベンゼン及びテトラクロロベンゼン類（大気）について調査を実施した。

このような中、平成21年5月にCOP4が開催され、HCH類、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンが新規にPOPs条約対象物質とすることが採択された。これを受けて調査頻度の見直しを行い、それらPOPs条約対象物質については毎年度の調査とすることとした一方で、平成14年度又は平成15年度から毎年度の調査が行われていた従前のPOPs条約対象物質であるPCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、ヘプタクロル類、トキサフェン類及びマイレックスのうち、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、トキサフェン類及びマイレックスについては、隔年度の調査とすることとした。

平成22年度は、従前のPOPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、DDT類、クロルデン類及びヘプタクロル類の5物質（群）並びに新規にPOPs条約対象物質として採択されたHCH類、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンの5物質（群）について全媒体の調査を実施したほか、その他の物質として、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（全媒体）、トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物（水質、底質及び生物）並びに*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類（大気）について調査を実施した。

なお、HCH類の大気については、平成15年度から平成20年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

表4 継続的調査の年度別調査物質・媒体一覧

[illegible]

(注) PCB 類の水質は昭和 50 年 2 月に環境基準が設定され、地方公共団体が常時監視を行っている。また底質については昭和 50 年 2 月に暫定除去基準が定められており、地方公共団体において測定されているが、ここでは触れない。なお、昭和 49 年の化審法施行以前の調査として、昭和 47 年度に水質、底質及び生物についての一斉調査を行っている。

[illegible][illegible]

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和															平成																							
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
[4]	水質													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	底質													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	貝類						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	魚類						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	鳥類						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	大気																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和																平成																					
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[5]	水質																														■	■	■	■	■	■	■	■	
	底質																														■	■	■	■	■	■	■	■	
	貝類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●								■	■	■	■	■	■	■	■	
	魚類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●							■	■	■	■	■	■	■	■	
	鳥類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●		●							■	■	■	■	■	■	■	■	
	大気																													■	■	■	■	■	■	■	■	■	

(注1) : 非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

(注2) ●：水質・底質モニタリング又は生物モニタリングにおいて実施したことを意味する。

(注3)○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。

(注4) : 継続的調査以外の調査において実施したことを意味する。

(注5) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

[1] PCB 類、[2] HCB、[3] アルドリン（参考）、[4] ディルドリン（参考）、[5] エンドリン（参考）

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																										
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
[10]	水質																																							
	底質																																							
	貝類																																							
	魚類																																							
	鳥類																																							
	大気																																							

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																										
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
[11-1] [11-2]	水質													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	底質													●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	貝類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	魚類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鳥類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
[11-3] [11-4]	大気																														□	□	□	□	□	□	□	■	■	
	水質																																							
	底質																																							
	貝類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲															
	魚類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲															
[11-4]	鳥類					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲	●	▲	▲	▲	▲																
	大気																															□	□	□	□	□	□	■	■	

(注) ▲：γ-体についてのみ調査を実施した。

□：HCH 類の大気については、平成 15 年度から平成 20 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和																平成																						
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
[12]	水質																																					■		■
	底質																																				■		■	
	貝類																																				■		■	
	魚類																																				■		■	
	鳥類																																				■		■	
	大気																																				■		■	

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和													平成																								
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[13]	水質																																					■	■
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■		

[10] マイレックス（参考）、[11-1] α-HCH、[11-2] β-HCH、[11-3] γ-HCH（別名：リンデン）、[11-4] δ-HCH、[12] クロルデコン、[13] ヘキサプロモビフェニル類

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																									
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[14-1] [14-4]	水質																																					■	■
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	
	水質																																				■	■	
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
[14-2]	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	
	水質																																				■	■	
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
[14-3]	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	
	水質																																				■	■	
	底質																																				■	■	
[14-5]	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	
	水質																																				■	■	
[14-6]	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	
[14-7]	水質																																				■	■	
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■	■	

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和														平成																							
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[15]	水質																																					■	■
	底質																																				■	■	
	貝類																																				■	■	
	魚類																																				■	■	
	鳥類																																				■	■	
	大気																																				■		

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和														平成																							
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[16]	水質																																					■	■
	底質																																					■	■
	貝類																																					■	■
	魚類																																					■	■
	鳥類																																					■	■
	大気																																					■	

[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類、[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類、[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類、
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類、[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類、[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類、[14-7]
デカブロモジフェニルエーテル、[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、[16] ペルフルオロオクタナ酸（PFOA）

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																										
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
[17]	水質																																			■			■	
	底質																																			■			■	
	貝類							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	魚類							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	鳥類							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	大気																																			■		■	■	

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																									
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
[18-1] [18-2] [18-3]	水質																																						
	底質																																					■	
	貝類																																						
	魚類																																						
	鳥類																																						
	大気																																					■	

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和												平成																								
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
[19]	水質															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				■					■
	底質															○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				■					■
	貝類												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■
	魚類												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■
	鳥類												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■
	大気																																					

物質 調査 番号	調査 媒体	昭和															平成																					
		49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
[20]	水質																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					■					■
	底質																○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■		■					■	
	貝類																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■	
	魚類																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■	
	鳥類																●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■		■					■
	大気																																					

[17] ペンタクロロベンゼン、[18-1] *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン、[18-2] *N,N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン、[18-3] *N,N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン、[19] トリブチルスズ化合物、[20] トリフェニルスズ化合物

(2) 調査地点の推移

化学物質環境実態調査における継続的調査の年度別調査地点の状況は表5-1から表5-4のとおりである。

・水質

平成14年度及び15年度は38地点、平成16年度は40地点、平成17年度は47地点、平成18年度から平成20年度は48地点、平成21年度は49地点においての調査であった。

平成22年度は、平成21年度と同一の49地点において調査を実施した。

平成13年度以前には、PCB類について、平成12年度に28地点で開始し、平成13年度には29地点において調査を実施していた。PCB類以外のものについては、昭和61年度に18地点で開始し、その後多少の増減を経た後、平成10年度には18地点において調査を実施していた（なお、平成11年度から平成13年度には調査を実施していない。）。

・底質

平成14年度は63地点、平成15年度は62地点、平成16年度及び17年度は63地点、平成18年度から平成21年度は64地点においての調査であった。

平成22年度は、平成18年度から平成21年度と同一の64地点において調査を実施した。

平成13年度以前には、PCB類について、平成8年度に36地点で開始し、平成13年度には39地点において調査を実施していた。PCB類以外のもの（有機スズ化合物を除く。）については、昭和61年度に18地点で開始し、その後多少の増減を経た後、平成13年度には20地点において調査を実施していた。

・生物

平成14年度は北海道釧路沖のオオサガ、長崎県祝言島地先のスズキの調査が廃止され、川崎港のスズキ、横浜港のムラサキイガイ等が新規追加され23地点（うち1地点は2生物種を調査）、平成15年度は三浦半島のムラサキイガイ及び萩市見島のムラサキインコガイの2地点が外れ21地点、平成16年度には高松港のムラサキイガイが新規追加され、洞海湾のムラサキイガイがムラサキインコガイに変更され22地点、平成17年度は釧路沖のシロサケ及び姫路沖のスズキが新規追加され、高松港のムラサキイガイがイガイに、洞海湾のムラサキインコガイがムラサキイガイに変更され23地点（うち2地点は2生物種を調査）、平成18年及び平成19年度も平成17年度と同一23地点、平成20年度は大分川河口（大分市）のスズキが新規追加され24地点（うち2地点は2生物種を調査）、平成21年度は、名古屋港のボラが新規追加され、洞海湾のムラサキイガイがムラサキインコガイに変更され25地点においての調査であった。

平成22年度は、能登半島沿岸のムラサキイガイが外れ、横浜港のムラサキイガイがミドリイガイに、洞海湾のムラサキインコガイがムラサキイガイに変更され24地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。

平成13年度以前には、PCB類について、平成8年度、9年度、12年度及び13年度には貝類及び魚類で実施されている。PCB類以外のものについては、昭和53年度に8地点で開始し、その後経年的に増加し、平成13年度には23地点において調査を実施していた。

・大気

平成14年度は34地点、平成15年度は小笠原父島が追加され、釧路市立春採中学校（釧路市）が北海道渡島支庁庁舎（函館市）に変更され35地点、平成16年度は兵庫県環境研究センター（神戸市）及び鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）が追加され、北海道渡島支庁庁舎（函館市）が上川保健福祉事務所（名寄

市)に変更され37地点、平成17年度は上川保健福祉事務所(名寄市)が釧路市立春採中学校(釧路市)に変更され37地点、平成18年度には釧路市立春採中学校(釧路市)が北海道渡島支庁庁舎(函館市)に変更され37地点、平成19年度は北海道渡島支庁庁舎(函館市)が上川保健福祉事務所(名寄市)、茨城県環境監視センター(水戸市)が茨城県霞ヶ浦環境科学センター(土浦市)に変更され、天理一般環境大気観測局(天理市)が廃止され36地点、平成20年度は上川保健福祉事務所(名寄市)が北海道釧路支庁(釧路市)に変更され、天理一般環境大気観測局(天理市)が再度追加され37地点においての調査であった。平成21年度は北海道釧路支庁(釧路市)が北海道渡島支庁庁舎(函館市)に変更され37地点においての調査であった。

平成22年度は、北海道渡島支庁庁舎(函館市)が北海道上川合同庁舎(旭川市)に、富士吉田合同庁舎(富士吉田市)が山梨県衛生環境研究所(甲府市)に変更され、37地点において調査が実施された。

平成13年度以前には、PCB類について平成12年度には17地点、平成13年度には15地点において調査を実施しているが、PCB類以外のものについては継続的調査が過去に実施されていない。

表5-1 継続的調査の年度別調査地点の一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	昭和			平成																						
		61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	苫小牧港	●	●	●																							
青森県	堤川河口（青森市）											○	○	○	○	○	○										
	十三湖						●	●	●	●	●	●	●	●			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
岩手県	雫石川																										
	豊沢川（花巻市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
宮城県	仙台湾（松島湾）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
秋田県	八郎湖				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山形県	最上川黒滝橋																										
	最上川須川合流点																										
	最上川河口（酒田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福島県	阿武隈川																										
	小名浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）																		■	■	■	■	■	■	■	■	
	利根川河口利根川大橋（波崎町）																	■									
	霞ヶ浦			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
栃木県	田川（宇都宮市）																				■	■	■	■	■	■	
埼玉県	新河岸川																										
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）																							■	■		
千葉県	市原・姉崎海岸				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
千葉市	花見川河口（千葉市）										○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	荒川河口（江東区）																				■	■	■	■	■	■	
東京都	隅田川河口（港区）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	東京湾中瀬			○	○	○	○	○	○	○	○																
	鶴見川河口				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
横浜市	横浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	多摩川河口											○	○	○	○												
川崎市	川崎港京浜運河																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	新潟東港			●																							
新潟県	信濃川河口（新潟市）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●													
	信濃川下流（新潟市）															○	○	○				■	■	■	■	■	
	神通川河口萩浦橋（富山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
石川県	珠洲市沖	●	●	●																							
	犀川河口（金沢市）	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）																			■	■	■	■	■	■	■	
山梨県	荒川（甲府市）					●	●	●	●	●	●	●	●	●													
長野県	千曲川屋島橋（須坂市）	●	●	●																							
	諏訪湖湖心	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
静岡県	清水港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
	天竜川（磐田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
愛知県	名古屋港			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三重県	長良川河口（桑名市）			○																							
	四日市港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
滋賀県	琵琶湖早崎港沖																										
	琵琶湖唐崎沖中央			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	琵琶湖浜大津沖				●	●		●	●	●	●	●	●	●													
京都府	宮津港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	桂川渡月橋（京都市）	●	●	●																							
京都市	桂川宮前橋（京都市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪府	大和川河口（堺市）	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	泉大津沖	●	●	●																							

地方 公共団体	調査地点	昭和			平成																					
		61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
大阪市	大阪港	●	●	○	●	○	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	大阪港外																									
	淀川河口	●	●	●																						
兵庫県	香住三田浜	●	●	●																						
	姫路沖	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
神戸市	神戸港中央										●	●	●	●				■	■	■	■	■	■	■	■	■
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）																			■	■	■	■	■	■	■
岡山県	水島沖	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	太濃地島西沖	●	●	●																						
広島県	呉港				●	○	●	○										■	■	■	■	■	■	■	■	■
	広島湾			○				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				■	■	■	■	■	■
山口県	徳山湾			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	宇部沖																				■	■	■	■	■	■
	萩沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
徳島県	紀伊水道																									
	吉野川河口（徳島市）						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
香川県	高松港			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高知県	四万十川河口（四万十市）				●	○	●	●	○	●	○	●	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
福岡県	大牟田沖			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
北九州市	関門海峡		●	●																						
	洞海湾		●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○			■	■	■	■	■	■	■
福岡市	博多湾					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
佐賀県	伊万里湾						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長崎県	大村湾																					■	■	■	■	■
	長崎港					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
熊本県	緑川（宇土市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
鹿児島県	天降川（霧島市）																					■	■	■	■	■
	甲突川松方橋（鹿児島市）	●	●	●																						
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	●	●	●	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
沖縄県	中城湾																									
	那覇港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- （注１）：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。
- （注２）●：水質・底質モニタリングにおいて実施したことを意味する。
- （注３）○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。
- （注４）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。
- （注５）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。
- （注６）■は水質・底質モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表5-2 継続的調査の年度別調査地点の一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	昭和			平成																					
		61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	十勝川すずらん大橋（帯広市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	苫小牧港	●	●	●														■	■	■	■	■	■	■	■	■
青森県	堤川河口（青森市）											○	○	○	○	○	○									
	十三湖						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
岩手県	雫石川																									
	豊沢川（花巻市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮城県	北上川																									
	仙台湾（松島湾）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
秋田県	八郎湖				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山形県	最上川黒滝橋																									
	最上川須川合流点																									
	最上川河口（酒田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
福島県	阿武隈川																									
	小名浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）																		■	■	■	■	■	■	■	■
	利根川河口利根川大橋（波崎町）																	■								
	利根川布川栄橋（利根町）																									
	霞ヶ浦			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									
	霞ヶ浦北浦																									
栃木県	田川（宇都宮市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
埼玉県	新河岸川																									
千葉県	市原・姉崎海岸				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
千葉市	花見川河口（千葉市）										○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
東京都	荒川河口（江東区）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	隅田川河口（港区）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	東京湾中瀬			○	○	○	○	○	○	○	○															
横浜市	鶴見川河口																									
	横浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
川崎市	多摩川河口（川崎市）												○	○	○	○		■	■	■	■	■	■	■	■	■
	川崎港京浜運河																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
新潟県	新潟東港			●																						
	信濃川河口（新潟市）			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●												
	信濃川下流（新潟市）															○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
石川県	珠洲市沖	●	●	●																						
	犀川河口（金沢市）	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■		■	■	■	■	■	■	■
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長野県	千曲川屋敷橋（須坂市）	●	●	●																						
	諏訪湖湖心	●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	木曽川三根橋（南木曽町）																									
静岡県	清水港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	天竜川（磐田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
愛知県	衣浦港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	名古屋港			○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三重県	長良川河口（桑名市）			○																						
	四日市港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	鳥羽港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■

地方 公共団体	調査地点	昭和			平成																						
		61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
滋賀県	琵琶湖早崎港沖																	■									
	琵琶湖南比良沖中央																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	琵琶湖唐崎沖中央			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	琵琶湖浜大津沖				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
京都府	宮津港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	桂川渡月橋（京都市）	●	●	●																							
京都市	桂川宮前橋（京都市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪府	大和川河口（堺市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	泉大津沖	●	●	●																							
大阪市	大阪港	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	大阪港外			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	淀川河口（大阪市）	●	●	●														■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	大川毛馬橋（大阪市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
兵庫県	香住三田浜	●	●	●																							
	西宮沖																										
	姫路沖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
神戸市	神戸港中央										●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
奈良県	大和川（王寺町）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
鳥取県	中海																										
岡山県	水島沖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	太濃地島西沖	●	●	●																							
広島県	呉港				●	●	●											■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	広島湾			○													●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	
山口県	徳山湾			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	宇部沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	萩沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
徳島県	紀伊水道																										
	吉野川河口（徳島市）						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
香川県	高松港			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
愛媛県	新居浜港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
高知県	四万十川河口（四万十市）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福岡県	大牟田沖			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
北九州市	関門海峡		●	●																							
	洞海湾		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
福岡市	博多湾					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
佐賀県	伊万里湾							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
長崎県	大村湾																						■	■	■	■	
	長崎港						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										
大分県	大分川河口（大分市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
鹿児島県	天降川（霧島市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	甲突川松方橋（鹿児島市）	●	●	●																							
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
沖縄県	中城湾																	●	●								
	那覇港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

（注１）：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

（注２）●：水質・底質モニタリングにおいて実施したことを意味する。

（注３）○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。

（注４）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

（注５）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

（注６）■は水質・底質モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表5-3 継続的調査の年度別調査地点の一覧（生物）

地方 公共団体	調査地点	生物種	昭和											平成																					
			53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		(貝 類)																																	
岩手県	山田湾	ムラサキイ ガイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
神奈川県	三浦半島	ムラサキイ ガイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■									
横浜市	横浜港	ムラサキイ ガイ																								■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		ミドリイガイ																																	■
石川県	能登半島沿岸	ムラサキイ ガイ				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
愛知県	伊勢湾	ムラサキイ ガイ												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
島根県	島根半島沿岸七瀬湾	ムラサキイ ガイ														●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山口県	見島	ムラサキイン コガイ																								■									
徳島県	紀伊水道	ムラサキイ ガイ																																	
	鳴門	イガイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
香川県	高松港	ムラサキイ ガイ																									■								
北九州市	洞海湾	イガイ																										■	■	■	■	■	■	■	■
		ムラサキイン コガイ																										■						■	
		(魚 類)																																	
北海道	根室沖	オオサガ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
	釧路沖	ウサギアイ ナメ																								●	■	■	■	■	■	■	■	■	■
		オオサガ シロサケ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●										
	石狩川河口	ウグイ																																	
	日本海沖 (岩内沖)	アイナメ																									●	■	■	■	■	■	■	■	■
岩手県	山田湾	アイナメ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	雫石川	スズキ	●	●																															
宮城県	北上川	ウグイ																																	
	仙台湾(松 島湾)	スズキ																									●	■	■	■	■	■	■	■	■
山形県	最上川黒滝 橋	フナ																																	
	最上川須川 合流点	ウグイ																																	
	日本海東北 沖	マダラ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
福島県	阿武隈川	ウグイ																																	
茨城県	常磐沖	サンマ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	利根川	フナ																																	
	霞ヶ浦北浦	フナ																																	
	霞ヶ浦西浦	フナ																																	
東京都	東京湾	スズキ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	荒川河口	マコガレイ			●																														

地方 公共団体	調査地点	生物種	昭和											平成																						
			53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	元	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
福井県	笙の川	ウグイ																																		
長野県	諏訪湖	フナ																																		
岐阜県	木曽川	ウグイ																																		
静岡県	清水港	スズキ																																		
愛知県	名古屋港	ボラ																																■	■	
三重県	四日市港	スズキ																																		
滋賀県	琵琶湖早崎 港沖	フナ																																		
	琵琶湖北湖	フナ																																		
	琵琶湖安曇 川(高島市)	ウグイ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪府	大阪湾	スズキ			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪市	大阪港外	スズキ																																		
	淀川	オイカワ																																		
	淀川河口	スズキ																																		
兵庫県	西宮沖	スズキ																																		
	姫路沖	スズキ																																		
神戸市	神戸港	スズキ																																		
和歌山県	紀の川河口	フナ																																		
鳥取県	中海	スズキ					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
島根県	山陰沖	ブリ	●	●																																
岡山県	水島沖	ニベ																																		
広島県	広島湾	ボラ																																		
広島市	広島湾	スズキ		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高知県	四万十川河 口（四万十 市）	スズキ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
北九州市	洞海湾	マダイ																																		
長崎県	長崎港	ボラ																																		
	小値賀島又 は祝言島地 先	スズキ												●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●											
大分県	大分川河口	スズキ																																■	■	■
鹿児島県	薩摩半島西 岸	スズキ						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮崎県	大淀川	フナ																																		
沖縄県	中城湾	ミナミクロ ダイ										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
		(鳥 類)																																		
青森県	蕪島（八戸 市）	ウミネコ																		●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
岩手県	盛岡市郊外	ムクドリ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
東京都	東京湾	ウミネコ					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

- (注1) : 非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。
- (注2) ● : 生物モニタリングにおいて実施したことを意味する。
- (注3) ■ : モニタリング調査において実施したことを意味する。
- (注4) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。
- (注5) □は生物モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表5-4 継続的調査の年度別調査地点の一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	平成										
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
北海道	上川保健福祉事務所（名寄市）					■			■			
	釧路市立春採中学校（釧路市）			■			■					
	北海道釧路支庁（釧路市）									■		
	北海道環境科学センター（札幌市）											
	北海道渡島支庁庁舎（函館市）				■			■			■	
	北海道上川合同庁舎（旭川市）											■
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
岩手県	網張スキー場（雫石町）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮城県	宮城県保健環境センター（仙台市）				■	■	■	■	■	■	■	■
	国設仙台測定局（仙台市）			■								
茨城県	茨城県環境監視センター（水戸市）			■	■	■	■	■				
	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）								■	■	■	■
群馬県	群馬県衛生環境研究所（前橋市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
千葉県	市原松崎一般環境大気測定局（市原市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）				■	■	■	■	■	■	■	■
	東京都立衛生研究所（調査当時）（新宿区）			■								
	小笠原父島				■	■	■	■	■	■	■	■
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
山梨県	富士吉田合同庁舎（富士吉田市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	山梨県衛生環境研究所（甲府市）											■
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
京都府	京都府立城陽高校（城陽市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
大阪府	大阪府環境農林水産総合研究所（大阪市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
兵庫県	兵庫県環境研究センター（神戸市）					■	■	■	■	■	■	■
神戸市	葺合一般環境大気測定局（神戸市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
奈良県	天理一般環境大気観測局（天理市）			■	■	■	■	■		■	■	■
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
山口県	山口県環境保健センター（山口市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	萩市役所見島支所（萩市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
徳島県	徳島県保健環境センター（徳島市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
	（対照地点：香川県立総合水泳プール（高松市））							■	■	■	■	■
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
福岡県	大牟田市役所（大牟田市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
北九州市	北九州観測所（北九州市）											
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
長崎県	長崎県庁（長崎市）											
	小ヶ倉支所測定局（長崎市）											
	北消防署測定局（長崎市）											
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）					■	■	■	■	■	■	■
沖縄県	辺戸岬（国頭村）			■	■	■	■	■	■	■	■	■

（注1）：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

（注2）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

（注3）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

（注4）□は非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

(3) 定量(検出)下限値の推移

平成13年度の検出下限値と平成14年度以降の検出下限値の比較一覧を表6-1から表6-4に、平成14年度以降の定量下限値の比較を表7-1から表7-2に示す。平成13年度の検出下限値は後述する「統一検出限界値」であり、平成14年度以降の検出下限値は、分析を担当した民間分析機関における検出下限値である。なお、平成14年度の水質及び底質は装置検出下限値(IDL)を、平成15年度以降の水質及び底質並びに平成14年度以降の生物及び大気は分析方法の検出下限値(MDL)をそれぞれ検出下限値として扱っている。

また、検出下限値の変化に対応した検出状況の変動については表8にまとめた。その際、地点の相違の影響を除外するため、継続して調査されている地点のみをみることにした。

表6-1から表6-4にあるとおり、検出下限値については、平成13年度までの値と比べ平成14年度以降の値が大きく改善している。

平成13年度まで実施されていた「生物モニタリング」においては、主として地方公共団体による分析によっていたため、分析機関間の装置の違い等を考慮してデータ処理を行う必要があり、調査に当たりあらかじめ同一の検出下限値(「統一検出限界値」と称していた。)を設定し、データ処理をしてきた。用いていた「統一検出限界値」は、開始当初のGC-ECDによる分析を勘案して設定されたものであり、GC/MSが主流となっている現在の分析法では十分に定量可能な値であり、より高感度の分析を行った地方公共団体からは「トレース値」として別報告を受ける状況が続いていた。平成14年度以降は分析機関が媒体ごとに一機関になったことに加え、高感度のGC/HRMSを用いた分析に移行しており、検出下限値は「統一検出限界値」に比べて一千分の一程度又はそれ以下となっている。

同じく平成13年度まで実施されていた「水質・底質モニタリング」においては、開始当初からGC/MSによる分析であり、水質は $0.01 \mu\text{g/L}$ ($= 10,000\text{pg/L}$)、底質は 1ng/g-dry ($= 1,000\text{pg/g-dry}$)を「統一検出下限値」として実施してきた。平成14年度以降は高感度のGC/HRMSを用いた分析に移行し、平成13年度に比べて、検出下限値は水質で一万分の一、底質で一千分の一程度に下がっている。

「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」におけるPCB類の総量は、平成8年度及び9年度はGC/MSで測定されたが、平成12年度及び13年度は高感度のHRGC/HRMSにより測定された。このため、平成12年度及び13年度は平成8年度及び9年度の一万分の一程度の検出下限値となっている。平成14年度以降は平成12年度及び13年度と同等の検出下限値であった。なお、コプラナーPCBについては平成8年度よりHRGC/HRMS分析が行われていたため、平成14年度以降とほぼ同等の検出下限値であった。

モニタリング調査では測定値の推移を定量的に評価できることが重要であるため、平成14年度調査結果からは原則として次のとおり定量下限値を示すことで数値の信頼性を確保することとした。

- ・ 検出下限値の約3倍を定量下限値とする。
- ・ 検出頻度(検出数/検体数等)は検出下限値により判定する。
- ・ 幾何平均値の算出においては、検出下限値以上の測定値はそのまま用い、検出下限値未満の測定値は検出下限値の1/2を用いる。
- ・ 幾何平均値、中央値等の表記に当たっては、その数値が検出下限値以上定量下限値未満の場合においてはトレース値とし、検出下限値未満であった場合においては不検出とする。

表6-1 平成13年度の継続的調査と平成14年度以降のモニタリング調査における検出下限値の比較（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質（pg/L）									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.03 ～ 30	0.06 ～ 0.3	0.07 ～ 2	0.2 ～ 4	0.09 ～ 2	0.1 ～ 0.7	0.2 ～ 0.5	0.1 ～ 0.6	0.1 ～ 2	0.09 ～ 8
[2]	HCB	10,000	0.2	2	8	5	5	3	1	0.2	4
[3]	アルドリン（参考）	---	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	---
[4]	ディルドリン（参考）	10,000	0.6	0.3	0.5	0.3	1	0.7	0.6	0.2	---
[5]	エンドリン（参考）	---	2	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1	0.3	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	10,000	0.2	0.9	2	1	0.6	0.6	0.5	0.06	0.8
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	10,000	0.2	2	3	2	2	2	0.4	0.4	0.8
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	10,000	0.08	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.2	0.2	0.08
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	---	0.4	0.7	2	1	0.8	0.8	0.5	0.06	0.5
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	---	0.3	0.3	0.5	0.4	0.9	0.8	0.3	0.09	0.09
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	---	0.20	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.09	0.2
[7]	クロルデン類										
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	10,000	0.3	0.9	2	1	2	2	0.6	0.4	4
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	10,000	0.5	2	2	1	2	0.8	1	0.3	4
	[7-3] オキシクロルデン	---	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	2	0.7	0.4	0.3
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	10,000	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	0.3	0.1	0.4
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	10,000	0.4	0.5	2	0.8	1.0	2	0.6	0.4	3
[8]	ヘプタクロル類										
	[8-1] ヘプタクロル	---	0.5	0.5	2	1	2	0.8	0.8	0.3	0.7
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	0.2	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	0.4	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5
[9]	トキサフェン類（参考）										
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	---	20	3	4	5	5	3	2	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	---	30	7	5	5	3	3	3	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	---	90	30	30	20	30	20	20	---
[10]	マイレックス（参考）	---	---	0.09	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2	---
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	10,000	0.3	0.9	2	1	1	0.6	2	0.4	1
	[11-2] β -HCH	10,000	0.3	0.7	2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.2	0.7
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	---	2	7	5	6	0.7	1	0.2	2
	[11-4] δ -HCH	---	---	0.5	0.7	0.5	0.8	0.4	0.9	0.4	0.3
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	0.05	---	0.04
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.19 ～ 0.78	1
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数 が 4 から 10 までのもの）										
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	3	3
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	4	1
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	2
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	2	1
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	1
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	30	7
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	---	200	100
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	---	14	20
[16]	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	---	23	20
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	---	1,300	---	---	1
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類										
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	1,700	---	---
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	2,000	---	---
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	2,100	---	---
[19]	トリブチルスズ化合物	3,000	---	---	---	100	---	---	---	---	100
[20]	トリフェニルスズ化合物	1,000	---	---	---	50	---	---	---	---	50

（注 1）平成13年度の検出下限値は「統一検出限界値」（PCB類の「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」はMDL）、平成14年度の検出下限値はIDL、平成15年度以降の検出下限値はMDLである。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

（注 3）平成13年度水質のPCB類以外に係る値については平成10年度調査のもの（平成11年度から平成13年度は水質の継続的調査が行われなかったため）。

表6-2 平成13年度の継続的調査と平成14年度以降のモニタリング調査における検出下限値の比較（底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	底質（pg/g-dry）									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.03 ～ 10	0.07 ～ 0.5	0.2 ～ 2	0.06 ～ 0.6	0.1 ～ 0.6	0.05 ～ 0.2	0.08 ～ 0.4	0.05～ 0.3	0.1 ～ 0.4	0.3 ～ 60
[2]	HCB	1,000	0.3	2	3	1	1.0	2	0.8	0.7	1
[3]	アルドリン（参考）	---	2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	1	0.2	---
[4]	ディルドリン（参考）	1,000	1	2	0.9	1	1.0	0.9	0.5	0.3	---
[5]	エンドリン（参考）	---	2	2	0.9	0.9	1	2	0.7	0.6	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	1,000	2	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	1,000	0.9	0.3	0.8	0.9	0.3	0.4	0.7	0.3	2
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	1,000	0.8	0.3	0.7	0.6	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	---	2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	---	1	0.2	0.8	0.9	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	---	2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4
[7]	クロルデン類										
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	1,000	0.3	2	2	0.6	0.8	2	0.9	0.3	2
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1,000	0.6	2	0.9	0.8	0.4	0.8	0.8	0.7	4
	[7-3] オキシクロルデン	---	0.5	0.4	0.8	0.7	1.0	0.9	1	1	0.4
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1,000	0.7	0.9	0.6	0.6	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	1,000	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.8	0.3	2
[8]	ヘプタクロル類										
	[8-1]ヘプタクロル	---	0.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	1	0.4	0.4
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	1	2	2	1.0	1	1	0.3	0.3
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	3	2	2	2	4	0.7	0.6	1
[9]	トキサフェン類（参考）										
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	---	30	20	30	4	3	5	4	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	---	50	20	40	7	10	6	5	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	---	2,000	400	700	60	70	40	30	---
[10]	マイレックス（参考）	---	---	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	---
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	1,000	0.4	0.5	0.6	0.6	2	0.6	0.6	0.4	0.8
	[11-2] β -HCH	1,000	0.3	0.7	0.8	0.9	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	---	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	0.7
	[11-4] δ -HCH	---	---	0.7	0.5	0.3	0.6	2	1	0.5	0.5
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	0.16	---	0.2
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.042～ 0.14	0.6
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数 が 4 から 10 までのもの）										
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	23	2
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	8	2
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	4	2
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	4
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	4	9
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	---	20	80
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	---	3.7	2
[16]	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	---	3.3	5
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	---	33	---	---	0.3
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類										
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[19]	トリブチルスズ化合物	800	1,200	400	---	80	---	---	---	---	80
[20]	トリフェニルスズ化合物	1,000	550	90	---	30	---	---	---	---	30

（注 1）平成13年度の検出下限値は「統一検出限界値」（PCB類の「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」はMDL）、平成14年度の検出下限値はIDL、平成15年度以降の検出下限値はMDLである。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表6-3 平成13年度の継続的調査と平成14年度以降のモニタリング調査における検出下限値の比較（生物）

物質 調査 番号	調査対象物質	生物（pg/g-wet）									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	10,000									
		0.02 ～ 0.5	0.4 ～ 1	0.69 ～ 3.7	0.61 ～ 6.1	0.6 ～ 4.9	0.6 ～ 2	0.4 ～ 3	0.5 ～ 2	0.5 ～ 2	0.8 ～ 3
[2]	HCB	1,000	0.06	7.5	4.6	3.8	1	3	3	2	2
[3]	アルドリン（参考）	1,000	1.4	0.84	1.3	1.2	2	2	2	0.8	---
[4]	ディルドリン（参考）	1,000	4	1.6	10	3	3	3	3	2	---
[5]	エンドリン（参考）	1,000	6	1.6	4.2	5.5	4	3	3	3	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	1,000	1.4	3.5	1.1	1.7	2	2	2	1	1
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	1,000	0.8	1.9	2.7	2.8	0.7	1	1	1	1
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	1,000	1.8	3.3	0.70	0.97	0.9	1	1	0.9	0.5
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1,000	4	0.97	0.61	0.86	1	1	1	0.8	1
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	1,000	1.2	1.2	0.69	1.1	1	0.9	1	1	0.6
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	1,000	4	2.0	1.9	1.1	1	1	2	1	0.2
[7]	クロルデン類										
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	1,000	0.8	1.3	5.8	3.9	1	2	2	2	2
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1,000	0.8	2.4	16	3.5	2	2	3	1	1
	[7-3] オキシクロルデン	1,000	1.2	2.8	3.1	3.1	3	2	2	1	3
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1,000	0.4	1.6	1.1	1.5	1	1	1	1	1
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	1,000	0.8	1.2	4.2	2.1	1	3	2	1	2
[8]	ヘプタクロル類										
	[8-1] ヘプタクロル	---	1.4	2.2	1.4	2.0	2	2	2	2	1
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	2.3	3.3	1.2	1	1	2	1	0.9
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	4.4	4.0	7.5	5	5	4	3	1
[9]	トキサフェン類（参考）										
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	---	15	14	16	7	4	3	3	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	---	11	15	18	5	3	4	3	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	---	40	33	34	30	30	30	20	---
[10]	マイレックス（参考）	---	---	0.81	0.82	0.99	1	1	1	0.8	---
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	1,000	1.4	0.61	4.3	3.6	1	2	2	2	1
	[11-2] β -HCH	1,000	4	3.3	2	0.75	1	3	2	2	1
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	---	1.1	10	2.8	2	3	3	3	1
	[11-4] δ -HCH	---	---	1.3	1.5	1.7	1	2	2	2	1
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	2.2	---	2.3
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.087 ～ 0.13	0.7 ～ 3
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）										
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	2.2	---	16
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	5.9	---	6
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	5.0	---	3
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	6.7	---	10
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	3.6	---	4
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	13	---	10
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	74	---	97
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	---	7.4	9.6
[16]	ペルフルオロオクタノ酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	---	9.9	9.9
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	---	61	---	---	0.7
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類										
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[19]	トリブチルスズ化合物	10,000	1,000	1,000	---	1,000	---	---	---	---	160
[20]	トリフェニルスズ化合物	20,000	500	500	---	500	---	---	---	---	110

（注 1）平成13年度の検出下限値は「統一検出限界値」（PCB類の「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」はMDL）、平成14年度以降の検出下限値はMDLである。

（注 2）「—」は比較対象なしを意味する。

（注 3）平成 13 年度の PCB 類（生物）については、「生物モニタリング」と「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」の二つの調査が行われたため、上段に「生物モニタリング」の検出下限値を、下段に「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」の検出下限値を記載した。

表6-4 平成13年度の継続的調査と平成14年度以降のモニタリング調査における検出下限値の比較（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気（pg/m ³ ）									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.0004 ～ 5	0.005 ～ 30	0.0043 ～ 1.1	0.0081 ～ 0.33	0.005 ～ 0.02	0.009 ～ 0.06	0.005 ～ 0.03	0.01 ～ 0.1	0.006 ～ 0.1	0.01 ～ 0.9
[2]	HCB	---	0.3	0.78	0.37	0.03	0.07	0.03	0.08	0.2	0.7
[3]	アルドリン（参考）	---	0.020	0.0077	0.05	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	---
[4]	ディルドリン（参考）	---	0.20	0.70	0.11	0.20	0.1	0.07	0.09	0.02	---
[5]	エンドリン（参考）	---	0.03	0.014	0.048	0.20	0.10	0.04	0.04	0.04	---
[6]	DDT 類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	---	0.08	0.046	0.074	0.05	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	---	0.03	0.13	0.039	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.21
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	---	0.006	0.018	0.018	0.05	0.04	0.004	0.009	0.01	0.01
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	---	0.05	0.04	0.031	0.03	0.03	0.01	0.01	0.008	0.05
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	---	0.01	0.0068	0.012	0.02	0.03	0.007	0.009	0.006	0.01
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	---	0.007	0.014	0.048	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01
[7]	クロルデン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	---	0.20	0.17	0.19	0.05	0.04	0.04	0.05	0.06	0.3
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	---	0.20	0.29	0.23	0.1	0.06	0.05	0.06	0.05	0.4
	[7-3] オキシクロルデン	---	0.008	0.015	0.042	0.05	0.08	0.02	0.01	0.02	0.01
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	---	0.010	0.0088	0.024	0.03	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	---	0.10	0.12	0.16	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.3
[8]	ヘプタクロル類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[8-1] ヘプタクロル	---	0.04	0.085	0.078	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.04
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	0.0048	0.017	0.04	0.04	0.01	0.008	0.01	0.01
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	0.033	0.2	0.05	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06
[9]	トキサフェン類（参考）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	---	0.066	0.066	0.1	0.6	0.2	0.08	0.09	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	---	0.27	0.4	0.2	0.5	0.1	0.09	0.1	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	---	0.52	0.81	0.4	3	0.6	0.6	0.6	---
[10]	マイレックス（参考）	---	---	0.0028	0.017	0.03	0.04	0.01	0.01	0.006	---
[11]	HCH 類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[11-1] α -HCH	---	---	0.24	0.11	0.02	0.03	0.04	0.04	0.05	0.47
	[11-2] β -HCH	---	---	0.063	0.041	0.04	0.06	0.02	0.01	0.03	0.09
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	---	0.19	0.076	0.04	0.03	0.04	0.03	0.02	0.12
	[11-4] δ -HCH	---	---	0.01	0.05	0.04	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.04	0.05
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.06	0.05
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.09	0.06
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.06
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	1.2
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	---	5	9.1
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	---	4.8	---	2.5	0.5
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.34
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.51
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.34
[19]	トリブチルスズ化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[20]	トリフェニルスズ化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

（注 1）平成13年度の検出下限値は「統一検出限界値」（PCB類の「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」はMDL）、平成14年度以降の検出下限値はMDLである。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表 7-1 平成 14 年度以降のモニタリング調査における定量下限値の比較（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質（pg/L）								
		H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.18 ～ 0.9	0.3 ～ 6	0.4 ～ 10	0.28 ～ 7	0.3 ～ 2.0	0.4 ～ 1.5	0.4 ～ 1.4	0.4 ～ 4	0.23 ～ 24
[2]	HCB	0.6	5	30	15	16	8	3	0.5	13
[3]	アルドリノ（参考）	0.6	0.6	2	0.9	1.7	1.0	1.4	0.7	---
[4]	ディルドリン（参考）	1.8	0.7	2	1.0	3	2.1	1.5	0.6	---
[5]	エンドリン（参考）	6.0	0.7	2	1.1	1.3	1.9	3	0.7	---
[6]	DDT 類									
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.6	3	6	4	1.9	1.7	1.2	0.15	2.4
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.6	4	8	6	7	4	1.1	1.1	2.3
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.24	2	3	1.9	1.6	1.7	0.6	0.4	0.20
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1.2	3	5	3	2.3	2.5	1.4	0.16	1.5
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.9	0.8	2	1.2	2.6	2.3	0.7	0.22	0.24
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.60	0.8	2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.22	0.6
[7]	クロルデン類									
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.9	3	6	4	5	4	1.6	1.1	11
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1.5	5	5	4	7	2.4	3	0.8	13
	[7-3] オキシクロルデン	1.2	2	2	1.1	2.8	6	1.9	1.1	0.7
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.8	0.3	0.6	0.5	0.8	2.4	0.9	0.3	1.3
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	1.2	2	4	2.5	3.0	5	1.6	1.0	8
[8]	ヘプタクロル類									
	[8-1]ヘプタクロル	1.5	2	5	3	5	2.4	2.1	0.8	2.2
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.7	2	0.7	2.0	1.3	0.6	0.5	0.4
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	2	0.9	0.7	1.8	2.0	1.9	0.7	1.3
[9]	トキサフェン類（参考）									
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	40	9	10	16	20	8	5	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	70	20	20	16	9	7	7	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	300	90	70	60	70	40	40	---
[10]	マイレックス（参考）	---	0.3	0.4	0.4	1.6	1.1	0.6	0.4	---
[11]	HCH 類									
	[11-1] α -HCH	0.9	3	6	4	3	1.9	4	1.2	4
	[11-2] β -HCH	0.9	3	4	2.6	1.7	2.7	1.0	0.6	2.0
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	7	20	14	18	2.1	3	0.6	6
	[11-4] δ -HCH	---	2	2	1.5	2.0	1.2	2.3	0.9	0.8
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	0.14	---	0.09
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	0.51 ～ 2.1	3
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数 が 4 から 10 までのもの）									
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	8	9
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	11	3
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.4	4
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	4	3
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.4	3
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	91	21
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	600	300
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	37	50
[16]	ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	59	60
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	3,300	---	---	4
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類									
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	4,400	---	
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	5,100	---	
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	5,400	---	
[19]	トリブチルスズ化合物	---	---	---	300	---	---	---	---	200
[20]	トリフェニルスズ化合物	---	---	---	130	---	---	---	---	120

（注 1）平成 14 年度の定量下限値はIDLの3倍、平成 15 年度から平成 17 年度の定量下限値はMDLの3倍、平成 18 年度以降の定量下限値はMDL測定時に得られた標準偏差の10倍である。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表 7-2 平成 14 年度以降のモニタリング調査における定量下限値の比較（底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	底質（pg/g-dry）								
		H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.21 ～ 1.5	0.4 ～ 6	0.2 ～ 2	0.16 ～ 1.8	0.16 ～ 0.7	0.3 ～ 1.0	0.13 ～ 0.7	0.3 ～ 0.9	0.8 ～ 180
[2]	HCB	0.9	4	7	3	2.9	5	2.0	1.8	3
[3]	アルドリノ（参考）	6	2	2	1.4	1.9	1.8	3	0.5	---
[4]	ディルドリン（参考）	3	4	3	3	2.9	2.7	1.2	0.8	---
[5]	エンドリン（参考）	6	5	3	2.6	4	5	1.9	1.6	---
[6]	DDT 類									
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	6	2	2	1.0	1.4	1.3	1.2	1.0	2.8
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	2.7	0.9	3	2.7	1.0	1.1	1.7	0.8	5
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	2.4	0.9	2	1.7	0.7	1.0	1.0	0.4	1.4
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	6	0.8	2	0.8	1.2	1.8	1.5	1.2	1.1
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	3	0.6	3	2.6	1.1	1.2	1.4	0.6	1.2
[7]	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	6	2	2	1.0	0.5	1.0	0.3	0.5	0.9
	クロルデン類									
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.9	4	4	1.9	2.4	5	2.4	0.7	6
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1.8	4	3	2.3	1.1	2.2	2.0	1.7	11
	[7-3] オキシクロルデン	1.5	1	3	2.0	2.9	2.5	3	2	1.0
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	2.1	3	2	1.9	1.2	1.6	0.6	1.0	0.9
[8]	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	1.5	2	2	1.5	1.2	1.7	2.2	0.9	6
	ヘプタクロル類									
	[8-1] ヘプタクロル	1.8	3	3	2.5	1.9	3.0	4	1.1	1.1
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	3	6	7	3.0	3	2	0.7	0.8
[9]	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	9	4	5	7	10	1.7	1.4	3
	トキサフェン類（参考）									
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	90	60	60	12	7	12	10	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	200	60	90	24	30	17	12	---
[10]	[9-3] Parlar-62（参考）	---	4,000	2,000	2,000	210	300	90	80	---
	マイレックス（参考）	---	2	2	0.9	0.6	0.9	0.7	1.0	---
[11]	HCH 類									
	[11-1] α -HCH	1.2	2	2	1.7	5	1.8	1.6	1.1	2.0
	[11-2] β -HCH	0.9	2	3	2.6	1.3	0.9	0.8	1.3	2.4
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	2	2	2.0	2.1	1.2	0.9	0.6	2.0
	[11-4] δ -HCH	---	2	2	1.0	1.7	5	2	1.2	1.2
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	0.42	---	0.4
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	0.11 ～ 0.38	1.5
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数 が 4 から 10 までのもの）									
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	69	6
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	24	5
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	5	4
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	9	4
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.2	10
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	9	24
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	60	220
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	9.6	5
[16]	ペルフルオロオクタタン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	8.3	12
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	86	---	---	0.9
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類									
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[19]	トリブチルスズ化合物	3,600	1,200	---	200	---	---	---	---	160
[20]	トリフェニルスズ化合物	1,600	280	---	70	---	---	---	---	70

（注 1）平成 14 年度の定量下限値はIDLの3倍、平成 15 年度から平成 17 年度の定量下限値はMDLの3倍、平成 18 年度以降の定量下限値はMDL測定時に得られた標準偏差の10倍である。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表 7-3 平成 14 年度以降のモニタリング調査における定量下限値の比較（生物）

物質 調査 番号	調査対象物質	生物（pg/g-wet）								
		H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	1.2 ～ 3	2.1 ～ 11	2.1 ～ 18	1.8 ～ 15	1.7 ～ 6	1.1 ～ 8	1.3 ～ 7	1.2 ～ 6	2.0 ～ 8
[2]	HCB	0.18	23	14	11	3	7	7	4	5
[3]	アルドリノ（参考）	4.2	2.5	4.0	3.5	4	5	5	2.1	---
[4]	ディルドリン（参考）	12	4.8	31	9	7	9	9	7	---
[5]	エンドリン（参考）	18	4.8	12	17	11	9	8	7	---
[6]	DDT 類									
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	4.2	11	3.2	5.1	6	5	5	3	3
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	2.4	5.7	8.2	8.5	1.9	3	3	4	3
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	5.4	9.9	2.2	2.9	2.4	3	3	2.4	1.3
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	12	2.9	1.8	2.6	3	3	3	2.2	3
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	3.6	3.6	2.1	3.4	3	2.3	3	3	1.5
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	12	6	5.7	3.3	4	3	4	3	0.6
[7]	クロルデン類									
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	2.4	3.9	18	12	4	5	5	4	4
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	2.4	7.2	48	10	4	6	7	4	3
	[7-3] オキシクロルデン	3.6	8.4	9.2	9.3	7	6	7	4	8
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.2	4.8	3.4	4.5	3	3	4	3	3
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	2.4	3.6	13	6.2	3	7	6	3	4
[8]	ヘプタクロル類									
	[8-1] ヘプタクロル	4.2	6.6	4.1	6.1	6	6	6	5	3
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	6.9	9.9	3.5	4	4	5	3	2.4
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	13	12	23	13	13	10	8	3
[9]	トキサフェン類（参考）									
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	45	42	47	18	10	9	7	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	33	46	54	14	9	10	8	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	120	98	100	70	70	80	70	---
[10]	マイレックス（参考）	---	2.4	2.5	3.0	3	3	4	2.1	---
[11]	HCH 類									
	[11-1] α -HCH	4.2	1.8	13	11	3	7	6	5	3
	[11-2] β -HCH	12	9.9	6.1	2.2	3	7	6	6	3
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	3.3	31	8.4	4	9	9	7	3
	[11-4] δ -HCH	---	3.9	4.6	5.1	3	4	6	5	3
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	5.6	---	5.9
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	0.26 ～ 0.38	1.9 ～ 8
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）									
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	5.9	---	43
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	16	---	14
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	14	---	8
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	18	---	30
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	9.6	---	11
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	35	---	30
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	220	---	270
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	19	25
[16]	ペルフルオロオクタナ酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	25	26
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	180	---	---	1.9
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類									
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[19]	トリブチルスズ化合物	3,000	3,000	---	3,000	---	---	---	---	420
[20]	トリフェニルスズ化合物	1,500	1,500	---	1,500	---	---	---	---	270

（注 1）平成 14 年度の定量下限値はIDLの3倍、その他の定量下限値はMDLの約3倍である。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表 7-4 平成 14 年度以降のモニタリング調査における定量下限値の比較（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)								
		H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	0.015 ～ 90	0.013 ～ 3.2	0.024 ～ 0.99	0.01 ～ 0.07	0.026 ～ 0.18	0.012 ～ 0.07	0.03 ～ 0.3	0.016 ～ 0.3	0.03 ～ 2.6
[2]	HCB	0.9	2.3	1.1	0.1	0.21	0.09	0.22	0.6	1.8
[3]	アルドリン（参考）	0.060	0.023	0.15	0.08	0.14	0.05	0.04	0.04	---
[4]	ディルドリン（参考）	0.60	2.1	0.33	0.5	0.3	0.18	0.24	0.06	---
[5]	エンドリン（参考）	0.090	0.042	0.14	0.5	0.30	0.09	0.10	0.09	---
[6]	DDT 類									
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.24	0.14	0.22	0.16	0.17	0.03	0.07	0.07	0.10
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.09	0.40	0.12	0.1	0.10	0.04	0.04	0.08	0.62
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.018	0.054	0.053	0.16	0.13	0.011	0.025	0.03	0.02
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.15	0.12	0.093	0.10	0.09	0.03	0.03	0.019	0.14
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.03	0.020	0.037	0.07	0.09	0.013	0.025	0.016	0.04
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.021	0.042	0.14	0.10	0.10	0.024	0.04	0.03	0.03
[7]	クロルデン類									
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.60	0.51	0.57	0.16	0.13	0.1	0.14	0.16	0.9
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.60	0.86	0.69	0.3	0.17	0.12	0.17	0.12	1.2
	[7-3] オキシクロルデン	0.024	0.045	0.13	0.16	0.23	0.1	0.04	0.04	0.03
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.030	0.026	0.072	0.08	0.15	0.03	0.03	0.04	0.11
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.30	0.35	0.48	0.13	0.10	0.09	0.09	0.07	0.8
[8]	ヘプタクロル類									
	[8-1]ヘプタクロル	0.12	0.25	0.23	0.16	0.11	0.03	0.06	0.04	0.11
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.015	0.052	0.12	0.11	0.03	0.022	0.03	0.02
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.099	0.6	0.16	0.3	0.14	0.16	0.14	0.16
[9]	トキサフェン類（参考）									
	[9-1] Parlar-26（参考）	---	0.20	0.2	0.3	1.8	0.6	0.22	0.23	---
	[9-2] Parlar-50（参考）	---	0.81	1.2	0.6	1.6	0.3	0.25	0.3	---
	[9-3] Parlar-62（参考）	---	1.6	2.4	1.2	8	1.3	1.6	1.6	---
[10]	マイレックス（参考）	---	0.0084	0.05	0.10	0.13	0.03	0.03	0.015	---
[11]	HCH 類									
	[11-1] α -HCH	---	0.71	0.33	0.07	0.08	0.08	0.10	0.12	1.4
	[11-2] β -HCH	---	0.19	0.12	0.12	0.17	0.06	0.04	0.09	0.27
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	---	0.57	0.23	0.13	0.08	0.05	0.07	0.06	0.35
	[11-4] δ -HCH	---	0.03	0.15	0.13	0.14	0.05	0.04	0.04	0.05
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.04
[13]	ヘキサブロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）									
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.11	0.12
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.16	0.12
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.22	0.16
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.3
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.15
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.8	3.7
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	16	27
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4
[16]	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	12	---	6.4	1.2
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン類									
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	1.5
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> -フェニレンジアミン	---	---	---	---	---	---	---	---	1.4
[19]	トリブチルスズ化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[20]	トリフェニルスズ化合物	---	---	---	---	---	---	---	---	---

（注 1）平成 14 年度の定量下限値はIDLの3倍、その他の定量下限値はMDLの約3倍である。

（注 2）「---」は比較対象なしを意味する。

表8 平成13年度以前の継続的調査と平成14年度以降のモニタリング調査の継続調査地点における検出頻度の比較

物質 調査 番号	調査対象物質	水質									
		H10	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	10/10	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15
[2]	HCB	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	12/15
[4]	ディルドリン（参考）	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
[7]	クロルデン類										
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	14/15
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15
	[7-3] オキシクロルデン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15
	[11-2] β -HCH	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15

物質 調査 番号	調査対象物質	底質									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	24/24	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	15/17
[2]	HCB	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
[4]	ディルドリン（参考）	1/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	17/17	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	2/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	7/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	5/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
[7]	クロルデン類										
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	5/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[7-3] オキシクロルデン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	4/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	1/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17
	[11-2] β -HCH	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17

物質 調査 番号	調査対象物質	生物									
		H12	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	3/3	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
[2]	HCB	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
[4]	ディルドリン（参考）	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	---
[6]	DDT 類										
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	15/16
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	12/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	6/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	14/16
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	1/17	16/16	16/16	15/16	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	15/16
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	2/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	16/16
	クロルデン類										
[7]	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	7/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	5/17	16/16	16/16	15/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[7-3] オキシクロルデン	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	9/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	1/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16
	[11-2] β -HCH	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16

物質 調査 番号	調査対象物質	大気									
		H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22
[1]	PCB 類	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	8/8	9/9	10/10	10/10

（注１）「---」は平成13年度以前からの継続調査地点なし又は調査対象外であることを意味する。

（注２）水質については、平成11年度から平成13年度に継続的調査が行われなかったため、平成10年度の値と比較することとした。

（注３）生物については、平成13年度に継続調査地点の一つが調査されていないため、平成12年度調査の値と比較することとした。

（注４）大気については、平成13年度以前はPCB類のみの測定となっている。

（注５）継続調査地点における検出頻度の比較ができない調査対象物質については記載しなかった。

（注６）継続地点とは、表5-1から表5-4に示した地点のうち調査実施状況の欄を■で強調した地点を意味する。

(4) まとめ

(1)～(3)の検討結果より、調査結果の評価を行うに当たっては以下の点を考慮する必要がある。

・PCB類

平成13年度以前に実施してきたPCB類の継続的調査としては、水質、底質及び大気については「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」、生物（貝類、魚類及び鳥類）については「生物モニタリング」が該当する。これらの調査におけるPCB類の調査実績は、水質及び大気は平成12年度及び平成13年度の2年間、底質は平成8年度、平成9年度、平成12年度及び平成13年度の4年間、生物は昭和53年度から平成13年度までの24年間である。したがって、生物については経年推移を評価するのに十分な期間にわたっての調査が実施されているといえる。

PCB類の調査地点については、水質及び底質の平成14年度以降の調査地点は平成13年度以前の調査地点を一部引き継いでいるものの、少なくない地点が入れ替わっている。このため、これらの媒体では平成14年度以降と平成13年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。生物では平成13年度以前の調査地点・生物種の多くが平成14年度以降にも引き継がれたが、平成14年度に2地点・生物種（釧路沖のオオサガ及び祝言島地先のスズキ）減り、平成15年度に1地点・生物種（三浦半島のムラサキイガイ）減ったものの、平成17年度に1地点・生物種（釧路沖のシロサケ）の調査が、平成20年度にも1地点・生物種（大分川のスズキ）の調査がそれぞれ再開された。経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。大気の平成14年度以降の調査地点は、水質及び底質と同様、平成13年度以前の調査地点を一部引き継いでいるものの、少なくない地点が入れ替わっている。このため、これらの媒体では平成14年度以降と平成13年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。また、大気では平成19年度の温暖期及び寒冷期並びに平成20年度の温暖期にそれぞれ3分の1程度の地点で欠測となっており、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。

PCB類の検出下限値については、水質、底質、生物（「生物モニタリング」に係るものを除く。）及び大気ともに平成13年度以前の値は、平成14年度以降の値とほぼ同等であるため経年的な評価に当たり支障はない。一方、「生物モニタリング」に係る検出下限値は、平成14年度以降の検出下限値に比べて到底及びレベルではなく、検出頻度や幾何平均値（検出下限値未満の値は検出下限値の1/2として計算）により残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。また、検出下限値未満の検体が多いことから、中央値、70%値、80%値等で推移を見ることも困難である。

・PCB類以外のPOPs

平成13年度以前に実施してきた継続的調査としては、水質及び底質については、「水質・底質モニタリング」（平成11年度～平成13年度は「底質モニタリング」）、生物（貝類、魚類及び鳥類）については「生物モニタリング」が該当する。大気について継続的調査は実施していなかった。また、ヘブタクロル類については、全媒体において平成13年度以前に継続的調査を実施していない。なお、平成14年度以降においても、大気のHCH類は平成14年度の調査では対象外であった。

PCB類以外のPOPs及びHCH類における平成13年度以前の調査実績として、水質及び底質ではHCB、ディルドリン、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、*cis*-ノナクロル、*trans*-ノナクロル、 α -HCH及び β -HCHについて昭和61年度から平成10年度までの13年間（底質は昭和61年度から平成

13年度までの16年間）モニタリングを実施した。オキシクロルデンについては昭和61年度及び昭和62年度の2年間のみ実施し、その他の物質（アルドリン、エンドリン、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE、*o,p'*-DDD、ヘプタクロル類、トキサフェン類、マイレックス、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCH）については水質及び底質の継続的調査は実施していなかった。生物は、アルドリン、エンドリン、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHについては昭和53年度から開始されるものの平成13年度よりも前に中断され、その他の物質（ヘプタクロル類、トキサフェン類及びマイレックスを除く。）については昭和50年代から平成13年度まで継続的調査を実施した（調査開始年度は物質により異なる。また平成9年度及び平成11年度には調査を実施していない物質がある。詳細は表4を参照のこと。）。

以上より、継続的調査を実施していない物質（ヘプタクロル等）及び媒体（大気等）については平成13年度以前からの経年的な残留状況の傾向を判断できないほか、オキシクロルデンの水質及び底質、アルドリン、エンドリン、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHの生物については、過去の調査実施から間隔が開いたため平成13年度以前からの経年的な残留状況の傾向を評価する場合には考慮を要する。

PCB類以外のPOPs及びHCH類の調査地点については、水質及び底質の平成14年度以降の調査地点は平成13年度以前にはなかったものが大幅に追加されている。このため、これらの媒体では平成14年度以降と平成13年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。生物ではPCB類と同様、平成13年度以前の調査地点・生物種の多くが平成14年度以降に引き継がれたが平成14年度以降、いくつかの調査地点・生物種に変更があり、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。大気ではPCB類と同様、HCBが平成19年度の温暖期及び寒冷期並びに平成20年度の温暖期にそれぞれ3分の1程度の地点で欠測となっており、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。

PCB類以外のPOPs及びHCH類の検出下限値については、平成14年度以降の値は平成13年度以前の値と比較して、水質では一万分の一程度に、底質及び生物では一千分の一程度に下がっている。これに伴い検出数が増え、検出頻度や幾何平均値（検出下限値未満の値は検出下限値の1/2として計算）により残留状況の傾向を評価する場合には考慮を要する。生物についても、平成13年度以前は検出下限値未満の検体が多く、中央値、70%値、80%値等での推移を見ることも困難である。

モニタリング調査は長期にわたり実施されてきており、その間に調査地点、分析法、生物種等の変更が行われている。そのため、調査開始当初と最近の調査結果をそのまま比較可能な値として扱うことは困難であるが、共通の調査地点及び分析法が同一である期間ごとにみれば継続性をもって評価を行うことができると考えられる。

特に水質のHCB、ディルドリン、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル、*trans*-ノナクロル、 α -HCH、 β -HCHについては、平成13年度以前に調査実績はあるものの、検出下限値が高い（10,000pg/L）ため検出頻度が低いことに留意が必要である。このため、平成13年度以前のこれらの物質に係る水質の調査結果については、経年変化図は省略することとした。

5．調査結果の概要

モニタリング調査の検出状況一覧を表9-1から表9-6に、検出下限値一覧を表10-1及び表10-3に、幾何平均値の経年変化については図7として物質ごとに示した。

また、平成22年度の調査も平成14年度（物質・媒体により15年度）から継続的に調査を実施している地点と概ね同一地点で実施しており、これまでに9年間又は8年間の調査結果の蓄積があることから、9年間又は8年間を通じた経年的な傾向について統計的な分析を行った。なお、鳥類に関しては、平成22年度の調査からPOPs条約対象物質が増加したことへ対応するため検体数がウミネコとムクドリそれぞれ5検体であったものからそれぞれ1検体のみとなり、データ数が少ない中での変更が分析結果に影響を及ぼす恐れがあることから、本年度は統計的な分析の対象外とした。経年分析の結果を表11に示した。

○調査結果についての留意事項は以下のとおりである。

・水質

兵庫県においては50L及び250Lの大量採水方式による試料採取が実施されたが、本誌においては250L採水の結果のみ採用した。

・大気

各地点ともに、第1回目を温暖期（平成22年8月30日～平成22年10月27日）調査として、第2回目を寒冷期（平成22年11月7日～平成23年1月7日）調査として実施した。

香川県では、「香川県高松合同庁舎」の対照地点として「香川県立総合水泳プール（高松市）」において試料採取が実施された。

○経年分析の方法は以下の通りである。

平成14年度から（大気の全物質（群）及びその他媒体の一部物質（群）については平成15年度から）の調査結果に、経年的な傾向が統計学的な有意差をもっているかどうかについて、図6に示す手順の分析及びその分析結果に基づく評価を、以下に示す方法により行った。なお、過年度における評価方法において、正規性が棄却された結果についてはノンパラメトリック分析を用いていたが、定量性が得られないために経年変化の判断には不十分であるとの課題があった。そのため、正規性が棄却される結果に対しても適用可能な評価方法として最尤法を用いた回帰直線による経年変化の分析及びブートストラップ法を用いた平均値の差の検定を採用した。

継続的に調査を行っている地点の調査結果において、いずれの年度の調査結果のうち検出下限値未満（nd）が検体の1/3以上存在する調査結果では、濃度の最多頻度が検出下限値未満（nd）となることから回帰直線による経年変化の分析を行うことは適切ではないと判断されたため、検出下限値未満（nd）が検体の1/3未満である調査結果について、経年分析を行うこととした。

経年分析は、年度と濃度の対数との回帰直線（対数線形回帰モデル）を作成し、その回帰直線の傾きから増減傾向を判断することとした。回帰直線を作成する際には、各測定結果が持つ母集団の分布に従って各測定値の確率密度の積を最大とする方法（最尤法）を利用して直線を選択した。また、地点毎の検体数が異なる場合には、地点毎のデータの重みが等価となるよう重み付けを行った。さらに、


1 次式である回帰直線モデルと測定値との適合を評価するため“傾きのあるモデル(対数線形回帰モデル)”と“傾きのないモデル(平均値からのずれモデル)”についてAIC(赤池情報量規準)を求め、事後確率(95%以上)によりモデルへの適合を判断した。

において適合と判断したものについて、で得られた回帰直線の傾きが負である(又は正である)場合に、「減少傾向(又は増加傾向)」が統計的に有意と判定された。」と評価し、表11においては「↓」(又は「↑」)と表記した。

検出下限値未満(nd)が検体の1/3以上存在する調査結果においては、で述べたとおり最尤法による回帰直線での経年変化の分析を行うことは適切ではないとされたため、ブートストラップ法を用いた平均値の差の検定を適用した。ブートストラップ法とは、2つの標本に対し、それぞれ複数のデータを無作為に抽出した際の平均値を求め、それを繰り返すことにより得られる平均値の分布が、標本間で差があるかを検定する方法である。検定は調査を実施した平成14年度から平成22年度までにおける前期3ヵ年(平成14年度から平成16年度)と後期3ヵ年(平成20年度から平成22年度)を対象とし、対象の各年度で検出下限値(nd)が1/2以上存在していない調査結果において、濃度に有意に差が生じているか検定を行うこととした。

ブートストラップ法を用いた平均値の差の検定を行い、危険率が5%未満のものについて差があると判断し、かつ、その差が後期の濃度群より前期の濃度群が低値である(又は高値である)ことにより生じている場合には、「調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べて低値である(又は高値である)」ことが示唆された。」と評価し、表11においては「⌊」(又は「⌋」)と表記した。

なお、の判断において減少傾向(又は増加傾向)が統計的に有意と判定されない場合若しくはの判断において差があると判断されない場合には、表11において「-」と表記した。また、で検出下限値(nd)が検体の1/2以上存在する場合においては、本分析法により経年分析を行うことが妥当ではないと判断し、表11において「X」と表記した。



(注) 図中の ~ の番号は、前述した経年分析の方法の項目番号と対応する。

図6 経年分析の手順及び分析結果に対する評価

表 9-1 平成 22 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（その 1）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質（pg/L）		底質（pg/g-dry）	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[1]	PCB 類	nd ~ 2,200 (41/49)	120	nd ~ 710,000 (56/64)	6,500
[2]	HCB	nd ~ 120 (39/49)	tr(10)	4 ~ 21,000 (64/64)	130
[3]	アルドリノ（参考）				
[4]	ディルドリン（参考）				
[5]	エンドリン（参考）				
[6]	DDT 類	8.0 ~ 11,000 (49/49)	46	42 ~ 330,000 (64/64)	1,900
	[6-1] <i>pp'</i> -DDT	tr(1.0) ~ 7,500 (49/49)	8.5	9.3 ~ 220,000 (64/64)	230
	[6-2] <i>pp'</i> -DDE	2.4 ~ 1,600 (49/49)	14	11 ~ 40,000 (64/64)	680
	[6-3] <i>pp'</i> -DDD	1.6 ~ 970 (49/49)	12	4.4 ~ 78,000 (64/64)	510
	[6-4] <i>op'</i> -DDT	nd ~ 700 (43/49)	1.5	1.4 ~ 13,000 (64/64)	40
	[6-5] <i>op'</i> -DDE	tr(0.13) ~ 180 (49/49)	0.97	tr(0.7) ~ 25,000 (64/64)	37
	[6-6] <i>op'</i> -DDD	tr(0.5) ~ 170 (49/49)	4.6	tr(0.8) ~ 6,900 (64/64)	130
[7]	クロルデン類	nd ~ 540 (44/49)	52	tr(14) ~ 25,000 (64/64)	320
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	nd ~ 170 (47/49)	19	tr(4) ~ 7,200 (64/64)	82
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	nd ~ 310 (44/49)	15	tr(4) ~ 8,000 (64/64)	95
	[7-3] オキシクロルデン	nd ~ 45 (47/49)	1.5	nd ~ 60 (56/64)	1.7
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	tr(0.9) ~ 40 (49/49)	5.4	2.3 ~ 3,600 (64/64)	53
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	nd ~ 93 (45/49)	12	tr(3) ~ 6,200 (64/64)	80
[8]	ヘプタクロル類	nd ~ 760 (44/49)	5.8	nd ~ 340 (45/64)	tr(4.4)
	[8-1] ヘプタクロル	nd ~ 43 (4/49)	nd	nd ~ 35 (51/64)	1.2
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエ ポキシド	0.7 ~ 710 (49/49)	5.9	nd ~ 300 (62/64)	3.1
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシド	nd ~ 8.0 (2/49)	nd	nd ~ 4 (1/64)	nd
[9]	トキサフェン類（参考）				
	[9-1] Parlar-26（参考）				
	[9-2] Parlar-50（参考）				
	[9-3] Parlar-62（参考）				
[10]	マイレックス（参考）				
[11]	HCH 類				
	[11-1] α -HCH	14 ~ 1,400 (49/49)	94	3.1 ~ 3,700 (64/64)	140
	[11-2] β -HCH	33 ~ 2,500 (49/49)	180	11 ~ 8,200 (64/64)	230
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデ ン）	tr(5) ~ 190 (49/49)	26	tr(1.5) ~ 2,300 (64/64)	35
	[11-4] δ -HCH	0.9 ~ 780 (49/49)	16	1.3 ~ 3,800 (64/64)	39

（注 1）「平均値」は幾何平均値を意味する。nd（検出下限値未満）は検出下限値の1/2として算出した。

（注 2）■は調査対象外であることを意味する。

表9-2 平成22年度モニタリング調査 検出状況一覧表（その2）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質（pg/L）		底質（pg/g-dry）	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[12]	クロルデコン	nd ~ 1.6 (13/49)	tr(0.04)	nd ~ 2.8 (9/64)	nd
[13]	ヘキサブロモビフェニル 類	nd (0/49)	nd	nd ~ 18 (10/64)	nd
[14]	ポリブロモジフェニルエ ーテル類（臭素数が4か ら10までのもの）	nd ~ 14,000 (31/49)	tr(270)	nd ~ 730,000 (60/64)	5,800
	[14-1] テトラブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 390 (17/49)	nd	nd ~ 910 (57/64)	35
	[14-2] ペンタブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 130 (25/49)	tr(1)	nd ~ 740 (58/64)	26
	[14-3] ヘキサブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 51 (16/49)	nd	nd ~ 770 (57/64)	23
	[14-4] ヘプタブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 14 (17/49)	nd	nd ~ 930 (58/64)	28
	[14-5] オクタブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 69 (40/49)	tr(2)	nd ~ 1,800 (60/64)	71
	[14-6] ノナブロモジフェ ニルエーテル類	nd ~ 620 (39/49)	tr(17)	nd ~ 26,000 (60/64)	360
	[14-7] デカブロモジフェ ニルエーテル	nd ~ 13,000 (31/49)	tr(250)	nd ~ 700,000 (60/64)	5,100
[15]	ペルフルオロオクタンス ルホン酸（PFOS）	tr(37) ~ 230,000 (49/49)	490	tr(3) ~ 1,700 (64/64)	82
[16]	ペルフルオロオクタン酸 （PFOA）	190 ~ 23,000 (49/49)	2,700	nd ~ 180 (62/64)	28
[17]	ペンタクロロベンゼン	tr(1) ~ 100 (49/49)	8	1.0 ~ 4,200 (64/64)	90
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェ ニレンジアミン類				
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> - フェニレンジアミン				
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フ ェニレンジアミン				
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> - フェニレンジアミン				
[19]	トリブチルスズ化合物	nd ~ 1,600 (12/49)	nd	nd ~ 1,300,000 (53/64)	2,500
[20]	トリフェニルスズ化合物	nd ~ 250 (4/49)	nd	nd ~ 210,000 (42/64)	290

（注1）「平均値」は幾何平均値を意味する。nd（検出下限値未満）は検出下限値の1/2として算出した。

（注2）範囲は検体ベース、検出頻度は地点ベースで示したため、全地点において検出されても範囲がnd～となる場合がある。

（注3）■は調査対象外であることを意味する。

表 9-3 平成 22 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（その 3）

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)						大気 (pg/m ³)			
		貝類		魚類		鳥類		第 1 回(温暖期)		第 2 回(寒冷期)	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[1]	PCB 類	1,500 ~ 46,000 (6/6)	9,200	880 ~ 260,000 (18/18)	13,000	6,600 ~ 9,100 (2/2)	7,700	36 ~ 970 (35/35)	160	19 ~ 630 (35/35)	84
[2]	HCB	tr(4) ~ 210 (6/6)	34	36 ~ 1,700 (18/18)	240	500 ~ 1,900 (2/2)	970	73 ~ 160 (37/37)	120	56 ~ 380 (37/37)	100
[3]	アルドリノ (参考)										
[4]	ディルドリン (参考)										
[5]	エンドリン (参考)										
[6]	DDT 類	460 ~ 7,400 (6/6)	1,800	360 ~ 19,000 (18/18)	3,600	6,400 ~ 160,000 (2/2)	32,000	1.0 ~ 290 (37/37)	12	1.4 ~ 41 (37/37)	4.9
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	43 ~ 470 (6/6)	180	7 ~ 2,100 (18/18)	240	nd ~ 15 (1/2)	3	0.28 ~ 56 (37/37)	3.5	0.30 ~ 16 (37/37)	1.3
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	230 ~ 6,300 (6/6)	1,100	260 ~ 13,000 (18/18)	2,300	6,300 ~ 160,000 (2/2)	32,000	tr(0.41) ~ 200 (37/37)	4.9	tr(0.47) ~ 28 (37/37)	2.2
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	11 ~ 960 (6/6)	180	57 ~ 2,900 (18/18)	560	120 ~ 1,600 (2/2)	440	0.04 ~ 1.7 (37/37)	0.20	0.02 ~ 0.41 (37/37)	0.10
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	15 ~ 160 (6/6)	51	5 ~ 550 (18/18)	58	nd (0/2)	nd	0.19 ~ 26 (37/37)	2.2	0.22 ~ 5.5 (37/37)	0.81
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	7.8 ~ 160 (6/6)	46	tr(1.2) ~ 2,800 (18/18)	47	nd ~ 3.7 (1/2)	tr(1.1)	0.09 ~ 9.0 (37/37)	0.49	0.08 ~ 2.3 (37/37)	0.27
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	5.8 ~ 400 (6/6)	57	2.6 ~ 700 (18/18)	75	3.6 ~ 11 (2/2)	6.3	0.04 ~ 1.8 (37/37)	0.21	tr(0.02) ~ 0.48 (37/37)	0.10
[7]	クロルデン類	230 ~ 31,000 (6/6)	3,900	230 ~ 11,000 (18/18)	1,900	860 ~ 1,600 (2/2)	1,200	6.6 ~ 2,100 (37/37)	210	tr(2.9) ~ 380 (37/37)	63
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	67 ~ 15,000 (6/6)	1,600	51 ~ 3,400 (18/18)	450	4 ~ 180 (2/2)	27	2.2 ~ 700 (37/37)	68	tr(0.8) ~ 130 (37/37)	20
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	31 ~ 5,500 (6/6)	520	9 ~ 1,100 (18/18)	120	tr(2) ~ 10 (2/2)	4	2.0 ~ 820 (37/37)	79	tr(1.0) ~ 150 (37/37)	24
	[7-3] オキシクロルデン	11 ~ 3,300 (6/6)	240	33 ~ 1,000 (18/18)	120	320 ~ 510 (2/2)	400	0.44 ~ 6.2 (37/37)	1.5	0.26 ~ 2.3 (37/37)	0.56
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	35 ~ 1,300 (6/6)	280	23 ~ 2,200 (18/18)	320	57 ~ 190 (2/2)	100	0.23 ~ 68 (37/37)	7.5	tr(0.06) ~ 13 (37/37)	1.8
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	84 ~ 6,000 (6/6)	790	110 ~ 4,700 (18/18)	800	290 ~ 880 (2/2)	510	1.7 ~ 520 (37/37)	52	tr(0.7) ~ 89 (37/37)	15
[8]	ヘブタクロル類	10 ~ 1,900 (6/6)	180	tr(6.0) ~ 230 (18/18)	41	240 ~ 360 (2/2)	290	1.4 ~ 170 (37/37)	21	0.73 ~ 53 (37/37)	8.7
	[8-1] ヘブタクロル	nd ~ 78 (5/6)	3	nd ~ 5 (12/18)	tr(2)	nd ~ tr(1) (1/2)	nd	0.69 ~ 160 (37/37)	17	0.22 ~ 53 (37/37)	7.2
	[8-2] <i>cis</i> -ヘブタクロルエ ポキシド	9.0 ~ 1,800 (6/6)	170	5.0 ~ 230 (18/18)	39	240 ~ 360 (2/2)	290	0.38 ~ 10 (37/37)	2.3	0.33 ~ 4.3 (37/37)	0.93
	[8-3] <i>trans</i> -ヘブタクロル エポキシド	nd ~ 24 (3/6)	3	nd (0/18)	nd	nd (0/2)	nd	nd ~ 0.16 (6/37)	nd	nd (0/37)	nd
[9]	トキサフェン類 (参考)										
	[9-1] Parlar-26 (参考)										
	[9-2] Parlar-50 (参考)										
	[9-3] Parlar-62 (参考)										
[10]	マイレックス (参考)										
[11]	HCH 類										
	[11-1] α -HCH	13 ~ 730 (6/6)	35	tr(1) ~ 250 (18/18)	27	160 ~ 430 (2/2)	260	14 ~ 280 (37/37)	46	6.8 ~ 410 (37/37)	19
	[11-2] β -HCH	27 ~ 1,500 (6/6)	89	5 ~ 760 (18/18)	81	910 ~ 2,800 (2/2)	1,600	0.89 ~ 34 (37/37)	5.6	tr(0.26) ~ 29 (37/37)	1.7
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデ ン)	5 ~ 150 (6/6)	14	tr(1) ~ 56 (18/18)	9	4 ~ 23 (2/2)	10	2.3 ~ 66 (37/37)	14	1.1 ~ 60 (37/37)	4.8
	[11-4] δ -HCH	nd ~ 870 (5/6)	4	nd ~ 36 (13/18)	tr(2)	11 ~ 13 (2/2)	12	0.11 ~ 25 (37/37)	1.4	0.05 ~ 22 (37/37)	0.38

(注 1) 「平均値」は幾何平均値を意味する。nd (検出下限値未満) は検出下限値の 1/2 として算出した。

(注 2) ■ は調査対象外であることを意味する。

表9-4 平成22年度モニタリング調査 検出状況一覧表(その4)

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)						大気 (pg/m ³)			
		貝類		魚類		鳥類		第1回(温暖期)		第2回(寒冷期)	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[12]	クロルデコン	nd (0/6)	nd	nd (0/18)	nd	nd (0/2)	nd	nd (0/37)	nd	nd (0/37)	nd
[13]	ヘキサブロモビフェニル 類	nd (0/6)	nd	nd (0/18)	nd	nd (0/2)	nd	nd (0/37)	nd	nd (0/37)	nd
[14]	ポリブロモジフェニルエー テル類 (臭素数が4か ら10までのもの)	nd ~ 610 (3/6)	tr(160)	nd ~ 1,200 (12/18)	tr(300)	460 ~ 660 (2/2)	550	nd ~ 330 (16/37)	nd	nd ~ 120 (22/37)	tr(14)
	[14-1] テトラブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 310 (5/6)	59	tr(16) ~ 740 (18/18)	160	72 ~ 270 (2/2)	140	0.15 ~ 50 (37/37)	0.79	tr(0.09) ~ 25 (37/37)	0.40
	[14-2] ペンタブロモジフ ェニルエーテル類	tr(9) ~ 98 (6/6)	32	nd ~ 200 (16/18)	51	120 ~ 200 (2/2)	150	nd ~ 45 (35/37)	0.20	nd ~ 28 (34/37)	0.20
	[14-3] ヘキサブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ 26 (4/6)	8	nd ~ 400 (16/18)	39	86 ~ 140 (2/2)	110	nd ~ 4.9 (29/37)	tr(0.14)	nd ~ 5.4 (31/37)	0.24
	[14-4] ヘプタブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ tr(10) (1/6)	nd	nd ~ 40 (4/18)	nd	nd ~ 70 (1/2)	tr(19)	nd ~ 1.4 (24/37)	tr(0.2)	nd ~ 11 (28/37)	0.3
	[14-5] オクタブロモジフ ェニルエーテル類	nd ~ tr(10) (2/6)	nd	nd ~ 100 (8/18)	tr(6)	26 ~ 65 (2/2)	41	nd ~ 2.3 (30/37)	0.25	nd ~ 6.9 (32/37)	0.40
	[14-6] ノナブロモジフェ ニルエーテル類	nd ~ 60 (5/6)	tr(16)	nd ~ 40 (3/18)	nd	tr(20) ~ 50 (2/2)	32	nd ~ 24 (12/37)	nd	nd ~ 7.1 (22/37)	tr(1.2)
	[14-7] デカブロモジフェ ニルエーテル	nd ~ tr(190) (2/6)	nd	nd ~ tr(150) (2/18)	nd	nd (0/2)	nd	nd ~ 290 (10/37)	nd	nd ~ 88 (21/37)	tr(11)
[15]	ペルフルオロオクタンス ルホン酸 (PFOS)	nd ~ 680 (5/6)	72	nd ~ 15,000 (17/18)	390	580 ~ 3,000 (2/2)	1,300	1.6 ~ 14 (37/37)	5.2	1.4 ~ 15 (37/37)	4.7
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	nd ~ 76 (5/6)	28	nd ~ 95 (13/18)	tr(13)	30 ~ 48 (2/2)	38	4.0 ~ 210 (37/37)	25	2.4 ~ 130 (37/37)	14
[17]	ペンタクロロベンゼン	5.9 ~ 110 (6/6)	18	5.6 ~ 230 (18/18)	42	49 ~ 170 (2/2)	91	36 ~ 140 (37/37)	68	37 ~ 180 (37/37)	70
[18]	N,N'-ジフェニル-p-フェ ニレンジアミン類							nd (0/114)	nd		
	[18-1] N,N'-ジフェニル-p- フェニレンジアミン							nd (0/114)	nd		
	[18-2] N,N'-ジトリル-p-フ ェニレンジアミン							nd (0/114)	nd		
	[18-3] N,N'-ジキシリル-p- フェニレンジアミン							nd (0/114)	nd		
[19]	トリブチルスズ化合物	1,600 ~ 30,000 (6/6)	6,400	nd ~ 23,000 (17/18)	1,100	nd (0/2)	nd				
[20]	トリフェニルスズ化合物	490 ~ 6,500 (6/6)	1,700	tr(140) ~ 14,000 (18/18)	2,300	nd ~ tr(120) (1/2)	nd				

(注1) 「平均値」は幾何平均値を意味する。nd (検出下限値未満) は検出下限値の1/2として算出した。

(注2) 範囲は検体ベース、検出頻度は地点ベースで示したため、全地点において検出されても範囲が nd ~ となる場合がある。

(注3) ■は調査対象外であることを意味する。

表10-1 平成22年度モニタリング調査 定量[検出]下限値一覧表(その1)

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)	底質 (pg/g-dry)	生物 (pg/g-wet)	大気 (pg/m ³)
[1]	PCB 類	73 [24]	660 [220]	52 [20]	7.3 [2.5]
[2]	HCB	13 [4]	3 [1]	5 [2]	1.8 [0.7]
[3]	アルドリン (参考)				
[4]	ディルドリン (参考)				
[5]	エンドリン (参考)				
[6]	DDT 類	7.2 [2.5]	12 [4.7]	12 [4.3]	0.95 [0.32]
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	2.4 [0.8]	2.8 [0.9]	3 [1]	0.10 [0.03]
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	2.3 [0.8]	5 [2]	3 [1]	0.62 [0.21]
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.20 [0.08]	1.4 [0.5]	1.3 [0.5]	0.02 [0.01]
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1.5 [0.5]	1.1 [0.4]	3 [1]	0.14 [0.05]
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.24 [0.09]	1.2 [0.5]	1.5 [0.6]	0.04 [0.01]
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.6 [0.2]	0.9 [0.4]	0.6 [0.2]	0.03 [0.01]
[7]	クロルデン類	34 [12]	25 [8.7]	22 [9]	3.0 [1.0]
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	11 [4]	6 [2]	4 [2]	0.9 [0.3]
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	13 [4]	11 [4]	3 [1]	1.2 [0.4]
	[7-3] オキシクロルデン	0.7 [0.3]	1.0 [0.4]	8 [3]	0.03 [0.01]
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.3 [0.4]	0.9 [0.3]	3 [1]	0.11 [0.04]
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	8 [3]	6 [2]	4 [2]	0.8 [0.3]
[8]	ヘプタクロル類	3.9 [1.4]	4.9 [1.7]	8.4 [2.9]	0.29 [0.11]
	[8-1] ヘプタクロル	2.2 [0.7]	1.1 [0.4]	3 [1]	0.11 [0.04]
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエ ポキシド	0.4 [0.2]	0.8 [0.3]	2.4 [0.9]	0.02 [0.01]
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシド	1.3 [0.5]	3 [1]	3 [1]	0.16 [0.06]
	トキサフェン類 (参考)				
[9]	[9-1] Parlar-26 (参考)				
	[9-2] Parlar-50 (参考)				
	[9-3] Parlar-62 (参考)				
[10]	マイレックス (参考)				
[11]	HCH 類				
	[11-1] α -HCH	4 [1]	2.0 [0.8]	3 [1]	1.4 [0.47]
	[11-2] β -HCH	2.0 [0.7]	2.4 [0.8]	3 [1]	0.27 [0.09]
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデ ン)	6 [2]	2.0 [0.7]	3 [1]	0.35 [0.12]
	[11-4] δ -HCH	0.8 [0.3]	1.2 [0.5]	3 [1]	0.05 [0.02]

(注1) 上段は定量下限値、下段は検出下限値。

(注2) は同族体又は該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注3) 生物の定量下限値及び検出下限値は、貝類、魚類及び鳥類で共通であった。

(注4) 姫路沖では水質の定量下限値及び検出下限値が表中の値と異なる。

(注5) ■は調査対象外であることを意味する。

表10-2 平成22年度モニタリング調査 定量[検出]下限値一覧表(その2)

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)	底質 (pg/g-dry)	生物 (pg/g-wet)	大気 (pg/m ³)
[12]	クロルデコン	0.09 [0.04]	0.4 [0.2]	5.9 [2.3]	0.04 [0.02]
[13]	ヘキサブプロモビフェニル 類	3 [1]	1.5 [0.6]	24 [10]	0.3 [0.1]
[14]	ポリブプロモジフェニルエ ーテル類(臭素数が4か ら10までのもの)	340 [110]	270 [100]	400 [150]	32 [11]
	[14-1] テトラブプロモジフ ェニルエーテル類	9 [3]	6 [2]	43 [16]	0.12 [0.05]
	[14-2] ペンタブプロモジフ ェニルエーテル類	3 [1]	5 [2]	14 [6]	0.12 [0.05]
	[14-3] ヘキサブプロモジフ ェニルエーテル類	4 [2]	4 [2]	8 [3]	0.16 [0.06]
	[14-4] ヘプタブプロモジフ ェニルエーテル類	3 [1]	4 [2]	30 [10]	0.3 [0.1]
	[14-5] オクタブプロモジフ ェニルエーテル類	3 [1]	10 [4]	11 [4]	0.15 [0.06]
	[14-6] ノナブプロモジフェ ニルエーテル類	21 [7]	24 [9]	30 [10]	3.7 [1.2]
	[14-7] デカブプロモジフェ ニルエーテル	300 [100]	220 [80]	270 [97]	27 [9.1]
[15]	ペルフルオロオクタンス ルホン酸 (PFOS)	50 [20]	5 [2]	25 [9.6]	0.4 [0.1]
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	60 [20]	12 [5]	26 [9.9]	0.5 [0.2]
[17]	ペンタクロロベンゼン	4 [1]	0.9 [0.3]	1.9 [0.7]	1.2 [0.5]
[18]	<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> -フェ ニレンジアミン類				
	[18-1] <i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> - フェニレンジアミン				1.4 [0.34]
	[18-2] <i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> -フ ェニレンジアミン				1.5 [0.51]
	[18-3] <i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> - フェニレンジアミン				1.4 [0.34]
[19]	トリブチルスズ化合物	200 [100]	160 [80]	420 [160]	
[20]	トリフェニルスズ化合物	120 [50]	70 [30]	270 [110]	

(注1) 上段は定量下限値、下段は検出下限値。

(注2) は同族体又は該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注3) 生物の定量下限値及び検出下限値は、貝類、魚類及び鳥類で共通であった。

(注4) ■は調査対象外であることを意味する。

表 11-1 平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析結果（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質				
			河川域	湖沼域	河口域	海域
[1]	PCB 類	↓	↓	↓	↓	-
[2]	HCB	↓	↓	-	↓	┘
[3]	アルドリン（参考）					
[4]	ディルドリン（参考）					
[5]	エンドリン（参考）					
[6]	DDT 類					
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	-	-	↓	-	-
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	-	↓	-	↓	-
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	-	-	-	-	-
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	↓	↓	↓	↓	┘
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	┘	X	-	-	┘
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	-	-	-	↓	-
[7]	クロルデン類					
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	↓	↓	-	↓	↓
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	↓	-	-	-	↓
	[7-3] オキシクロルデン	X	- *	X	-	X
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	-	-	-	-	-
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	↓	-	-	-	↓
[8]	ヘプタクロル類					
	[8-1] ヘプタクロル	X	X	X	X	X
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	-	-	-	↓	↓
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	X	X	X	X	X
[9]	トキサフェン類（参考）					
	[9-1] Parlar-26（参考）					
	[9-2] Parlar-50（参考）					
	[9-3] Parlar-62（参考）					
[10]	マイレックス（参考）					
[11]	HCH 類					
	[11-1] α -HCH	-	-	-	-	-
	[11-2] β -HCH	-	-	↓	-	-
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	↓	↓	-	↓	↓
	[11-4] δ -HCH	- *	-	-	X	X

（注 1）AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。

（注 2）「↓」は経年的な減少傾向が統計的に有意と判定されたことを、「┘」は調査期間の後半で得られた結果が前半と比べ低値であることが示唆されたことを、「-」は経年的な減少傾向が有意と判定されなかったことをそれぞれ意味する。また、「X」は「不検出値(nd)が 1/2 を超えて存在する年度がある」ために本分析法により経年分析を行うことが妥当ではないと判断されたことを意味する。なお、「*」はブートストラップ法において調査期間前期と後期との差が確認されないことを意味する。

（注 3）河川域、湖沼域、河口域及び海域の分類は表 12 に示すとおりである。

（注 4）■は平成 22 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。

表 11-2 平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析結果（底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	底質				
			河川域	湖沼域	河口域	海域
[1]	PCB 類	-	- *	-	-	-
[2]	HCB	-	-	-	-	-
[3]	アルドリノ（参考）					
[4]	ディルドリン（参考）					
[5]	エンドリン（参考）					
[6]	DDT 類					
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	-	-	-	-	-
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	-	-	-	-	-
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	-	-	-	-	-
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	-	-	-	-	-
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	-	-	-	-	-
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	-	-	-	-	-
[7]	クロルデン類					
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	↘	-	↘	-	↘
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	-	-	-	-	↘
	[7-3] オキシクロルデン	- *	-	X	- *	X
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	-	-	-	-	↘
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	-	-	-	-	↘
[8]	ヘプタクロル類					
	[8-1] ヘプタクロル	X	X	X	┐	X
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	┐	- *	-	↘	X
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	X	X	X	X	X
[9]	トキサフェン類（参考）					
	[9-1] Parlar-26（参考）					
	[9-2] Parlar-50（参考）					
	[9-3] Parlar-62（参考）					
[10]	マイレックス（参考）					
[11]	HCH 類					
	[11-1] α -HCH	-	-	-	-	-
	[11-2] β -HCH	-	-	↘	-	-
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	-	-	↘	-	-
	[11-4] δ -HCH	-	-	-	-	-

（注 1）AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。

（注 2）「↘」は経年的な減少傾向が統計的に有意と判定されたことを、「┐」は調査期間の後半で得られた結果が前半と比べ低値であることが示唆されたことを、「-」は経年的な減少傾向が有意と判定されなかったことをそれぞれ意味する。また、「X」は「不検出値(nd)が 1/2 を超えて存在する年度がある」ために本分析法により経年分析を行うことが妥当ではないと判断されたことを意味する。なお、「*」はブートストラップ法において調査期間前期と後期との差が確認されないことを意味する。

（注 3）河川域、湖沼域、河口域及び海域の分類は表 12 に示すとおりである。

（注 4）■は平成 22 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。

表 11-3 平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析結果（生物）

物質 調査 番号	調査対象物質	貝類	魚類
[1]	PCB 類	↓	-
[2]	HCB	-	-
[3]	アルドリリン（参考）		
[4]	ディルドリン（参考）		
[5]	エンドリン（参考）		
[6]	DDT 類		
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	↓	-
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	-	-
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	↓	↓
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	↓	↓
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	↓	↓
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	↓	-
[7]	クロルデン類		
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	↓	↓
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	-	↓
	[7-3] オキシクロルデン	↓	↓
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	-	-
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	↓	-
[8]	ヘプタクロル類		
	[8-1] ヘプタクロル	X	X
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	-	-
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	X	X
[9]	トキサフェン類（参考）		
	[9-1] Parlar-26（参考）		
	[9-2] Parlar-50（参考）		
	[9-3] Parlar-62（参考）		
[10]	マイレックス（参考）		
[11]	HCH 類		
	[11-1] α -HCH	-	-
	[11-2] β -HCH	-	-
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	↓	↓
	[11-4] δ -HCH	X	- *

（注 1）AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。

（注 2）「↓」は経年的な減少傾向が統計的に有意と判定されたことを、「-」は経年的な減少傾向が有意と判定されなかったことをそれぞれ意味する。また、「X」は「不検出値(nd)が 1/2 を超えて存在する年度がある」ために本分析法により経年分析を行うことが妥当ではないと判断されたことを意味する。なお、「*」はブートストラップ法において調査期間前期と後期との差が確認されないことを意味する。

（注 3）■は平成 22 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。

表 11-4 平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析結果（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気	
		温暖期	寒冷期
[1]	PCB 類	-	-
[2]	HCB	-	-
[3]	アルドリン（参考）		
[4]	ディルドリン（参考）		
[5]	エンドリン（参考）		
[6]	DDT 類		
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	-	-
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	↘	-
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	-	-
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	↘	↘
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	↘	↘
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	↘	-
[7]	クロルデン類		
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	↘	-
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	↘	↘
	[7-3] オキシクロルデン	↘	-
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	↘	-
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	↘	-
[8]	ヘプタクロル類		
	[8-1] ヘプタクロル	-	-
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	-	-
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	X	X
[9]	トキサフェン類（参考）		
	[9-1] Parlar-26（参考）		
	[9-2] Parlar-50（参考）		
	[9-3] Parlar-62（参考）		
[10]	マイレックス（参考）		

（注 1）AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。

（注 2）「↘」は経年的な減少傾向が統計的に有意と判定されたことを、「-」は経年的な減少傾向が有意と判定されなかったことをそれぞれ意味する。また、「X」は「不検出値(nd)が 1/2 を超えて存在する年度がある」ために本分析法により経年分析を行うことが妥当ではないと判断されたことを意味する。

（注 3）■は平成 22 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。

表 12 平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の水域分類

分類	地方公共団体	調査地点	調査の実施	
			水質	底質
河川域	北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）		○
		十勝川すずらん大橋（帯広市）	○	○
		石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○	○
	岩手県	豊沢川（花巻市）	○	○
	仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）		○
	山形県	最上川河口（酒田市）	○	○
	茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○	○
	栃木県	田川（宇都宮市）	○	○
	埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	○	
	新潟県	信濃川下流（新潟市）	○	○
	富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	○	○
	福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	○	○
	山梨県	荒川千秋橋（甲府市）		○
	静岡県	天竜川（磐田市）	○	○
	京都市	桂川宮前橋（京都市）	○	○
	大阪市	大阪港	○	○
		淀川（大阪市）		○
	奈良県	大和川（王寺町）		○
	和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○	○
	高知県	四万十川河口（四万十市）	○	○
	熊本県	緑川（宇土市）	○	
	宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	○	○
	鹿児島県	天降川（霧島市）	○	○
		五反田川五反田橋（いちき串木野市）	○	○
湖沼域	青森県	十三湖	○	○
	秋田県	八郎湖	○	○
	長野県	諏訪湖湖心	○	○
	滋賀県	琵琶湖南比良沖中央		○
		琵琶湖唐崎沖中央	○	○
河口域	北海道	苫小牧港		○
	千葉市	花見川河口（千葉市）	○	○
	東京都	荒川河口（江東区）	○	○
		隅田川河口（港区）	○	○
	川崎市	多摩川河口（川崎市）		○
	石川県	犀川河口（金沢市）	○	○
	愛知県	衣浦港		○
	三重県	鳥羽港		○
	大阪府	大和川河口（堺市）	○	○
	大阪市	淀川河口（大阪市）		○
	徳島県	吉野川河口（徳島市）	○	○
	香川県	高松港	○	○
	北九州市	洞海湾	○	○
	大分県	大分川河口（大分市）		○
	沖縄県	那覇港	○	○
海域	宮城県	仙台湾（松島湾）	○	○
	福島県	小名浜港	○	○
	千葉県	市原・姉崎海岸		○
	横浜市	横浜港	○	○
	川崎市	川崎港京浜運河	○	○
	静岡県	清水港		○
	愛知県	名古屋港	○	○
	三重県	四日市港	○	○
	京都府	宮津港	○	○
	大阪市	大阪港外		○
	兵庫県	姫路沖	○	○
	神戸市	神戸港中央	○	○
	岡山県	水島沖	○	○
	広島県	呉港	○	○
		広島湾	○	○
	山口県	徳山湾	○	○
		宇部沖	○	○
		萩沖	○	○
	愛媛県	新居浜港		○
	福岡市	博多湾		○
	佐賀県	伊万里湾	○	○
	長崎県	大村湾	○	○

（注）調査地点の名称として河口としている地点の一部は、調査地点の状況から河川域及び海域に分類した。

平成 22 年度調査においては、従前の POPs 条約対象物質 10 物質（群）のうちの 5 物質（群）及び HCH 類について平成 14 年度から平成 21 年度までの調査に引き続き高感度の分析が行われ、生物のうち魚類及び鳥類でヘブタクロル類の *trans*-ヘブタクロルエポキシドが不検出であった以外は全て検出された。

また、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ペンタクロロベンゼン、*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類、トリブチルスズ化合物及びトリフェニルスズ化合物についても、高感度の分析が行われ、クロルデコンが生物及び大気で、ヘキサブロモビフェニル類が水質、生物及び大気で、*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類が大気で、トリフェニルスズ化合物が生物のうち鳥類で不検出であった以外は全て検出された。

物質（群）別の調査結果は、次のとおりである。

[1] PCB 類

・調査の経緯及び実施状況

PCB（ポリ塩化ビフェニル）類は、絶縁油等に利用されていた。難分解性で、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性を有するため、昭和 49 年 6 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」¹⁾で昭和 53 年度から平成 13 年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査しており、「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」²⁾で平成 8 年度及び平成 9 年度に底質及び生物（魚類）、平成 12 年度及び平成 13 年度に水質、底質、生物（魚類）及び大気の調査を実施している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 24pg/L において 49 地点中 41 地点で検出され、検出濃度は 2,200pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域、湖沼域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における水質についての PCB 類（総量）の検出状況

PCB 類（総量）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	470	330	11,000	60	7.4 [2.5]	114/114	38/38
	H15	530	450	3,100	230	9.4 [2.5]	36/36	36/36
	H16	630	540	4,400	140	14 [5.0]	38/38	38/38
	H17	520	370	7,800	140	10 [3.2]	47/47	47/47
	H18	240	200	4,300	15	9 [3]	48/48	48/48
	H19	180	140	2,700	12	7.6 [2.9]	48/48	48/48
	H20	260	250	4,300	27	7.8 [3.0]	48/48	48/48
	H21	210	170	3,900	14	10 [4]	48/48	48/48
	H22	120	99	2,200	nd	73 [24]	41/49	41/49

（注 1）：平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）：定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 220pg/g-dry において 64 地点中 56 地点で検出され、検出濃度は 710,000pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 14～22 年度における底質についての PCB 類（総量）の検出状況

PCB 類（総量）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	11,000	11,000	630,000	39	10 [3.5]	189/189	63/63
	H15	9,400	9,500	5,600,000	39	10 [3.2]	186/186	62/62
	H16	8,400	7,600	1,300,000	38	7.9 [2.6]	189/189	63/63
	H17	8,600	7,100	690,000	42	6.3 [2.1]	189/189	63/63
	H18	8,800	6,600	690,000	36	4 [1]	192/192	64/64
	H19	7,400	6,800	820,000	19	4.7 [1.5]	192/192	64/64
	H20	8,700	8,900	630,000	22	3.3 [1.2]	192/192	64/64
	H21	7,600	7,100	1,700,000	17	5.1 [2.1]	192/192	64/64
	H22	6,500	7,800	710,000	nd	660 [220]	56/64	56/64

（注 1）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）：定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

<生物>

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 20pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 1,500～46,000pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 20pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 880～260,000pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 20pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 6,600～9,100pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての PCB 類（総量）の検出状況

PCB 類（総量）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	8,800	28,000	160,000	200	25 [8.4]	38/38	8/8
	H15	11,000	9,600	130,000	1,000	50 [17]	30/30	6/6
	H16	11,000	11,000	150,000	1,500	85 [29]	31/31	7/7
	H17	11,000	13,000	85,000	920	69 [23]	31/31	7/7
	H18	8,500	8,600	77,000	690	42 [14]	31/31	7/7
	H19	9,000	11,000	66,000	980	46 [18]	31/31	7/7
	H20	8,600	8,600	69,000	870	47 [17]	31/31	7/7
	H21	8,700	11,000	62,000	780	32 [11]	31/31	7/7
	H22	9,200	11,000	46,000	1,500	52 [20]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	17,000	8,100	550,000	1,500	25 [8.4]	70/70	14/14
	H15	11,000	9,600	150,000	870	50 [17]	70/70	14/14
	H16	15,000	10,000	540,000	990	85 [29]	70/70	14/14
	H17	14,000	8,600	540,000	800	69 [23]	80/80	16/16
	H18	13,000	9,000	310,000	990	42 [14]	80/80	16/16
	H19	11,000	6,200	530,000	790	46 [18]	80/80	16/16
	H20	12,000	9,100	330,000	1,200	47 [17]	85/85	17/17
	H21	12,000	12,000	290,000	840	32 [11]	90/90	18/18
	H22	13,000	10,000	260,000	880	52 [20]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	12,000	14,000	22,000	4,800	25 [8.4]	10/10	2/2
	H15	19,000	22,000	42,000	6,800	50 [17]	10/10	2/2
	H16	9,000	9,400	13,000	5,900	85 [29]	10/10	2/2
	H17	10,000	9,700	19,000	5,600	69 [23]	10/10	2/2
	H18	12,000	9,800	48,000	5,600	42 [14]	10/10	2/2
	H19	7,600	7,800	15,000	3,900	46 [18]	10/10	2/2
	H20	9,700	7,400	56,000	3,000	47 [17]	10/10	2/2
	H21	5,900	5,700	9,500	3,900	32 [11]	10/10	2/2
	H22	7,700	---	9,100	6,600	52 [20]	2/2	2/2

（注 1）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）：定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 2.5pg/m³において欠測扱いとなった 2 地点を除く 35 地点全てで検出され、検出濃度は 36 ~ 970pg/m³の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 2.5pg/m³において欠測扱いとなった 2 地点を除く 35 地点全てで検出され、検出濃度は 19 ~ 630pg/m³の範囲であった。


○平成14～22年度における大気についてのPCB類（総量）の検出状況

PCB 類（総量）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	100	100	880	16	99 [33]	102/102	34/34
	H15 温暖期	260	340	2,600	36	6.6 [2.2]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	110	120	630	17		34/34	34/34
	H16 温暖期	240	250	3,300	25	2.9 [0.98]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	130	130	1,500	20		37/37	37/37
	H17 温暖期	190	210	1,500	23	0.38 [0.14]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	66	64	380	20		37/37	37/37
	H18 温暖期	170	180	1,500	21	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	82	90	450	19		37/37	37/37
	H19 温暖期	250	290	980	37	0.37 [0.13]	24/24	24/24
	H19 寒冷期	72	76	230	25		22/22	22/22
	H20 温暖期	200	170	960	52	0.8 [0.3]	22/22	22/22
	H20 寒冷期	93	86	1,500	21		36/36	36/36
	H21 温暖期	200	190	1,400	43	0.75 [0.26]	34/34	34/34
	H21 寒冷期	85	78	380	20		34/34	34/34
	H22 温暖期	160	150	970	36	7.3 [2.5]	35/35	35/35
	H22 寒冷期	84	86	630	19		35/35	35/35

（注 1）：定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

（注 2）：平成 14 年度の調査においては、特に低塩素化同族体の測定方法に技術的問題があったため、参考値として扱う。

[1] PCB類




(注1) PCB類の水質については、継続的調査において平成11年度以前に調査が実施されていない。

(注2) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-1-1 PCB類の水質の経年変化 (幾何平均値)


[1] PCB類



(注1) PCB類の底質については、継続的調査において平成7年度以前に調査が実施されていない。

(注2) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-1-2 PCB類の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-1-3 PCB 類の生物の経年変化（幾何平均値）




図 7-1-4 PCB 類の大気の経年変化（幾何平均値）

[2] HCB

・調査の経緯及び実施状況

HCB は、殺虫剤等原料に利用されていた。昭和 54 年 8 月に、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」で昭和 53 年度から平成 8 年度までの毎年度と平成 10 年度、平成 12 年度及び平成 13 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」で水質は昭和 61 年度から平成 10 年度まで、底質は昭和 61 年度から平成 13 年度の全期間にわたって調査を実施している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 4pg/L において 49 地点中 39 地点で検出され、検出濃度は 120pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定され、海域の調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における水質についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	37	28	1,400	9.8	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	H15	29	24	340	11	5 [2]	36/36	36/36
	H16	30	tr(29)	180	tr(11)	30 [8]	38/38	38/38
	H17	21	17	210	tr(6)	15 [5]	47/47	47/47
	H18	16	tr(12)	190	nd	16 [5]	46/48	46/48
	H19	17	14	190	tr(4)	8 [3]	48/48	48/48
	H20	16	13	480	4	3 [1]	48/48	48/48
	H21	15	17	180	2.4	0.5 [0.2]	49/49	49/49
	H22	tr(10)	tr(8)	120	nd	13 [4]	39/49	39/49

（注）：平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 4～21,000pg/g-dry の範囲であった。

○平成 14～22 年度における底質についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	240	200	19,000	7.6	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	H15	160	120	42,000	5	4 [2]	186/186	62/62
	H16	140	100	25,000	tr(6)	7 [3]	189/189	63/63
	H17	170	130	22,000	13	3 [1]	189/189	63/63
	H18	180	120	19,000	10	2.9 [1.0]	192/192	64/64
	H19	140	110	65,000	nd	5 [2]	191/192	64/64
	H20	160	97	29,000	4.4	2.0 [0.8]	192/192	64/64
	H21	150	120	34,000	nd	1.8 [0.7]	190/192	64/64
	H22	130	96	21,000	4	3 [1]	64/64	64/64

（注）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は tr(4) ~ 210pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 36 ~ 1,700pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 500 ~ 1,900pg/g-wet の範囲であった。

○平成 14 ~ 22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	21	22	330	2.4	0.18 [0.06]	38/38	8/8
	H15	44	27	660	tr(21)	23 [7.5]	30/30	6/6
	H16	32	31	80	14	14 [4.6]	31/31	7/7
	H17	51	28	450	19	11 [3.8]	31/31	7/7
	H18	46	28	340	11	3 [1]	31/31	7/7
	H19	37	22	400	11	7 [3]	31/31	7/7
	H20	38	24	240	13	7 [3]	31/31	7/7
	H21	34	32	200	12	4 [2]	31/31	7/7
	H22	34	48	210	tr(4)	5 [2]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	140	180	910	19	0.18 [0.06]	70/70	14/14
	H15	180	170	1,500	28	23 [7.5]	70/70	14/14
	H16	230	210	1,800	26	14 [4.6]	70/70	14/14
	H17	180	160	1,700	29	11 [3.8]	80/80	16/16
	H18	180	220	1,400	25	3 [1]	80/80	16/16
	H19	160	140	1,500	17	7 [3]	80/80	16/16
	H20	170	210	1,500	25	7 [3]	85/85	17/17
	H21	210	180	30,000	29	4 [2]	90/90	18/18
	H22	240	280	1,700	36	5 [2]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	1,000	1,200	1,600	560	0.18 [0.06]	10/10	2/2
	H15	1,800	2,000	4,700	790	23 [7.5]	10/10	2/2
	H16	980	1,300	2,200	410	14 [4.6]	10/10	2/2
	H17	1,000	1,100	2,500	400	11 [3.8]	10/10	2/2
	H18	970	1,100	2,100	490	3 [1]	10/10	2/2
	H19	960	1,100	2,000	420	7 [3]	10/10	2/2
	H20	880	1,100	2,500	240	7 [3]	10/10	2/2
	H21	850	910	1,500	400	4 [2]	10/10	2/2
	H22	970	---	1,900	500	5 [2]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 73 ~ 160pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 56 ~ 380pg/m³ の範囲であった。

○平成14～22年度における大気についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	99	93	3,000	57	0.9 [0.3]	102/102	34/34
	H15 温暖期	150	130	430	81	2.3 [0.78]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	94	90	320	64		34/34	34/34
	H16 温暖期	130	130	430	47	1.1 [0.37]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	98	89	390	51		37/37	37/37
	H17 温暖期	88	90	250	27	0.14 [0.034]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	77	68	180	44		37/37	37/37
	H18 温暖期	83	89	210	23	0.21 [0.07]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	65	74	170	8.2		37/37	37/37
	H19 温暖期	110	100	230	72	0.09 [0.03]	24/24	24/24
	H19 寒冷期	77	72	120	55		22/22	22/22
	H20 温暖期	120	110	260	78	0.22 [0.08]	22/22	22/22
	H20 寒冷期	87	83	160	58		36/36	36/36
	H21 温暖期	110	110	210	78	0.6 [0.2]	34/34	34/34
	H21 寒冷期	87	87	150	59		34/34	34/34
	H22 温暖期	120	120	160	73	1.8 [0.7]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	100	96	380	56		37/37	37/37


[2] HCB



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-2-1 HCB の水質の経年変化 (幾何平均値)

[2] HCB



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-2-2 HCB の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-2-3 HCB の生物の経年変化 (幾何平均値)




図 7-2-4 HCB の大気の大気経年変化 (幾何平均値)

[3] アルドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

アルドリンは、日本では土壌害虫の駆除に使用されていたが、昭和46年以降実質的に使用は中止された。農薬取締法に基づく登録は昭和50年に失効し、昭和56年10月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成13年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」¹⁾で昭和53年度から平成元年度並びに平成3年度及び平成5年度にて生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査している。

平成14年度から平成21年度のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

平成22年度以降のモニタリング調査では調査頻度を隔年とすることとし、平成22年度の調査としては実施していない。

以下に、参考として、平成21年度までの調査結果を示す。

・平成21年度までの調査結果

< 水質 >

○平成14～21年度における水質についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	0.8	0.9	18	nd	0.6 [0.2]	93/114	37/38
	H15	0.9	0.9	3.8	nd	0.6 [0.2]	34/36	34/36
	H16	tr(1.5)	tr(1.8)	13	nd	2 [0.4]	33/38	33/38
	H17	tr(0.6)	tr(0.7)	5.7	nd	0.9 [0.3]	32/47	32/47
	H18	nd	nd	4.4	nd	1.7 [0.6]	18/48	18/48
	H19	tr(0.6)	tr(0.6)	9.5	nd	1.0 [0.3]	34/48	34/48
	H20	tr(0.8)	tr(0.7)	21	nd	1.4 [0.6]	26/48	26/48
	H21	0.7	0.9	22	nd	0.7 [0.3]	32/49	32/49

（注）：平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

○平成14～21年度における底質についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	14	12	570	nd	6 [2]	149/189	56/63
	H15	19	18	1,000	nd	2 [0.6]	178/186	60/62
	H16	10	10	390	nd	2 [0.6]	170/189	62/63
	H17	8.4	7.1	500	nd	1.4 [0.5]	173/189	62/63
	H18	10	9.3	330	nd	1.9 [0.6]	184/192	64/64
	H19	7.5	6.7	330	nd	1.8 [0.6]	172/192	60/64
	H20	6	6	370	nd	3 [1]	153/192	56/64
	H21	8.9	7.8	540	nd	0.5 [0.2]	180/192	64/64

（注）：平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

○ 平成 14～21 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	tr(1.6)	nd	34	nd	4.2 [1.4]	12/38	4/8
	H15	tr(1.7)	tr(0.85)	51	nd	2.5 [0.84]	15/30	3/6
	H16	tr(2.5)	tr(1.6)	46	nd	4.0 [1.3]	16/31	4/7
	H17	tr(1.8)	nd	84	nd	3.5 [1.2]	11/31	3/7
	H18	tr(2)	nd	19	nd	4 [2]	11/31	3/7
	H19	tr(2)	nd	26	nd	5 [2]	5/31	2/7
	H20	tr(2)	nd	20	nd	5 [2]	5/31	3/7
	H21	tr(1.6)	tr(0.8)	89	nd	2.1 [0.8]	16/31	6/7
魚類 (pg/g-wet)	H14	nd	nd	tr(2.0)	nd	4.2 [1.4]	1/70	1/14
	H15	nd	nd	tr(1.9)	nd	2.5 [0.84]	16/70	7/14
	H16	nd	nd	tr(2.4)	nd	4.0 [1.3]	5/70	2/14
	H17	nd	nd	6.4	nd	3.5 [1.2]	11/80	5/16
	H18	nd	nd	tr(2)	nd	4 [2]	2/80	2/16
	H19	nd	nd	tr(2)	nd	5 [2]	2/80	2/16
	H20	nd	nd	tr(2)	nd	5 [2]	1/85	1/17
	H21	nd	nd	3.1	nd	2.1 [0.8]	22/90	7/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	nd	nd	nd	nd	4.2 [1.4]	0/10	0/2
	H15	nd	nd	nd	nd	2.5 [0.84]	0/10	0/2
	H16	nd	nd	nd	nd	4.0 [1.3]	0/10	0/2
	H17	nd	nd	nd	nd	3.5 [1.2]	0/10	0/2
	H18	nd	nd	nd	nd	4 [2]	0/10	0/2
	H19	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	H20	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	H21	nd	nd	nd	nd	2.1 [0.8]	0/10	0/2


（注）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

○ 平成 14～21 年度における大気についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	tr(0.030)	nd	3.2	nd	0.060 [0.020]	41/102	19/34
	H15 温暖期	1.5	1.9	28	nd	0.023 [0.0077]	34/35	34/35
	H15 寒冷期	0.55	0.44	6.9	0.030		34/34	34/34
	H16 温暖期	tr(0.12)	nd	14	nd	0.15 [0.05]	15/37	15/37
	H16 寒冷期	tr(0.08)	nd	13	nd		14/37	14/37
	H17 温暖期	0.33	0.56	10	nd	0.08 [0.03]	29/37	29/37
	H17 寒冷期	tr(0.04)	nd	1.8	nd		9/37	9/37
	H18 温暖期	0.30	0.35	8.5	nd	0.14 [0.05]	31/37	31/37
	H18 寒冷期	tr(0.05)	nd	1.1	nd		16/37	16/37
	H19 温暖期	0.58	0.48	19	nd	0.05 [0.02]	35/36	35/36
	H19 寒冷期	0.14	0.15	2.1	nd		34/36	34/36
	H20 温暖期	0.27	0.30	9.4	tr(0.02)	0.04 [0.02]	25/25	25/25
	H20 寒冷期	0.09	0.08	1.3	nd		22/25	22/25
	H21 温暖期	0.07	nd	10	nd	0.04 [0.02]	10/25	10/25
	H21 寒冷期	tr(0.03)	nd	1.8	nd		8/24	8/24


[3] アルドリン



(注) 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-3-1 アルドリンの水質の経年変化 (幾何平均値)

[3] アルドリン



(注) 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-3-2 アルドリンの底質の経年変化 (幾何平均値)

[3] アルドリン




図 7-3-3 アルドリンの大気の経年変化 (幾何平均値)

[4] ディルドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ディルドリンの農薬としての使用は、昭和 30 年代がピークであったといわれ、昭和 46 年に農薬取締法に基づく土壌残留性農薬に指定され、昭和 50 年には同法に基づく登録が失効した。しかし、ディルドリンはその後シロアリ防除剤として使われていた。昭和 56 年 10 月、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」で昭和 53 年度から平成 8 年度までの毎年度と平成 10 年度、平成 12 年度及び平成 13 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」で水質は昭和 61 年度から平成 10 年度まで、底質は昭和 61 年度から平成 13 年度の全期間にわたって調査を実施している。

平成 14 年度から平成 21 年度のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

平成 22 年度以降のモニタリング調査では調査頻度を隔年とすることとし、平成 22 年度の調査としては実施していない。

以下に、参考として、平成 21 年度までの調査結果を示す。

・平成 21 年度までの調査結果

< 水質 >

○平成 14～21 年度における水質についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	42	41	940	3.3	1.8 [0.6]	114/114	38/38
	H15	57	57	510	9.7	0.7 [0.3]	36/36	36/36
	H16	55	51	430	9	2 [0.5]	38/38	38/38
	H17	39	49	630	4.5	1.0 [0.34]	47/47	47/47
	H18	36	32	800	6	3 [1]	48/48	48/48
	H19	38	36	750	3.1	2.1 [0.7]	48/48	48/48
	H20	36	37	450	3.6	1.5 [0.6]	48/48	48/48
	H21	36	32	650	2.7	0.6 [0.2]	49/49	49/49

（注）：平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

○平成 14～21 年度における底質についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	70	51	2,300	4	3 [1]	189/189	63/63
	H15	66	56	9,100	nd	4 [2]	184/186	62/62
	H16	65	62	3,700	tr(1.9)	3 [0.9]	189/189	63/63
	H17	61	55	4,200	tr(2)	3 [1]	189/189	63/63
	H18	61	54	1,500	tr(1.7)	2.9 [1.0]	192/192	64/64
	H19	49	40	2,700	tr(1.2)	2.7 [0.9]	192/192	64/64
	H20	48	43	2,900	tr(0.7)	1.2 [0.5]	192/192	64/64
	H21	51	47	3,000	1.1	0.8 [0.3]	192/192	64/64

（注）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

○ 平成 14～21 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	440	390	190,000	tr(7)	12 [4]	38/38	8/8
	H15	440	160	78,000	46	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	H16	630	270	69,000	42	31 [10]	31/31	7/7
	H17	500	140	39,000	34	9.4 [3.4]	31/31	7/7
	H18	450	120	47,000	30	7 [3]	31/31	7/7
	H19	380	110	77,000	37	9 [3]	31/31	7/7
	H20	430	150	24,000	47	9 [3]	31/31	7/7
	H21	490	230	28,000	48	7 [2]	31/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H14	290	270	2,400	46	12 [4]	70/70	14/14
	H15	220	200	1,000	29	4.8 [1.6]	70/70	14/14
	H16	250	230	2,800	tr(23)	31 [10]	70/70	14/14
	H17	230	250	1,400	21	9.4 [3.4]	80/80	16/16
	H18	230	220	1,400	19	7 [3]	80/80	16/16
	H19	250	210	1,900	23	9 [3]	80/80	16/16
	H20	240	240	1,300	15	9 [3]	85/85	17/17
	H21	240	190	1,400	29	7 [2]	90/90	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	1,100	1,100	1,700	820	12 [4]	10/10	2/2
	H15	1,300	1,400	2,200	790	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	H16	600	610	960	370	31 [10]	10/10	2/2
	H17	830	740	1,800	500	9.4 [3.4]	10/10	2/2
	H18	700	690	1,300	440	7 [3]	10/10	2/2
	H19	710	710	910	560	9 [3]	10/10	2/2
	H20	680	620	1,300	260	9 [3]	10/10	2/2
	H21	470	420	890	330	7 [2]	10/10	2/2


(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

○ 平成 14～21 年度における大気についてのディルドリンの検出状況


ディルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	5.6	5.4	110	0.73	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	H15 温暖期	19	22	260	2.1	2.1 [0.70]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	5.7	5.2	110	tr(0.82)		34/34	34/34
	H16 温暖期	17	22	280	1.1	0.33 [0.11]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	5.5	6.9	76	0.81		37/37	37/37
	H17 温暖期	14	12	200	1.5	0.54 [0.24]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	3.9	3.6	50	0.88		37/37	37/37
	H18 温暖期	15	14	290	1.5	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	4.5	4.2	250	0.7		37/37	37/37
	H19 温暖期	19	22	310	1.3	0.18 [0.07]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	4.5	3.7	75	0.96		36/36	36/36
	H20 温暖期	14	16	220	1.6	0.24 [0.09]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	4.9	3.8	72	0.68		37/37	37/37
	H21 温暖期	13	13	150	0.91	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	4.5	4.0	80	0.52		37/37	37/37

[4] ディルドリン




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-4-1 ディルドリンの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-4-2 ディルドリンの底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-4-3 ディルドリンの生物の経年変化（幾何平均値）




図 7-4-4 ディルドリンの大気の大気の経年変化（幾何平均値）

[5] エンドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

エンドリンは、殺虫剤、殺鼠剤として利用されたが、昭和 50 年に農薬取締法に基づく登録は失効し、昭和 56 年 10 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」¹⁾で昭和 53 年度から平成元年度並びに平成 3 年度及び平成 5 年度にて生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査している。

平成 14 年度から平成 21 年度のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

平成 22 年度以降のモニタリング調査では調査頻度を隔年とすることとし、平成 22 年度の調査としては実施していない。

以下に、参考として、平成 21 年度までの調査結果を示す。

・平成 21 年度までの調査結果

< 水質 >

○平成 14～21 年度における水質についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	tr(4.8)	tr(5.5)	31	nd	6.0 [2.0]	101/114	36/38
	H15	5.7	6.0	78	0.7	0.7 [0.3]	36/36	36/36
	H16	7	7	100	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	H17	4.0	4.5	120	nd	1.1 [0.4]	45/47	45/47
	H18	3.1	3.5	26	nd	1.3 [0.4]	44/48	44/48
	H19	3.5	3.4	25	nd	1.9 [0.6]	46/48	46/48
	H20	3	4	20	nd	3 [1]	45/48	45/48
	H21	2.0	2.3	67	nd	0.7 [0.3]	39/49	39/49

（注）：平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

○平成 14～21 年度における底質についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	10	10	19,000	nd	6 [2]	141/189	54/63
	H15	12	11	29,000	nd	5 [2]	150/186	53/62
	H16	15	13	6,900	nd	3 [0.9]	182/189	63/63
	H17	12	11	19,000	nd	2.6 [0.9]	170/189	61/63
	H18	12	10	61,000	nd	4 [1]	178/192	63/64
	H19	11	9	61,000	nd	5 [2]	151/192	55/64
	H20	11	11	38,000	nd	1.9 [0.7]	168/192	61/64
	H21	9.6	8.4	11,000	nd	1.6 [0.6]	168/192	63/64

（注）：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

○ 平成 14～21 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのエンドリンの検出状況


エンドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	42	27	12,000	nd	18 [6]	35/38	7/8
	H15	38	21	5,000	6.3	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	H16	65	25	4,600	tr(5.7)	12 [4.2]	31/31	7/7
	H17	39	19	2,100	nd	17 [5.5]	27/31	7/7
	H18	40	15	3,100	tr(5)	11 [4]	31/31	7/7
	H19	28	12	3,000	tr(6)	9 [3]	31/31	7/7
	H20	30	10	1,500	tr(6)	8 [3]	31/31	7/7
	H21	38	19	1,400	tr(5)	7 [3]	31/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H14	20	24	180	nd	18 [6]	54/70	13/14
	H15	14	10	180	nd	4.8 [1.6]	67/70	14/14
	H16	18	24	220	nd	12 [4.2]	57/70	13/14
	H17	19	tr(16)	2,100	nd	17 [5.5]	58/80	12/16
	H18	13	tr(10)	150	nd	11 [4]	66/80	16/16
	H19	13	12	170	nd	9 [3]	69/80	15/16
	H20	11	10	200	nd	8 [3]	63/85	14/17
	H21	17	12	270	nd	7 [3]	86/90	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	28	52	99	nd	18 [6]	7/10	2/2
	H15	22	30	96	5.4	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	H16	tr(11)	25	62	nd	12 [4.2]	5/10	1/2
	H17	18	28	64	nd	17 [5.5]	7/10	2/2
	H18	16	23	57	tr(4)	11 [4]	10/10	2/2
	H19	17	28	55	nd	9 [3]	9/10	2/2
	H20	10	26	83	nd	8 [3]	5/10	1/2
	H21	11	17	43	tr(3)	7 [3]	10/10	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >


○ 平成 14～21 年度における大気についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	0.22	0.28	2.5	nd	0.090 [0.030]	90/102	32/34
	H15 温暖期	0.74	0.95	6.2	0.081	0.042 [0.014]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.23	0.20	2.1	0.042		34/34	34/34
	H16 温暖期	0.64	0.68	6.5	tr(0.054)	0.14 [0.048]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	0.23	0.26	1.9	nd		36/37	36/37
	H17 温暖期	tr(0.4)	tr(0.3)	2.9	nd	0.5 [0.2]	27/37	27/37
	H17 寒冷期	nd	nd	0.7	nd		8/37	8/37
	H18 温暖期	0.31	0.32	5.4	nd	0.30 [0.10]	32/37	32/37
	H18 寒冷期	nd	nd	5.0	nd		7/37	7/37
	H19 温暖期	0.69	0.73	6.3	tr(0.06)	0.09 [0.04]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.16	0.13	1.5	nd		33/36	33/36
	H20 温暖期	0.53	0.68	4.6	tr(0.06)	0.10 [0.04]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.18	0.18	1.8	nd		35/37	35/37
	H21 温暖期	0.49	0.51	3.4	nd	0.09 [0.04]	36/37	36/37
	H21 寒冷期	0.17	0.15	1.8	nd		36/37	36/37




(注) 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-5-1 エンドリンの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-5-2 エンドリンの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-5-3 エンドリンの生物の経年変化(幾何平均値)




図 7-5-4 エンドリンの大気の経年変化(幾何平均値)

[6] DDT 類

・調査の経緯及び実施状況

DDT 類は、ヘキサクロロシクロヘキサン（HCH）やドリノ類とともに多用された殺虫剤である。昭和 46 年に農薬取締法に基づく登録は失効し、昭和 56 年 10 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。DDT 類には芳香環に置換している塩素の位置によっていくつかの異性体があるが、継続的調査においては、殺虫剤の主な有効成分である *p,p'*-DDT に加えて *o,p'*-DDT を、また、DDT の環境中での分解産物である *p,p'*-DDE、*o,p'*-DDE、*p,p'*-DDD 及び *o,p'*-DDD も含めて昭和 53 年度からモニタリング調査を実施している。

平成 13 年度以前の継続的調査において、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD は「生物モニタリング」¹⁾で昭和 53 年度から平成 13 年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」²⁾で水質は昭和 61 年度から平成 10 年度まで、底質は昭和 61 年度から平成 13 年度の全期間にわたって調査を実施している。また、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD は「生物モニタリング」³⁾で昭和 53 年度から平成 8 年度の毎年と平成 10 年度、平成 12 年度及び平成 13 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD についての水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

○ *p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD

< 水質 >

p,p'-DDT：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.8pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は $\text{tr}(1.0) \sim 7,500\text{pg/L}$ の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、湖沼域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

p,p'-DDE：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.8pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 2.4～1,600pg/L の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

p,p'-DDD：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.08pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 1.6～970pg/L の範囲であった。

○ 平成 14～22 年度における水質についての *p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD の検出状況

<i>p,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	13	11	440	0.25	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	H15	14	12	740	$\text{tr}(2.8)$	3 [0.9]	36/36	36/36
	H16	15	14	310	nd	6 [2]	36/38	36/38
	H17	8	9	110	1	4 [1]	47/47	47/47
	H18	9.1	9.2	170	$\text{tr}(1.6)$	1.9 [0.6]	48/48	48/48
	H19	7.3	9.1	670	nd	1.7 [0.6]	46/48	46/48
	H20	11	11	1,200	nd	1.2 [0.5]	47/48	47/48
	H21	9.2	8.4	440	0.81	0.15 [0.06]	49/49	49/49
	H22	8.5	7.6	7,500	$\text{tr}(1.0)$	2.4 [0.8]	49/49	49/49

p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	25	26	760	1.3	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	H15	26	22	380	5	4 [2]	36/36	36/36
	H16	36	34	680	tr(6)	8 [3]	38/38	38/38
	H17	26	24	410	4	6 [2]	47/47	47/47
	H18	24	24	170	tr(4)	7 [2]	48/48	48/48
	H19	22	23	440	tr(2)	4 [2]	48/48	48/48
	H20	27	28	350	2.5	1.1 [0.4]	48/48	48/48
	H21	23	23	240	3.4	1.1 [0.4]	49/49	49/49
	H22	14	12	1,600	2.4	2.3 [0.8]	49/49	49/49
p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	16	18	190	0.57	0.24 [0.08]	114/114	38/38
	H15	19	18	410	4	2 [0.5]	36/36	36/36
	H16	19	18	740	tr(2.4)	3 [0.8]	38/38	38/38
	H17	17	16	130	tr(1.8)	1.9 [0.64]	47/47	47/47
	H18	16	17	99	2.0	1.6 [0.5]	48/48	48/48
	H19	15	12	150	tr(1.5)	1.7 [0.6]	48/48	48/48
	H20	22	20	850	2.0	0.6 [0.2]	48/48	48/48
	H21	14	13	140	1.4	0.4 [0.2]	49/49	49/49
	H22	12	10	970	1.6	0.20 [0.08]	49/49	49/49

(注) : 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

p,p' -DDT : 底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.9pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 9.3 ~ 220,000pg/g-dry の範囲であった。

p,p' -DDE : 底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 11 ~ 40,000pg/g-dry の範囲であった。

p,p' -DDD : 底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 4.4 ~ 78,000pg/g-dry の範囲であった。

○ 平成 14 ~ 22 年度における底質についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	380	240	97,000	tr(5)	6 [2]	189/189	63/63
	H15	290	220	55,000	3	2 [0.4]	186/186	62/62
	H16	460	230	98,000	7	2 [0.5]	189/189	63/63
	H17	360	230	1,700,000	5.1	1.0 [0.34]	189/189	63/63
	H18	310	240	130,000	4.5	1.4 [0.5]	192/192	64/64
	H19	210	150	130,000	3	1.3 [0.5]	192/192	64/64
	H20	270	180	1,400,000	4.8	1.2 [0.5]	192/192	64/64
	H21	250	170	2,100,000	1.9	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	H22	230	200	220,000	9.3	2.8 [0.9]	64/64	64/64
p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	780	630	23,000	8.4	2.7 [0.9]	189/189	63/63
	H15	790	780	80,000	9.5	0.9 [0.3]	186/186	62/62
	H16	720	700	39,000	8	3 [0.8]	189/189	63/63
	H17	710	730	64,000	8.4	2.7 [0.94]	189/189	63/63
	H18	710	820	49,000	5.8	1.0 [0.3]	192/192	64/64
	H19	670	900	61,000	3.2	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	H20	920	940	96,000	9.0	1.7 [0.7]	192/192	64/64
	H21	700	660	50,000	6.7	0.8 [0.3]	192/192	64/64
	H22	680	790	40,000	11	5 [2]	64/64	64/64

p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	640	690	51,000	tr(2.2)	2.4 [0.8]	189/189	63/63
	H15	670	580	32,000	3.7	0.9 [0.3]	186/186	62/62
	H16	650	550	75,000	4	2 [0.7]	189/189	63/63
	H17	600	570	210,000	5.2	1.7 [0.64]	189/189	63/63
	H18	560	540	53,000	2.2	0.7 [0.2]	192/192	64/64
	H19	520	550	80,000	3.5	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	H20	740	660	300,000	2.8	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	H21	540	560	300,000	3.9	0.4 [0.2]	192/192	64/64
	H22	510	510	78,000	4.4	1.4 [0.5]	64/64	64/64

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

p,p' -DDT : 生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 43 ~ 470pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 7 ~ 2,100pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 15pg/g-wet までの範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

p,p' -DDE : 生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 230 ~ 6,300pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 260 ~ 13,000pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 6,300 ~ 160,000pg/g-wet の範囲であった。

p,p' -DDD : 生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 11 ~ 960pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 57 ~ 2,900pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 120 ~ 1,600pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	200	200	1,200	38	4.2 [1.4]	38/38	8/8
	H15	290	290	1,800	49	11 [3.5]	30/30	6/6
	H16	360	340	2,600	48	3.2 [1.1]	31/31	7/7
	H17	240	170	1,300	66	5.1 [1.7]	31/31	7/7
	H18	250	220	1,100	56	6 [2]	31/31	7/7
	H19	240	150	1,200	49	5 [2]	31/31	7/7
	H20	160	100	1,400	12	5 [2]	31/31	7/7
	H21	240	170	9,600	46	3 [1]	31/31	7/7
	H22	180	280	470	43	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	430	450	24,000	6.8	4.2 [1.4]	70/70	14/14
	H15	220	400	1,900	tr(3.7)	11 [3.5]	70/70	14/14
	H16	410	330	53,000	5.5	3.2 [1.1]	70/70	14/14
	H17	280	330	8,400	tr(3.8)	5.1 [1.7]	80/80	16/16
	H18	300	340	3,000	tr(5)	6 [2]	80/80	16/16
	H19	260	320	1,800	9	5 [2]	80/80	16/16
	H20	280	310	2,900	7	5 [2]	85/85	17/17
	H21	250	300	2,000	4	3 [1]	90/90	18/18
	H22	240	280	2,100	7	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	440	510	1,300	76	4.2 [1.4]	10/10	2/2
	H15	610	620	1,400	180	11 [3.5]	10/10	2/2
	H16	340	320	700	160	3.2 [1.1]	10/10	2/2
	H17	430	550	900	180	5.1 [1.7]	10/10	2/2
	H18	580	490	1,800	110	6 [2]	10/10	2/2
	H19	480	350	1,900	160	5 [2]	10/10	2/2
	H20	160	170	270	56	5 [2]	10/10	2/2
	H21	300	190	2,900	85	3 [1]	10/10	2/2
	H22	3	---	15	nd	3 [1]	1/2	1/2
p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	1,000	1,700	6,000	140	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	H15	1,200	1,000	6,500	190	5.7 [1.9]	30/30	6/6
	H16	1,300	1,400	8,400	220	8.2 [2.7]	31/31	7/7
	H17	1,200	1,600	6,600	230	8.5 [2.8]	31/31	7/7
	H18	1,000	1,200	6,000	160	1.9 [0.7]	31/31	7/7
	H19	1,100	1,200	5,600	180	3 [1]	31/31	7/7
	H20	900	1,100	5,800	120	3 [1]	31/31	7/7
	H21	940	1,100	6,400	150	4 [1]	31/31	7/7
	H22	1,100	1,300	6,300	230	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	2,900	2,200	98,000	510	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	H15	2,000	2,200	12,000	180	5.7 [1.9]	70/70	14/14
	H16	3,000	2,100	52,000	390	8.2 [2.7]	70/70	14/14
	H17	2,400	2,400	73,000	230	8.5 [2.8]	80/80	16/16
	H18	2,200	2,600	28,000	280	1.9 [0.7]	80/80	16/16
	H19	2,200	2,000	22,000	160	3 [1]	80/80	16/16
	H20	2,500	2,000	53,000	320	3 [1]	85/85	17/17
	H21	2,300	2,100	20,000	260	4 [1]	90/90	18/18
	H22	2,300	2,100	13,000	260	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	36,000	60,000	170,000	8,100	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	H15	66,000	76,000	240,000	18,000	5.7 [1.9]	10/10	2/2
	H16	34,000	65,000	200,000	6,800	8.2 [2.7]	10/10	2/2
	H17	44,000	86,000	300,000	7,100	8.5 [2.8]	10/10	2/2
	H18	38,000	57,000	160,000	5,900	1.9 [0.7]	10/10	2/2
	H19	40,000	56,000	320,000	6,700	3 [1]	10/10	2/2
	H20	51,000	79,000	160,000	7,500	3 [1]	10/10	2/2
	H21	30,000	64,000	220,000	4,300	4 [1]	10/10	2/2
	H22	32,000	---	160,000	6,300	3 [1]	2/2	2/2

p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
貝類 (pg/g-wet)	H14	340	710	3,200	11	5.4 [1.8]	38/38	8/8
	H15	390	640	2,600	tr(7.5)	9.9 [3.3]	30/30	6/6
	H16	440	240	8,900	7.8	2.2 [0.70]	31/31	7/7
	H17	370	800	1,700	13	2.9 [0.97]	31/31	7/7
	H18	300	480	1,400	7.3	2.4 [0.9]	31/31	7/7
	H19	310	360	1,500	7	3 [1]	31/31	7/7
	H20	280	280	1,300	6	3 [1]	31/31	7/7
	H21	220	170	2,400	5.8	2.4 [0.9]	31/31	7/7
	H22	180	330	960	11	1.3 [0.5]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	750	680	14,000	80	5.4 [1.8]	70/70	14/14
	H15	510	520	3,700	43	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	H16	770	510	9,700	56	2.2 [0.70]	70/70	14/14
	H17	510	650	6,700	29	2.9 [0.97]	80/80	16/16
	H18	520	580	4,300	60	2.4 [0.9]	80/80	16/16
	H19	470	490	4,100	36	3 [1]	80/80	16/16
	H20	460	440	4,100	33	3 [1]	85/85	17/17
	H21	440	460	2,500	57	2.4 [0.9]	90/90	18/18
	H22	560	610	2,900	57	1.3 [0.5]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	580	740	3,900	140	5.4 [1.8]	10/10	2/2
	H15	640	860	3,900	110	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	H16	330	520	1,400	52	2.2 [0.70]	10/10	2/2
	H17	310	540	1,400	45	2.9 [0.97]	10/10	2/2
	H18	410	740	1,800	55	2.4 [0.9]	10/10	2/2
	H19	440	780	2,300	70	3 [1]	10/10	2/2
	H20	240	490	1,100	35	3 [1]	10/10	2/2
	H21	280	430	3,400	31	2.4 [0.9]	10/10	2/2
	H22	440	---	1,600	120	1.3 [0.5]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

p,p' -DDT : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.03pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.28 \sim 56\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.03pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.30 \sim 16\text{pg/m}^3$ の範囲であった。

p,p' -DDE : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.21pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $\text{tr}(0.41) \sim 200\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.21pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $\text{tr}(0.47) \sim 28\text{pg/m}^3$ の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。

p,p' -DDD : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.04 \sim 1.7\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.02 \sim 0.41\text{pg/m}^3$ の範囲であった。

○平成 14～22 年度における大気についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	1.9	1.8	22	0.25	0.24 [0.08]	102/102	34/34
	H15 温暖期	5.8	6.6	24	0.75	0.14 [0.046]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	1.7	1.6	11	0.31		34/34	34/34
	H16 温暖期	4.7	5.1	37	0.41	0.22 [0.074]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	1.8	1.7	13	0.29		37/37	37/37
	H17 温暖期	4.1	4.2	31	0.44	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	1.1	0.99	4.8	0.25		37/37	37/37
	H18 温暖期	4.2	3.8	51	0.35	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	1.4	1.2	7.3	0.29		37/37	37/37
	H19 温暖期	4.9	5.2	30	0.6	0.07 [0.03]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	1.2	1.2	8.8	0.23		36/36	36/36
	H20 温暖期	3.6	3.0	27	0.76	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	1.2	1.0	15	0.22		37/37	37/37
	H21 温暖期	3.6	3.6	28	0.44	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	1.1	1.0	8.0	0.20		37/37	37/37
	H22 温暖期	3.5	3.1	56	0.28	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	1.3	0.89	16	0.30		37/37	37/37
p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	2.8	2.7	28	0.56	0.09 [0.03]	102/102	34/34
	H15 温暖期	7.2	7.0	51	1.2	0.40 [0.13]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	2.8	2.4	22	1.1		34/34	34/34
	H16 温暖期	6.1	6.3	95	0.62	0.12 [0.039]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	2.9	2.6	43	0.85		37/37	37/37
	H17 温暖期	5.0	5.7	42	1.2	0.14 [0.034]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	1.7	1.5	9.9	0.76		37/37	37/37
	H18 温暖期	5.0	4.7	49	1.7	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	1.9	1.7	9.5	0.52		37/37	37/37
	H19 温暖期	6.4	6.1	120	0.54	0.04 [0.02]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	2.1	1.9	39	0.73		36/36	36/36
	H20 温暖期	4.8	4.4	96	0.98	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	2.2	2.0	22	0.89		37/37	37/37
	H21 温暖期	4.9	4.8	130	0.87	0.08 [0.03]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	2.1	1.9	100	0.60		37/37	37/37
	H22 温暖期	4.9	4.1	200	tr(0.41)	0.62 [0.21]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	2.2	1.8	28	tr(0.47)		37/37	37/37
p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	0.12	0.13	0.76	nd	0.018 [0.006]	101/102	34/34
	H15 温暖期	0.30	0.35	1.4	0.063	0.054 [0.018]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.13	0.14	0.52	tr(0.037)		34/34	34/34
	H16 温暖期	0.24	0.27	1.4	tr(0.036)	0.053 [0.018]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	0.12	0.12	0.91	tr(0.025)		37/37	37/37
	H17 温暖期	0.24	0.26	1.3	tr(0.07)	0.16 [0.05]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	tr(0.06)	tr(0.07)	0.29	nd		28/37	28/37
	H18 温暖期	0.28	0.32	1.3	nd	0.13 [0.04]	36/37	36/37
	H18 寒冷期	0.14	tr(0.12)	0.99	nd		36/37	36/37
	H19 温暖期	0.26	0.27	1.4	0.046	0.011 [0.004]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.093	0.087	0.5	0.026		36/36	36/36
	H20 温暖期	0.17	0.17	1.1	0.037	0.025 [0.009]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.091	0.081	0.31	0.036		37/37	37/37
	H21 温暖期	0.17	0.18	0.82	0.03	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.08	0.08	0.35	tr(0.02)		37/37	37/37
	H22 温暖期	0.20	0.17	1.7	0.04	0.02 [0.01]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.10	0.09	0.41	0.02		37/37	37/37

○ *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD

< 水質 >

o,p'-DDT: 水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/L において 49 地点中 43 地点で検出され、検出濃度は 700pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域、湖沼域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定され、海域の調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

o,p'-DDE: 水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.09pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.13) ~ 180pg/L の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。また、水質全体としても調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。

o,p'-DDD: 水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.5) ~ 170pg/L の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河口域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○ 平成 14 ~ 22 年度における水質についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	5.4	4.6	77	0.19	1.2 [0.4]	114/114	38/38
	H15	6	5	100	tr(1.5)	3 [0.7]	36/36	36/36
	H16	tr(4.5)	5	85	nd	5 [2]	29/38	29/38
	H17	3	3	39	nd	3 [1]	42/47	42/47
	H18	2.8	2.4	52	0.51	2.3 [0.8]	48/48	48/48
	H19	tr(2.1)	tr(2.2)	86	nd	2.5 [0.8]	38/48	38/48
	H20	3.1	3.0	230	nd	1.4 [0.5]	44/48	44/48
	H21	2.4	2.4	100	0.43	0.16 [0.06]	49/49	49/49
	H22	1.5	tr(1.2)	700	nd	1.5 [0.5]	43/49	43/49
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	2.4	2.1	680	nd	0.9 [0.3]	113/114	38/38
	H15	2.2	2.0	170	tr(0.42)	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	H16	3	2	170	tr(0.6)	2 [0.5]	38/38	38/38
	H17	2.5	2.1	410	0.4	1.2 [0.4]	47/47	47/47
	H18	tr(1.6)	tr(1.4)	210	nd	2.6 [0.9]	28/48	28/48
	H19	tr(1.5)	tr(1.1)	210	nd	2.3 [0.8]	29/48	29/48
	H20	1.5	1.8	260	nd	0.7 [0.3]	39/48	39/48
	H21	1.3	1.1	140	nd	0.22 [0.09]	47/49	47/49
	H22	0.97	0.65	180	tr(0.13)	0.24 [0.09]	49/49	49/49
<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	5.6	6.0	110	nd	0.60 [0.20]	113/114	38/38
	H15	7.1	5.0	160	1.1	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	H16	6	5	81	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	H17	5.2	5.4	51	tr(0.5)	1.2 [0.4]	47/47	47/47
	H18	2.5	3.3	39	nd	0.8 [0.3]	40/48	40/48
	H19	4.6	3.9	41	tr(0.3)	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	H20	6.7	7.2	170	nd	0.8 [0.3]	47/48	47/48
	H21	4.4	3.8	41	0.44	0.22 [0.09]	49/49	49/49
	H22	4.6	3.8	170	tr(0.5)	0.6 [0.2]	49/49	49/49

(注) : 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

o,p'-DDT: 底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 1.4 ~ 13,000pg/g-dry の範囲であった。

o,p'-DDE：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.7)～25,000pg/g-dry の範囲であった。

o,p'-DDD：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.8)～6,900pg/g-dry の範囲であった。

○ 平成 14～22 年度における底質についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	76	47	27,000	nd	6 [2]	183/189	62/63
	H15	50	43	3,200	nd	0.8 [0.3]	185/186	62/62
	H16	69	50	17,000	tr(1.1)	2 [0.6]	189/189	63/63
	H17	58	46	160,000	0.8	0.8 [0.3]	189/189	63/63
	H18	57	52	18,000	tr(0.8)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	H19	38	31	27,000	nd	1.8 [0.6]	186/192	63/64
	H20	51	40	140,000	tr(0.7)	1.5 [0.6]	192/192	64/64
	H21	44	30	100,000	nd	1.2 [0.5]	190/192	64/64
	H22	40	33	13,000	1.4	1.1 [0.4]	64/64	64/64
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	54	37	16,000	nd	3 [1]	188/189	63/63
	H15	48	39	24,000	tr(0.5)	0.6 [0.2]	186/186	62/62
	H16	40	34	28,000	nd	3 [0.8]	184/189	63/63
	H17	40	32	31,000	nd	2.6 [0.9]	181/189	62/63
	H18	42	40	27,000	tr(0.4)	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	H19	37	41	25,000	nd	1.2 [0.4]	186/192	63/64
	H20	50	48	37,000	nd	1.4 [0.6]	186/192	63/64
	H21	37	31	33,000	nd	0.6 [0.2]	191/192	64/64
	H22	37	32	25,000	tr(0.7)	1.2 [0.5]	64/64	64/64
<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	160	150	14,000	nd	6 [2]	184/189	62/63
	H15	160	130	8,800	tr(1.0)	2 [0.5]	186/186	62/62
	H16	140	120	16,000	tr(0.7)	2 [0.5]	189/189	63/63
	H17	130	110	32,000	tr(0.8)	1.0 [0.3]	189/189	63/63
	H18	120	110	13,000	tr(0.3)	0.5 [0.2]	192/192	64/64
	H19	110	130	21,000	tr(0.5)	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	H20	170	150	50,000	0.5	0.3 [0.1]	192/192	64/64
	H21	120	120	24,000	0.5	0.5 [0.2]	192/192	64/64
	H22	130	130	6,900	tr(0.8)	0.9 [0.4]	64/64	64/64

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

o,p'-DDT：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 15～160pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 5～550pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

o,p'-DDE：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 0.6pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 7.8～160pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 0.6pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1.2)～2,800pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.6pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 3.7pg/g-wet までの範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

計的に有意と判定された。

o,p'-DDD：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 5.8～400pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 2.6～700pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 3.6～11pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

- 平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	110	83	480	22	12 [4]	38/38	8/8
	H15	130	120	480	35	2.9 [0.97]	30/30	6/6
	H16	160	140	910	20	1.8 [0.61]	31/31	7/7
	H17	98	57	440	29	2.6 [0.86]	31/31	7/7
	H18	92	79	380	24	3 [1]	31/31	7/7
	H19	79	52	350	20	3 [1]	31/31	7/7
	H20	58	37	330	5	3 [1]	31/31	7/7
	H21	74	48	2,500	17	2.2 [0.8]	31/31	7/7
	H22	51	67	160	15	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	130	130	2,300	tr(6)	12 [4]	70/70	14/14
	H15	85	120	520	2.9	2.9 [0.97]	70/70	14/14
	H16	160	140	1,800	3.7	1.8 [0.61]	70/70	14/14
	H17	100	110	1,500	5.8	2.6 [0.86]	80/80	16/16
	H18	100	110	700	6	3 [1]	80/80	16/16
	H19	69	90	430	3	3 [1]	80/80	16/16
	H20	72	92	720	3	3 [1]	85/85	17/17
	H21	61	73	470	2.4	2.2 [0.8]	90/90	18/18
	H22	58	71	550	5	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	12	tr(10)	58	nd	12 [4]	8/10	2/2
	H15	24	16	66	8.3	2.9 [0.97]	10/10	2/2
	H16	8.5	13	43	tr(0.87)	1.8 [0.61]	10/10	2/2
	H17	11	14	24	3.4	2.6 [0.86]	10/10	2/2
	H18	14	10	120	3	3 [1]	10/10	2/2
	H19	9	9	26	tr(2)	3 [1]	10/10	2/2
	H20	4	6	16	nd	3 [1]	8/10	2/2
	H21	6.3	7.6	12	tr(1.4)	2.2 [0.8]	10/10	2/2
	H22	nd	---	nd	nd	3 [1]	0/2	0/2

o,p'-DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	83	66	1,100	13	3.6 [1.2]	38/38	8/8
	H15	85	100	460	17	3.6 [1.2]	30/30	6/6
	H16	86	69	360	19	2.1 [0.69]	31/31	7/7
	H17	70	89	470	12	3.4 [1.1]	31/31	7/7
	H18	62	81	340	12	3 [1]	31/31	7/7
	H19	56	69	410	8.9	2.3 [0.9]	31/31	7/7
	H20	49	52	390	8	3 [1]	31/31	7/7
	H21	46	58	310	8	3 [1]	31/31	7/7
	H22	46	58	160	7.8	1.5 [0.6]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	91	50	13,000	3.6	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	H15	51	54	2,500	nd	3.6 [1.2]	67/70	14/14
	H16	76	48	5,800	tr(0.89)	2.1 [0.69]	70/70	14/14
	H17	54	45	12,000	tr(1.4)	3.4 [1.1]	80/80	16/16
	H18	56	43	4,800	tr(1)	3 [1]	80/80	16/16
	H19	45	29	4,400	nd	2.3 [0.9]	79/80	16/16
	H20	50	37	13,000	tr(1)	3 [1]	85/85	17/17
	H21	46	33	4,300	tr(1)	3 [1]	90/90	18/18
	H22	47	37	2,800	tr(1.2)	1.5 [0.6]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	28	26	49	20	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	H15	tr(2.3)	tr(2.0)	4.2	nd	3.6 [1.2]	9/10	2/2
	H16	tr(1.0)	tr(1.1)	3.7	nd	2.1 [0.69]	5/10	1/2
	H17	tr(1.2)	tr(1.9)	tr(2.9)	nd	3.4 [1.1]	7/10	2/2
	H18	tr(1)	tr(2)	3	tr(1)	3 [1]	10/10	2/2
	H19	tr(1.0)	tr(1.4)	2.8	nd	2.3 [0.9]	6/10	2/2
	H20	tr(1)	nd	3	nd	3 [1]	5/10	1/2
	H21	nd	tr(1)	tr(2)	nd	3 [1]	6/10	2/2
	H22	tr(1.1)	---	3.7	nd	1.5 [0.6]	1/2	1/2
o,p'-DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	120	190	2,900	tr(9)	12 [4]	38/38	8/8
	H15	200	220	1,900	6.5	6.0 [2.0]	30/30	6/6
	H16	220	130	2,800	6.0	5.7 [1.9]	31/31	7/7
	H17	170	280	1,800	10	3.3 [1.1]	31/31	7/7
	H18	150	200	1,000	7	4 [1]	31/31	7/7
	H19	150	200	1,200	6	3 [1]	31/31	7/7
	H20	130	140	1,100	5	4 [2]	31/31	7/7
	H21	95	51	1,000	5	3 [1]	31/31	7/7
	H22	57	50	400	5.8	0.6 [0.2]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	95	90	1,100	nd	12 [4]	66/70	14/14
	H15	75	96	920	nd	6.0 [2.0]	66/70	14/14
	H16	120	96	1,700	nd	5.7 [1.9]	68/70	14/14
	H17	83	81	1,400	nd	3.3 [1.1]	79/80	16/16
	H18	80	86	1,100	tr(1)	4 [1]	80/80	16/16
	H19	66	62	1,300	nd	3 [1]	78/80	16/16
	H20	65	74	1,000	nd	4 [2]	80/85	16/17
	H21	63	64	760	nd	3 [1]	87/90	18/18
	H22	75	99	700	2.6	0.6 [0.2]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	15	15	23	tr(8)	12 [4]	10/10	2/2
	H15	15	14	36	tr(5.0)	6.0 [2.0]	10/10	2/2
	H16	6.1	5.7	25	nd	5.7 [1.9]	9/10	2/2
	H17	7.3	7.5	9.7	4.7	3.3 [1.1]	10/10	2/2
	H18	8	8	19	5	4 [1]	10/10	2/2
	H19	7	7	10	5	3 [1]	10/10	2/2
	H20	4	tr(3)	14	tr(2)	4 [2]	10/10	2/2
	H21	6	5	13	3	3 [1]	10/10	2/2
	H22	6.3	---	11	3.6	0.6 [0.2]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

o,p'-DDT : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.19 ~ 26pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.22 ~ 5.5pg/m³ の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期及び寒冷期とも減少傾向が統計的に有意と判定された。


o,p'-DDE : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.09 ~ 9.0pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.08 ~ 2.3pg/m³ の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期及び寒冷期とも減少傾向が統計的に有意と判定された。

o,p'-DDD : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.04 ~ 1.8pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $\mu(0.02)$ ~ 0.48pg/m³ の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○ 平成 14 ~ 22 年度における大気についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況


<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	2.2	2.0	40	0.41	0.15 [0.05]	102/102	34/34
	H15 温暖期	6.9	7.7	38	0.61	0.12 [0.040]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	1.6	1.4	6.4	0.43		34/34	34/34
	H16 温暖期	5.1	5.4	22	0.54	0.093 [0.031]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	1.5	1.4	9.4	0.35		37/37	37/37
	H17 温暖期	3.0	3.1	14	0.67	0.10 [0.034]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	0.76	0.67	3.0	0.32		37/37	37/37
	H18 温暖期	2.5	2.4	20	0.55	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	0.90	0.79	3.9	0.37		37/37	37/37
	H19 温暖期	2.9	2.6	19	0.24	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.77	0.63	3.4	0.31		36/36	36/36
	H20 温暖期	2.3	2.1	18	0.33	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.80	0.62	6.5	0.32		37/37	37/37
	H21 温暖期	2.3	2.2	14	0.33	0.019 [0.008]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.80	0.71	3.7	0.20		37/37	37/37
	H22 温暖期	2.2	1.9	26	0.19	0.14 [0.05]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.81	0.69	5.5	0.22		37/37	37/37
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	0.60	0.56	8.5	0.11	0.03 [0.01]	102/102	34/34
	H15 温暖期	1.4	1.5	7.5	0.17	0.020 [0.0068]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.50	0.47	1.7	0.18		34/34	34/34
	H16 温暖期	1.1	1.2	8.9	0.14	0.037 [0.012]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	0.53	0.49	3.9	0.14		37/37	37/37
	H17 温暖期	1.6	1.5	7.9	0.33	0.074 [0.024]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	0.62	0.59	2.0	0.24		37/37	37/37
	H18 温暖期	1.1	1.1	7.4	nd	0.09 [0.03]	36/37	36/37
	H18 寒冷期	0.65	0.56	2.6	0.19		37/37	37/37
	H19 温暖期	0.66	0.67	7	0.096	0.017 [0.007]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.3	0.29	3.7	0.12		36/36	36/36
	H20 温暖期	0.48	0.52	5.0	0.11	0.025 [0.009]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.30	0.24	1.1	0.15		37/37	37/37
	H21 温暖期	0.51	0.46	6.7	0.098	0.016 [0.006]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.27	0.24	23	0.072		37/37	37/37
	H22 温暖期	0.49	0.41	9.0	0.09	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.27	0.23	2.3	0.08		37/37	37/37

o,p'-DDD	実施年度	幾何 平均值	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	0.14	0.18	0.85	nd	0.021 [0.007]	97/102	33/34
	H15 温暖期	0.37	0.42	1.3	0.059	0.042 [0.014]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.15	0.14	0.42	0.062		34/34	34/34
	H16 温暖期	0.31	0.33	2.6	tr(0.052)	0.14 [0.048]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	0.14	tr(0.13)	0.86	nd		35/37	35/37
	H17 温暖期	0.22	0.19	0.90	tr(0.07)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	tr(0.07)	tr(0.07)	0.21	nd		35/37	35/37
	H18 温暖期	0.28	0.28	1.4	tr(0.05)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	0.12	0.11	0.79	nd		34/37	34/37
	H19 温暖期	0.28	0.29	1.9	0.05	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.095	0.09	0.33	tr(0.03)		36/36	36/36
	H20 温暖期	0.19	0.16	1.6	0.05	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.10	0.09	0.26	0.04		37/37	37/37
	H21 温暖期	0.20	0.19	0.90	0.04	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.08	0.08	0.28	tr(0.02)		37/37	37/37
	H22 温暖期	0.21	0.19	1.8	0.04	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.10	0.09	0.48	tr(0.02)		37/37	37/37




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-1-1 p,p' -DDT の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-1-2 p,p' -DDT の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 21 年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-1-3 p,p' -DDT の生物の経年変化 (幾何平均値)





図 7-6-1-4 p,p' -DDT の大気の経年変化 (幾何平均値)


[6-2] p,p' -DDE



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-6-2-1 p,p' -DDE の水質の経年変化 (幾何平均値)

[6-2] p,p' -DDE



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-2-2 p,p' -DDE の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-2-3 p,p' -DDE の生物の経年変化（幾何平均値）






図 7-6-2-4 p,p' -DDE の大気の大気経年変化（幾何平均値）




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-3-1 p,p' -DDD の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-3-2 p,p' -DDD の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-3-3 p,p' -DDD の生物の経年変化（幾何平均値）





図 7-6-3-4 p,p' -DDD の大気の経年変化（幾何平均値）


[6-4] *o,p'*-DDT



(注) 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-4-1 *o,p'*-DDT の水質の経年変化 (幾何平均値)


[6-4] *o,p'*-DDT



(注 1) *o,p'*-DDT の底質については、継続的調査において平成 13 年度以前の調査が実施されていない。

(注 2) 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-4-2 *o,p'*-DDT の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 21 年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-4-3 *o,p'*-DDT の生物の経年変化 (幾何平均値)





図 7-6-4-4 *o,p'*-DDT の大気の経年変化 (幾何平均値)


[6-5] *o,p'*-DDE



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-5-1 *o,p'*-DDE の水質の経年変化 (幾何平均値)


[6-5] *o,p'*-DDE



(注1) *o,p'*-DDE の底質については、継続的調査において平成13年度以前の調査が実施されていない。

(注2) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-5-2 *o,p'*-DDE の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 21 年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-5-3 o,p' -DDE の生物の経年変化 (幾何平均値)





図 7-6-5-4 o,p' -DDE の大気の経年変化 (幾何平均値)


[6-6] *o,p'*-DDD



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-6-1 *o,p'*-DDD の水質の経年変化 (幾何平均値)


[6-6] *o,p'*-DDD



(注1) *o,p'*-DDD の底質については、継続的調査において平成13年度以前の調査が実施されていない。

(注2) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-6-2 *o,p'*-DDD の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-6-6-3 o,p' -DDD の生物の経年変化（幾何平均値）




図 7-6-6-4 o,p' -DDD の大気の大気経年変化（幾何平均値）

[7] クロルデン類

・調査の経緯及び実施状況

クロルデン類は、殺虫剤として利用されたが、昭和 43 年に農薬取締法に基づく登録が失効した。しかし、クロルデン類はその後木材加工時に用いられ、シロアリ防除のために家屋等にも使用されていた。昭和 61 年 9 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定された。

工業的に生産されたクロルデン類の組成は多岐にわたるが、継続的調査では、当初ヘプタクロル、 γ -クロルディーン、ヘプタクロルエポキシド、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン（クロルデン代謝物）、*cis*-ノナクロル（農薬として未登録）及び *trans*-ノナクロル（農薬として未登録）の 8 種類を調査対象物質とした。昭和 58 年度以降は、昭和 57 年度精密環境調査において特に検出頻度が高かった 5 物質（*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロル）を調査対象物質に選定し、調査を実施している。

平成 13 年度までの継続的調査において、「生物モニタリング」¹⁾で昭和 58 年度から平成 13 年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。また、「水質・底質モニタリング」²⁾で *cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルについて、水質は昭和 61 年度から平成 10 年度まで、底質は昭和 61 年度から平成 13 年度の全期間にわたって調査を実施している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルについての水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

○ *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデン

< 水質 >

cis-クロルデン：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 4pg/L において 49 地点中 47 地点で検出され、検出濃度は 170pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-クロルデン：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 4pg/L において 49 地点中 44 地点で検出され、検出濃度は 310pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○ 平成 14～22 年度における水質についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	42	32	880	2.5	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	H15	69	51	920	12	3 [0.9]	36/36	36/36
	H16	92	87	1,900	10	6 [2]	38/38	38/38
	H17	53	54	510	6	4 [1]	47/47	47/47
	H18	31	26	440	5	5 [2]	48/48	48/48
	H19	23	22	680	nd	4 [2]	47/48	47/48
	H20	29	29	480	2.9	1.6 [0.6]	48/48	48/48
	H21	29	26	710	4.4	1.1 [0.4]	49/49	49/49
	H22	19	14	170	nd	11 [4]	47/49	47/49

<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	33	24	780	3.1	1.5 [0.5]	114/114	38/38
	H15	34	30	410	6	5 [2]	36/36	36/36
	H16	32	26	1,200	5	5 [2]	38/38	38/38
	H17	25	21	200	3	4 [1]	47/47	47/47
	H18	24	16	330	tr(4)	7 [2]	48/48	48/48
	H19	16	20	580	nd	2.4 [0.8]	47/48	47/48
	H20	23	22	420	3	3 [1]	48/48	48/48
	H21	23	18	690	3.0	0.8 [0.3]	49/49	49/49
	H22	15	tr(11)	310	nd	13 [4]	44/49	44/49

(注) : 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

cis-クロルデン：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(4)～7,200pg/g-dry の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、湖沼域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-クロルデン：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 4pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(4)～8,000pg/g-dry の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における底質についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	140	98	18,000	1.8	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	H15	190	140	19,000	tr(3.6)	4 [2]	186/186	62/62
	H16	160	97	36,000	4	4 [2]	189/189	63/63
	H17	150	100	44,000	3.3	1.9 [0.64]	189/189	63/63
	H18	100	70	13,000	tr(0.9)	2.4 [0.8]	192/192	64/64
	H19	82	55	7,500	nd	5 [2]	191/192	64/64
	H20	100	63	11,000	tr(2.3)	2.4 [0.9]	192/192	64/64
	H21	84	61	8,600	2.0	0.7 [0.3]	192/192	64/64
	H22	82	62	7,200	tr(4)	6 [2]	64/64	64/64
<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	150	110	16,000	2.1	1.8 [0.6]	189/189	63/63
	H15	130	100	13,000	tr(2.4)	4 [2]	186/186	62/62
	H16	110	80	26,000	3	3 [0.9]	189/189	63/63
	H17	110	81	32,000	3.4	2.3 [0.84]	189/189	63/63
	H18	110	76	12,000	2.2	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	H19	82	58	7,500	nd	2.2 [0.8]	191/192	64/64
	H20	110	66	10,000	2.4	2.0 [0.8]	192/192	64/64
	H21	91	68	8,300	2.1	1.7 [0.7]	192/192	64/64
	H22	95	69	8,000	tr(4)	11 [4]	64/64	64/64

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

cis-クロルデン：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 67～15,000pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 51～3,400pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 4～180pg/g-wet

の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-クロルデン：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 31～5,500pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 9～1,100pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は tr(2)～10pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	730	1,200	26,000	24	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	H15	1,100	1,400	14,000	110	3.9 [1.3]	30/30	6/6
	H16	1,300	1,600	14,000	91	18 [5.8]	31/31	7/7
	H17	1,000	960	13,000	78	12 [3.9]	31/31	7/7
	H18	970	1,100	18,000	67	4 [1]	31/31	7/7
	H19	870	590	19,000	59	5 [2]	31/31	7/7
	H20	750	560	11,000	85	5 [2]	31/31	7/7
	H21	1,200	1,100	16,000	83	4 [2]	31/31	7/7
	H22	1,600	2,300	15,000	67	4 [2]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	610	550	6,900	57	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	H15	510	400	4,400	43	3.9 [1.3]	70/70	14/14
	H16	620	490	9,800	68	18 [5.8]	70/70	14/14
	H17	520	600	8,000	42	12 [3.9]	80/80	16/16
	H18	520	420	4,900	56	4 [1]	80/80	16/16
	H19	430	360	5,200	30	5 [2]	80/80	16/16
	H20	430	340	3,500	36	5 [2]	85/85	17/17
	H21	430	450	3,200	41	4 [2]	90/90	18/18
	H22	450	630	3,400	51	4 [2]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	67	180	450	10	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	H15	47	120	370	6.8	3.9 [1.3]	10/10	2/2
	H16	39	110	240	tr(5.8)	18 [5.8]	10/10	2/2
	H17	53	120	340	tr(5.8)	12 [3.9]	10/10	2/2
	H18	32	83	250	5	4 [1]	10/10	2/2
	H19	29	83	230	tr(4)	5 [2]	10/10	2/2
	H20	24	87	280	tr(3)	5 [2]	10/10	2/2
	H21	21	48	130	4	4 [2]	10/10	2/2
	H22	27	---	180	4	4 [2]	2/2	2/2

<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	390	840	2,300	33	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	H15	550	840	2,800	69	7.2 [2.4]	30/30	6/6
	H16	560	770	2,800	53	48 [16]	31/31	7/7
	H17	470	660	2,400	40	10 [3.5]	31/31	7/7
	H18	470	580	2,800	41	4 [2]	31/31	7/7
	H19	440	460	1,500	34	6 [2]	31/31	7/7
	H20	360	410	1,300	52	7 [3]	31/31	7/7
	H21	540	560	16,000	48	4 [1]	31/31	7/7
	H22	520	640	5,500	31	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	190	160	2,700	20	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	H15	160	120	1,800	9.6	7.2 [2.4]	70/70	14/14
	H16	200	130	5,200	tr(17)	48 [16]	70/70	14/14
	H17	160	180	3,100	tr(9.8)	10 [3.5]	76/80	16/16
	H18	150	120	2,000	14	4 [2]	80/80	16/16
	H19	130	100	2,100	8	6 [2]	80/80	16/16
	H20	120	71	1,300	14	7 [3]	85/85	17/17
	H21	130	140	1,300	10	4 [1]	90/90	18/18
	H22	120	170	1,100	9	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	14	14	26	8.9	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	H15	11	12	27	tr(5.9)	7.2 [2.4]	10/10	2/2
	H16	nd	nd	tr(26)	nd	48 [16]	5/10	1/2
	H17	11	12	30	tr(4.5)	10 [3.5]	10/10	2/2
	H18	7	8	17	tr(3)	4 [2]	10/10	2/2
	H19	7	8	19	tr(3)	6 [2]	10/10	2/2
	H20	tr(5)	9	27	nd	7 [3]	7/10	2/2
	H21	6	7	13	tr(3)	4 [1]	10/10	2/2
	H22	4	---	10	tr(2)	3 [1]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

cis-クロルデン：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 2.2～700pg/m³の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.8)～130pg/m³の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-クロルデン：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 2.0～820pg/m³の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1.0)～150pg/m³の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期及び寒冷期とも減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における大気についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	31	40	670	0.86	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	H15 温暖期	110	120	1,600	6.4	0.51 [0.17]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	30	38	220	2.5		34/34	34/34
	H16 温暖期	92	160	1,000	2.3	0.57 [0.19]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	29	49	290	1.2		37/37	37/37
	H17 温暖期	92	120	1,000	3.4	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	16	19	260	1.4		37/37	37/37
	H18 温暖期	82	110	760	2.9	0.13 [0.04]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	19	19	280	2.0		37/37	37/37
	H19 温暖期	90	120	1,100	3.3	0.10 [0.04]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	17	20	230	1.4		36/36	36/36
	H20 温暖期	75	120	790	1.9	0.14 [0.05]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	21	34	200	1.5		37/37	37/37
	H21 温暖期	67	110	790	2.7	0.16 [0.06]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	19	22	180	0.65		37/37	37/37
	H22 温暖期	68	100	700	1.8	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	20	27	130	0.84		37/37	37/37
<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	36	48	820	0.62	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	H15 温暖期	130	150	2,000	6.5	0.86 [0.29]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	37	44	290	2.5		34/34	34/34
	H16 温暖期	110	190	1,300	2.2	0.69 [0.23]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	35	60	360	1.5		37/37	37/37
	H17 温暖期	100	130	1,300	3.2	0.34 [0.14]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	19	23	310	1.9		37/37	37/37
	H18 温暖期	96	140	1,200	3.4	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	22	21	350	2.0		37/37	37/37
	H19 温暖期	100	140	1,300	3.8	0.12 [0.05]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	20	24	300	1.5		36/36	36/36
	H20 温暖期	87	130	990	2.5	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	25	41	250	1.8		37/37	37/37
	H21 温暖期	79	120	960	2.6	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	23	30	210	0.68		37/37	37/37
	H22 温暖期	79	120	820	2.0	1.2 [0.4]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	24	34	150	tr(1.0)		37/37	37/37

○ オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロル

< 水質 >

オキシクロルデン：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/L において 49 地点中 47 地点で検出され、検出濃度は 45pg/L までの範囲であった。

cis-ノナクロル：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.9)～40pg/L の範囲であった。

trans-ノナクロル：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 3pg/L において 49 地点中 45 地点で検出され、検出濃度は 93pg/L までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○ 平成 14～22 年度における水質についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	2.7	3.5	41	nd	1.2 [0.4]	96/114	35/38
	H15	3	2	39	tr(0.6)	2 [0.5]	36/36	36/36
	H16	3.2	2.9	47	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	H17	2.6	2.1	19	nd	1.1 [0.4]	46/47	46/47
	H18	tr(2.5)	tr(2.4)	18	nd	2.8 [0.9]	43/48	43/48
	H19	tr(2)	nd	41	nd	6 [2]	25/48	25/48
	H20	1.9	1.9	14	nd	1.9 [0.7]	40/48	40/48
	H21	2.0	1.9	19	nd	1.1 [0.4]	45/49	45/49
	H22	1.5	1.3	45	nd	0.7 [0.3]	47/49	47/49
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	7.9	6.7	250	0.23	1.8 [0.6]	114/114	38/38
	H15	8.0	7.0	130	1.3	0.3 [0.1]	36/36	36/36
	H16	7.5	6.3	340	0.8	0.6 [0.2]	38/38	38/38
	H17	6.0	5.9	43	0.9	0.5 [0.2]	47/47	47/47
	H18	6.6	5.6	83	1.0	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	H19	5.9	6.1	210	nd	2.4 [0.8]	43/48	43/48
	H20	6.5	5.9	130	0.9	0.9 [0.3]	48/48	48/48
	H21	7.1	5.5	210	1.4	0.3 [0.1]	49/49	49/49
	H22	5.4	3.9	40	tr(0.9)	1.3 [0.4]	49/49	49/49
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	30	24	780	1.8	1.2 [0.4]	114/114	38/38
	H15	26	20	450	4	2 [0.5]	36/36	36/36
	H16	25	19	1,100	tr(3)	4 [2]	38/38	38/38
	H17	20	17	150	2.6	2.5 [0.84]	47/47	47/47
	H18	21	16	310	3.2	3.0 [1.0]	48/48	48/48
	H19	17	17	540	tr(2)	5 [2]	48/48	48/48
	H20	18	17	340	1.9	1.6 [0.6]	48/48	48/48
	H21	20	17	530	2.7	1.0 [0.4]	49/49	49/49
	H22	12	11	93	nd	8 [3]	45/49	45/49

(注)：平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 底質 >

オキシクロルデン：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/g-dry において 64 地点中 56 地点で検出され、検出濃度は 60pg/g-dry までの範囲であった。

cis-ノナクロル：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 2.3～3,600pg/g-dry の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-ノナクロル：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(3)～6,200pg/g-dry の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における底質についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	2.7	1.7	120	nd	1.5 [0.5]	153/189	59/63
	H15	2	2	85	nd	1 [0.4]	158/186	57/62
	H16	tr(2.1)	tr(1.3)	140	nd	3 [0.8]	129/189	54/63
	H17	2.3	tr(1.9)	160	nd	2.0 [0.7]	133/189	51/63
	H18	tr(2.5)	tr(1.7)	280	nd	2.9 [1.0]	141/192	54/64
	H19	tr(2.1)	tr(1.5)	76	nd	2.5 [0.9]	117/192	46/64
	H20	tr(2)	tr(1)	340	nd	3 [1]	110/192	48/64
	H21	2	tr(1)	150	nd	2 [1]	97/192	45/64
	H22	1.7	1.2	60	nd	1.0 [0.4]	56/64	56/64
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	76	66	7,800	nd	2.1 [0.7]	188/189	63/63
	H15	66	50	6,500	nd	3 [0.9]	184/186	62/62
	H16	53	34	9,400	tr(0.8)	2 [0.6]	189/189	63/63
	H17	56	42	9,900	tr(1.1)	1.9 [0.64]	189/189	63/63
	H18	58	48	5,800	tr(0.6)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	H19	48	35	4,200	nd	1.6 [0.6]	191/192	64/64
	H20	57	42	5,100	1.1	0.6 [0.2]	192/192	64/64
	H21	53	38	4,700	1.4	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	H22	53	45	3,600	2.3	0.9 [0.3]	64/64	64/64
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	130	83	13,000	3.1	1.5 [0.5]	189/189	63/63
	H15	110	78	11,000	2	2 [0.6]	186/186	62/62
	H16	94	63	23,000	3	2 [0.6]	189/189	63/63
	H17	99	72	24,000	2.4	1.5 [0.54]	189/189	63/63
	H18	100	65	10,000	3.4	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	H19	78	55	8,400	tr(1.6)	1.7 [0.6]	192/192	64/64
	H20	91	53	8,400	tr(1.6)	2.2 [0.8]	192/192	64/64
	H21	85	58	7,800	2.0	0.9 [0.3]	192/192	64/64
	H22	80	65	6,200	tr(3)	6 [2]	64/64	64/64

(注)：平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<生物>

オキシクロルデン：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 11～3,300pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 33～1,000pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 320～510pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

cis-ノナクロル：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 35～1,300pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 23～2,200pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 57～190pg/g-wet の範囲であった。

trans-ノナクロル：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 84～6,000pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 110～4,700pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 290～880pg/g-wet の範囲であった。平成 14 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	71	83	5,600	nd	3.6 [1.2]	37/38	8/8
	H15	93	62	1,900	11	8.4 [2.8]	30/30	6/6
	H16	110	100	1,700	14	9.2 [3.1]	31/31	7/7
	H17	99	79	1,400	12	9.3 [3.1]	31/31	7/7
	H18	91	90	2,400	7	7 [3]	31/31	7/7
	H19	70	43	2,200	8	6 [2]	31/31	7/7
	H20	64	55	1,100	7	7 [2]	31/31	7/7
	H21	100	89	820	10	4 [1]	31/31	7/7
	H22	240	390	3,300	11	8 [3]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	170	140	3,900	16	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	H15	150	160	820	30	8.4 [2.8]	70/70	14/14
	H16	160	140	1,500	25	9.2 [3.1]	70/70	14/14
	H17	150	150	1,900	20	9.3 [3.1]	80/80	16/16
	H18	150	120	3,000	28	7 [3]	80/80	16/16
	H19	120	100	1,900	17	6 [2]	80/80	16/16
	H20	130	130	2,200	15	7 [2]	85/85	17/17
	H21	120	99	2,400	23	4 [1]	90/90	18/18
	H22	120	140	1,000	33	8 [3]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	640	630	890	470	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	H15	760	700	1,300	610	8.4 [2.8]	10/10	2/2
	H16	460	450	730	320	9.2 [3.1]	10/10	2/2
	H17	610	660	860	390	9.3 [3.1]	10/10	2/2
	H18	510	560	720	270	7 [3]	10/10	2/2
	H19	440	400	740	290	6 [2]	10/10	2/2
	H20	560	530	960	290	7 [2]	10/10	2/2
	H21	300	290	540	190	4 [1]	10/10	2/2
	H22	400	---	510	320	8 [3]	2/2	2/2

cis- ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	170	300	870	8.6	1.2 [0.4]	38/38	8/8
	H15	290	260	1,800	48	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	H16	320	380	1,800	43	3.4 [1.1]	31/31	7/7
	H17	270	220	1,300	27	4.5 [1.5]	31/31	7/7
	H18	270	180	1,500	31	3 [1]	31/31	7/7
	H19	250	250	1,000	26	3 [1]	31/31	7/7
	H20	210	210	780	33	4 [1]	31/31	7/7
	H21	300	310	10,000	31	3 [1]	31/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H22	280	310	1,300	35	3 [1]	6/6	6/6
	H14	460	420	5,100	46	1.2 [0.4]	70/70	14/14
	H15	360	360	2,600	19	4.8 [1.6]	70/70	14/14
	H16	430	310	10,000	48	3.4 [1.1]	70/70	14/14
	H17	380	360	6,200	27	4.5 [1.5]	80/80	16/16
	H18	370	330	3,300	33	3 [1]	80/80	16/16
	H19	320	280	3,700	16	3 [1]	80/80	16/16
	H20	350	300	3,200	46	4 [1]	85/85	17/17
鳥類 (pg/g-wet)	H21	340	340	2,600	27	3 [1]	90/90	18/18
	H22	320	370	2,200	23	3 [1]	18/18	18/18
	H14	200	240	450	68	1.2 [0.4]	10/10	2/2
	H15	200	260	660	68	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	H16	140	150	240	73	3.4 [1.1]	10/10	2/2
	H17	160	180	370	86	4.5 [1.5]	10/10	2/2
	H18	120	130	270	60	3 [1]	10/10	2/2
	H19	130	140	300	42	3 [1]	10/10	2/2
trans- ノナクロル	H20	140	150	410	37	4 [1]	10/10	2/2
	H21	81	85	160	44	3 [1]	10/10	2/2
	H22	100	---	190	57	3 [1]	2/2	2/2
	H14	450	1,100	1,800	21	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	H15	800	700	3,800	140	3.6 [1.2]	30/30	6/6
	H16	780	870	3,400	110	13 [4.2]	31/31	7/7
	H17	700	650	3,400	72	6.2 [2.1]	31/31	7/7
	H18	660	610	3,200	85	3 [1]	31/31	7/7
貝類 (pg/g-wet)	H19	640	610	2,400	71	7 [3]	31/31	7/7
	H20	510	510	2,000	94	6 [2]	31/31	7/7
	H21	780	680	33,000	79	3 [1]	31/31	7/7
	H22	790	870	6,000	84	4 [2]	6/6	6/6
	H14	1,000	900	8,300	98	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	H15	920	840	5,800	85	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	H16	1,100	760	21,000	140	13 [4.2]	70/70	14/14
	H17	970	750	13,000	80	6.2 [2.1]	80/80	16/16
魚類 (pg/g-wet)	H18	940	680	6,900	120	3 [1]	80/80	16/16
	H19	800	680	7,900	71	7 [3]	80/80	16/16
	H20	860	750	6,900	87	6 [2]	85/85	17/17
	H21	810	720	7,400	68	3 [1]	90/90	18/18
	H22	800	---	4,700	110	4 [2]	18/18	18/18
	H14	890	980	1,900	350	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	H15	1,100	1,400	3,700	350	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	H16	690	780	1,200	390	13 [4.2]	10/10	2/2
鳥類 (pg/g-wet)	H17	870	880	2,000	440	6.2 [2.1]	10/10	2/2
	H18	650	620	1,500	310	3 [1]	10/10	2/2
	H19	590	680	1,400	200	7 [3]	10/10	2/2
	H20	740	850	2,600	180	6 [2]	10/10	2/2
	H21	400	430	730	220	3 [1]	10/10	2/2
	H22	510	---	880	290	4 [2]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

オキシクロルデン：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.44 ~ 6.2pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値

0.01pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.26～2.3pg/m³の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。


cis-ノナクロル：大気温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.04pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.23～68pg/m³の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.04pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.06)～13pg/m³の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-ノナクロル：大気温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 1.7～520pg/m³の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/m³において 37 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.7)～89pg/m³の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、温暖期の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○平成 14～22 年度における大気についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況


オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	0.96	0.98	8.3	nd	0.024 [0.008]	101/102	34/34
	H15 温暖期	2.5	2.7	12	0.41	0.045 [0.015]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.87	0.88	3.2	0.41		34/34	34/34
	H16 温暖期	1.9	2.0	7.8	0.41	0.13 [0.042]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	0.80	0.76	3.9	0.27		37/37	37/37
	H17 温暖期	1.9	2.0	8.8	0.65	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	0.55	0.50	2.2	0.27		37/37	37/37
	H18 温暖期	1.8	1.9	5.7	0.47	0.23 [0.08]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	0.54	0.56	5.1	tr(0.13)		37/37	37/37
	H19 温暖期	1.9	1.8	8.6	0.56	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.61	0.63	2.4	0.26		36/36	36/36
	H20 温暖期	1.7	1.7	7.1	0.50	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.61	0.63	1.8	0.27		37/37	37/37
	H21 温暖期	1.7	1.8	6.5	0.38	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.65	0.61	2.7	0.24		37/37	37/37
	H22 温暖期	1.5	1.5	6.2	0.44	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.56	0.55	2.3	0.26		37/37	37/37
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	3.1	4.0	62	0.071	0.030 [0.010]	102/102	34/34
	H15 温暖期	12	15	220	0.81	0.026 [0.0088]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	2.7	3.5	23	0.18		34/34	34/34
	H16 温暖期	10	15	130	0.36	0.072 [0.024]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	2.7	4.4	28	0.087		37/37	37/37
	H17 温暖期	10	14	160	0.30	0.08 [0.03]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	1.6	1.6	34	0.08		37/37	37/37
	H18 温暖期	11	12	170	0.28	0.15 [0.05]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	2.4	2.0	41	tr(0.14)		37/37	37/37
	H19 温暖期	10	14	150	0.31	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	1.6	1.7	22	0.09		36/36	36/36
	H20 温暖期	7.9	12	87	0.18	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	2.0	2.7	19	0.16		37/37	37/37
	H21 温暖期	7.5	10	110	0.33	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	1.9	2.1	18	0.07		37/37	37/37
	H22 温暖期	7.5	10	68	0.23	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	1.8	2.1	13	tr(0.06)		37/37	37/37

trans-ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H14	24	30	550	0.64	0.30 [0.10]	102/102	34/34
	H15 温暖期	87	100	1,200	5.1	0.35 [0.12]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	24	28	180	2.1		34/34	34/34
	H16 温暖期	72	120	870	1.9	0.48 [0.16]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	23	39	240	0.95		37/37	37/37
	H17 温暖期	75	95	870	3.1	0.13 [0.044]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	13	16	210	1.2		37/37	37/37
	H18 温暖期	68	91	800	3.0	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	16	15	240	1.4		37/37	37/37
	H19 温暖期	72	96	940	2.5	0.09 [0.03]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	13	15	190	1.1		36/36	36/36
	H20 温暖期	59	91	650	1.5	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	17	25	170	1.3		37/37	37/37
	H21 温暖期	54	81	630	2.2	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	16	19	140	0.75		37/37	37/37
	H22 温暖期	52	78	520	1.7	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	15	17	89	tr(0.7)		37/37	37/37




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図7-7-1-1 *cis*-クロルデンの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図7-7-1-2 *cis*-クロルデンの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-1-3 *cis*-クロルデンの生物の経年変化(幾何平均値)






図 7-7-1-4 *cis*-クロルデンの大気の経年変化(幾何平均値)

[7-2] *trans*-クロルデン




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-2-1 *trans*-クロルデンの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-2-2 *trans*-クロルデンの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-2-3 *trans*-クロルデンの生物の経年変化 (幾何平均値)





図 7-7-2-4 *trans*-クロルデンの大気の経年変化 (幾何平均値)


[7-3] オキシクロルデン



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-3-1 オキシクロルデンの水質の経年変化 (幾何平均値)


[7-3] オキシクロルデン



(注1) オキシクロルデンの底質については、継続的調査において平成13年度以前の調査が実施されていない。

(注2) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-3-2 オキシクロルデンの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-3-3 オキシクロルデンの生物の経年変化(幾何平均値)






図 7-7-3-4 オキシクロルデンの大気の経年変化(幾何平均値)

[7-4] *cis*-ノナクロル




(注) 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-4-1 *cis*-ノナクロルの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-4-2 *cis*-ノナクロルの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-4-3 *cis*-ノナクロルの生物の経年変化(幾何平均値)






図 7-7-4-4 *cis*-ノナクロルの大気の大気経年変化(幾何平均値)

[7-5] *trans*-ノナクロル




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-5-1 *trans*-ノナクロルの水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-5-2 *trans*-ノナクロルの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-7-5-3 *trans*-ノナクロルの生物の経年変化(幾何平均値)




図 7-7-5-4 *trans*-ノナクロルの大気の経年変化(幾何平均値)

[8] ヘブタクロル類

・調査の経緯及び実施状況

ヘブタクロル及びその代謝物ヘブタクロルエポキシドは、有機塩素系殺虫剤の一種である。稲、麦類、じゃがいも、さつまいも、たばこ、豆類、あぶらな科野菜、ネギ類、ウリ類、てんさい、ほうれん草等の殺虫剤として使用された。農薬取締法に基づく登録は昭和 50 年に失効した。工業用クロルデン（シロアリ防除剤）にも含まれており、昭和 61 年 9 月、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの調査として「化学物質環境調査」¹⁾では、ヘブタクロル及びヘブタクロルエポキシドについて昭和 57 年度に水質、底質及び魚類を、昭和 61 年度に大気を調査している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、ヘブタクロルについては平成 14 年度から、*cis*-ヘブタクロルエポキシド及び *trans*-ヘブタクロルエポキシドについては平成 15 年度からそれぞれ毎年度実施している。

・調査結果

○ヘブタクロル、*cis*-ヘブタクロルエポキシド及び *trans*-ヘブタクロルエポキシド

<水質>

ヘブタクロル：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/L において 49 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 43pg/L までの範囲であった。

cis-ヘブタクロルエポキシド：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 0.7～710pg/L の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

trans-ヘブタクロルエポキシド：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/L において 49 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は 8.0pg/L までの範囲であった。

○平成 14～22 年度における水質についてのヘブタクロル、*cis*-ヘブタクロルエポキシド及び *trans*-ヘブタクロルエポキシドの検出状況

ヘブタクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H14	tr(1.2)	tr(1.0)	25	nd	1.5 [0.5]	97/114	38/38
	H15	tr(1.8)	tr(1.6)	7	tr(1.0)	2 [0.5]	36/36	36/36
	H16	nd	nd	29	nd	5 [2]	9/38	9/38
	H17	nd	tr(1)	54	nd	3 [1]	25/47	25/47
	H18	nd	nd	6	nd	5 [2]	5/48	5/48
	H19	nd	nd	5.2	nd	2.4 [0.8]	12/48	12/48
	H20	nd	nd	4.6	nd	2.1 [0.8]	19/48	19/48
	H21	tr(0.5)	nd	17	nd	0.8 [0.3]	20/49	20/49
	H22	nd	nd	43	nd	2.2 [0.7]	4/49	4/49
<i>cis</i> -ヘブタクロルエ ポキシド	実施 年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	9.8	11	170	1.2	0.7 [0.2]	36/36	36/36
	H16	10	10	77	2	2 [0.4]	38/38	38/38
	H17	7.1	6.6	59	1.0	0.7 [0.2]	47/47	47/47
	H18	7.6	6.6	47	1.1	2.0 [0.7]	48/48	48/48
	H19	6.1	5.8	120	tr(0.9)	1.3 [0.4]	48/48	48/48
	H20	4.7	5.0	37	nd	0.6 [0.2]	46/48	46/48
	H21	5.5	4.2	72	0.8	0.5 [0.2]	49/49	49/49
	H22	5.9	3.9	710	0.7	0.4 [0.2]	49/49	49/49

trans-ヘプタクロル エポキシド	実施 年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	nd	nd	2	nd	2 [0.4]	4/36	4/36
	H16	nd	nd	nd	nd	0.9 [0.3]	0/38	0/38
	H17	nd	nd	nd	nd	0.7 [0.2]	0/47	0/47
	H18	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.6]	0/48	0/48
	H19	nd	nd	tr(0.9)	nd	2.0 [0.7]	2/48	2/48
	H20	nd	nd	nd	nd	1.9 [0.7]	0/48	0/48
	H21	nd	nd	nd	nd	0.7 [0.3]	0/49	0/49
	H22	nd	nd	8.0	nd	1.3 [0.5]	2/49	2/49

(注) : 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<底質>

ヘプタクロル：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.4pg/g-dry において 64 地点中 51 地点で検出され、検出濃度は 35pg/g-dry までの範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河口域の調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。

cis-ヘプタクロルエポキシド：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/g-dry において 64 地点中 62 地点で検出され、検出濃度は 300pg/g-dry までの範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河口域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが示唆された。

trans-ヘプタクロルエポキシド：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-dry において 64 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 4pg/g-dry までの範囲であった。

- 平成 14～22 年度における底質についてのヘプタクロル、cis-ヘプタクロルエポキシド及び trans-ヘプタクロルエポキシドの検出状況

ヘプタクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	4.1	3.2	120	nd	1.8 [0.6]	167/189	60/63
	H15	tr(2.7)	tr(2.2)	160	nd	3 [1.0]	138/186	53/62
	H16	tr(2.8)	tr(2.3)	170	nd	3 [0.9]	134/189	53/63
	H17	3.1	2.8	200	nd	2.5 [0.8]	120/189	48/63
	H18	5.2	3.9	230	nd	1.9 [0.6]	190/192	64/64
	H19	tr(1.8)	tr(1.5)	110	nd	3.0 [0.7]	143/192	57/64
	H20	tr(1)	nd	85	nd	4 [1]	59/192	27/64
	H21	1.6	1.3	65	nd	1.1 [0.4]	144/192	59/64
	H22	1.2	tr(0.8)	35	nd	1.1 [0.4]	51/64	51/64
cis-ヘプタクロルエ ポキシド	実施 年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	4	3	160	nd	3 [1]	153/186	55/62
	H16	tr(5)	tr(3)	230	nd	6 [2]	136/189	52/63
	H17	tr(4)	tr(3)	140	nd	7 [2]	119/189	49/63
	H18	4.0	3.2	210	nd	3.0 [1.0]	157/192	58/64
	H19	3	tr(2)	270	nd	3 [1]	141/192	53/64
	H20	3	2	180	nd	2 [1]	130/192	51/64
	H21	2.7	1.9	290	nd	0.7 [0.3]	176/192	63/64
	H22	3.1	2.4	300	nd	0.8 [0.3]	62/64	62/64
trans-ヘプタクロル エポキシド	実施 年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/186	0/62
	H16	nd	nd	tr(2.5)	nd	4 [2]	1/189	1/63
	H17	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/189	0/63
	H18	nd	nd	19	nd	7 [2]	2/192	2/64
	H19	nd	nd	31	nd	10 [4]	2/192	2/64
	H20	nd	nd	nd	nd	1.7 [0.7]	0/192	0/64
	H21	nd	nd	nd	nd	1.4 [0.6]	0/192	0/64
	H22	nd	nd	4	nd	3 [1]	1/64	1/64

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<生物>

ヘブタクロル：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 78pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点中 12 地点で検出され、検出濃度は 5pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は tr(1)pg/g-wet までの範囲であった。

cis-ヘブタクロルエポキシド：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 0.9pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 9.0～1,800pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 0.9pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 5.0～230pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.9pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 240～360pg/g-wet の範囲であった。

trans-ヘブタクロルエポキシド：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 24pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出されなかった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。

○平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）のヘブタクロル、cis-ヘブタクロルエポキシド及び trans-ヘブタクロルエポキシドの検出状況

ヘブタクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	tr(3.5)	4.6	15	nd	4.2 [1.4]	28/38	6/8
	H15	tr(2.8)	tr(2.4)	14	nd	6.6 [2.2]	16/30	4/6
	H16	tr(3.4)	5.2	16	nd	4.1 [1.4]	23/31	6/7
	H17	tr(2.9)	tr(2.9)	24	nd	6.1 [2.0]	18/31	6/7
	H18	tr(4)	tr(4)	20	nd	6 [2]	23/31	6/7
	H19	tr(3)	tr(3)	12	nd	6 [2]	20/31	6/7
	H20	tr(2)	nd	9	nd	6 [2]	13/31	5/7
	H21	tr(4)	nd	120	nd	5 [2]	14/31	4/7
	H22	3	tr(2)	78	nd	3 [1]	5/6	5/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	4.2	4.8	20	nd	4.2 [1.4]	57/70	12/14
	H15	nd	nd	11	nd	6.6 [2.2]	29/70	8/14
	H16	tr(2.3)	tr(2.1)	460	nd	4.1 [1.4]	50/70	11/14
	H17	nd	nd	7.6	nd	6.1 [2.0]	32/80	8/16
	H18	tr(2)	nd	8	nd	6 [2]	36/80	8/16
	H19	tr(2)	nd	7	nd	6 [2]	28/80	6/16
	H20	nd	nd	9	nd	6 [2]	25/85	7/17
	H21	tr(2)	nd	8	nd	5 [2]	30/90	11/18
	H22	tr(2)	tr(2)	5	nd	3 [1]	12/18	12/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	tr(1.7)	tr(2.8)	5.2	nd	4.2 [1.4]	7/10	2/2
	H15	nd	nd	nd	nd	6.6 [2.2]	0/10	0/2
	H16	nd	nd	tr(1.5)	nd	4.1 [1.4]	1/10	1/2
	H17	nd	nd	nd	nd	6.1 [2.0]	0/10	0/2
	H18	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	H19	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	H20	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	H21	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	H22	nd	nd	tr(1)	nd	3 [1]	1/2	1/2

<i>cis</i> -ヘブタクロルエ ポキシド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	44	29	880	9.7	6.9 [2.3]	30/30	6/6
	H16	64	34	840	tr(9.8)	9.9 [3.3]	31/31	7/7
	H17	49	20	590	7.4	3.5 [1.2]	31/31	7/7
	H18	56	23	1,100	8	4 [1]	31/31	7/7
	H19	37	20	1,100	8	4 [1]	31/31	7/7
	H20	37	19	510	8	5 [2]	31/31	7/7
	H21	59	33	380	10	3 [1]	31/31	7/7
	H22	170	260	1,800	9.0	2.4 [0.9]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H15	43	43	320	7.0	6.9 [2.3]	70/70	14/14
	H16	51	49	620	tr(3.3)	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	H17	41	45	390	4.9	3.5 [1.2]	80/80	16/16
	H18	42	48	270	4	4 [1]	80/80	16/16
	H19	43	49	390	4	4 [1]	80/80	16/16
	H20	39	46	350	tr(3)	5 [2]	85/85	17/17
	H21	41	50	310	4	3 [1]	90/90	18/18
	H22	39	49	230	5.0	2.4 [0.9]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	540	510	770	370	6.9 [2.3]	10/10	2/2
	H16	270	270	350	190	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	H17	370	340	690	250	3.5 [1.2]	10/10	2/2
	H18	330	310	650	240	4 [1]	10/10	2/2
	H19	280	270	350	250	4 [1]	10/10	2/2
	H20	370	370	560	180	5 [2]	10/10	2/2
	H21	220	210	390	160	3 [1]	10/10	2/2
	H22	290	300	360	240	2.4 [0.9]	2/2	2/2
<i>trans</i> -ヘブタクロル エポキシド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	48	nd	13 [4.4]	5/30	1/6
	H16	nd	nd	55	nd	12 [4.0]	9/31	2/7
	H17	nd	nd	37	nd	23 [7.5]	5/31	1/7
	H18	nd	nd	45	nd	13 [5]	5/31	1/7
	H19	nd	nd	61	nd	13 [5]	5/31	1/7
	H20	nd	nd	33	nd	10 [4]	5/31	1/7
	H21	tr(3)	nd	24	nd	8 [3]	13/31	3/7
	H22	3	tr(2)	24	nd	3 [1]	3/6	3/6
魚類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	nd	nd	13 [4.4]	0/70	0/14
	H16	nd	nd	tr(10)	nd	12 [4.0]	2/70	2/14
	H17	nd	nd	nd	nd	23 [7.5]	0/80	0/16
	H18	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/80	0/16
	H19	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/80	0/16
	H20	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/85	0/17
	H21	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/90	0/18
	H22	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/18	0/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	nd	nd	13 [4.4]	0/10	0/2
	H16	nd	nd	nd	nd	12 [4.0]	0/10	0/2
	H17	nd	nd	nd	nd	23 [7.5]	0/10	0/2
	H18	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/10	0/2
	H19	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/10	0/2
	H20	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/10	0/2
	H21	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/10	0/2
	H22	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/2	0/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

ヘブタクロル：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.04pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.69～160pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.04pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.22～53pg/m³ の範囲であった。

cis-ヘブタクロルエポキシド：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.38～10pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.01pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.33～4.3pg/m³ の範囲であった。


trans-ヘブタクロルエポキシド：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点中 6 地点で検出され、検出濃度は 0.16pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

○ 平成 14～22 年度における大気についてのヘブタクロル、cis-ヘブタクロルエポキシド及び trans-ヘブタクロルエポキシドの検出状況

ヘブタクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	H14	11	14	220	0.20	0.12 [0.04]	102/102	34/34
	H15 温暖期	27	41	240	1.1	0.25 [0.085]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	10	16	65	0.39		34/34	34/34
	H16 温暖期	23	36	200	0.46	0.23 [0.078]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	11	18	100	0.53		37/37	37/37
	H17 温暖期	25	29	190	1.1	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	6.5	7.9	61	0.52		37/37	37/37
	H18 温暖期	20	27	160	0.88	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	6.8	7.2	56	0.32		37/37	37/37
	H19 温暖期	22	27	320	1.1	0.07 [0.03]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	6.3	8.0	74	0.42		36/36	36/36
	H20 温暖期	20	31	190	0.92	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	7.5	12	60	0.51		37/37	37/37
	H21 温暖期	18	30	110	0.48	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	6.3	7.8	48	0.15		37/37	37/37
	H22 温暖期	17	26	160	0.69	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	7.2	9.5	53	0.22		37/37	37/37
cis-ヘブタクロルエ ポキシド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	3.5	3.5	28	0.45	0.015 [0.0048]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	1.3	1.3	6.6	0.49		34/34	34/34
	H16 温暖期	2.8	2.9	9.7	0.65	0.052 [0.017]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	1.1	1.1	7.0	0.44		37/37	37/37
	H17 温暖期	1.5	1.7	11	tr(0.10)	0.12 [0.044]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	0.91	0.81	2.9	0.43		37/37	37/37
	H18 温暖期	1.7	2.0	6.7	0.13	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	H18 寒冷期	0.74	0.88	3.2	nd		36/37	36/37
	H19 温暖期	2.9	2.8	13	0.54	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.93	0.82	3.0	0.41		36/36	36/36
	H20 温暖期	2.4	2.2	9.9	0.53	0.022 [0.008]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.91	0.84	3.0	0.37		37/37	37/37
	H21 温暖期	2.5	2.6	16	0.37	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	1.0	0.91	3.8	0.42		37/37	37/37
	H22 温暖期	2.3	2.3	10	0.38	0.02 [0.01]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.93	0.85	4.3	0.33		37/37	37/37

<i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	tr(0.036)	tr(0.038)	0.30	nd	0.099 [0.033]	18/35	18/35
	H15 寒冷期	nd	nd	tr(0.094)	nd		3/34	3/34
	H16 温暖期	nd	nd	tr(0.38)	nd	0.6 [0.2]	4/37	4/37
	H16 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H17 温暖期	tr(0.10)	tr(0.12)	1.2	nd	0.16 [0.05]	27/37	27/37
	H17 寒冷期	nd	nd	0.32	nd		3/37	3/37
	H18 温暖期	nd	nd	0.7	nd	0.3 [0.1]	2/37	2/37
	H18 寒冷期	nd	nd	tr(0.1)	nd		1/37	1/37
	H19 温暖期	nd	nd	0.16	nd	0.14 [0.06]	8/36	8/36
	H19 寒冷期	nd	nd	tr(0.06)	nd		1/36	1/36
	H20 温暖期	nd	nd	0.17	nd	0.16 [0.06]	6/37	6/37
	H20 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H21 温暖期	nd	nd	0.18	nd	0.14 [0.05]	10/37	10/37
	H21 寒冷期	nd	nd	tr(0.06)	nd		1/37	1/37
	H22 温暖期	nd	nd	0.16	nd	0.16 [0.06]	6/37	6/37
	H22 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37


[8-1] ヘプタクロル



(注)平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図7-8-1-1 ヘプタクロルの底質の経年変化(幾何平均値)

[8-1] ヘプタクロル



(注)平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図7-8-1-2 ヘプタクロルの生物の経年変化(幾何平均値)





図 7-8-1-3 ヘプタクロルの大気の経年変化 (幾何平均値)


[8-2] *cis*-ヘブタクロルエポキシド



(注) *cis*-ヘブタクロルエポキシドの水質については、継続的調査において平成14年度に調査が実施されていない。

図 7-8-2-1 *cis*-ヘブタクロルエポキシドの水質の経年変化 (幾何平均値)


[8-2] *cis*-ヘブタクロルエポキシド



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-8-2-2 *cis*-ヘブタクロルエポキシドの底質の経年変化 (幾何平均値)

[8-2] *cis*-ヘプタクロルエポキシド



(注1) *cis*-ヘプタクロルエポキシドの生物については、継続的調査において平成14年度に調査が実施されていない。

(注2) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-8-2-3 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの生物の経年変化 (幾何平均値)




図 7-8-2-4 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの大気の大気経年変化 (幾何平均値)

[9] トキサフェン類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

トキサフェン類は、有機塩素系殺虫剤の一種である。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。平成 14 年 9 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの調査としては、「化学物質環境調査」¹⁾で、昭和 58 年度に水質及び底質を調査している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 について水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を平成 15 年度から平成 21 年度まで毎年度実施している。

平成 22 年度以降のモニタリング調査では調査頻度を隔年とすることとし、平成 22 年度の調査としては実施していない。

以下に、参考として、平成 21 年度までの調査結果を示す。

・平成 21 年度までの調査結果

○ Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62

< 水質 >

○ 平成 15～21 年度における水質についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/36	0/36
	H16	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/38	0/38
	H17	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/47	0/47
	H18	nd	nd	nd	nd	16 [5]	0/48	0/48
	H19	nd	nd	nd	nd	20 [5]	0/48	0/48
	H20	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/48	0/48
	H21	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/49	0/49
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/36	0/36
	H16	nd	nd	nd	nd	20 [7]	0/38	0/38
	H17	nd	nd	nd	nd	20 [5]	0/47	0/47
	H18	nd	nd	nd	nd	16 [5]	0/48	0/48
	H19	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/48	0/48
	H20	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/48	0/48
	H21	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/49	0/49
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	nd	nd	nd	nd	300 [90]	0/36	0/36
	H16	nd	nd	nd	nd	90 [30]	0/38	0/38
	H17	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/47	0/47
	H18	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/48	0/48
	H19	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/48	0/48
	H20	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/48	0/48
	H21	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/49	0/49

< 底質 >

○ 平成 15～21 年度における底質についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	nd	nd	nd	nd	90 [30]	0/186	0/62
	H16	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/189	0/63
	H17	nd	nd	nd	nd	60 [30]	0/189	0/63
	H18	nd	nd	nd	nd	12 [4]	0/192	0/64
	H19	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/192	0/64
	H20	nd	nd	nd	nd	12 [5]	0/192	0/64
	H21	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/192	0/64
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	nd	nd	nd	nd	200 [50]	0/186	0/62
	H16	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/189	0/63
	H17	nd	nd	nd	nd	90 [40]	0/189	0/63
	H18	nd	nd	nd	nd	24 [7]	0/192	0/64
	H19	nd	nd	nd	nd	30 [10]	0/192	0/64
	H20	nd	nd	nd	nd	17 [6]	0/192	0/64
	H21	nd	nd	nd	nd	12 [5]	0/192	0/64
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	nd	nd	nd	nd	4,000 [2,000]	0/186	0/62
	H16	nd	nd	nd	nd	2,000 [400]	0/189	0/63
	H17	nd	nd	nd	nd	2,000 [700]	0/189	0/63
	H18	nd	nd	nd	nd	210 [60]	0/192	0/64
	H19	nd	nd	nd	nd	300 [70]	0/192	0/64
	H20	nd	nd	nd	nd	90 [40]	0/192	0/64
	H21	nd	nd	nd	nd	80 [30]	0/192	0/64

(注) : 平成 15 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

○ 平成 15～21 年度における生物(貝類、魚類及び鳥類)についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	tr(39)	nd	45 [15]	11/30	3/6
	H16	nd	nd	tr(32)	nd	42 [14]	15/31	3/7
	H17	nd	nd	tr(28)	nd	47 [16]	7/31	4/7
	H18	tr(9)	tr(12)	25	nd	18 [7]	21/31	5/7
	H19	tr(7)	tr(8)	20	nd	10 [4]	26/31	6/7
	H20	tr(7)	tr(8)	22	nd	9 [3]	27/31	7/7
	H21	9	9	23	nd	7 [3]	27/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H15	tr(28)	tr(24)	810	nd	45 [15]	44/70	11/14
	H16	43	tr(41)	1,000	nd	42 [14]	54/70	13/14
	H17	tr(42)	53	900	nd	47 [16]	50/75	13/16
	H18	41	44	880	nd	18 [7]	70/80	15/16
	H19	24	32	690	nd	10 [4]	64/80	14/16
	H20	35	33	730	nd	9 [3]	79/85	17/17
	H21	25	20	690	nd	7 [3]	82/90	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	120	650	2,500	nd	45 [15]	5/10	1/2
	H16	70	340	810	nd	42 [14]	5/10	1/2
	H17	86	380	1,200	nd	47 [16]	5/10	1/2
	H18	48	290	750	nd	18 [7]	5/10	1/2
	H19	34	280	650	nd	10 [4]	5/10	1/2
	H20	38	320	1,200	nd	9 [3]	6/10	2/2
	H21	26	200	500	nd	7 [3]	6/10	2/2

Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	tr(12)	tr(12)	58	nd	33 [11]	17/30	4/6
	H16	tr(15)	nd	tr(45)	nd	46 [15]	15/31	3/7
	H17	nd	nd	tr(38)	nd	54 [18]	9/31	4/7
	H18	tr(10)	14	32	nd	14 [5]	24/31	6/7
	H19	9	10	37	nd	9 [3]	27/31	7/7
	H20	tr(7)	tr(6)	23	nd	10 [4]	23/31	6/7
	H21	9	9	31	nd	8 [3]	27/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H15	35	34	1,100	nd	33 [11]	55/70	14/14
	H16	60	61	1,300	nd	46 [15]	59/70	14/14
	H17	tr(52)	66	1,400	nd	54 [18]	55/80	13/16
	H18	56	52	1,300	nd	14 [5]	79/80	16/16
	H19	35	41	1,100	nd	9 [3]	77/80	16/16
	H20	44	45	1,000	nd	10 [4]	77/85	17/17
	H21	30	23	910	nd	8 [3]	85/90	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	110	850	3,000	nd	33 [11]	5/10	1/2
	H16	83	440	1,000	nd	46 [15]	5/10	1/2
	H17	100	480	1,500	nd	54 [18]	5/10	1/2
	H18	46	380	1,000	nd	14 [5]	5/10	1/2
	H19	34	360	930	nd	9 [3]	5/10	1/2
	H20	49	410	1,600	nd	10 [4]	5/10	1/2
	H21	29	250	620	nd	8 [3]	5/10	1/2
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	nd	nd	120 [40]	0/30	0/6
	H16	nd	nd	nd	nd	98 [33]	0/31	0/7
	H17	nd	nd	nd	nd	100 [34]	0/31	0/7
	H18	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/31	0/7
	H19	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/31	0/7
	H20	nd	nd	nd	nd	80 [30]	0/31	0/7
	H21	nd	nd	nd	nd	70 [20]	0/31	0/7
魚類 (pg/g-wet)	H15	nd	nd	580	nd	120 [40]	9/70	3/14
	H16	nd	nd	870	nd	98 [33]	24/70	7/14
	H17	nd	nd	830	nd	100 [34]	23/80	8/16
	H18	tr(30)	nd	870	nd	70 [30]	28/80	10/16
	H19	tr(30)	nd	530	nd	70 [30]	22/80	7/16
	H20	tr(30)	nd	590	nd	80 [30]	31/85	8/17
	H21	tr(20)	nd	660	nd	70 [20]	24/90	8/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	tr(96)	200	530	nd	120 [40]	5/10	1/2
	H16	tr(64)	110	280	nd	98 [33]	5/10	1/2
	H17	tr(78)	130	460	nd	100 [34]	5/10	1/2
	H18	70	120	430	nd	70 [30]	5/10	1/2
	H19	tr(60)	100	300	nd	70 [30]	5/10	1/2
	H20	tr(70)	130	360	nd	80 [30]	5/10	1/2
	H21	tr(40)	80	210	nd	70 [20]	5/10	1/2


(注) : 平成 15 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

○ 平成 15～21 年度における大気についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	0.31	0.31	0.77	tr(0.17)	0.20 [0.066]	35/35	35/35
	H15 寒冷期	tr(0.17)	tr(0.17)	0.27	tr(0.091)		34/34	34/34
	H16 温暖期	0.27	0.26	0.46	tr(0.17)	0.20 [0.066]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	tr(0.15)	tr(0.15)	0.50	tr(0.094)		37/37	37/37
	H17 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.3 [0.1]	0/37	0/37
	H17 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H18 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.6]	0/37	0/37
	H18 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H19 温暖期	nd	nd	tr(0.3)	nd	0.6 [0.2]	18/36	18/36
	H19 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	H20 温暖期	tr(0.21)	0.22	0.58	tr(0.12)	0.22 [0.08]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	tr(0.11)	tr(0.12)	tr(0.20)	nd		36/37	36/37
	H21 温暖期	tr(0.18)	tr(0.19)	0.26	tr(0.11)	0.23 [0.09]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	tr(0.12)	tr(0.13)	0.27	nd		33/37	33/37
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	nd	nd	tr(0.37)	nd	0.81 [0.27]	2/35	2/35
	H15 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/34	0/34
	H16 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.2 [0.4]	0/37	0/37
	H16 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H17 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.6 [0.2]	0/37	0/37
	H17 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H18 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.5]	0/37	0/37
	H18 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H19 温暖期	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	nd	0.3 [0.1]	29/36	29/36
	H19 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	H20 温暖期	nd	nd	tr(0.19)	nd	0.25 [0.09]	15/37	15/37
	H20 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H21 温暖期	nd	nd	tr(0.1)	nd	0.3 [0.1]	11/37	11/37
	H21 寒冷期	nd	nd	tr(0.1)	nd		1/37	1/37
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.52]	0/35	0/35
	H15 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/34	0/34
	H16 温暖期	nd	nd	nd	nd	2.4 [0.81]	0/37	0/37
	H16 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H17 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.2 [0.4]	0/37	0/37
	H17 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H18 温暖期	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/37	0/37
	H18 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H19 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.5 [0.6]	0/36	0/36
	H19 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	H20 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.6]	0/37	0/37
	H20 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	H21 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.6]	0/37	0/37
	H21 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37

[9-1] Parlar-26



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-9-1-1 トキサフェン Parlar-26 の生物の経年変化 (幾何平均値)





図 7-9-1-2 トキサフェン Parlar-26 の大気の経年変化 (幾何平均値)


[9-2] Parlar-50



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-9-2 トキサフェン Parlar-50 の生物の経年変化 (幾何平均値)

[9-3] Parlar-62



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-9-3 トキサフェン Parlar-62 の生物の経年変化 (幾何平均値)

[10] マイレックス（参考）

・調査の経緯及び実施状況

マイレックスは、米国で開発された有機塩素系殺虫剤で、海外では難燃剤としても使用されている。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。平成 14 年 9 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 13 年度までの調査としては、「化学物質環境調査」¹⁾で、昭和 58 年度に水質及び底質を調査している。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を平成 15 年度から平成 21 年度まで毎年度実施している。

平成 22 年度以降のモニタリング調査では調査頻度を隔年とすることとし、平成 22 年度の調査としては実施していない。

以下に、参考として、平成 21 年度までの調査結果を示す。

・平成 21 年度までの調査結果

< 水質 >

○平成 15～21 年度における水質についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H15	tr(0.13)	tr(0.12)	0.8	nd	0.3 [0.09]	25/36	25/36
	H16	nd	nd	1.1	nd	0.4 [0.2]	18/38	18/38
	H17	nd	nd	1.0	nd	0.4 [0.1]	14/47	14/47
	H18	nd	nd	0.07	nd	1.6 [0.5]	1/48	1/48
	H19	nd	nd	tr(0.5)	nd	1.1 [0.4]	2/48	2/48
	H20	nd	nd	0.7	nd	0.6 [0.2]	4/48	4/48
	H21	nd	nd	0.5	nd	0.4 [0.2]	8/49	8/49

< 底質 >

○平成 15～21 年度における底質についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	2	tr(1.6)	1,500	nd	2 [0.4]	137/186	51/62
	H16	2	tr(1.6)	220	nd	2 [0.5]	153/189	55/63
	H17	1.8	1.2	5,300	nd	0.9 [0.3]	134/189	48/63
	H18	1.7	1.2	640	nd	0.6 [0.2]	156/192	57/64
	H19	1.5	0.9	200	nd	0.9 [0.3]	147/192	55/64
	H20	1.4	1.1	820	nd	0.7 [0.3]	117/192	48/64
	H21	1.4	1.3	620	nd	1.0 [0.4]	126/192	49/64

（注）：平成 15 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

○ 平成 15～21 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	4.9	4.2	19	tr(1.6)	2.4 [0.81]	30/30	6/6
	H16	4.4	4.3	12	tr(1.1)	2.5 [0.82]	31/31	7/7
	H17	5.4	5.2	20	tr(1.9)	3.0 [0.99]	31/31	7/7
	H18	5	4	19	tr(2)	3 [1]	31/31	7/7
	H19	5	4	18	tr(2)	3 [1]	31/31	7/7
	H20	4	tr(3)	18	tr(2)	4 [1]	31/31	7/7
	H21	5.9	5.2	21	tr(1.7)	2.1 [0.8]	31/31	7/7
魚類 (pg/g-wet)	H15	8.3	9.0	25	tr(1.7)	2.4 [0.81]	70/70	14/14
	H16	13	11	180	3.8	2.5 [0.82]	70/70	14/14
	H17	13	13	78	tr(1.0)	3.0 [0.99]	80/80	16/16
	H18	11	10	53	tr(2)	3 [1]	80/80	16/16
	H19	9	11	36	tr(1)	3 [1]	80/80	16/16
	H20	11	13	48	tr(1)	4 [1]	85/85	17/17
	H21	8.6	9.6	37	tr(0.9)	2.1 [0.8]	90/90	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	120	150	450	31	2.4 [0.81]	10/10	2/2
	H16	61	64	110	33	2.5 [0.82]	10/10	2/2
	H17	77	66	180	41	3.0 [0.99]	10/10	2/2
	H18	77	70	280	39	3 [1]	10/10	2/2
	H19	57	59	100	32	3 [1]	10/10	2/2
	H20	74	68	260	27	4 [1]	10/10	2/2
	H21	49	50	79	32	2.1 [0.8]	10/10	2/2


(注) : 平成 15 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

○ 平成 15～21 年度における大気についてのマイレックスの検出状況


マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H15 温暖期	0.11	0.12	0.19	0.047	0.0084	35/35	35/35
	H15 寒冷期	0.044	0.043	0.099	0.024	[0.0028]	34/34	34/34
	H16 温暖期	0.099	0.11	0.16	tr(0.042)	0.05 [0.017]	37/37	37/37
	H16 寒冷期	tr(0.046)	tr(0.047)	0.23	tr(0.019)		37/37	37/37
	H17 温暖期	tr(0.09)	tr(0.09)	0.24	tr(0.05)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	H17 寒冷期	tr(0.04)	tr(0.04)	tr(0.08)	nd		29/37	29/37
	H18 温暖期	tr(0.07)	tr(0.10)	0.22	nd	0.13 [0.04]	29/37	29/37
	H18 寒冷期	tr(0.07)	tr(0.07)	2.1	nd		27/37	27/37
	H19 温暖期	0.11	0.11	0.28	0.04	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	H19 寒冷期	0.04	0.04	0.09	tr(0.02)		36/36	36/36
	H20 温暖期	0.09	0.09	0.25	0.03	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	H20 寒冷期	0.05	0.04	0.08	0.03		37/37	37/37
	H21 温暖期	0.12	0.13	0.48	0.049	0.015 [0.006]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.058	0.054	0.18	0.030		37/37	37/37

[10] マイレックス



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-10-1 マイレックスの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-10-2 マイレックスの生物の経年変化 (幾何平均値)

[10] マイレックス




図 7-10-3 マイレックスの大気の経年変化 (幾何平均値)

[11] HCH 類

・調査の経緯及び実施状況

HCH 類は、農薬、殺虫剤及びシロアリ駆除剤等として使用された。昭和 46 年に農薬取締法に基づく登録が失効したが、その後もシロアリ駆除剤や木材処理剤として使われていた。平成 21 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議 (COP4) において、HCH 類のうち α -HCH、 β -HCH 及び γ -HCH (別名：リンデン) について条約対象物質とすることが採択され、平成 22 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

HCH 類には多くの異性体が存在するが、継続的調査においては α -体、 β -体、 γ -体及び δ -体の 4 種の異性体を調査対象物質として水質、底質、生物 (貝類、魚類及び鳥類) 並びに大気についてモニタリング調査を実施している。

平成 13 年度までの調査として「化学物質環境調査」¹⁾では、昭和 49 年度に水質、底質及び魚類について調査している。 α -体及び β -体については「水質・底質モニタリング」²⁾で水質は昭和 61 年度から平成 10 年度まで、底質は昭和 61 年度から平成 13 年度の全期間にわたって調査している。「生物モニタリング」³⁾では、昭和 53 年度から平成 8 年度までの毎年と平成 10 年度、平成 12 年度及び平成 13 年度に生物 (貝類、魚類及び鳥類) について調査している (γ -体は平成 9 年度以降、 δ -体は平成 5 年度以降未実施)。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、 α -体及び β -体の水質、底質及び生物 (貝類、魚類及び鳥類) については平成 14 年度から、 α -体及び β -体の大気並びに γ -体及び δ -体の水質、底質、生物 (貝類、魚類及び鳥類) 及び大気については平成 15 年度からそれぞれ毎年度実施している。

・調査結果

○ α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH (別名：リンデン) 及び δ -HCH

<水質>

α -HCH：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 1pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 14 ~ 1,400pg/L の範囲であった。

β -HCH：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 33 ~ 2,500pg/L の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、湖沼域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

γ -HCH (別名：リンデン)：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 2pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は μ (5) ~ 190pg/L の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、河川域、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

δ -HCH：水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 0.9 ~ 780pg/L の範囲であった。

○平成 14～22 年度における水質についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	86	76	6,500	1.9	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	H15	120	120	970	13	3 [0.9]	36/36	36/36
	H16	150	145	5,700	13	6 [2]	38/38	38/38
	H17	90	81	660	16	4 [1]	47/47	47/47
	H18	110	90	2,100	25	3 [1]	48/48	48/48
	H19	76	73	720	13	1.9 [0.6]	48/48	48/48
	H20	78	75	1,100	9	4 [2]	48/48	48/48
	H21	74	73	560	14	1.2 [0.4]	49/49	49/49
	H22	94	75	1,400	14	4 [1]	49/49	49/49
β -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H14	210	180	1,600	24	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	H15	250	240	1,700	14	3 [0.7]	36/36	36/36
	H16	260	250	3,400	31	4 [2]	38/38	38/38
	H17	200	170	2,300	25	2.6 [0.9]	47/47	47/47
	H18	200	160	2,000	42	1.7 [0.6]	48/48	48/48
	H19	170	150	1,300	18	2.7[0.9]	48/48	48/48
	H20	150	150	1,800	15	1.0 [0.4]	48/48	48/48
	H21	150	150	1,100	18	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	H22	180	160	2,500	33	2.0 [0.7]	49/49	49/49
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H15	92	90	370	32	7 [2]	36/36	36/36
	H16	91	76	8,200	21	20 [7]	38/38	38/38
	H17	48	40	250	tr(8)	14 [5]	47/47	47/47
	H18	44	43	460	tr(9)	18 [6]	48/48	48/48
	H19	34	32	290	5.2	2.1 [0.7]	48/48	48/48
	H20	34	32	340	4	3 [1]	48/48	48/48
	H21	32	26	280	5.1	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	H22	26	22	190	tr(5)	6 [2]	49/49	49/49
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H15	14	14	200	tr(1.1)	2 [0.5]	36/36	36/36
	H16	24	29	670	tr(1.4)	2 [0.7]	38/38	38/38
	H17	1.8	nd	62	nd	1.5 [0.5]	23/47	23/47
	H18	24	18	1,000	2.2	2.0 [0.8]	48/48	48/48
	H19	11	9.7	720	tr(0.7)	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	H20	11	10	1,900	tr(1.1)	2.3 [0.9]	48/48	48/48
	H21	10	11	450	tr(0.7)	0.9 [0.4]	49/49	49/49
	H22	16	17	780	0.9	0.8 [0.3]	49/49	49/49

(注) : 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<底質>

α -HCH：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.8pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 3.1～3,700pg/g-dry の範囲であった。

β -HCH：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.8pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 11～8,200pg/g-dry の範囲であった。平成 14 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、湖沼域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

γ -HCH (別名：リンデン)：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1.5)～2,300pg/g-dry の範囲であった。平成 15 年度から平成 22 年度における経年分析の結果、湖沼域の減少傾向が統計的に有意と判定された。

δ -HCH：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 1.3～3,800pg/g-dry の範囲であった。

○平成 14～22 年度における底質についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	150	170	8,200	2.0	1.2 [0.4]	189/189	63/63
	H15	160	170	9,500	2	2 [0.5]	186/186	62/62
	H16	160	180	5,700	tr(1.5)	2 [0.6]	189/189	63/63
	H17	140	160	7,000	3.4	1.7 [0.6]	189/189	63/63
	H18	140	160	4,300	tr(2)	5 [2]	192/192	64/64
	H19	140	150	12,000	tr(1.3)	1.8 [0.6]	192/192	64/64
	H20	140	190	5,200	nd	1.6 [0.6]	191/192	64/64
	H21	120	120	6,300	nd	1.1 [0.4]	191/192	64/64
	H22	140	140	3,700	3.1	2.0 [0.8]	64/64	64/64
β -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	230	230	11,000	3.9	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	H15	250	220	39,000	5	2 [0.7]	186/186	62/62
	H16	240	230	53,000	4	3 [0.8]	189/189	63/63
	H17	200	220	13,000	3.9	2.6 [0.9]	189/189	63/63
	H18	190	210	21,000	2.3	1.3 [0.4]	192/192	64/64
	H19	200	190	59,000	1.6	0.9 [0.3]	192/192	64/64
	H20	190	200	8,900	2.8	0.8 [0.3]	192/192	64/64
	H21	180	170	10,000	2.4	1.3 [0.5]	192/192	64/64
	H22	230	210	8,200	11	2.4 [0.8]	64/64	64/64
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	51	47	4,000	tr(1.4)	2 [0.4]	186/186	62/62
	H16	53	48	4,100	tr(0.8)	2 [0.5]	189/189	63/63
	H17	49	46	6,400	tr(1.8)	2.0 [0.7]	189/189	63/63
	H18	48	49	3,500	tr(1.4)	2.1 [0.7]	192/192	64/64
	H19	42	41	5,200	tr(0.6)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	H20	40	43	2,200	tr(0.7)	0.9 [0.4]	192/192	64/64
	H21	38	43	3,800	nd	0.6 [0.2]	191/192	64/64
	H22	35	30	2,300	tr(1.5)	2.0 [0.7]	64/64	64/64
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H15	42	46	5,400	nd	2 [0.7]	180/186	61/62
	H16	55	55	5,500	tr(0.5)	2 [0.5]	189/189	63/63
	H17	52	63	6,200	nd	1.0 [0.3]	188/189	63/63
	H18	45	47	6,000	nd	1.7 [0.6]	189/192	64/64
	H19	26	28	5,400	nd	5 [2]	165/192	60/64
	H20	41	53	3,300	nd	2 [1]	186/192	64/64
	H21	36	37	5,000	nd	1.2 [0.5]	190/192	64/64
	H22	39	40	3,800	1.3	1.2 [0.5]	64/64	64/64

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

α -HCH : 生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 13～730pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1)～250pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 160～430pg/g-wet の範囲であった。

β -HCH : 生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 27～1,500pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 5～760pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 910～2,800pg/g-wet の範囲であった。

γ -HCH（別名：リンデン）：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 5～150pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1)～56pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 4～23pg/g-wet の範囲であった。平成 15 年から平成 22 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

δ -HCH：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 870pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 18 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は 36pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 1pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 11～13pg/g-wet の範囲であった。

- 平成 14～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	67	64	1,100	12	4.2 [1.4]	38/38	8/8
	H15	45	30	610	9.9	1.8 [0.61]	30/30	6/6
	H16	56	25	1,800	tr(12)	13 [4.3]	31/31	7/7
	H17	38	25	1,100	tr(7.1)	11 [3.6]	31/31	7/7
	H18	30	21	390	6	3 [1]	31/31	7/7
	H19	31	17	1,400	8	7 [2]	31/31	7/7
	H20	26	16	380	7	6 [2]	31/31	7/7
	H21	45	21	2,200	9	5 [2]	31/31	7/7
	H22	35	20	730	13	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	57	56	590	tr(1.9)	4.2 [1.4]	70/70	14/14
	H15	43	58	590	2.6	1.8 [0.61]	70/70	14/14
	H16	57	55	2,900	nd	13 [4.3]	63/70	14/14
	H17	42	43	1,000	nd	11 [3.6]	75/80	16/16
	H18	44	53	360	tr(2)	3 [1]	80/80	16/16
	H19	39	40	730	tr(2)	7 [2]	80/80	16/16
	H20	36	47	410	nd	6 [2]	84/85	17/17
	H21	39	32	830	tr(2)	5 [2]	90/90	18/18
	H22	27	39	250	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	170	130	360	93	4.2 [1.4]	10/10	2/2
	H15	73	74	230	30	1.8 [0.61]	10/10	2/2
	H16	190	80	1,600	58	13 [4.3]	10/10	2/2
	H17	76	77	85	67	11 [3.6]	10/10	2/2
	H18	76	75	100	55	3 [1]	10/10	2/2
	H19	75	59	210	43	7 [2]	10/10	2/2
	H20	48	48	61	32	6 [2]	10/10	2/2
	H21	43	42	56	34	5 [2]	10/10	2/2
	H22	260	---	430	160	3 [1]	2/2	2/2

β -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	88	62	1,700	32	12 [4]	38/38	8/8
	H15	78	50	1,100	23	9.9 [3.3]	30/30	6/6
	H16	100	74	1,800	22	6.1 [2.0]	31/31	7/7
	H17	85	56	2,000	20	2.2 [0.75]	31/31	7/7
	H18	81	70	880	11	3 [1]	31/31	7/7
	H19	79	56	1,800	21	7 [3]	31/31	7/7
	H20	73	51	1,100	23	6 [2]	31/31	7/7
	H21	83	55	1,600	27	6 [2]	31/31	7/7
	H22	89	56	1,500	27	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	110	120	1,800	tr(5)	12 [4]	70/70	14/14
	H15	81	96	1,100	tr(3.5)	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	H16	110	140	1,100	tr(3.9)	6.1 [2.0]	70/70	14/14
	H17	95	110	1,300	6.7	2.2 [0.75]	80/80	16/16
	H18	89	110	1,100	4	3 [1]	80/80	16/16
	H19	110	120	810	7	7 [3]	80/80	16/16
	H20	94	150	750	tr(4)	6 [2]	85/85	17/17
	H21	98	130	970	tr(5)	6 [2]	90/90	18/18
	H22	81	110	760	5	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	3,000	3,000	7,300	1,600	12 [4]	10/10	2/2
	H15	3,400	3,900	5,900	1,800	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	H16	2,300	2,100	4,800	1,100	6.1 [2.0]	10/10	2/2
	H17	2,500	2,800	6,000	930	2.2 [0.75]	10/10	2/2
	H18	2,100	2,400	4,200	1,100	3 [1]	10/10	2/2
	H19	2,000	1,900	3,200	1,400	7 [3]	10/10	2/2
	H20	2,400	2,000	5,600	1,300	6 [2]	10/10	2/2
	H21	1,600	1,400	4,200	870	6 [2]	10/10	2/2
	H22	1,600	---	2,800	910	3 [1]	2/2	2/2
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	19	18	130	5.2	3.3 [1.1]	30/30	6/6
	H16	tr(24)	tr(16)	230	nd	31 [10]	28/31	7/7
	H17	23	13	370	tr(5.7)	8.4 [2.8]	31/31	7/7
	H18	18	12	140	7	4 [2]	31/31	7/7
	H19	16	10	450	tr(4)	9 [3]	31/31	7/7
	H20	12	10	98	tr(3)	9 [3]	31/31	7/7
	H21	14	12	89	tr(3)	7 [3]	31/31	7/7
	H22	14	9	150	5	3 [1]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H15	16	22	130	tr(1.7)	3.3 [1.1]	70/70	14/14
	H16	tr(28)	tr(24)	660	nd	31 [10]	55/70	11/14
	H17	17	17	230	nd	8.4 [2.8]	78/80	16/16
	H18	19	22	97	tr(2)	4 [2]	80/80	16/16
	H19	15	15	190	nd	9 [3]	71/80	15/16
	H20	13	16	96	nd	9 [3]	70/85	15/17
	H21	14	12	180	nd	7 [3]	81/90	17/18
	H22	9	13	56	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	14	19	40	3.7	3.3 [1.1]	10/10	2/2
	H16	64	tr(21)	1,200	tr(11)	31 [10]	10/10	2/2
	H17	18	20	32	9.6	8.4 [2.8]	10/10	2/2
	H18	16	17	29	8	4 [2]	10/10	2/2
	H19	21	14	140	tr(8)	9 [3]	10/10	2/2
	H20	12	14	19	tr(5)	9 [3]	10/10	2/2
	H21	11	11	21	tr(6)	7 [3]	10/10	2/2
	H22	10	---	23	4	3 [1]	2/2	2/2

δ -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H15	7.4	tr(2.6)	1,300	nd	3.9 [1.3]	29/30	6/6
	H16	6.3	tr(2.1)	1,500	nd	4.6 [1.5]	25/31	6/7
	H17	5.4	tr(2.1)	1,600	nd	5.1 [1.7]	23/31	6/7
	H18	6	tr(2)	890	tr(1)	3 [1]	31/31	7/7
	H19	4	nd	750	nd	4 [2]	12/31	4/7
	H20	tr(3)	nd	610	nd	6 [2]	7/31	3/7
	H21	tr(4)	nd	700	nd	5 [2]	14/31	4/7
	H22	4	tr(2)	870	nd	3 [1]	5/6	5/6
魚類 (pg/g-wet)	H15	tr(3.6)	4.0	16	nd	3.9 [1.3]	59/70	13/14
	H16	tr(4.2)	tr(3.5)	270	nd	4.6 [1.5]	54/70	11/14
	H17	tr(3.2)	tr(3.1)	32	nd	5.1 [1.7]	55/80	12/16
	H18	4	3	35	nd	3 [1]	72/80	16/16
	H19	tr(3)	tr(2)	31	nd	4 [2]	42/80	10/16
	H20	tr(4)	tr(3)	77	nd	6 [2]	54/85	12/17
	H21	tr(3)	tr(3)	18	nd	5 [2]	57/90	13/18
	H22	tr(2)	tr(2)	36	nd	3 [1]	13/18	13/18
鳥類 (pg/g-wet)	H15	19	18	31	12	3.9 [1.3]	10/10	2/2
	H16	30	14	260	6.4	4.6 [1.5]	10/10	2/2
	H17	16	15	30	10	5.1 [1.7]	10/10	2/2
	H18	13	12	21	9	3 [1]	10/10	2/2
	H19	12	10	22	4	4 [2]	10/10	2/2
	H20	9	8	31	tr(3)	6 [2]	10/10	2/2
	H21	5	6	9	tr(3)	5 [2]	10/10	2/2
	H22	12	---	13	11	3 [1]	2/2	2/2

(注) : 平成 14 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

α -HCH : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.47pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $14 \sim 280\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.47pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $6.8 \sim 410\text{pg/m}^3$ の範囲であった。

β -HCH : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.09pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.89 \sim 34\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.09pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $\text{tr}(0.26) \sim 29\text{pg/m}^3$ の範囲であった。

γ -HCH (別名: リンデン) : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.12pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $2.3 \sim 66\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.12pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $1.1 \sim 60\text{pg/m}^3$ の範囲であった。


δ -HCH : 大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.02pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.11 \sim 25\text{pg/m}^3$ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.02pg/m^3 において 37 地点全てで検出され、検出濃度は $0.05 \sim 22\text{pg/m}^3$ の範囲であった。

なお、HCH 類の大気については、平成 15 年度から平成 20 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

○平成 21～22 年度における大気についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況


α -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	58	58	340	19	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	21	18	400	7.8		37/37	37/37
	H22 温暖期	46	51	280	14	1.4 [0.47]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	19	16	410	6.8		37/37	37/37
β -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	5.6	5.6	28	0.96	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	1.8	1.8	24	0.31		37/37	37/37
	H22 温暖期	5.6	6.2	34	0.89	0.27 [0.09]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	1.7	1.7	29	tr(0.26)		37/37	37/37
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	17	19	65	2.9	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	5.6	4.6	55	1.5		37/37	37/37
	H22 温暖期	14	16	66	2.3	0.35 [0.12]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	4.8	4.4	60	1.1		37/37	37/37
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	1.3	1.3	21	0.09	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.36	0.33	20	0.04		37/37	37/37
	H22 温暖期	1.4	1.3	25	0.11	0.05 [0.02]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.38	0.35	22	0.05		37/37	37/37

[11-1] α -HCH




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-1-1 α -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-11-1-2 α -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-11-1-3 α -HCH の生物の経年変化（幾何平均値）

[11-2] β -HCH




(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-2-1 β -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成14年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-11-2-2 β -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



（注）平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-2-3 β -HCH の生物の経年変化（幾何平均値）


[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)



(注) 平成 14 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-3-1 γ -HCH (別名：リンデン) の水質の経年変化 (幾何平均値)


[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)



(注 1) γ -HCH (別名：リンデン) の底質については、継続的調査において平成 14 年度以前に調査が実施されていない。

(注 2) 平成 15 年度から平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


図 7-11-3-2 γ -HCH (別名：リンデン) の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成21年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-3-3 γ -HCH (別名：リンデン) の生物の経年変化 (幾何平均値)


[11-4] δ -HCH



(注) 平成14年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-4-1 δ -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)


[11-4] δ -HCH



(注1) δ -HCH の底質については、継続的調査において平成14年度以前に調査が実施されていない。

(注2) 平成15年度から平成21年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-4-2 δ -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 平成 21 年度以前は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-11-4-3 δ -HCH の生物の経年変化 (幾何平均値)

[12] クロルデコン

・調査の経緯及び実施状況

クロルデコンは、有機塩素系殺虫剤の一種である。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。平成 21 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議 (COP4) において、条約対象物質とすることが採択された。

平成 20 年度のモニタリング調査において、水質、底質及び生物 (貝類、魚類及び鳥類) の調査を実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 0.04pg/L において 49 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は 1.6pg/L までの範囲であった。

○平成 20 年度及び平成 22 年度における水質についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H20	nd	nd	0.76	nd	0.14 [0.05]	13/46	13/46
	H22	tr(0.04)	nd	1.6	nd	0.09 [0.04]	13/49	13/49

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/g-dry において 64 地点中 9 地点で検出され、検出濃度は 2.8pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 20 年度及び平成 22 年度における底質についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H20	nd	nd	5.8	nd	0.42 [0.16]	23/129	10/49
	H22	nd	nd	2.8	nd	0.4 [0.2]	9/64	9/64

(注) : 平成 20 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 2.3pg/g-wet において 6 地点全てで検出されなかった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 2.3pg/g-wet において 18 地点全てで検出されなかった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 2.3pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。

○平成 20 年度及び平成 22 年度における生物 (貝類、魚類及び鳥類) についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/31	0/7
	H22	nd	nd	nd	nd	5.9 [2.3]	0/6	0/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/85	0/17
	H22	nd	nd	nd	nd	5.9 [2.3]	0/18	0/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/10	0/2
	H22	nd	---	nd	nd	5.9 [2.3]	0/2	0/2

(注) : 平成 20 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.02pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.02pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

○ 平成 22 年度における大気についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.04 [0.02]	0/37	0/37
	H22 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37

[13] ヘキサブロモビフェニル類

・調査の経緯及び実施状況

ヘキサブロモビフェニル類は、プラスチック製品等の難燃剤として利用されていた。平成 21 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議（COP4）において条約対象物質とすることが採択され、平成 22 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 21 年度のモニタリング調査において、水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 1pg/L において 49 地点全てで検出されなかった。

○平成 21～22 年度における水質についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質	H21	nd	nd	nd	nd	5.7 [2.2]	0/49	0/49
(pg/L)	H22	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/49	0/49

（注）：平成 21 年度の定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.6pg/g-dry において 64 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 18pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 21～22 年度における底質についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質	H21	nd	nd	12	nd	1.1 [0.40]	45/190	21/64
(pg/g-dry)	H22	nd	nd	18	nd	1.5 [0.6]	10/64	10/64

（注 1）：平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）：平成 21 年度の定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 6 地点全てで検出されなかった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 18 地点全てで検出されなかった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。

○平成 21～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類	H21	nd	nd	tr(0.53)	nd	1.3 [0.43]	1/31	1/7
(pg/g-wet)	H22	nd	nd	nd	nd	24 [10]	0/6	0/6
魚類	H21	tr(0.49)	tr(0.43)	6.0	nd	1.3 [0.43]	46/90	12/18
(pg/g-wet)	H22	nd	nd	nd	nd	24 [10]	0/18	0/18
鳥類	H21	1.6	1.6	2.1	tr(1.2)	1.3 [0.43]	10/10	2/2
(pg/g-wet)	H22	nd	---	nd	nd	24 [10]	0/2	0/2

（注 1）：平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）：定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。
 寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

○平成 22 年度における大気についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.3 [0.1]	0/37	0/37
	H22 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37

[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）

・調査の経緯及び実施状況

ポリブロモジフェニルエーテル類は、プラスチック製品等の難燃剤として利用されていた。平成21年5月に開催されたPOPs条約の第4回条約締約国会議（COP4）において、ポリブロモジフェニルエーテル類のうちテトラブロモジフェニルエーテル類、ペンタブロモジフェニルエーテル類、ヘキサブロモジフェニルエーテル類及びヘプタブロモジフェニルエーテル類について条約対象物質とすることが採択され、平成22年4月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

モニタリング調査では、平成20年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、平成21年度に水質、底質及び大気の調査を実施している。

・調査結果

- テトラブロモジフェニルエーテル類、ペンタブロモジフェニルエーテル類、ヘキサブロモジフェニルエーテル類、ヘプタブロモジフェニルエーテル類、オクタブロモジフェニルエーテル類、ノナブロモジフェニルエーテル類及びデカブロモジフェニルエーテル

<水質>

テトラブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値3pg/Lにおいて49地点中17地点で検出され、検出濃度は390pg/Lまでの範囲であった。

ペンタブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値1pg/Lにおいて49地点中25地点で検出され、検出濃度は130pg/Lまでの範囲であった。

ヘキサブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値2pg/Lにおいて49地点中16地点で検出され、検出濃度は51pg/Lまでの範囲であった。

ヘプタブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値1pg/Lにおいて49地点中17地点で検出され、検出濃度は14pg/Lまでの範囲であった。

オクタブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値1pg/Lにおいて49地点中40地点で検出され、検出濃度は69pg/Lまでの範囲であった。

ノナブロモジフェニルエーテル類：水質については、49地点を調査し、検出下限値7pg/Lにおいて49地点中39地点で検出され、検出濃度は620pg/Lまでの範囲であった。

デカブロモジフェニルエーテル：水質については、49地点を調査し、検出下限値100pg/Lにおいて49地点中31地点で検出され、検出濃度は13,000pg/Lまでの範囲であった。

- 平成21～22年度における水質についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	17	16	160	nd	8 [3]	44/49	44/49
	H22	nd	nd	390	nd	9 [3]	17/49	17/49
ペンタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	11	12	87	nd	11 [4]	43/49	43/49
	H22	tr(1)	tr(1)	130	nd	3 [1]	25/49	25/49

ヘキサブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	tr(0.9)	tr(0.7)	18	nd	1.4 [0.6]	26/49	26/49
	H22	nd	nd	51	nd	4 [2]	16/49	16/49
ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	nd	nd	40	nd	4 [2]	9/49	9/49
	H22	nd	nd	14	nd	3 [1]	17/49	17/49
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	3.0	3.9	56	nd	1.4 [0.6]	37/49	37/49
	H22	tr(2)	tr(2)	69	nd	3 [1]	40/49	40/49
ノナブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	tr(46)	tr(38)	500	nd	91 [30]	32/49	32/49
	H22	tr(17)	tr(13)	620	nd	21 [7]	39/49	39/49
デカブロモジフェニルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H21	tr(310)	tr(220)	3,400	nd	600 [200]	26/49	26/49
	H22	tr(250)	tr(200)	13,000	nd	300 [100]	31/49	31/49

<底質>

テトラブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点中 57 地点で検出され、検出濃度は 910pg/g-dry までの範囲であった。

ペンタブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点中 58 地点で検出され、検出濃度は 740pg/g-dry までの範囲であった。

ヘキサブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点中 57 地点で検出され、検出濃度は 770pg/g-dry までの範囲であった。

ヘプタブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点中 58 地点で検出され、検出濃度は 930pg/g-dry までの範囲であった。

オクタブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 4pg/g-dry において 64 地点中 60 地点で検出され、検出濃度は 1,800pg/g-dry までの範囲であった。

ノナブロモジフェニルエーテル類：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 9pg/g-dry において 64 地点中 60 地点で検出され、検出濃度は 26,000pg/g-dry までの範囲であった。

デカブロモジフェニルエーテル：底質については、64 地点を調査し、検出下限値 80pg/g-dry において 64 地点中 60 地点で検出され、検出濃度は 700,000pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 21～22 年度における底質についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	tr(60)	tr(44)	1,400	nd	69 [23]	131/192	51/64
	H22	35	38	910	nd	6 [2]	57/64	57/64
ペンタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	36	24	1,700	nd	24 [8]	146/192	57/64
	H22	26	23	740	nd	5 [2]	58/64	58/64
ヘキサブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	21	21	2,600	nd	5 [2]	139/192	53/64
	H22	23	23	770	nd	4 [2]	57/64	57/64

ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	30	25	16,000	nd	9 [4]	125/192	51/64
	H22	28	18	930	nd	4 [2]	58/64	58/64
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	210	96	110,000	nd	1.2 [0.5]	182/192	63/64
	H22	71	76	1,800	nd	10 [4]	60/64	60/64
ノナブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	1,100	710	230,000	nd	9 [4]	181/192	64/64
	H22	360	430	26,000	nd	24 [9]	60/64	60/64
デカブロモジフェニルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	6,000	4,800	880,000	tr(30)	60 [20]	192/192	64/64
	H22	5,100	4,200	700,000	nd	220 [80]	60/64	60/64

(注) : 平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

テトラブロモジフェニルエーテル類:生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 16pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 310pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 16pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は tr(16) ~ 740pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 16pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 72 ~ 270pg/g-wet の範囲であった。

ペンタブロモジフェニルエーテル類:生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 6pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は tr(9) ~ 98pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 6pg/g-wet において 18 地点中 16 地点で検出され、検出濃度は 200pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 6pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 120 ~ 200pg/g-wet の範囲であった。

ヘキサブロモジフェニルエーテル類:生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 6 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 26pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 18 地点中 16 地点で検出され、検出濃度は 400pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 3pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 86 ~ 140pg/g-wet の範囲であった。

ヘプタブロモジフェニルエーテル類:生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 6 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は tr(10)pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 18 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 40pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 70pg/g-wet までの範囲であった。

オクタブロモジフェニルエーテル類:生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 4pg/g-wet において 6 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(10)pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 4pg/g-wet において 18 地点中 8 地点で検出され、検出濃度は 100pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 4pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 26 ~ 65pg/g-wet の範囲であった。

ノナプロモジフェニルエーテル類：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 60pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 18 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 40pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 10pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は tr(20)～50pg/g-wet の範囲であった。

デカプロモジフェニルエーテル：生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 97pg/g-wet において 6 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(190)pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 97pg/g-wet において 18 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(150)pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 97pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。

○平成 20 年度及び平成 22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのポリプロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラプロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	73	61	380	20	5.9 [2.2]	31/31	7/7
	H22	59	73	310	nd	43 [16]	5/6	5/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	120	110	1,300	9.8	5.9 [2.2]	85/85	17/17
	H22	160	170	740	tr(16)	43 [16]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	170	190	1,200	32	5.9 [2.2]	10/10	2/2
	H22	140	---	270	72	43 [16]	2/2	2/2
ペンタプロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	32	27	94	tr(11)	16 [5.9]	31/31	7/7
	H22	32	37	98	tr(9)	14 [6]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	30	37	280	nd	16 [5.9]	72/85	16/17
	H22	51	54	200	nd	14 [6]	16/18	16/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	150	130	440	52	16 [5.9]	10/10	2/2
	H22	150	---	200	120	14 [6]	2/2	2/2
ヘキサプロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	19	16	82	tr(5.3)	14 [5.0]	31/31	7/7
	H22	8	16	26	nd	8 [3]	4/6	4/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	46	51	310	nd	14 [5.0]	83/85	17/17
	H22	39	47	400	nd	8 [3]	16/18	16/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	140	120	380	62	14 [5.0]	10/10	2/2
	H22	110	---	140	86	8 [3]	2/2	2/2
ヘプタプロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	tr(8.5)	tr(7.6)	35	nd	18 [6.7]	20/31	7/7
	H22	nd	nd	tr(10)	nd	30 [10]	1/6	1/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	tr(11)	tr(8.1)	77	nd	18 [6.7]	44/85	10/17
	H22	nd	nd	40	nd	30 [10]	4/18	4/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	35	35	53	19	18 [6.7]	10/10	2/2
	H22	tr(19)	---	70	nd	30 [10]	1/2	1/2
オクタプロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	10	nd	9.6 [3.6]	15/31	6/7
	H22	nd	nd	tr(10)	nd	11 [4]	2/6	2/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	tr(5.7)	nd	73	nd	9.6 [3.6]	35/85	7/17
	H22	tr(6)	nd	100	nd	11 [4]	8/18	8/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	42	41	64	30	9.6 [3.6]	10/10	2/2
	H22	41	---	65	26	11 [4]	2/2	2/2

ノナブロモジフェニ ルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	tr(23)	nd	35 [13]	5/31	1/7
	H22	tr(16)	tr(15)	60	nd	30 [10]	5/6	5/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	tr(15)	nd	35 [13]	2/85	2/17
	H22	nd	nd	40	nd	30 [10]	3/18	3/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	tr(21)	tr(20)	tr(33)	nd	35 [13]	9/10	2/2
	H22	32	---	50	tr(20)	30 [10]	2/2	2/2
デカブロモジフェニ ルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	tr(170)	nd	220 [74]	8/31	3/7
	H22	nd	nd	tr(190)	nd	270 [97]	2/6	2/6
魚類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	230	nd	220 [74]	5/76	4/16
	H22	nd	nd	tr(150)	nd	270 [97]	2/18	2/18
鳥類 (pg/g-wet)	H20	nd	nd	tr(110)	nd	220 [74]	4/10	1/2
	H22	nd	---	nd	nd	270 [97]	0/2	0/2

(注) : 平成 20 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

テトラブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 0.15～50pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.09)～25pg/m³ の範囲であった。

ペンタブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点中 35 地点で検出され、検出濃度は 45pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.05pg/m³ において 37 地点中 34 地点で検出され、検出濃度は 28pg/m³ までの範囲であった。

ヘキサブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点中 29 地点で検出され、検出濃度は 4.9pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点中 31 地点で検出され、検出濃度は 5.4pg/m³ までの範囲であった。

ヘプタブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点中 24 地点で検出され、検出濃度は 1.4pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点中 28 地点で検出され、検出濃度は 11pg/m³ までの範囲であった。

オクタブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点中 30 地点で検出され、検出濃度は 2.3pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.06pg/m³ において 37 地点中 32 地点で検出され、検出濃度は 6.9pg/m³ までの範囲であった。

ノナブロモジフェニルエーテル類：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 1.2pg/m³ において 37 地点中 12 地点で検出され、検出濃度は 24pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 1.2pg/m³ において 37 地点中 22 地点で検出され、検出濃度は 7.1pg/m³ までの範囲であった。

デカブロモジフェニルエーテル：大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 9.1pg/m³ において 37 地点中 10 地点で検出され、検出濃度は 290pg/m³ までの範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 9.1pg/m³ において 37 地点中 21 地点で検出され、検出濃度は 88pg/m³ までの範囲であった。

- 平成 21～22 年度における大気についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	0.89	0.80	18	0.11	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	H21 寒冷期	0.40	0.37	7.1	tr(0.04)		37/37	37/37
	H22 温暖期	0.79	0.57	50	0.15	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	0.40	0.35	25	tr(0.09)		37/37	37/37
ペンタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	0.20	0.19	18	nd	0.16 [0.06]	33/37	33/37
	H21 寒冷期	0.19	0.16	10	nd		29/37	29/37
	H22 温暖期	0.20	0.17	45	nd	0.12 [0.05]	35/37	35/37
	H22 寒冷期	0.20	0.22	28	nd		34/37	34/37
ヘキサブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	tr(0.11)	tr(0.11)	2.0	nd	0.22 [0.09]	19/37	19/37
	H21 寒冷期	tr(0.20)	0.22	27	nd		24/37	24/37
	H22 温暖期	tr(0.14)	tr(0.13)	4.9	nd	0.16 [0.06]	29/37	29/37
	H22 寒冷期	0.24	0.27	5.4	nd		31/37	31/37
ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	tr(0.1)	nd	1.7	nd	0.3 [0.1]	17/37	17/37
	H21 寒冷期	tr(0.2)	0.3	20	nd		25/37	25/37
	H22 温暖期	tr(0.2)	tr(0.1)	1.4	nd	0.3 [0.1]	24/37	24/37
	H22 寒冷期	0.3	0.4	11	nd		28/37	28/37
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	tr(0.2)	0.3	1.6	nd	0.3 [0.1]	23/37	23/37
	H21 寒冷期	0.3	0.4	7.1	nd		26/37	26/37
	H22 温暖期	0.25	0.30	2.3	nd	0.15 [0.06]	30/37	30/37
	H22 寒冷期	0.40	0.52	6.9	nd		32/37	32/37
ノナブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	tr(0.7)	tr(0.7)	3.0	nd	1.8 [0.6]	22/37	22/37
	H21 寒冷期	tr(1.0)	tr(0.8)	3.9	nd		27/37	27/37
	H22 温暖期	nd	nd	24	nd	3.7 [1.2]	12/37	12/37
	H22 寒冷期	tr(1.2)	tr(1.3)	7.1	nd		22/37	22/37
デカブロモジフェニルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H21 温暖期	tr(7)	tr(9)	31	nd	16 [5]	28/37	28/37
	H21 寒冷期	tr(10)	tr(11)	45	nd		29/37	29/37
	H22 温暖期	nd	nd	290	nd	27 [9.1]	10/37	10/37
	H22 寒冷期	tr(11)	tr(12)	88	nd		21/37	21/37

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)

・調査の経緯及び実施状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) は、撥水撥油剤及び界面活性剤等として利用されている。平成 21 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議 (COP4) において、条約対象物質とすることが採択され、平成 22 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

平成 21 年度のモニタリング調査において、水質、底質及び生物 (貝類、魚類及び鳥類) の調査を実施している。

なお、平成 21 年度におけるペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の調査は、直鎖のオクチル基を有する *n*-ペルフルオロオクタンスルホン酸を分析対象としている。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 20pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は tr(37) ~ 230,000pg/L の範囲であった。

○平成 21 ~ 22 年度における水質についてのペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質	H21	730	580	14,000	tr(26)	37 [14]	49/49	49/49
(pg/L)	H22	490	380	230,000	tr(37)	50 [20]	49/49	49/49

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 2pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は tr(3) ~ 1,700pg/g-dry の範囲であった。

○平成 21 ~ 22 年度における底質についてのペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質	H21	78	97	1,900	nd	9.6 [3.7]	180/190	64/64
(pg/g-dry)	H22	82	100	1,700	tr(3)	5 [2]	64/64	64/64

(注) : 平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 9.6pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 680pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 9.6pg/g-wet において 18 地点中 17 地点で検出され、検出濃度は 15,000pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 9.6pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 580 ~ 3,000pg/g-wet の範囲であった。

- 平成 21～22 年度における生物(貝類、魚類及び鳥類)についてのペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類	H21	24	28	640	nd	19 [7.4]	17/31	5/7
(pg/g-wet)	H22	72	85	680	nd	25 [9.6]	5/6	5/6
魚類	H21	220	230	15,000	nd	19 [7.4]	83/90	17/18
(pg/g-wet)	H22	390	480	15,000	nd	25 [9.6]	17/18	17/18
鳥類	H21	300	360	890	37	19 [7.4]	10/10	2/2
(pg/g-wet)	H22	1,300	---	3,000	580	25 [9.6]	2/2	2/2

(注) : 平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 1.6～14pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.1pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 1.4～15pg/m³ の範囲であった。

- 平成 22 年度における大気についてのペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気	H22 温暖期	5.2	5.9	14	1.6	0.4 [0.1]	37/37	37/37
(pg/m ³)	H22 寒冷期	4.7	4.4	15	1.4		37/37	37/37

[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)

・調査の経緯及び実施状況

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) は、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) と同様、撥水撥油剤及び界面活性剤等として利用されている。

化学物質環境実態調査の初期環境調査又は暴露量調査においては平成 14 年度、平成 15 年度、平成 16 年度及び平成 17 年度に調査を実施し、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) と同程度かそれ以上の濃度で検出されており、モニタリング調査においてペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の調査に併せ調査を実施することとした。

平成 21 年度のモニタリング調査において、水質、底質及び生物 (貝類、魚類及び鳥類) の調査を実施している。なお、平成 21 年度におけるペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の調査は、直鎖のオクチル基を有する *n*-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、生物では、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 20pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は 190 ~ 23,000pg/L の範囲であった。

○平成 21 ~ 22 年度における水質についてのペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の検出状況

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H21	1,600	1,300	31,000	250	59 [23]	49/49	49/49
	H22	2,700	2,400	23,000	190	60 [20]	49/49	49/49

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 5pg/g-dry において 64 地点中 62 地点で検出され、検出濃度は 180pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 21 ~ 22 年度における底質についてのペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の検出状況

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H21	27	24	500	nd	8.3 [3.3]	182/190	64/64
	H22	28	33	180	nd	12 [5]	62/64	62/64

(注) : 平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 9.9pg/g-wet において 6 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 76pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 9.9pg/g-wet において 18 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は 95pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 9.9pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 30 ~ 48pg/g-wet の範囲であった。

- 平成 21～22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H21	tr(20)	tr(21)	94	nd	25 [9.9]	27/31	7/7
	H22	28	33	76	nd	26 [9.9]	5/6	5/6
魚類 (pg/g-wet)	H21	tr(23)	tr(19)	490	nd	25 [9.9]	74/90	17/18
	H22	tr(13)	tr(11)	95	nd	26 [9.9]	13/18	13/18
鳥類 (pg/g-wet)	H21	32	29	58	tr(16)	25 [9.9]	10/10	2/2
	H22	38	---	48	30	26 [9.9]	2/2	2/2

（注）：平成 21 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 4.0～210pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.2pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 2.4～130pg/m³ の範囲であった。

- 平成 22 年度における大気についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22 温暖期	25	26	210	4.0	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	14	14	130	2.4		37/37	37/37

[17] ペンタクロロベンゼン

・調査の経緯及び実施状況

ペンタクロロベンゼンは、難燃剤としての用途がある。また、農薬としての用途があるが、日本では農薬登録されたことはない。農薬製造時の副生成物質でもある他、燃焼に伴い非意図的にも生成する。平成 21 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議（COP4）において、条約対象物質とすることが採択され、平成 22 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

モニタリング調査では、平成 19 年度に全媒体の調査を、平成 21 年度に大気の調査を実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 1pg/L において 49 地点全てで検出され、検出濃度は tr(1) ~ 100pg/L の範囲であった。

○平成 19 年度及び平成 22 年度における水質についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H19	nd	nd	nd	nd	3,300 [1,300]	0/48	0/48
	H22	8	5	100	tr(1)	4 [1]	49/49	49/49

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 0.3pg/g-dry において 64 地点全てで検出され、検出濃度は 1.0 ~ 4,200pg/g-dry の範囲であった。

○平成 19 年度及び平成 22 年度における底質についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H19	tr(46)	nd	2,400	nd	86 [33]	79/19	35/64
	H22	90	95	4,200	1.0	0.9 [0.3]	64/64	64/64

（注）：平成 19 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 5.9 ~ 110pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は 5.6 ~ 230pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.7pg/g-wet において 2 地点全てで検出され、検出濃度は 49 ~ 170pg/g-wet の範囲であった。

- 平成 19 年度及び平成 22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H19	nd	nd	tr(150)	nd	180 [61]	1/31	1/7
	H22	18	16	110	5.9	1.9 [0.7]	6/6	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H19	nd	nd	480	nd	180 [61]	36/80	10/16
	H22	42	37	230	5.6	1.9 [0.7]	18/18	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H19	tr(140)	tr(140)	210	tr(89)	180 [61]	10/10	2/2
	H22	91	---	170	49	1.9 [0.7]	2/2	2/2

（注）：平成 19 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

< 大気 >

大気の温暖期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 36～140pg/m³ の範囲であった。寒冷期については、37 地点を調査し、検出下限値 0.5pg/m³ において 37 地点全てで検出され、検出濃度は 37～180pg/m³ の範囲であった。

- 平成 19 年度及び平成 21～22 年度における大気についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H19 温暖期	85	83	310	18	12 [4.8]	78/78	26/26
	H19 寒冷期	60	55	220	27		75/75	25/25
	H21 温暖期	63	64	210	20	6.4 [2.5]	111/111	37/37
	H21 寒冷期	25	22	120	tr(5.0)		111/111	37/37
	H22 温暖期	68	73	140	36	1.2 [0.5]	37/37	37/37
	H22 寒冷期	70	69	180	37		37/37	37/37




図 7-17-4 ペンタクロロベンゼンの大気の経年変化 (幾何平均値)

[18] *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類

・調査の経緯及び実施状況

N,N'-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類は、ゴムの老化防止剤及びスチレンブタジエンゴムの原料等として利用されている。*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類のうち、*N,N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン及び *N,N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミンが、*N*-トリル-*N'*-キシリル-*p*-フェニレンジアミンとともに平成 12 年 12 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。*N,N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン及び *N,N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミンについては、現在、国内における製造、輸入及び使用の実績がないが、高濃縮性物質であることから、環境中の存在状況を把握することが重要であるとされた。

平成 20 年度のモニタリング調査において、水質の調査を実施している。

・調査結果

○ *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン、*N,N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン及び *N,N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン

<大気>

N,N'-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン：大気については、37 地点を調査し、検出下限値 0.34pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

N,N'-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン：大気については、37 地点を調査し、検出下限値 0.51pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

N,N'-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン：大気については、37 地点を調査し、検出下限値 0.34pg/m³ において 37 地点全てで検出されなかった。

○ 平成 22 年度における大気についての *N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類の検出状況

<i>N,N'</i> -ジフェニル- <i>p</i> - フェニレンジアミン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22	nd	nd	nd	nd	1.4 [0.34]	0/114	0/37
<i>N,N'</i> -ジトリル- <i>p</i> - フェニレンジアミン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22	nd	nd	nd	nd	1.5 [0.51]	0/114	0/37
<i>N,N'</i> -ジキシリル- <i>p</i> - フェニレンジアミン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	H22	nd	nd	nd	nd	1.4 [0.34]	0/114	0/37

[19] トリブチルスズ化合物

・調査の経緯及び実施状況

トリブチルスズ化合物は、船底防汚塗料及び漁網防汚剤として利用されていた。トリブチルスズ化合物である 13 物質が、昭和 63 年度に化審法に基づく指定化学物質（現在の第二種特定化学物質）に指定された。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、平成 14 年度及び平成 15 年度に底質及び生物の調査を、平成 17 年度に水質、底質及び生物の調査を実施している。

・調査結果

< 水質 >

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 100pg/L において 49 地点中 12 地点で検出され、検出濃度は 1,600pg/L までの範囲であった。

○平成 17 年度及び平成 22 年度における水質についてのトリブチルスズ化合物の検出状況

トリブチルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	H17	nd	nd	760	nd	300 [100]	2/47	2/47
	H22	nd	nd	1,600	nd	200 [100]	12/49	12/49

< 底質 >

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 80pg/g-dry において 64 地点中 53 地点で検出され、検出濃度は 1,300,000pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 14～15 年度、平成 17 年度及び平成 22 年度における底質についてのトリブチルスズ化合物の検出状況

トリブチルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	5,200	4,000	390,000	nd	3,600 [1,200]	126/189	48/63
	H15	3,300	4,400	450,000	nd	1,200 [400]	127/186	46/62
	H17	2,300	4,500	590,000	nd	200 [80]	143/189	52/63
	H22	2,500	3,400	1,300,000	nd	160 [80]	148/192	53/64

（注）：各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


< 生物 >

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 160pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 1,600～30,000pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 160pg/g-wet において 18 地点中 17 地点で検出され、検出濃度は 23,000pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 160pg/g-wet において 2 地点全てで検出されなかった。

○平成 14～15 年度、平成 17 年度及び平成 22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのトリブチルスズ化合物の検出状況


トリブチルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	12,000	12,000	57,000	tr(2,000)	3,000 [1,000]	38/38	8/8
	H15	10,000	12,000	25,000	tr(2,000)	3,000 [1,000]	30/30	6/6
	H17	6,400	7,00	25,000	tr(1,500)	3,000 [1,000]	31/31	7/7
	H22	6,400	6,000	30,000	1,600	420 [160]	16/16	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	8,000	6,000	500,000	nd	3,000 [1,000]	55/70	13/14
	H15	8,000	6,000	72,000	nd	3,000 [1,000]	63/70	13/14
	H17	3,300	4,200	130,000	nd	3,000 [1,000]	49/80	11/16
	H22	1,100	760	23,000	nd	420 [160]	49/54	17/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	nd	nd	nd	nd	3,000 [1,000]	0/10	0/2
	H15	nd	nd	tr(1,000)	nd	3,000 [1,000]	1/10	1/2
	H17	nd	nd	nd	nd	3,000 [1,000]	0/10	0/2
	H22	nd	nd	nd	nd	420 [160]	0/6	0/2

（注）：各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。



(注) 各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-19-1 トリブチルスズ化合物の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-19-2 トリブチルスズ化合物の生物の経年変化 (幾何平均値)

[20] トリフェニルスズ化合物

・調査の経緯及び実施状況

トリフェニルスズ化合物は、トリブチルスズ化合物と同様、船底防汚塗料及び漁網防汚剤として利用されていた。トリフェニルスズ化合物である 7 物質が、昭和 63 年度に化審法に基づく指定化学物質（現在の第二種特定化学物質）に指定された。

平成 14 年度以降のモニタリング調査では、平成 14 年度及び平成 15 年度に底質及び生物の調査を、平成 17 年度に水質、底質及び生物の調査を実施している。

・調査結果

<水質>

水質については、49 地点を調査し、検出下限値 50pg/L において 49 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 250pg/L までの範囲であった。

○平成 17 年度及び平成 22 年度における水質についてのトリフェニルスズ化合物の検出状況

トリフェニルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	H17	nd	nd	190	nd	130 [50]	2/47	2/47
	H22	nd	nd	250	nd	120 [50]	4/49	4/49

<底質>

底質については、64 地点を調査し、検出下限値 30pg/g-dry において 64 地点中 42 地点で検出され、検出濃度は 210,000pg/g-dry までの範囲であった。

○平成 14～15 年度、平成 17 年度及び平成 22 年度における底質についてのトリフェニルスズ化合物の検出状況

トリフェニルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	H14	tr(720)	nd	490	nd	1,600 [550]	76/189	30/63
	H15	300	tr(160)	540	nd	280 [90]	96/186	37/62
	H17	210	120	420	nd	70 [30]	104/189	39/63
	H22	290	190	210,000	nd	70 [30]	106/192	42/64

（注）：各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


<生物>

生物のうち貝類については、6 地点を調査し、検出下限値 110pg/g-wet において 6 地点全てで検出され、検出濃度は 490～6,500pg/g-wet の範囲であった。魚類については、18 地点を調査し、検出下限値 110pg/g-wet において 18 地点全てで検出され、検出濃度は tr(140)～14,000pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 110pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は tr(120)pg/g-wet までの範囲であった。

○平成 14～15 年度、平成 17 年度及び平成 22 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのトリフェニルスズ化合物の検出状況


トリフェニルスズ化合物	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	H14	2,300	4,500	25,000	nd	1,500 [500]	31/38	7/8
	H15	3,000	3,600	27,000	nd	1,500 [500]	26/30	6/6
	H17	2,900	2,900	15,000	tr(600)	1,500 [500]	31/31	7/7
	H22	1,700	1,500	6,500	490	270 [110]	16/16	6/6
魚類 (pg/g-wet)	H14	8,500	7,900	520,000	nd	1,500 [500]	69/70	14/14
	H15	5,600	5,400	30,000	nd	1,500 [500]	68/70	14/14
	H17	4,200	4,900	34,000	nd	1,500 [500]	76/80	16/16
	H22	2,300	3,100	14,000	tr(140)	270 [110]	54/54	18/18
鳥類 (pg/g-wet)	H14	nd	nd	nd	nd	1,500 [500]	0/10	0/2
	H15	nd	nd	nd	nd	1,500 [500]	0/10	0/2
	H17	nd	nd	tr(500)	nd	1,500 [500]	1/10	1/2
	H22	nd	nd	tr(120)	nd	270 [110]	1/6	1/2

（注）：各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。



(注) 各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-20-1 トリフェニルスズの底質の経年変化 (幾何平均値)



(注) 各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 7-20-2 トリフェニルスズ化合物の生物の経年変化 (幾何平均値)

● 参考文献（全物質共通）

- i) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」水質・底質モニタリング調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- ii) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」生物モニタリング調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- iii) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- iv) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」化学物質環境調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)

