## [6-1] p,p'-DDT·生物(単位:pg/g-wet)

調査年度: 2013

検出頻度(地点ベース):26/26(欠測等:0) 検出頻度(検体ベース): 26/26(欠測等:0)

検出下限値:1.1 定量下限值:3.3

|       | 集計値   |
|-------|-------|
| 幾何平均值 | 210   |
| 中央値   | 220   |
| 最大値   | 3,300 |
| 最小値   | 4.3   |

|             | 貝類  | 魚類    | 鳥類  |
|-------------|-----|-------|-----|
| 検出頻度(地点ベース) | 5/5 | 19/19 | 2/2 |
| 検出頻度(検体ベース) | 5/5 | 19/19 | 2/2 |
| 幾何平均値       | 190 | 280   | 14  |
| 中央値         | 210 | 250   | 25  |
| 最大値         | 890 | 3,300 | 46  |
| 最小値         | 46  | 5.2   | 4.3 |

|    | 地方公共団体 | 地点<br>番号 | 調査地点          | 生物種        | 測定値   |
|----|--------|----------|---------------|------------|-------|
| 貝類 | 岩手県    | 1        | 山田湾           | ムラサキイガイ    | 46    |
|    | 横浜市    | 2        | 横浜港           | ムラサキイガイ    | 890   |
|    | 石川県    | 3        | 能登半島沿岸        | ムラサキイガイ    | 66    |
|    | 島根県    | 4        | 島根半島沿岸七類湾     | ムラサキイガイ    | 210   |
|    | 北九州市   | 5        | 洞海湾           | ムラサキイガイ    | 450   |
| 魚類 | 北海道    | 1        | 釧路沖           | ウサギアイナメ    | 110   |
|    |        | 2        | 釧路沖           | シロザケ       | 84    |
|    |        | 3        | 日本海沖(岩内沖)     | アイナメ       | 1,700 |
|    | 岩手県    | 4        | 山田湾           | アイナメ       | 500   |
|    | 宮城県    | 5        | 仙台湾(松島湾)      | アイナメ       | 120   |
|    | 茨城県    | 6        | 常磐沖           | サンマ        | 250   |
|    | 東京都    | 7        | 東京湾           | スズキ        | 800   |
|    | 川崎市    | 8        | 川崎港扇島沖        | スズキ        | 290   |
|    | 名古屋市   | 9        | 名古屋港          | ボラ         | 260   |
|    | 滋賀県    | 10       | 琵琶湖安曇川 (高島市)  | ウグイ        | 5.2   |
|    | 大阪府    | 11       | 大阪湾           | スズキ        | 1,300 |
|    | 兵庫県    | 12       | 姫路沖           | スズキ        | 1,000 |
|    | 鳥取県    | 13       | 中海            | スズキ        | 110   |
|    | 広島市    | 14       | 広島湾           | スズキ        | 220   |
|    | 香川県    | 15       | 高松港           | ボラ         | 3,300 |
|    | 高知県    | 16       | 四万十川河口(四万十市)  | スズキ        | 180   |
|    | 大分県    | 17       | 大分川河口 (大分市)   | スズキ        | 1,100 |
|    | 鹿児島県   | 18       | 薩摩半島西岸        | スズキ        | 150   |
|    | 沖縄県    | 19       | 中城湾           | ミナミクロダイ    | 170   |
| 鳥類 | 滋賀県    | 1        | 琵琶湖北湖 (竹生島沖)  | カワウ        | 46    |
|    | 鳥取県    | 2        | 天神川(倉吉市)      | カワウ        | 4.3   |
|    | 山梨県    | 参考       | 笛吹川下曽根橋 (甲府市) | カワウの卵(卵黄)  | 3,500 |
|    |        | 値        |               | カワウの卵 (卵白) | 23    |

<sup>「</sup>検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠則等は除く)を、

<sup>「</sup>検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠則等は除く)をそれぞれ意味する。(注2)検出下限値以上を検出とした。