

[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）・生物(単位：pg/g-wet)

調査年度：2019

検出頻度（地点ベース）：12/20(欠測等：0)

検出頻度（検体ベース）：12/20(欠測等：0)

検出下限値：※120

定量下限値：※330

	集計値
幾何平均値	tr(150)
中央値	tr(140)
最大値	1,400
最小値	nd

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度（地点ベース）	1/3	10/16	1/1
検出頻度（検体ベース）	1/3	10/16	1/1
幾何平均値	nd	tr(140)	---
中央値	nd	tr(140)	---
最大値	410	670	1,400
最小値	nd	nd	1,400

	地方公共団体	地点番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	nd
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	410
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	nd
魚類	北海道	1	釧路沖	ウサギアイナメ	nd
	岩手県	2	山田湾	アイナメ	tr(140)
	宮城県	3	仙台湾（松島湾）	アイナメ	nd
	茨城県	4	常磐沖	マサバ	tr(140)
	東京都	5	東京湾	スズキ	tr(270)
	川崎市	6	川崎港扇島沖	スズキ	tr(130)
	名古屋市	7	名古屋港	ボラ	tr(150)
	滋賀県	8	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	470
	大阪府	9	大阪湾	スズキ	390
	兵庫県	10	姫路沖	スズキ	tr(270)
	鳥取県	11	中海	スズキ	nd
	広島市	12	広島湾	スズキ	tr(180)
	高知県	13	四万十川河口（四万十市）	スズキ	nd
	大分県	14	大分川河口（大分市）	スズキ	670
	鹿児島県	15	薩摩半島西岸	スズキ	nd
	沖縄県	16	中城湾	ミナミクロダイ	nd
鳥類	鳥取県	1	天神川（倉吉市）	カワウ	1,400
	山梨県	参考値	笛吹川下曾根橋下流左岸（甲府市）	カワウの卵（卵黄）	88,000
				カワウの卵（卵白）	nd
	兵庫県	参考値	昆陽池（伊丹市）	カワウの卵（卵黄）	94,000
				カワウの卵（卵白）	nd

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 検出下限値以上を検出とした。

(注3) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

(注4) 「nd」は不検出を意味する。

(注5) ※定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。