

[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105) ・生物 (単位 : pg/g-wet)

調査年度 : 2020

検出頻度 (地点ベース) : 22/22(欠測等 : 0)

検出頻度 (検体ベース) : 22/22(欠測等 : 0)

検出下限値 : 0.7

定量下限値 : 1.9

| | 集計値 |
|-------|-------|
| 幾何平均値 | 110 |
| 中央値 | 120 |
| 最大値 | 3,200 |
| 最小値 | 5.1 |

| | 貝類 | 魚類 | 鳥類 |
|--------------|-----|-------|-------|
| 検出頻度 (地点ベース) | 3/3 | 18/18 | 1/1 |
| 検出頻度 (検体ベース) | 3/3 | 18/18 | 1/1 |
| 幾何平均値 | 22 | 120 | --- |
| 中央値 | 13 | 120 | --- |
| 最大値 | 160 | 910 | 3,200 |
| 最小値 | 5.1 | 14 | 3,200 |

| | 地方公共団体 | 地点番号 | 調査地点 | 生物種 | 測定値 |
|----|--------|------|---------------|------------|---------|
| 貝類 | 岩手県 | 1 | 山田湾 | ムラサキイガイ | 13 |
| | 横浜市 | 2 | 横浜港 | ミドリイガイ | 160 |
| | 石川県 | 3 | 能登半島沿岸 | ムラサキイガイ | 5.1 |
| 魚類 | 北海道 | 1 | 釧路沖 | ウサギアイナメ | 29 |
| | | 2 | | シロサケ | 25 |
| | 岩手県 | 3 | 山田湾 | アイナメ | 210 |
| | 宮城県 | 4 | 仙台湾 (松島湾) | アイナメ | 110 |
| | 茨城県 | 5 | 常磐沖 | マサバ | 49 |
| | 東京都 | 6 | 東京湾 | スズキ | 550 |
| | 川崎市 | 7 | 川崎港扇島沖 | スズキ | 570 |
| | 名古屋市 | 8 | 名古屋港 | ボラ | 130 |
| | 滋賀県 | 9 | 琵琶湖安曇川 (高島市) | ウグイ | 340 |
| | 大阪府 | 10 | 大阪湾 | スズキ | 910 |
| | 兵庫県 | 11 | 姫路沖 | スズキ | 480 |
| | 鳥取県 | 12 | 中海 | スズキ | 85 |
| | 広島市 | 13 | 広島湾 | スズキ | 110 |
| | 香川県 | 14 | 高松港 | ボラ | 160 |
| | 高知県 | 15 | 四万十川河口 (四万十市) | スズキ | 14 |
| | 大分県 | 16 | 大分川河口 (大分市) | スズキ | 130 |
| | 鹿児島県 | 17 | 薩摩半島西岸 | スズキ | 64 |
| | 沖縄県 | 18 | 中城湾 | ミナミクロダイ | 36 |
| 鳥類 | 滋賀県 | 1 | 琵琶湖北湖竹生島 | カワウ | 3,200 |
| | 兵庫県 | 参考値 | 昆陽池 (伊丹市) | カワウの卵 (卵黄) | 380,000 |
| | | | | カワウの卵 (卵白) | 1,200 |

(注1) 「検出頻度 (地点ベース) 」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
 「検出頻度 (検体ベース) 」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。
 (注2) 検出下限値以上を検出とした。