

2022年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体 数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分(%)		脂質分(%)	
								範囲	平均	範囲	平均			採取時	測定時	採取時	測定時
北海道	釧路沖	1	2023年1月14日	魚類	ウサギアイナメ	1	不明	45.0	45.0	1,500	1,500	-	筋肉	-	78.9	-	2.9
		2	2023年1月14日	魚類	ウサギアイナメ	1	不明	47.3	47.3	1,510	1,510	-	筋肉	78.0		-	
		3	2023年1月14日	魚類	ウサギアイナメ	1	不明	47.5	47.5	1,600	1,600	-	筋肉	-		-	
		1	2022年10月31日	魚類	シロサケ	2	混合	57.0 ~ 60.0	58.0	1,695 ~ 1,765	1,730	-	筋肉	74.0	74.9	2.0	2.3
		2	2022年10月31日	魚類	シロサケ	1	雌	62.0	62.0	2,150	2,150	-	筋肉	76.0		1.3	
		3	2022年10月31日	魚類	シロサケ	1	雄	66.5	66.5	2,152	2,152	-	筋肉	72.0		2.3	
岩手県	山田湾	1	2022年10月24日	貝類	ムラサキイガイ	100	不明	8.9 ~ 11.0	9.5	48.6 ~ 123.2	75.1	不明	可食部	78.9	79.7	1.7	1.7
		2	2022年10月24日	貝類	ムラサキイガイ	173	不明	7.9 ~ 8.5	8.2	32.2 ~ 64.2	47.9	不明	可食部	77.6		2.0	
		3	2022年10月24日	貝類	ムラサキイガイ	279	不明	6.9 ~ 7.5	7.3	26.6 ~ 42.1	34.9	不明	可食部	78.5		2.0	
		1	2022年10月15日	魚類	アイナメ	8	不明	31.9 ~ 38.0	34.2	917 ~ 1,265	1,096	不明	筋肉	71.5	70.2	6.0	4.0
		2	2022年10月15日	魚類	アイナメ	10	不明	29.8 ~ 32.5	31.0	584 ~ 824	662	不明	筋肉	73.3		4.4	
		3	2022年10月15日	魚類	アイナメ	10	不明	24.8 ~ 29.0	26.6	313 ~ 524	397	不明	筋肉	73.5		3.7	
宮城県	仙台湾（松島湾）	1	2022年11月24日	魚類	アイナメ	13	不明	18.4 ~ 32.8	25.2	120 ~ 700	349	不明	筋肉	-	77.2	-	1.2
		2	2022年11月24日	魚類	アイナメ	10	不明	22.6 ~ 31.0	25.2	240 ~ 600	364	不明	筋肉	-		-	
		3	2022年11月24日	魚類	アイナメ	5	不明	24.2 ~ 37.9	29.4	280 ~ 1,300	612	不明	筋肉	-		-	
茨城県	常磐沖	1	2023年1月18日	魚類	マサバ	26	不明	23.0 ~ 23.5	24.3	147 ~ 206	165	不明	筋肉	31.4	68.6	11.7	8.4
		2	2023年1月18日	魚類	マサバ	19	不明	25.0 ~ 27.5	26.1	212 ~ 313	250	不明	筋肉	30.9		4.2	
		3	2023年1月18日	魚類	マサバ	11	不明	31.0 ~ 35.5	32.7	446 ~ 601	515	不明	筋肉	29.5		3.3	
東京都	東京湾	1	2022年10月4日	魚類	スズキ	4	混合	47.3 ~ 52.0	48.9	1,540 ~ 1,970	1,740	5~4	筋肉	77.1	75.8	1.1	3.4
		2	2022年10月4日	魚類	スズキ	5	混合	45.5 ~ 47.5	46.2	1,330 ~ 1,440	1,378	4	筋肉	77.1		1.8	
		3	2022年10月4日	魚類	スズキ	5	混合	37.0 ~ 43.7	41.6	820 ~ 1,170	1,030	3	筋肉	77.4		1.9	
横浜市	横浜港	1	2022年9月26日	貝類	ムラサキイガイ	94	混合	4.4 ~ 6.0	5.0	9.6 ~ 22.9	15.5	不明	可食部	82.7	85.4	1.4	1.7
		2	2022年9月26日	貝類	ムラサキイガイ	96	混合	3.5 ~ 6.5	5.3	5.2 ~ 23.8	16.4	不明	可食部	82.4		1.5	
		3	2022年9月26日	貝類	ムラサキイガイ	109	混合	3.9 ~ 5.9	4.9	6.0 ~ 24.7	13.7	不明	可食部	82.3		1.5	
川崎市	川崎港扇島沖	1	2022年9月26日	魚類	スズキ	15	雄	28.6 ~ 33.4	30.9	366 ~ 538	456	不明	筋肉	82.4	85.7	2.3	1.5
		2	2022年9月26日	魚類	スズキ	16	雌	26.4 ~ 31.4	30.0	272 ~ 525	423	不明	筋肉	70.6		1.5	
		3	2022年9月26日	魚類	スズキ	15	雄	31.4 ~ 33.7	32.3	429 ~ 532	488	不明	筋肉	76.9		2.0	
石川県	能登半島沿岸	1	2022年8月19日	貝類	ムラサキイガイ	31	不明	13.8 ~ 17.5	15.6	186.3 ~ 347.2	261.8	不明	可食部	79.9	80.3	1.4	1.5
		2	2022年8月19日	貝類	ムラサキイガイ	47	不明	11.5 ~ 14.2	12.9	119.6 ~ 286.6	177.7	不明	可食部	78.1		1.4	
		3	2022年8月19日	貝類	ムラサキイガイ	76	不明	8.3 ~ 11.0	9.6	51.4 ~ 120.2	79.0	不明	可食部	76.6		1.7	
名古屋市	名古屋港	1	2022年9月27日	魚類	ボラ	5	不明	47.0 ~ 50.1	48.4	1,109 ~ 1,419	1,287	不明	筋肉	-	75.1	-	3.3
		2	2022年9月27日	魚類	ボラ	5	不明	46.0 ~ 48.0	47.2	1,029 ~ 1,112	1,065	不明	筋肉	-		-	
		3	2022年9月27日	魚類	ボラ	5	不明	44.0 ~ 46.0	45.2	906 ~ 1,143	991	不明	筋肉	-		-	
滋賀県	琵琶湖北湖竹生島	1	2022年7月29日	鳥類	カワウ	3	雌	119.0 ~ 122.4	120.6	1,692 ~ 1,760	1,732	不明	胸筋	69.9	75.2	3.6	3.6
		2	2022年7月29日	鳥類	カワウ	3	雄	123.0 ~ 130.0	125.8	2,160 ~ 2,300	2,213	不明	胸筋				
		3	2022年7月29日	鳥類	カワウ	4	雄	124.5 ~ 130.5	128.3	1,840 ~ 2,040	1,928	不明	胸筋				
	琵琶湖安曇川（高島市）	1	2022年4月4日	魚類	ウグイ	28	雌	23.3 ~ 30.5	26.9	170 ~ 477	260	不明	筋肉	76.7	69.9	2.9	3.0
		2	2022年4月4日	魚類	ウグイ	30	雄	23.5 ~ 29.0	25.6	158 ~ 328	216	不明	筋肉	76.7		2.7	
		3	2022年4月4日	魚類	ウグイ	29	雌	23.2 ~ 31.5	26.4	164 ~ 398	251	不明	筋肉	76.8		3.1	
大阪府	大阪湾	1	2022年10月18日	魚類	スズキ	3	雄	42.0 ~ 49.5	45.8	1,240 ~ 1,820	1,607	不明	筋肉	79.3	79.3	2.4	2.4
		2	2022年10月18日	魚類	スズキ	2	雌	44.0 ~ 47.8	45.9	1,340 ~ 1,800	1,570	不明	筋肉	79.3		2.4	
		3	2022年10月18日	魚類	スズキ	2	雌	46.9 ~ 48.5	47.3	1,420 ~ 1,900	1,660	不明	筋肉	79.3		2.4	
兵庫県	姫路沖	1	2022年12月18日	魚類	スズキ	1	不明	69.0	69.0	2,700	2,700	不明	筋肉	-	70.0	-	1.5
		2	2022年12月18日	魚類	スズキ	1	不明	64.0	64.0	2,300	2,300	不明	筋肉	-		-	
		3	2022年12月18日	魚類	スズキ	1	不明	62.0	62.0	1,800	1,800	不明	筋肉	-		-	

2022年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体 数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分(%)		脂質分(%)	
								範囲	平均	範囲	平均			採取時	測定時	採取時	測定時
鳥取県	天神川（倉吉市）	1	2022年3月24日	鳥類	カワウ	1	雌	122.0	122.0	1,650	1,650	不明	胸筋	75.8	75.8	3.3	3.3
		2	2022年4月9日	鳥類	カワウ	1	雌	123.7	123.7	1,590	1,590	不明	胸筋				
	中海	1	2022年10月25日	魚類	スズキ	10	混合	35.8 ～ 44.2	40.6	508 ～ 1025	805	不明	筋肉	78.1	79.8	1.2	0.9
		2	2022年10月25日	魚類	スズキ	11	混合	34.0 ～ 39.5	36.4	418 ～ 697	559	不明	筋肉	79.3		1.0	
		3	2022年10月25日	魚類	スズキ	12	混合	29.0 ～ 35.5	32.5	262 ～ 491	409	不明	筋肉	79.7		0.9	
広島市	広島湾	1	2022年11月24日及び 27日	魚類	スズキ	3	雄	38.0 ～ 48.0	42.5	1,064 ～ 1,572	1,253	不明	筋肉	74.9	77.4	-	1.6
		2	2022年11月24日及び 27日	魚類	スズキ	3	雌	43.0 ～ 50.0	46.3	1,474 ～ 2,019	1,761	不明	筋肉	73.5		-	
		3	2022年11月27日	魚類	スズキ	2	混合	47.3 ～ 51.6	49.5	1,485 ～ 1,810	1,648	不明	筋肉	75.9		-	
香川県	高松港	1	2022年8月26日	魚類	ボラ	1	不明	60.0	60.0	2,300	2,300	不明	筋肉	75.6	71.6	4.0	8.9
		2	2022年8月26日	魚類	ボラ	1	不明	58.0	58.0	2,300	2,300	不明	筋肉	71.4		3.9	
		3	2022年8月26日	魚類	ボラ	2	不明	48.0 ～ 53.0	51.0	1,200 ～ 1,400	1,300	不明	筋肉	72.8		4.0	
高知県	四万十川河口（四万十市）	1	2022年9月2日、9日及び 15日並びに11月15 日及び28日	魚類	スズキ	7	不明	23.4 ～ 33.2	27.6	275 ～ 757	433	不明	筋肉	74.3	76.7	1.2	1.4
		2	2022年9月1日、2日及び 15日	魚類	スズキ	12	不明	22.1 ～ 24.8	23.4	224 ～ 366	271	不明	筋肉	74.6		1.8	
		3	2022年9月15日、10月 16日並びに11月15 日、24日及び28日	魚類	スズキ	20	不明	17.3 ～ 23.2	19.7	100 ～ 261	150	不明	筋肉	75.4		1.3	
大分県	大分川河口（大分市）	1	2023年1月25日	魚類	サワラ	1	不明	75.2	75.2	3,080	3,080	不明	筋肉	64.0	73.8	1.7	2.9
		2	2023年1月25日	魚類	サワラ	1	不明	70.9	70.9	2,916	2,916	不明	筋肉	58.2		3.3	
		3	2023年1月25日	魚類	サワラ	1	不明	66.2	66.2	2,711	2,711	不明	筋肉	56.8		3.4	
鹿児島県	薩摩半島西岸	1	2022年11月16日	魚類	スズキ	2	混合	47.5 ～ 52.5	50.0	1,526 ～ 1,577	1,551	不明	筋肉	79.1	74.0	2.7	1.7
		2	2022年11月16日	魚類	スズキ	2	雄	48.0 ～ 50.9	49.5	1,389 ～ 1,545	1,467	不明	筋肉	76.3		3.2	
		3	2022年11月16日	魚類	スズキ	2	混合	50.9 ～ 52.0	51.5	1,411 ～ 1,808	1,609	不明	筋肉	77.9		2.2	
沖縄県	中城湾	1	2023年1月31日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	33.0 ～ 37.5	36.3	745 ～ 1,175	998	不明	筋肉	73.3	77.1	1.9	1.6
		2	2023年1月31日	魚類	ミナミクロダイ	3	雄	27.0 ～ 37.0	33.0	310 ～ 980	708	不明	筋肉	72.1		1.5	
		3	2023年1月31日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	31.5 ～ 40.0	35.6	620 ～ 1,505	946	不明	筋肉	74.6		1.1	
兵庫県	*参考 昆陽池（伊丹市）	1	2022年4月6日及び19 日	鳥類	カワウの卵	9	不明	5.3×3.8 ～ 6.4×3.9	5.7×3.8	8.0 ～ 14.3	11.8	発生初期	卵黄	-	卵黄:	-	卵黄:
										16.1 ～ 28.7	23.6	卵白	-	64.0	-	22.1	
		2	2022年4月6日及び19 日	鳥類	カワウの卵	6	不明	5.2×3.7 ～ 6.0×3.8	5.6×3.8	11.2 ～ 15.8	12.7	発生初期	卵黄	-	-	-	-
										22.4 ～ 31.5	25.4	卵白	-	卵白:	-	卵白:	
		3	2022年4月6日及び19 日	鳥類	カワウの卵	3	不明	5.5×3.7 ～ 6.3×4.0	5.8×3.9	12.0 ～ 15.7	13.0	発生初期	卵黄	-	89.6	-	0.1
										24.1 ～ 31.5	26.1	卵白	-	-	-	-	

注) 参考で示したカワウの卵の値のうち、体長の欄に示した値は「卵高」×「卵径」を記載している。