

[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）・生物(単位：pg/g-wet)

調査年度：2022

検出頻度（地点ベース）：18/23(欠測等：0)

検出頻度（検体ベース）：18/23(欠測等：0)

検出下限値：※23

定量下限値：※57

	集計値
幾何平均値	86
中央値	110
最大値	1,300
最小値	nd

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度（地点ベース）	1/3	15/18	2/2
検出頻度（検体ベース）	1/3	15/18	2/2
幾何平均値	tr(26)	79	1,000
中央値	nd	100	---
最大値	140	430	1,300
最小値	nd	nd	820

	地方公共団体	地点番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	nd
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	140
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	nd
魚類	北海道	1	釧路沖	ウサギアイナメ	tr(49)
		2		シロサケ	nd
	岩手県	3	山田湾	アイナメ	tr(35)
	宮城県	4	仙台湾（松島湾）	アイナメ	71
	茨城県	5	常磐沖	マサバ	160
	東京都	6	東京湾	スズキ	97
	川崎市	7	川崎港扇島沖	スズキ	160
	名古屋市	8	名古屋港	ボラ	tr(51)
	滋賀県	9	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	360
	大阪府	10	大阪湾	スズキ	200
	兵庫県	11	姫路沖	スズキ	430
	鳥取県	12	中海	スズキ	tr(39)
	広島市	13	広島湾	スズキ	140
	香川県	14	高松港	ボラ	160
	高知県	15	四万十川河口（四万十市）	スズキ	nd
	大分県	16	大分川河口（大分市）	サワラ	220
	鹿児島県	17	薩摩半島西岸	スズキ	110
	沖縄県	18	中城湾	ミナミクロダイ	nd
鳥類	滋賀県	1	琵琶湖北湖竹生島	カワウ	820
	鳥取県	2	天神川（倉吉市）	カワウ	1,300
	兵庫県	参考値	昆陽池（伊丹市）	カワウの卵（卵黄）	49,000
				カワウの卵（卵白）	tr(33)

（注1）「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

（注2）検出下限値以上を検出とした。

（注3）「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

（注4）「nd」は不検出を意味する。

（注5）※定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。