

2023年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体 数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分(%)		脂質分(%)	
								範囲	平均	範囲	平均			採取時	測定時	採取時	測定時
北海道	釧路沖	1	2023年10月19日	魚類	ウサギアイナメ	2	混合	48.0 ～ 48.5	48.3	1,580 ～ 1,820	1,700	不明	筋肉	77.7	79.8	2.1	1.6
		2	2023年10月19日	魚類	ウサギアイナメ	2	混合	44.0 ～ 50.0	47.0	1,250 ～ 1,450	1,350	不明	筋肉	77.7		2.4	
		3	2023年10月19日	魚類	ウサギアイナメ	2	混合	50.0 ～ 59.0	54.5	1,300 ～ 2,150	1,725	不明	筋肉	78.1		1.6	
		1	2023年10月18日	魚類	シロサケ	1	雌	70.0	70.0	3,200	3,200	不明	筋肉	73.3	74.5	2.6	2.4
		2	2023年10月18日	魚類	シロサケ	1	雌	69.0	69.0	3,100	3,100	不明	筋肉	74.5		1.6	
		3	2023年10月18日	魚類	シロサケ	1	雄	68.0	68.0	2,900	2,900	不明	筋肉	72.4		3.2	
岩手県	山田湾	1	2023年10月23日	貝類	ムラサキイガイ	130	不明	9.3 ～ 10.8	10.0	53.0 ～ 117.6	80.2	不明	可食部	78.4	78.3	2.1	2.0
		2	2023年10月23日	貝類	ムラサキイガイ	180	不明	7.8 ～ 8.9	8.2	31.0 ～ 64.9	45.7	不明	可食部	77.7		2.1	
		3	2023年10月23日	貝類	ムラサキイガイ	267	不明	6.6 ～ 7.5	7.0	19.5 ～ 40.9	28.6	不明	可食部	76.7		2.3	
		1	2023年11月6日	魚類	アイナメ	10	不明	26.9 ～ 33.3	28.9	423 ～ 606	492	不明	筋肉	77.1	75.4	3.2	3.1
		2	2023年11月6日	魚類	アイナメ	15	不明	24.5 ～ 26.6	25.6	342 ～ 399	373	不明	筋肉	74.9		3.4	
		3	2023年11月6日	魚類	アイナメ	18	不明	22.7 ～ 24.6	23.7	185 ～ 327	277	不明	筋肉	74.7		3.4	
宮城県	仙台湾（松島湾）	1	2023年11月27日	魚類	アイナメ	19	不明	19.0 ～ 25.8	23.1	142 ～ 254	206	不明	筋肉	-	80.2	-	0.7
		2	2023年11月27日	魚類	アイナメ	11	不明	25.5 ～ 30.0	27.5	257 ～ 500	353	不明	筋肉	-		-	
		3	2023年11月27日	魚類	アイナメ	6	不明	30.6 ～ 38.7	33.1	501 ～ 892	638	不明	筋肉	-		-	
茨城県	常磐沖	1	2023年12月12日	魚類	マサバ	21	不明	25.0 ～ 31.0	26.7	235 ～ 389	270	不明	筋肉	33.9	76.9	1.7	1.4
		2	2023年12月12日	魚類	マサバ	27	不明	23.0 ～ 30.0	24.8	183 ～ 235	204	不明	筋肉	31.7		1.3	
		3	2023年12月12日	魚類	マサバ	36	不明	20.0 ～ 29.0	22.6	107 ～ 178	153	不明	筋肉	28.3		1.2	
東京都	東京湾	1	2023年10月3日	魚類	スズキ	2	混合	55.5 ～ 70.0	62.8	2,476 ～ 3,544	3,010	6以上	筋肉	78.1	78.5	1.3	2.6
		2	2023年10月3日	魚類	スズキ	3	混合	48.9 ～ 53.0	50.5	1,474 ～ 1,968	1,665	4～5	筋肉	77.8		1.9	
		3	2023年10月3日	魚類	スズキ	4	混合	44.3 ～ 46.7	45.6	966 ～ 1,175	1,089	3～4	筋肉	78.9		1.1	
川崎市	川崎港扇島沖	1	2023年9月19日	魚類	スズキ	21	雄	27.0 ～ 32.5	29.4	290 ～ 503	384	不明	筋肉	74.7	78.7	1.1	1.4
		2	2023年9月19日	魚類	スズキ	17	雌	26.5 ～ 29.5	28.0	293 ～ 390	353	不明	筋肉	73.6		1.3	
		3	2023年9月19日	魚類	スズキ	14	雌	29.5 ～ 33.0	30.4	334 ～ 513	416	不明	筋肉	69.7		1.2	
石川県	能登半島沿岸	1	2023年8月21日	貝類	ムラサキイガイ	35	不明	14.2 ～ 16.4	15.2	237 ～ 523	323	不明	可食部	73.4	74.1	2.2	2.0
		2	2023年8月21日	貝類	ムラサキイガイ	50	不明	12.5 ～ 15.0	14.0	168 ～ 348	243	不明	可食部	71.9		2.3	
		3	2023年8月21日	貝類	ムラサキイガイ	65	不明	10.0 ～ 13.3	11.4	93 ～ 208	140	不明	可食部	71.9		2.2	
名古屋市	名古屋港	1	2023年9月5日	魚類	ボラ	9	不明	25.5 ～ 29.8	27.8	527 ～ 739	622	不明	筋肉	-	75.8	-	2.9
		2	2023年9月5日	魚類	ボラ	9	不明	25.5 ～ 32.2	28.6	519 ～ 876	665	不明	筋肉	-		-	
		3	2023年9月5日	魚類	ボラ	9	不明	25.8 ～ 32.0	27.7	539 ～ 911	642	不明	筋肉	-		-	
滋賀県	琵琶湖北湖竹生島	1	2023年7月31日	鳥類	カワウ	1	雄	111	111.0	2,560	2,560	不明	筋肉	-	70.5	-	5.0
		2	2023年7月31日	鳥類	カワウ	1	雄	108	108.0	2,300	2,300	不明	筋肉	-		-	
		3	2023年7月31日	鳥類	カワウ	1	雄	105	105.0	1,700	1,700	不明	筋肉	-		-	
	琵琶湖安曇川（高島市）	1	2023年4月5日	魚類	ウグイ	25	雄	22.2 ～ 26.9	24.9	133 ～ 257	204	不明	筋肉	73.8	60.7	3.5	3.6
		2	2023年4月5日	魚類	ウグイ	25	雌	22.5 ～ 28.3	25.2	126 ～ 291	204	不明	筋肉	75.0		3.5	
		3	2023年4月5日	魚類	ウグイ	25	雌	24.3 ～ 32.5	26.1	151 ～ 500	221	不明	筋肉	73.8		3.8	
大阪府	大阪湾	1	2023年10月25日	魚類	スズキ	4	雌3雄	34.2 ～ 47.5	38.7	560 ～ 1,400	805	不明	筋肉	-	77.5	-	2.0
		2	2023年10月25日	魚類	スズキ	2	雌	49.3 ～ 49.4	49.4	1,440 ～ 1,720	1,580	不明	筋肉	-		-	
		3	2023年10月25日	魚類	スズキ	2	雌	45.8 ～ 53.4	49.6	1,260 ～ 2,220	1,740	不明	筋肉	-		-	
兵庫県	姫路沖	1	2023年12月11日	魚類	スズキ	1	不明	60.5	60.5	2,520	2,520	不明	筋肉	-	80.8	-	0.9
		2	2023年12月11日	魚類	スズキ	1	不明	60.2	60.2	2,780	2,780		筋肉	-		-	
		3	2023年12月11日	魚類	スズキ	1	不明	60.0	60.0	2,840	2,840		筋肉	-		-	
鳥取県	天神川（倉吉市）	1	2023年4月15日	鳥類	カワウ	1	雄	109	109.0	2,000	2,000	-	筋肉	-	69.3	-	3.7
		2	2023年4月20日	鳥類	カワウ	1	雄	108	108.0	2,080	2,080	-	筋肉	-		-	
	中海	1	2023年11月1日	魚類	スズキ	9	混合	38.5 ～ 48.9	43.8	765 ～ 1245	1,010	不明	筋肉	80.2	79.5	1.0	0.9
		2	2023年11月1日	魚類	スズキ	10	混合	30.5 ～ 41.5	34.3	414 ～ 826	580	不明	筋肉	80.1		1.0	
		3	2023年11月1日	魚類	スズキ	11	混合	27.0 ～ 31.5	29.6	269 ～ 406	347	不明	筋肉	79.6		0.9	

2023年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体 数	性別	体長(cm)		体重(g)		年 齢	採取 部位	水分 (%)		脂質分 (%)	
								範囲	平均	範囲	平均			採取時	測定時	採取時	測定時
広島市	広島湾	1	2023年11月13日	魚類	スズキ	3	雄	46.1 ~ 46.9	46.4	1,286 ~ 1,468	1,395	不明	筋肉	74.6	77.2	-	1.0
		2	2023年11月13日	魚類	スズキ	2	混合	53.5 ~ 56.8	55.2	1,400 ~ 1,850	1,625	不明	筋肉	77.8		-	
		3	2023年11月13日	魚類	スズキ	2	雌	47.2 ~ 49.1	48.2	1,627 ~ 1,799	1,713	不明	筋肉	75.9		-	
香川県	高松港	1	2023年8月26日	魚類	ボラ	1	不明	58.0	58.0	2,100	2,100	不明	筋肉	69.5	73.4	3.8	5.6
		2	2023年8月26日	魚類	ボラ	1	不明	57.0	57.0	1,950	1,950	不明	筋肉	70.0		4.7	
		3	2023年8月26日	魚類	ボラ	1	不明	56.0	56.0	1,950	1,950	不明	筋肉	67.7		4.8	
高知県	四万十川河口（四万十市）	1	2023年11月10日、26日	魚類	スズキ	4	不明	27.3 ~ 48.0	33.6	370 ~ 1,652	731	不明	筋肉	73.9	77.4	1.0	1.1
		2	2023年11月10日、11日、14日	魚類	スズキ	7	不明	27.2 ~ 31.0	29.1	376 ~ 577	475	不明	筋肉	70.5		1.1	
		3	2023年11月7日、8日、26日	魚類	スズキ	8	不明	20.2 ~ 30.2	26.5	207 ~ 515	378	不明	筋肉	72.9		0.9	
大分県	大分川河口（大分市）	1	2024年2月5日	魚類	サワラ	1	不明	81.5	81.5	4,919	4,919	不明	筋肉	40.9	68.6	9.7	2.5
		2	2024年2月5日	魚類	サワラ	1	不明	79.5	79.5	4,401	4,401	不明	筋肉	46.8		10.0	
鹿児島県	薩摩半島西岸	1	2023年11月24日	魚類	スズキ	3	雄	44.5 ~ 48.5	46.8	1,208 ~ 1,462	1,361	不明	筋肉	75.3	75.9	2.5	2.5
		2	2023年11月24日	魚類	スズキ	3	混合	47.5 ~ 50.5	49.2	1,237 ~ 1,589	1,402	不明	筋肉	76.2		1.7	
		3	2023年11月24日	魚類	スズキ	3	混合	45.0 ~ 51.0	47.3	1,213 ~ 1,500	1,386	不明	筋肉	76.5		1.5	
沖縄県	中城湾	1	2024年1月23日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	36.0 ~ 40.0	37.8	855 ~ 1,150	988	不明	筋肉	78.7	79.7	0.9	0.9
		2	2024年1月23日	魚類	ミナミクロダイ	3	雄	29.5 ~ 41.0	34.2	525 ~ 1,365	830	不明	筋肉	76.3		1.4	
		3	2024年1月23日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	26.5 ~ 33.0	30.3	505 ~ 645	570	不明	筋肉	78.4		1.2	
兵庫県	*参考 昆陽池（伊丹市）	1	2023年3月30日、4月5日	鳥類	カワウの卵	6	不明	5.0×3.6 ~ 6.5×4.2	6.0×3.9	30.8 ~ 53.3	45.7	発生初期	卵黄	-	卵黄	-	卵黄
												卵白	-	56.2	-	23.0	
		2	2023年3月30日、4月5日	鳥類	カワウの卵	7	不明	5.3×3.7 ~ 5.9×4.0	5.6×3.8	34.4 ~ 44.6	40.1	発生初期	卵黄	-	卵白	-	卵白
												卵白	-	89.9	-	0.0	

注) 参考で示したカワウの卵の値のうち、体長の欄に示した値は「卵高」×「卵径」を記載している。