

状の症状の軽減が認められたが、その程度は-50と軽く、プラセボの症状の軽減は-340と、40ppbと8ppbのちょうど中間の変化であった。なおこの患者では他の患者に比べて、ガス暴露前からのスコアが非常に高いのが特徴であった。また、暴露前後の変動を足すと、40ppbで2308、8ppbで2649、プラセボで2842となり、さらに図で自覚症状の変化をみると、他の被検者に比較して極めて大きな変動を示していた。

(ii) 患者2について

40ppbでスコアは38と軽度の悪化を示し、8ppbでは-9と軽度の症状の軽減、プラセボでは-57と症状の軽減が認められ、用量依存的な症状悪化が認められた。基準となるガス暴露室入室前のスコアは平均的なものであった。

(iii) 患者3について

40ppbホルムアルデヒド暴露ではスコアが39程度の軽度の悪化であったのに対し、8ppbでは242、プラセボでは231と症状の悪化を示しており、用量依存的な症状軽減傾向がみられた。

(iv) 患者4について

40ppbで-82と症状の軽減を示していた。8ppbでは症状の変動はまったくなく、プラセボガス暴露前では60と軽度の悪化を示しており、用量依存的な症状軽減がみられた。の値が、8ppbの折にはほとんど自覚症状なしという、特異な結果であった。

(v) 患者5について

40ppbで症状スコアは71と悪化が認められた。一方8ppbおよびプラセボではそれぞれスコアは-80、-75と症状の軽減が認められており、用量依存的な症状増悪傾向がみられた。

(vi) 患者6について

症状変動の図でも分かるように、スコアの変動はわずかであったが、40ppb暴露では症状スコア4、8ppb暴露でスコア26と症状の悪化が認められた。プラセボではまったく変動を示さなかった。ただ、この患者では、基準とすべき暴露前の症状が非常に軽い点の特徴であった。

(vii) 患者7について

40ppb暴露によりスコア-590という著明な症状の悪化が認められた。8ppbでは-30と軽い症状の軽減が認められ、プラセボでは13という軽い症状の悪化が認められており、用量依存的な症状軽減がみられた。

(viii) 患者8について

トルエン $130\mu\text{g}/\text{m}^3$ で31と症状の悪化を、8ppbでは18と軽度悪化を示していた。プラセボでは-1とほぼ変化を示さなかった。全体としての変動幅は少なかったが、用量依存的に症状増悪がみられた。

(ix) 対照1について

全体の変動は少なかった。40ppbホルムアルデヒド暴露で-10、8ppbで16、そしてプラセボで-10のスコアを示した。暴露前の値は当然健常者のために、低い値を示していた。

(x) 対照 2 について

全体の変動は少なかった。40ppbで-8、8ppbで13。そしてプラセボで-7のスコアであった。暴露前の値は低く、また症状の変動はわずかであった。

(xi) 対照 3 について

ガス暴露、プラセボとも、まったく症状を示さなかった。

(x ii) 対照 4 について

40ppb暴露で-91と、8ppbでは-53と症状の軽快を示した。一方プラセボでは77と症状の悪化を示した。この対象者は健常者であるが、暴露前に100前後の症状を示していた。

患者 1 40ppb 暴露前

ブース検査 (前)・後 症状記入表

今のあなたの体調について書いてください。

以下を目安にしてください。

アレルギー：記載の症状が何もない場合

最も強い：今までの中で、最も強い症状の場合

例) かゆみ： ない |-----| * |-----| 最も強い

関節の痛み： ない |-----| |-----| * |-----| 最も強い

筋肉の痛み： ない |-----| |-----| * |-----| 最も強い

けいれん： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

こわばり： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

目・鼻の刺激： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

しみる感じ： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

舌がピリピリする： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

息苦しい： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

どうき： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

脈の異常： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

お腹の不快感： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

吐き気： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

気持ちが悪い： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

頭がボーとする： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

眠い、あくびが出る： ない |-----| |-----| * |-----| 最も強い

いらだち気味： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

身体がだるい： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

意欲低下： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

頭の重い感じ： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

頭痛： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

めまい： ない |-----| |-----| * |-----| 最も強い

ふらつき： ない |-----| |-----| * |-----| 最も強い

発疹、かゆみ： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

口やのどの乾き： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

手足の冷たい感じ： ない * |-----| |-----| |-----| 最も強い

その他の症状があればご記入ください。

(肩がこる)： ない |-----| |-----| |-----| * |-----| 最も強い

5

64
64
0
85
90
75
0
97
0
0
0
76
63
85
50
0
87
84
81
69
50
58
96
100
0

患者1 40ppb 暴露後

ブース検査 前・後 症状記入表

6

今のあなたの体調について書いてください。

以下を目安にしてください。

アレルギー科 記載の症状が何もない場合

最も強い：今までの中で、最も強い症状の場合

例) かゆみ：ない	-----X-----	最も強い	
関節の痛み：ない	-----*-----	最も強い	50
筋肉の痛み：ない	-----*-----	最も強い	50
けいれん：ない *	-----	最も強い	0
こわばり：ない *	-----	最も強い	0
目・鼻の刺激：ない	-----X-----	最も強い	73
しみる感じ：ない	-----X-----	最も強い	78
舌がピリピリする：ない *	-----	最も強い	0
息苦しい：ない	-----X-----	最も強い	58
どろき：ない *	-----	最も強い	0
脈の異常：ない *	-----	最も強い	0
お腹の不快感：ない *	-----	最も強い	0
吐き気：ない *	-----	最も強い	0
気持ちが悪い：ない	-----X-----	最も強い	30
頭がぼーとする：ない	-----X-----	最も強い	72
眠い、あくびが出る：ない	-----X-----	最も強い	8
いらだち気味：ない *	-----	最も強い	0
身体がだるい：ない	-----X-----	最も強い	68
意欲低下：ない	-----X-----	最も強い	64
頭の重い感じ：ない	-----X-----	最も強い	55
頭痛：ない *	-----	最も強い	2
めまい：ない	-----X-----	最も強い	7
ふらつき：ない *	-----	最も強い	2
発疹、かゆみ：ない	-----X-----	最も強い	62
口やのどの乾き：ない *	-----X-----	最も強い	88
手足の冷たい感じ：ない *	-----	最も強い	0
その他の症状があればご記入ください。			
(肩がこる)：ない	-----X-----	最も強い	

