

【公表用資料】 2021 年度苫小牧沖における秋季調査結果（詳細版）

1. 背景と目的

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号）では、油、有害液体物質等又は廃棄物の海底下廃棄を原則禁止した上で、例外的に、特定二酸化炭素ガス¹⁾については、許可基準を満たす場合にのみ、環境大臣の許可を受けた上で、海底下廃棄の実施が可能となっている。

2016 年 2 月 22 日に、経済産業省より苫小牧沖における特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に係る許可の申請書が提出され、当該申請について許可基準を満たしていることが確認されたことから、3 月 31 日に環境大臣の許可処分を行った。このため、2016 年 4 月から苫小牧沖において、経済産業省による苫小牧沖海底下 CCS 実証試験事業が開始され、2019 年 11 月 22 日まで海底下への CO₂ の圧入が実施された。累計 300,110.3t の CO₂ が圧入された。

国内第 1 号の海底下 CCS 事業である苫小牧沖海底下 CCS 実証試験事業について、海洋環境に悪影響を及ぼさないように適正に実施されていることを確保するために、最新の科学的知見に基づくモニタリング技術を活用し、結果を検証していくことにより、海底下 CCS 事業における適正なモニタリング技術及びその適用方法の確立を図ることを目的として、審査当局である環境省は独自に苫小牧沖における海洋調査を実施した。

なお、環境省は、2011 年度から 2015 年度までの 5 年間、「海底下 CCS 実施のための海洋調査事業に係る現地調査（2011～2013 年度）」及び「海底下 CCS 実施のための海洋調査事業に係る苫小牧沖現地調査（2014～2015 年度）」において、経済産業省から海底下 CCS 事業に係る許可申請がされた際の審査に活用することを目的として、苫小牧沖において 2021 年度秋季調査と同様の海洋調査を実施しており、その結果との比較も行った。

2. 調査内容

2. 1 調査海域

調査海域は北海道苫小牧海域における約 10km×8km の範囲とし、海水の化学的性状、底質及び海洋生態系の変化を把握できるように調査測点を配置した（図 1）。

① 海水の化学的性状調査

約 10km×8km の範囲の①～⑨の 9 測点において採水分析調査を実施した。

¹⁾ 二酸化炭素濃度が大部分を占めるガスで、政令で定める基準に適合するもの（法第 18 条の 7 第 2 号）。

② 底質調査

海水の化学的性状調査を実施した 9 測点に加え、圧入井終端位置周辺の A、B、C の 3 測点において底質調査を実施した。

③ 海洋生態系把握調査

水中カメラによるメガベントス²⁾ 生息分布調査は、海水の化学的性状調査を実施した 9 測点³⁾ において実施した。

ドレッジによるメガベントス採取調査は、海水の化学的性状調査を実施した 9 測点において実施した。

ウバガイ（ホッキ貝）生息密度等調査は、沿岸部漁場の特別採捕許可範囲内の 2 地点において実施した。

マクロベントス⁴⁾ 及びメイオベントス⁵⁾ 調査は、底質調査測点と同じ 12 測点において実施した。




図 1 調査海域及び調査測点

²⁾ 肉眼で把握できるサイズで、ドレッジや트롤等²⁾の底引き網で採取できるような大型の底生生物

³⁾ 2020 年度までは 9 測点を含む 33 測点で実施してきたが、メガベントス生息分布把握の効率性を高めるため、海底環境に係る情報が充実している 9 測点で、調査を実施することとした。

⁴⁾ 目合い 1mm のふるいに残るサイズの底生生物

⁵⁾ 目合い 1mm のふるいを通過し、目合い 32 μ m のふるいに残るサイズの底生生物

2. 2 調査時期

① 海水の化学的性状調査

海水の化学的性状調査は、2021年11月15日、16日に実施した。

② 底質調査

底質調査は、2021年11月14日、17日、18日に実施した。

③ 海洋生態系把握調査

水中カメラによるメガベントス分布調査は、2021年11月29日～12月8日に実施した。

ドレッジによるメガベントス調査は、2021年11月21日に実施した。

ウバガイ（ホッキ貝）生息密度等調査は、2021年11月19日に実施した。

マクロベントス及びメイオベントス調査は、2021年11月14日、17日、18日に実施した。

2. 3 調査項目及び調査方法

2. 3. 1 海水の化学的性状調査

海水中における二酸化炭素（ CO_2 ）の溶解・平衡反応を図2に示す。

海水に溶けた CO_2 の一部は溶存気体として存在し、その存在度は CO_2 分圧（ $p\text{CO}_2$ ）として算出あるいは計測される。 $p\text{CO}_2$ は海水に溶けた CO_2 が生物等に実質的に作用する CO_2 量の指標とされる。

水和して生じる炭酸（ H_2CO_3 ）は、海水中の過剰な塩基成分（アルカリ度といい、強酸イオンの Cl^- 、 SO_4^{2-} 等に対して過剰に存在する Na^+ 、 K^+ 、 Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 等のアルカリ金属及びアルカリ土類金属イオンの総和）に中和されて炭酸水素イオン（ HCO_3^- ）と炭酸イオン（ CO_3^{2-} ）に解離し、これらのイオンが海水に溶けた CO_2 の大部分を占める。また、これらのイオンは水素イオン（ H^+ ）と平衡状態にある。

海水に溶ける CO_2 が増えると $p\text{CO}_2$ が高くなるとともに、全炭酸（ $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{HCO}_3^- + \text{CO}_3^{2-}$ の合計、Dissolved Inorganic Carbon。以下「DIC」という。）が増えることから、平衡状態を保つため（1）式及び（2）式は右向きに、（3）式は左向きに反応が進み、結果として海水中の H^+ が増加することで $\text{pH}^{6)}$ は低下する。

⁶⁾ 水溶液中の水素イオン（ H^+ ）濃度を表す指数。 H^+ が増えると pH は下がる（酸性化する）。




図2 海水中における二酸化炭素の溶解反応

海水の化学的性状調査では、これらの変化を検知するために、DIC、アルカリ度、pH を分析し $p\text{CO}_2$ を算出した。

海水中の CO₂ 濃度は、CO₂ 漏出のような外的な要因だけでなく、例えば、海水の混合度合いや生物の呼吸・光合成などにより著しく変化する。これらの影響を把握するため、塩分、生物活動や有機物分解に関する溶存酸素 (Dissolved Oxygen。以下「DO」という。) 及びクロロフィル a 濃度についても分析した。

DIC、アルカリ度、pH、塩分及び DO についてはニスキン採水器を、クロロフィル a 濃度についてはバンドーン採水器を用いて、表層 (水深 0.5m)、上層 (水深 5m)、下層 (底上 5m) 及び底層 (底上 2m) の 4 層において採水した。

DIC 及びアルカリ度の分析は「A Handbook of Methods for the Analysis of Carbon Dioxide Parameters in Sea Water」⁷⁾ に準じて行い、その際、海水標準物質を使って分析の系統的誤差を補正した。 $p\text{CO}_2$ については、DIC、アルカリ度及び塩分の分析値を用い、Lewis & Wallace (1998)⁸⁾ の方法に従い算出した。その他の項目の分析については海洋観測指針 (1999)⁹⁾ に従った。

⁷⁾ A. G. Dickson & C. Goyet, eds. ORNL/CDIAC-74 (1994)

⁸⁾ E. Lewis and D. Wallace. ORNL/CDIAC-105 (1998)

⁹⁾ 気象庁海洋部編 気象業務支援センター刊 (1999)

2014～2015 年度に実施した海底下 CCS 実施のための海洋調査事業等において、海水中における CO_2 と O_2 の量的関係については、呼吸による O_2 消費及び CO_2 生成、光合成による O_2 発生及び CO_2 消費等が支配的である場合、 $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度は負の相関関係を示すことがわかった。

前述したように、海水中の CO_2 は漏出が起こらない場合においても、海域での光合成や呼吸（有機物の分解を含む）など生物的な要因によっても大きく変化する。光合成と呼吸は海水中の O_2 の放出と消費を伴うことから、これら生物的な要因による変化分を $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度の関係から見積もることが可能であると考えられた。

2011 年度から 2015 年度までの調査^{1 0)} で得られたデータの解析により、調査海域の底層における $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度には累乗近似の曲線関係があることが確認された。

ここでは、当該曲線の 95% 予測区間の上限を超過するデータが確認された場合、 CO_2 圧入開始前の過去の傾向から統計的に外れたとみなされることから、漏出を懸念することとした。ただし、統計学的には、漏出が発生していない場合においても、2.5% の確率で上限を超過するデータが確認される可能性がある。

また、調査海域の水塊構造を把握することを目的として、多項目水質センサを用いた水温、塩分等の鉛直観測を行った。

2. 3. 2 底質調査

底泥の状況を把握するための基本項目として、泥色、泥臭及び泥温を測定し、粒度組成及び含水率を分析した。

底泥の間隙水に CO_2 が溶けると pH が下がることが予想されることから、採取した底質試料の pH を船上で測定した。また、炭酸カルシウムの指標として無機炭素を、有機物に係る項目として有機炭素及び全窒素を、さらに硫化物を併せて分析した。分析については底質調査方法^{1 1)} に従った。

スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用い、調査測点 1、A、B 及び C については 4 回、それ以外の調査測点については 1 回、底質を採取した。

^{1 0)} 2011～2015 年度に実施した海底下 CCS 実施のための海洋調査事業

^{1 1)} 環境省水・大気環境局（2001 年 3 月）

2. 3. 3 海洋生態系把握調査

海洋生態系の状況を把握するため、底生生物（メガベントス、マクロベントス、メイオベントス）の分布状況を調査した。

（１）水中カメラによるメガベントス生息分布調査

万が一、圧入された CO_2 が漏出した場合、分布状況が変化する可能性があるメガベントスの生息分布状況を観察し、また海底面から気泡が発生すると考えられるため、海底面の状況についても併せて観察した。（図 3）。遠隔操作無人探査機（Remotely Operated Vehicle。以下「ROV」という。）に搭載した水中カメラにより、1 測点あたり 0.8m（水中カメラの画像の横幅）×200m（ROV の調査距離）の範囲の海底を撮影した。




図 3 水中カメラによるメガベントス生息分布調査（模式図）

（２）ドレッジによるメガベントス採取調査

水中カメラによる目視観察では、生物種を正確には把握できないことから、ドレッジによるメガベントス採取調査を行った。

開口 0.5m、内袋目合い 5mm の簡易ドレッジを用いてメガベントスを採取し、分類・同定して、分類群ごとの個体数及び湿重量を計測した（図 4）。

簡易ドレッジの曳網距離及び面積については図表集 表・4 に示す。




図 4 簡易ドレッジによるメガベントス採取調査（模式図）

(3) ウバガイ（ホッキ貝）生息密度等調査

メガベントスの中でもウバガイ（ホッキ貝）は苫小牧地域における水産重要種であることから、特別採捕許可範囲内で桁網を2回曳網し、ウバガイの生息密度等を調査した。

底質のpH低下の影響が比較的大きいと考えられる炭酸カルシウムの殻を持つ生物であるため、採取したウバガイの個体重量に対する貝殻重量の割合、貝殻の厚さ等を計測した。

(4) マクロベントス及びメイオベントス調査

底質のpH低下の影響が比較的大きいと考えられるマクロベントス及びメイオベントスについて調査を行った。

スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採泥し、マクロベントスは2回分の試料を合わせた全量を、また、メイオベントスは採泥試料表面から深さ3cmまでを採取試料として、それぞれ分類・同定し、分類群ごとに個体数を計数した。

なお、調査測点1、A、B及びCは4回の採泥を行っていることから、マクロベントス及びメイオベントスも4回分の採泥試料について分類同定及び分類群ごとの個体数計数を行った。

3. 調査結果

調査結果は、以下のとおりである。

3. 1 海水の化学的性状調査結果

水温は 9.11～13.32 °C（図表集 図-2）、塩分は 33.11～34.12（図表集 表-1）、アルカリ度は 2,229～2,272 $\mu\text{mol/kg}$ （図表集 図-8 及び表-1）、DIC は 2,046～2,137 $\mu\text{mol/kg}$ （図表集 図-10 及び表-1）、pH は 7.85～8.00（図表集 図-12 及び表-1）、 $p\text{CO}_2$ （計算値）は 384～512 μatm （図表集 図-14 及び表-1）、DO は 202～243 $\mu\text{mol/kg}$ （図表集 表-1）、DO 飽和度（計算値）は 73～92 %（図表集 図-16）、クロロフィル a 濃度は 0.1～1.9 $\mu\text{g/L}$ （図表集 図-18 及び表-1）の範囲であった。

2021 年度秋季における水塊構造の特徴は、水温では調査測点 1 及び 2 を除く調査測点の表層から底層にかけて低くなり温度躍層が形成されていた。塩分では調査測点 1、2、3、4 及び 6 では塩分躍層が形成され、そのほかの調査測点では表層から底層にかけて概ね一様な分布であった。海水の化学的性状では、DIC は表層から底層にかけて高くなり、DO 飽和度は表層から底層にかけて低くなる分布を示した。 $p\text{CO}_2$ は表層から底層にかけて高くなる傾向がみられた。過年度調査結果と比較すると大きな変化はみられなかった（図表集 図-10、図-14 及び図-16）。

2011 年度から 2015 年度までの海水の化学的性状調査及び 2021 年度秋季調査で得られた $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度の関係は図 5 のとおりである。2021 年度秋季の調査結果は、これまでの秋季調査結果と同様の傾向を示し、95% 予測区間の上限を超過するデータ、すなわち CO_2 漏出を懸念させるデータはみられなかった。




図 5 $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度との関係

3. 2 底質調査結果

底質調査結果を図表集 表-2 に、粒度組成の経年変化を図表集 図-19 に示す。

pH（標準）は 7.26～7.94、含水率は 17.3～31.6 %、有機炭素は 0.7～9.5 mg/g-dry、無機炭素は定量下限値未満～0.3 mg/g-dry、全窒素は 0.06～1.00 mg/g-dry の範囲であった。硫化物は調査測点 3、5 及び C で検出され、0.1～0.3 mg/g-dry の範囲であった。

万が一 CO₂ が漏出した場合に値が低下すると考えられる底質の pH 及び無機炭素については、2021 年度秋季調査結果を過年度秋季調査結果と比較したところ、大きな変化はみられなかった。

3. 3 海洋生態系把握調査結果

(1) 水中カメラによるメガベントス生息分布調査結果

水中カメラによるメガベントス生息分布調査結果を図表集 図-20～図-24 に示す。

水中カメラで観察された代表的なメガベントスは、刺胞動物門ではヒダベリイソギンチャク、イソギンチャク目、軟体動物門ではエゾボラ、腹足綱、環形動物門ではゴカイの仲間、節足動物門ではヤドカリ亜目、棘皮動物門ではスナヒトデ、ニッポンヒトデ、クモヒトデの仲間、キンコ、脊索動物門ではカジカ科の仲間、カレイ目であった。これらの写真を以下に示す。

2021 年度秋季調査結果は、過年度秋季調査結果^{1 2)}と比較して大きな変化はみられなかった。



ヒダベリイソギンチャク



イソギンチャク目

^{1 2)} 2020 年度までの調査における 33 測点のうち、今回調査を実施した 9 測点の調査結果。



エゾボラ



腹足綱の仲間



ゴカイの仲間



ヤドカリ垂目



スナヒトデ



ニッポンヒトデ



クモヒトデの仲間



キンコ



カジカ科の仲間



カレイ目の仲間

(2) ドレッジによるメガベントス採取調査結果

ドレッジによるメガベントス採取調査結果を図表集 表-4 に、個体数の経年変化を図表集 図-25 に、湿重量組成と過年度秋季調査結果の比較を図表集 図-26 及び表-5 に示す。


メガベントスの出現個体数は、ゴカイの仲間が多数を占めた環形動物門、二枚貝の仲間が多数を占めた軟体動物門、クモヒトデの仲間が多数を占めた棘皮動物門の順に多かった。

出現個体数の上位 3 種は、*Ophiura* 属、チマキゴカイ、キララガイであった。




Ophiura 属の一種

イ




チマキゴカイ



キララガイ

底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻等を持つもので出現個体数が多かったメガベントスは *Ophiura* 属、キララガイ、エゾハマグリであった。



エゾハマグリ

2021 年度秋季調査結果を過年度秋季調査結果と比較したところ、個体数では大きな変化はみられなかった。湿重量（生物量）では調査測点 5 で秋季調査としては最小値を示した。

調査測点 5 については、水中カメラによるメガベントス生息分布調査結果では、これまでと同様の傾向を示していることから、今後も継続して変動の傾向を観測する必要がある。

その他の調査測点の調査結果は、過年度秋季調査結果と比較して大きな変化はみられなかった。

（３）ウバガイ（ホッキ貝）生息密度等調査結果

ウバガイ（ホッキ貝）生息密度等の調査結果を図表集 表-6 及び図-27 に示す。

1 回目の曳網では、生息密度は 450 個体/100m²、湿重量は 141.0 kg-wet/100m²、2 回目の曳網では、生息密度は 525 個体/100m²、湿重量は 172.6 kg-wet/100m²であった。また、個体重量に対する貝殻重量の割合は、1 回目、2 回目の曳網とも 70%であった。

2021 年度秋季調査結果を過年度秋季調査結果と比較したところ、生息密度、貝殻重量、軟体部湿重量及び個体重量に対する貝殻重量の割合に大きな変化はみられなかった。

（４）マクロベントス及びメイオベントス調査結果

マクロベントス及びメイオベントスの個体数（生息密度）の経年変化を図表集 図-28 及び図-29 に示す。


マクロベントスは、多毛綱、軟甲綱、二枚貝綱の順に出現個体数が多く、優占種^{1 3)}

^{1 3)} 総個体数に対して 5%以上を占める種

はカタマガリギボシイソメ、クルミガイ、フクロスガメであった。なお、2021 年度夏季調査において、調査測点 2 及び B で個体数が顕著に多くになっていたキヌタソコエビ属の個体数は少なくなり、フクロスガメが優占種となった。



カタマガリギボシイソメ



クルミガイ



フクロスガメ

底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻等を持つもので、出現個体数が多かったマクロベントスは、クルミガイ、フクロスガメ、キタスガメであった。



キタスガメ

2021 年度秋季調査結果を過年度秋季調査結果と比較したところ、個体数では調査測点

6で過年度秋季調査結果の平均値±標準偏差の範囲を下回っていた。調査測点6については、2017年度及び2019年度に同様の低い値がみられており、変動幅の大きい調査測点であることが考えられた。

その他の調査測点の調査結果は、過年度秋季調査結果と比較して大きな変化はみられなかった。

メイオベントスは、線形動物門（線虫の仲間）、有孔虫目（有孔虫の仲間）、繊毛虫門（繊毛虫の仲間）、ソコミジンコ目の順で出現個体数が多かった。繊毛虫門については、調査測点Aにおいて出現個体数が特に多く、その結果、調査測点Aの個体数が過年度秋季調査結果の平均値±標準偏差を上回り、苫小牧沖の調査範囲において、出現比率がソコミジンコ目より高くなったが、その差は僅かであった¹⁴⁾。優占分類群¹⁵⁾は線形動物門（線虫の仲間）及び有孔虫目（有孔虫の仲間）であった。



線虫の一種



有孔虫の一種



繊毛虫の一種



ソコミジンコ目

底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻等を持つもので、出現個体数が多かったメイオベントスは、有孔虫目、ソコミジンコ目、ノープリウスの幼生であった。

¹⁴⁾ 出現比率は、繊毛虫門が 3.4%、ソコミジンコ目が 2.3%であった。

¹⁵⁾ 総個体数に対して 5%以上を占める分類群



ノープリウスの幼生

2021 年度秋季調査結果を過年度秋季調査結果と比較したところ、個体数では調査測点 3 及び 9 で過年度秋季調査結果の平均値±標準偏差の範囲を下回っていた。調査測点 3 については 2018 年度に、調査測点 9 については 2016 年度及び 2019 年度に同様の低い値がみられており、変動幅の大きい調査測点であることが考えられた。

その他の調査測点の調査結果は、過年度秋季調査結果と比較して大きな変化はみられなかった。

担当者等連絡先

部 署 名：環境省 水・大気環境局水環境課海洋環境室

T E L：03-5521-9023（直 通）

責任者名：室長 山 下 信

担当者名：室長補佐 堀野上 貴章（内線：25523）