

【公表用資料】 2024年度苫小牧沖における春季調査(5～6月)結果(概要版)

2016年4月から苫小牧沖において、海洋汚染等防止法に基づく環境大臣の許可を受けた国内第1号の海底下 CCS 事業である苫小牧沖海底下 CCS 実証試験事業が開始され、海底下への CO₂ の圧入が経済産業省により実施されていきました。2019年11月末までに約 30 万 t の CO₂ が圧入され終了しました。

2024年度春季(2024年5～6月)に環境省が調査した結果、2011年度から2015年度までの調査¹⁾と比較して、大きな変化はみられず、海洋への CO₂ の漏出が懸念されるデータはありませんでした。

【調査の概要】

海底下 CCS 事業に係る許可制度の規制当局である環境省として独自に、最新の知見に基づくモニタリング技術を活用し、結果を検証していくことにより、海底下 CCS 事業における適切な海域のモニタリング技術及びその適用方法の確立を図ることを目的として、苫小牧沖において海洋調査を実施しました。

調査海域は苫小牧沖の約 10 km × 8 km の範囲とし、海水の化学的性状、底質、海洋生態系の変化について、図 1 に示す調査測点で調査しました。




図 1 調査海域及び調査測点

¹⁾ 2011～2015 年度に実施した海底下 CCS 実施のための海洋調査事業等

1. 海水の化学的性状調査

万が一、圧入された CO₂ が漏出した場合、海水中の CO₂ 濃度や平衡状態が変化すると予想され、例えば CO₂ の分圧 ($p\text{CO}_2$)²⁾ 及び全炭酸 (DIC) 濃度の上昇や pH の低下が起こることが考えられます。このような変化を検知するため、採水を行い、海水中の CO₂ に関係するパラメータとして DIC、アルカリ度、pH 及び塩分について分析し、 $p\text{CO}_2$ を算出しました。

海水中の CO₂ 濃度は、CO₂ の漏出のような外的な要因だけでなく、例えば海水の混合度合いや生物の呼吸・光合成などにより著しく変化します。これらの影響を把握するため、多項目水質センサを用いて水温及び塩分の分布を把握し、溶存酸素 (DO) や光合成を行う植物プランクトンの指標となるクロロフィル *a* 濃度についても分析しました。

海水の化学的性状調査は 2024 年 5 月 30 日、31 日に実施しました。

2. 底質調査

底泥中の水分 (間隙水) に CO₂ が溶解すると pH の低下が起こります。この変化を検知するため、採泥を行い、間隙水の pH (以下、「底質の pH」といいます。) を測定するとともに、関連項目として含水率、有機炭素、無機炭素、全窒素及び硫化物について分析しました。

底質調査は 2024 年 5 月 29 日、6 月 2 日、3 日に実施しました。

3. 海洋生態系把握調査

海洋生態系のうち、海底面上または底泥中に生息する底生生物は、海中を遊泳する魚類等と比較して移動範囲が狭いことから、底泥中の間隙水に CO₂ が溶解した場合、影響をより強く受ける可能性があります。特に炭酸カルシウムの殻を持つ生物は、底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられます。

底生生物については、肉眼でみえる大きさでドレッジやトロール等の底引き網で採取できるような大型の底生生物 (メガベントス)、1 mm 以上の中型の底生生物 (マクロベントス)、1 mm 未満の小型の底生生物 (メイオベントス) に区分されます。

ドレッジによる大型の底生生物採取調査は 2024 年 6 月 4 日に、苫小牧地域の水産重要種であるウバガイ (ホッキガイ) 生息密度等調査は 2024 年 5 月 27 日に実施しました。

また、中型の底生生物及び小型の底生生物調査は 2024 年 5 月 29 日、6 月 2 日、3 日に実施しました。

²⁾ 海水に溶けた CO₂ が生物等に実質的に作用する CO₂ の量の指標とされており、文中の「CO₂ 濃度」とほぼ同様の意味を持つものになります。

【調査の結果】

1. 海水の化学的性状調査

水温は 3.84～11.63 °C、塩分は 32.42～33.38、アルカリ度は 2,217～2,256 $\mu\text{mol/kg}$ 、DIC は 1,987～2,153 $\mu\text{mol/kg}$ 、pH は 7.75～8.11、 $p\text{CO}_2$ (計算値) は 272～499 μatm 、DO は 252～317 $\mu\text{mol/kg}$ 、DO 飽和度 (計算値) は 78～113 %、クロロフィル *a* 濃度は 0.1～3.8 $\mu\text{g/L}$ の範囲でした。過年度春季調査結果と比較すると、調査測点 1 の全層、調査測点 2、4、5、6 及び 9 の下層及び底層、調査測点 3 の表層以外の DIC、調査測点 1 の全層、調査測点 2～6 の下層及び底層の $p\text{CO}_2$ 、調査測点 3 及び 7 の表層及び上層、調査測点 6 の上層のクロロフィル *a* 濃度が過年度の最大値より高くなっています。また、調査測点 1 の全層、調査測点 2、3 及び 6 の下層及び底層の pH、調査測点 1 の全層、調査測点 2～7 及び 9 の下層及び底層の DO 飽和度、調査測点 4 及び 6 の下層のクロロフィル *a* 濃度が過年度の最小値より低くなっています。それ以外の調査測点及び項目については、過年度春季調査結果の最小値から最大値の範囲内に収まっています。

前述したように、海水中の CO_2 は、 CO_2 の漏出が起これなくても、海域での光合成や呼吸 (有機物の分解を含む) など生物的な要因により大きく変化します。光合成と呼吸は海水中の酸素の放出と消費を伴うことから、これら生物的な要因による変化分を $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度の関係から見積もることが可能であると考えられました。2011 年度から 2015 年度までの調査で得られたデータの解析により、調査海域における $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度には図 2 に示す累乗近似の曲線関係があることが確認されています。この曲線の 95% 予測区間の上限を超過するデータが確認された場合、 CO_2 圧入開始以前の過去の傾向から統計的に外れたとみなされることから、漏出を懸念することとしました。ただし統計学的には、漏出が発生していない場合においても、2.5% の確率で上限を超過するデータが確認される可能性があります。

2024 年度春季調査の $p\text{CO}_2$ と DO 飽和度との関係を 2011 年度から 2015 年度までの調査結果と比較したところ、図 2 のとおり、95% 予測区間の上限を超過するデータ、すなわち CO_2 漏出を懸念させるデータはありませんでした。




図2 pCO₂とDO飽和度との関係

2. 底質調査

pHは7.27～8.01、含水率は21.2～33.0%、有機炭素は0.9～9.5 mg/g-dry、無機炭素は定量下限値未満～0.2 mg/g-dry、全窒素は0.20～0.98 mg/g-dryの範囲でした。硫化物は調査測点3、5、B（2回目）及びCで検出され、0.1～0.3 mg/g-dryの範囲でした。

万が一CO₂が漏出した場合に値が低下すると考えられる底質のpH及び無機炭素については、全調査測点の結果を過年度春季調査結果と比較して、大きな変化はみられませんでした。

3. 海洋生態系把握調査

(1) ドレッジによる大型底生生物（メガベントス）採取調査結果

出現個体数は、多毛綱（ゴカイの仲間）のみ出現した環形動物門が最も多く、次いで二枚貝綱（二枚貝の仲間）が多数を占めた軟体動物門、軟甲綱（エビ・カニ・ヨコエビ等の仲間）のみ出現した節足動物門の順でありました。

底質のpH低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻を持つもので、出現個体数が多かったのはキララガイ、*Ophiura*属（クモヒトデの仲間）、スガメソコエビ属（エビ・カニ・ヨコエビ等の仲間）でした。

過年度春季調査結果と比較すると、出現個体数（生息密度）の合計では、調査測点9で

過年度春季調査結果の 95%信頼区間（平均値±2σ）³⁾ を下回りました。それ以外の調査測点では前記区間の範囲に収まっており、大きな変化はみられませんでした。

一方、一部の調査測点では大型底生生物の各分類群の組成は変動しており、今後も継続して変動の傾向を把握する必要があります。

(3) ウバガイ（ホッキ貝）生息密度調査結果

ウバガイ調査では2回曳網を行いました。1回目の曳網では499個体/100m²、湿重量は178.2 kg-wet/100m²、2回目の曳網では、生息密度は581個体/100m²、湿重量は201.5 kg-wet/100m²でした。また、個体重量に対する貝殻重量の割合は、1回目及び2回目の曳網ともに66%でした。

過年度春季調査結果と比較すると、生息密度（1、2回目とも）、貝殻重量及び軟体部湿重量では、それぞれの過年度春季調査結果の95%信頼区間（平均値±2σ）の範囲に収まっており、大きな変化はみられませんでした。また、個体重量に対する貝殻重量の割合も大きな変化はみられませんでした。

(4) 中型底生生物（マクロベントス）及び小型底生生物（メイオベントス）調査結果

中型底生生物の出現個体数は、多毛綱（ゴカイの仲間）のみ出現した環形動物門が最も多く、次いで二枚貝綱（二枚貝の仲間）が多数を占めた軟体動物門、軟甲綱（エビ・カニ・ヨコエビ等の仲間）が多数を占めた節足動物門の順でありました。

底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻を持つもので出現個体数が多かったのは、クルミガイ、キヌタソコエビ属、キタスガメでした。

過年度春季調査結果と比較して、出現個体数（生息密度）の合計では調査測点2及びCで過年度春季調査結果の95%信頼区間（平均値±2σ）を上回りました。それ以外の調査測点では前記区間の範囲に収まっており、大きな変化はみられませんでした。一方、一部の調査測点では中型底生生物の各分類群の組成は変動しており、今後も継続して変動の傾向を把握する必要があります。

小型底生生物の出現個体数は、線形動物門（線虫の仲間）が最も多く、次いで有孔虫目（有孔虫の仲間）が多数を占めた肉質鞭毛虫門、ソコミジンコ目（ソコミジンコの仲間）とノープリウス幼生が多数を占めた節足動物門の順でありました。

底質の pH 低下の影響を受けやすいと考えられる炭酸カルシウムの殻を持つもので、出現個体数が多かったのは、有孔虫目、ソコミジンコ目、ノープリウス幼生でした。

過年度春季調査結果と比較して、出現個体数（生息密度）の合計では調査測点4で過年度春季調査結果の95%信頼区間（平均値±2σ）を上回りました。それ以外の調査測点で

³⁾ 「σ」は標準偏差を示します。95%信頼区間を求めるための平均値と標準偏差は、同一調査測点における過年度春季調査結果を元に算出しました。

は前記区間の範囲に収まっており、大きな変化はみられませんでした。一方、一部の調査測点では小型底生生物の各分類群の組成は変動しており、今後も継続して変動の傾向を把握する必要があります。

担当者等連絡先

部 署 名：環境省 水・大気環境局海洋環境課

T E L：03-5521-9023（直 通）

：課長 水 谷 好 洋

担当者名：課長補佐 堀野上 貴 章（内線：25523）