医学的判定に関する留意事項（案） 新旧対照表

令和7年1月23日
中央環境審議会
石綿健康被害判定小委員会

○ Mesothelioma in situ(MIS)の取扱いに関する記載の追加について
(傍線部分は改訂部分)

改訂後	改訂前
<p>1 中皮腫について (略) (1) 病理組織診断を実施している場合について (略) その他の特殊な組織型、又は胸膜以外の中皮腫の場合には、これらの提出が推奨される¹。 <u>1前浸潤性中皮腫瘍である mesothelioma in situ についても、現時点では中皮腫に準じて取り扱うものとする。</u></p>	<p>1 中皮腫について (略) (1) 病理組織診断を実施している場合について (略) その他の特殊な組織型、又は胸膜以外の中皮腫の場合には、これらの提出が推奨される。</p>

○ Claudin4 の推奨度の変更について
(傍線部分は改訂部分)

改訂後	改訂前
<p>1 中皮腫について (略) (1) 病理組織診断を実施している場合について (略) ③中皮腫診断に有用な免疫染色として、(略) 中皮腫では陰性になり、多くの癌で陽性になる <u>claudin 4</u> についても結果を添付することが強く推奨される。 (略) 女性の腹膜中皮腫が疑われる場合には、婦人科腫瘍との鑑別のため、腹膜中皮腫の場合には陰性となる <u>claudin 4</u> を確認することが強く推奨される。また、<u>estrogen receptor (ER)、progesteron receptor (PgR)</u> を併せて確認することも推奨される。</p>	<p>1 中皮腫について (略) (1) 病理組織診断を実施している場合について (略) ③中皮腫診断に有用な免疫染色として、(略) <u>Claudin 4</u> は中皮腫では陰性になり、多くの癌で陽性になるため、確認することが重要である。 (略) 女性の腹膜中皮腫が疑われる場合には、婦人科腫瘍との鑑別のため、腹膜中皮腫の場合には陰性となる <u>estrogen receptor (ER)、progesteron receptor (PgR)</u> を併せて確認することが強く推奨される。また、<u>claudin 4</u> を確認することも重要である。</p>