

水質汚濁に係る人の健康の保護に関する
環境基準等の見直しについて
(第 7 次報告案)

2 1. はじめに

3 環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準のうち、公共用水域の水質汚濁に
4 係る人の健康の保護に関する環境基準の項目については、現在27項目が定められ
5 ており、地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目については、現在28項目が定め
6 られている（以下、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基
7 準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準をあわせて「水質環境基準健康項目」と
8 いう）。

9 また、人の健康の保護に関連する物質ではあるが、公共用水域及び地下水（以
10 下、「公共用水域等」という。）における検出状況等からみて、直ちに水質環境基
11 準健康項目とせず、引き続き公共用水域等の検出状況などの知見の集積に努める
12 べきものについては、「要監視項目」として位置づけており、現在、要監視項目に
13 ついては公共用水域において27項目、地下水において25項目の監視等が行われて
14 いる。

15 「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて（第5
16 次答申）（令和2年5月27日）」（以下、「第5次答申」という。）において、ペルフ
17 ルオロオクタンスルホン酸（以下、「PFOS」という。）及びペルフルオロオクタン
18 酸（以下、「PFOA」という。）を要監視項目に位置づけるとともに、「現時点で毒性
19 学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であるものの、各国・各機関が行っ
20 た評価の中で妥当と考えられるものを参考に指針値（暫定）とすることが適当で
21 ある」とされ、当時の知見を基に、PFOS及びPFOAの合算値として50ng/Lが設定さ
22 れた。

23 今般、令和6年6月に内閣府食品安全委員会が「有機フッ素化合物（PFAS）に
24 係る食品健康影響評価」（以下、「評価書」という。）を取りまとめたこと等を踏ま
25 え、公共用水域等におけるPFOS及びPFOAの指針値（暫定）の取扱いについて検討
26 し、結果を取りまとめた。

2. 検討事項等

前述のとおり、令和2年に PFOS 及び PFOA の指針値(暫定)を設定した際には、毒性学的に明確な基準値及び指針値の設定は困難であったが、令和6年6月に、内閣府食品安全委員会の評価書において、耐容一日摂取量(以下「TDI」という。)として、PFOS は 20ng/kg 体重/日 ($2 \times 10^{-5} \text{ mg/kg}$ 体重/日)、PFOA は 20 ng/kg 体重/日 ($2 \times 10^{-5} \text{ mg/kg}$ 体重/日)と設定することが妥当と判断された。このような状況を踏まえて、PFOS 及び PFOA の指針値(暫定)の取扱いについて検討を行った。

なお、検討にあたっては、第5次答申の「2. (2) 2) 水質環境基準健康項目基準値及び要監視項目指針値の設定の考え方」に記載された考え方を基本とした。

3. 検討結果

現在設定されている PFOS 及び PFOA の指針値(暫定)については、内閣府食品安全委員会の評価書において、PFOS 及び PFOA に関する TDI を設定したことを踏まえると、毒性学的に明確な基準値又は指針値の設定が可能と判断されることから、「指針値(暫定)」を「指針値」とし、また、指針値の導出においては、寄与率・体重・1日あたりの摂取量等については基本的な考え方を適用した上で、内閣府食品安全委員会の食品健康影響評価結果を踏まえると、PFOS、PFOA それぞれ 50ng/L となるところ、安全側の観点から PFOS と PFOA の合計値として 50ng/L とすることが適当である。

1) 指針値の導出根拠

内閣府食品安全委員会の評価書において、食品健康影響の指標値の算出の根拠として、PFOS については、ラット2世代生殖・発生毒性試験(Luebker et al. 2005a)でみられた児動物における体重増加抑制を、PFOA については、マウス生殖・発生毒性試験(Lau et al. 2006)でみられた胎児の前肢及び後肢の近位指節骨の骨化部位数の減少、雄の児動物の性成熟促進をそれぞれ採用した。また、血中濃度から摂取量への換算のための独自の用量推計モデルの構築には期間を要すること等から、海外評価機関で採用された用量推計モデル等を確認した上で、その計算結果を適用し、TDI として PFOS は 20ng/kg 体重/日 ($2 \times 10^{-5} \text{ mg/kg}$ 体重/日)、PFOA は 20 ng/kg 体重/日 ($2 \times 10^{-5} \text{ mg/kg}$ 体重/日)と設定することが妥当と判断された。

この結果を踏まえて、指針値の導出においては、水の飲用に係る寄与率を 10%、体重を 50kg 、1日あたりの摂取量を 2L とし、内閣府食品安全委員会の評価書で示された TDI を適用すると、PFOS、PFOA それぞれ 50ng/L となるところ、安全側の観点から PFOS と PFOA の合計値として 50ng/L とする。

4. おわりに

内閣府食品安全委員会の評価書の結果を踏まえた PFOS 及び PFOA の指針値（暫定）の取扱いについて、以上のとおり結論を得たところである。

PFOS 及び PFOA は、引き続き、環境中で検出される状況が認められるものの、国民の健康リスクの低減の観点からは、飲み水の安全性を確保するための水道水源から蛇口までの一体的なリスク管理を図ることが重要であり、水道水質基準への位置づけとともに、水道水源等での重点的な環境モニタリングや飲用井戸等での検査促進、指針値等を超過した場合の飲用摂取防止等の取組を講じていくことが適当である。

その上で、製造・輸入等は既に原則禁止されているものの、主に過去様々な形で排出された PFOS・PFOA が環境中等に残存している状況であること、環境中で指針値を超過した地域における汚染の態様が様々であることを踏まえ、①環境中への流出や拡散に係る知見（分析法に係る知見を含む）の収集や、効果的・効率的な対策技術に係る知見の収集を進めていく必要があること、②これらの成果を地方自治体等に提供しつつ、汚染の態様に応じた対策の効果や実行可能性や、健康リスクの低減に効果的な対策のあり方に関する検討を進める必要があること、③水質汚染による食品への影響（水・土壌から農水産物への移行特性、食品中の PFOS 等の含有実態等）に関する知見についても把握していく必要があることから、当面の間、環境中での検出状況のほか、様々な知見の集積を図りつつ、引き続き、「検討に当たっての基本的考え方」（第5次答申 2.（2））の適用の在り方について検討することとする。

PFOS 及び PFOA に係る基礎的情報

付表 1 PFOS 及び PFOA の物理化学的性状

名称	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)
構造式	$\text{F}_3\text{C}-(\text{CF}_2)_7-\text{S}(=\text{O})_2-\text{OX}$ X=H、K など	$\text{F}_3\text{C}-(\text{CF}_2)_6-\text{C}(=\text{O})-\text{OX}$ X=H、NH₄ など
CAS No.	1763-23-1(酸) 29081-56-9(アンモニウム塩) 70225-14-8(ジエタノールアミン(DEA)塩) 2795-39-3(カリウム塩) 29457-72-5(リチウム塩)	335-67-1(酸) 3825-26-1(アンモニウム塩) 335-95-5(ナトリウム塩) 2395-00-8(カリウム塩) 335-93-3(銀塩)
組成式	C ₈ F ₁₇ O ₃ SX(X は H, K など)	C ₈ F ₁₅ O ₂ X(X は H, NH ₄ など)
分子量	500.1(酸)	414.1(酸)
物理的性状	液状(酸) ¹⁾ 、白色粉末(カリウム塩)	白色粉末(酸、アンモニウム塩) ¹⁾
融点	>400℃(カリウム塩)	54.3℃(酸) 157～165℃(アンモニウム塩、165℃で 20%が分解)
沸点	249℃(酸) ¹⁾	188℃(酸、760mmHg) 189℃(酸、736mmHg) 192℃(酸) ¹⁾
比重、密度	～0.6(カリウム塩) ～1.1(リチウム塩) ～1.1(アンモニウム塩) ～1.1(ジエタノールアミン塩)	1.792 g/cm ³ (酸、20℃) 0.6～0.7 g/cm ³ (アンモニウム塩、かさ密度)
蒸気圧	0.85Pa(酸、25℃、MPBPWIN により算出) 1.9×10 ⁻⁹ Pa(カリウム塩、25℃、MPBPWIN により算出)	4.2Pa(酸、25℃、外挿値) 3Pa(酸、20℃、外挿値) 8×10 ⁻³ Pa(アンモニウム塩、20℃、外挿値)
オクタノール/ 水分分配係数 (log Pow)	4.49、5.43(酸、推定値) ¹⁾	4.81、5.11(酸、推定値) ¹⁾ オクタノール・水混合物中に複数の層を形成するため、実測不可(酸) ²⁾
解離定数 (pKa)	0.14(酸、推定値) ²⁾	2.5、2.8(酸)
水溶解度	519 mg/L(カリウム塩、20±0.5℃) 680 mg/L(カリウム塩、24～25℃) 570 mg/L(カリウム塩) 370 mg/L(カリウム塩、淡水) 12.4 mg/L(カリウム塩、未ろ過海水) 25 mg/L(カリウム塩、ろ過海水) 12.4 mg/L(カリウム塩、天然海水、22～23℃) 20.0 mg/L(カリウム塩、3.5%NaCl 溶液、22～24℃)	3.3×10 ³ mg/L(酸、25℃) ¹⁾ 9.5×10 ³ mg/L(酸、25℃)

土壌吸着性	土壌吸着定数 (Kd) : 18.3 (カリウム塩、粘土) 9.72 (カリウム塩、Clay Loam) 35.3 (カリウム塩、Sandy Loam) 7.42 (カリウム塩、河川底質) 土壌吸着定数 (Koc) : 704 (カリウム塩、粘土) 374 (カリウム塩、Clay Loam) 1,260 (カリウム塩、Sandy Loam) 571 (カリウム塩、河川底質)	土壌吸着定数 (Kd) : 4.25～8.86 (アンモニウム塩、土壌(Drummer)) 0.41～0.83 (アンモニウム塩、土壌(Hidalgo)) 1.19 ～ 2.84 (アンモニウム塩、土壌(Cape Fear)) 1.82～4.26 (アンモニウム塩、土壌(KeyPort)) 土壌吸着定数 (Koc) : 73.8～111 (アンモニウム塩、土壌(Drummer)) 53.0～108 (アンモニウム塩、土壌(Hidalgo)) 95.9～229 (アンモニウム塩、土壌(Cape Fear)) 48.9～115 (アンモニウム塩、土壌(KeyPort))
-------	---	---

【出典】一部を除き、PFOS は化学物質の環境リスク評価(第 6 巻)(環境省)、PFOA は化学物質の環境リスク評価(第 9 巻)(環境省)による。一部の出典は以下のとおり。

- 1) 評価書 有機フッ素化合物(PFAS) 食品安全委員会(令和 6 年(2024 年)6 月)
- 2) ATSDR; Toxicological Profile for Perfluoralkyls. Atlanta, GA: Agency for Toxic Substances and Disease Registry, US Public Health Service (2020). Available from, as of May, 2021
(<https://wwwn.cdc.gov/TSP/ToxProfiles/ToxProfiles.aspx?id=1117&tid=237>)