

平成16年度 SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>濃度 月・年平均值

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均值	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	25.2	11.9	18.5	12.5	11.8	31.1	47.2	44.4	33.7	32.8	55.9	27.9	27.5	331	1.1
札幌	31.8	22.7	13.2	10.3	6.0	14.1	32.0	25.5	23.5	*	27.0	35.2	21.2	91.7	4.8
落石岬	27.0	32.0	10.8	17.1	18.3	24.3	23.5	38.9	98.2	69.4	73.3	31.6	29.5	343	3.7
竜飛岬	227	23.8	27.5	24.3	10.9	12.9	23.4	29.2	33.3	46.0	*	*	23.9	3360	1.4
八幡平	*	16.3	18.0	8.5	5.4	13.0	7.9	19.6	10.5	15.2	23.6	37.6	13.4	200	0.6
籠岳	18.6	10.0	10.5	15.4	10.3	8.6	5.8	11.0	7.4	12.9	13.1	22.2	10.9	142	1.3
尾花沢	21.1	10.0	5.3	8.5	5.9	13.9	5.5	21.0	13.9	18.1	18.8	42.3	14.3	56.4	2.1
筑波	34.4	19.2	19.5	14.6	16.0	15.9	8.8	13.3	12.4	5.8	*	47.1	15.2	128	1.6
赤城	29.0	22.5	15.1	2.4	*	11.8	5.0	14.8	3.9	12.3	10.8	29.2	13.5	172	0.2
小笠原	23.7	6.9	8.2	7.6	7.1	7.6	7.2	9.5	13.6	16.1	9.7	18.4	11.3	162	1.7
佐渡関岬	*	10.3	14.5	15.3	3.8	17.0	20.5	35.9	45.5	93.0	97.9	74.5	25.1	1810	0.0
新潟巻	28.4	9.2	11.0	16.2	6.8	31.8	20.9	27.8	32.0	34.7	48.4	34.8	22.2	565	2.4
八方尾根	18.7	7.0	8.6	11.5	3.6	4.5	7.3	10.1	9.7	8.3	13.4	17.6	9.3	153	0.0
越前岬	33.2	9.8	8.7	9.1	13.8	5.1	16.9	32.8	24.9	60.7	50.3	41.2	24.8	258	0.4
伊自良湖	14.5	16.9	12.9	12.1	*	15.7	5.3	15.6	6.1	14.0	12.4	20.8	13.5	171	3.3
犬山	30.4	13.5	11.0	10.4	17.3	34.3	36.3	56.7	12.8	23.3	16.5	25.0	17.7	388	2.0
潮岬	64.7	16.1	12.9	24.3	8.3	30.5	48.9	9.0	8.3	14.2	24.5	28.8	23.2	1220	1.5
京都八幡	19.4	11.3	9.9	18.6	7.9	3.2	4.5	10.1	5.1	9.3	14.9	26.0	10.4	139	0.9
尼崎	16.8	11.8	12.9	20.4	16.8	8.3	3.6	9.0	9.0	12.4	21.9	25.3	11.5	103	1.1
倉橋島	17.0	13.7	14.1	24.3	12.6	12.9	8.0	13.6	5.2	36.9	16.6	26.0	13.7	167	2.7
隠岐	30.2	10.2	10.2	12.2	11.9	12.1	34.2	92.8	36.1	91.7	80.3	61.6	30.9	533	2.3
蟠竜湖	34.3	9.6	12.6	12.6	12.1	15.4	22.9	27.7	17.9	51.0	75.1	53.2	21.6	159	4.4
梶原	5.7	5.6	5.6	9.2	5.2	5.9	2.9	8.1	4.9	28.4	8.2	18.2	6.7	318	0.0
筑後小郡	73.8	10.7	13.9	14.5	13.7	12.0	4.1	17.2	8.6	40.1	30.0	21.9	14.9	249	2.2
大分久住	17.9	10.4	3.8	17.3	13.0	8.3	7.0	68.3	5.2	32.4	10.6	26.4	11.6	105	1.5
対馬	19.6	13.5	31.4	27.4	17.3	19.2	19.4	21.5	13.3	*	*	*	17.6	142	2.5
五島	27.6	17.9	7.2	14.6	14.5	25.7	12.9	14.9	13.4	38.1	15.0	*	17.1	230	1.5
えびの	25.6	9.6	7.6	27.1	4.4	5.9	1.7	15.0	6.6	20.2	11.3	22.3	9.5	192	0.4
屋久島	21.4	*	15.6	15.0	10.8	22.0	20.7	21.3	32.1	35.6	20.9	33.5	21.1	275	6.9
辺戸岬	21.0	7.1	*	8.6	22.4	*	258	16.7	75.8	66.3	40.5	56.6	74.6	1950	3.4
最大値 <sup>1)</sup>	227	32.0	31.4	27.4	22.4	34.3	258	92.8	98.2	93.0	97.9	74.5	74.6	3360	6.9
最小値 <sup>1)</sup>	5.7	5.6	3.8	2.4	3.6	3.2	1.7	8.1	3.9	5.8	8.2	17.6	6.7	56.4	0.0
全国平均	34.2	13.4	12.8	14.7	11.0	15.3	24.1	25.0	20.8	33.6	31.1	33.5	19.2		
標準偏差	40.2	6.0	6.0	6.2	5.0	8.8	46.0	19.3	21.5	24.2	25.2	14.4	12.3		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均值の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 nss- $\text{SO}_4^{2-}$ 濃度 月・年平均値

単位： $\mu\text{mol/L}$

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	17.1	10.0	17.5	11.8	7.3	5.8	16.6	13.5	13.6	17.7	19.9	19.0	13.1	59.3	0.9
札幌	23.9	22.2	12.9	9.4	5.5	12.4	16.5	10.6	13.2	*	12.7	27.6	14.0	85.4	4.3
落石岬	20.2	21.1	8.7	16.5	4.6	8.8	9.7	13.1	16.5	18.0	10.2	8.3	12.5	308	0.6
竜飛岬	191	19.7	16.7	22.8	5.8	5.5	11.6	11.8	13.0	18.9	*	*	13.2	191	0.0
八幡平	*	16.2	17.8	8.5	4.5	12.0	7.5	13.9	9.3	12.3	11.4	34.4	11.6	113	0.5
籠岳	17.8	9.7	9.9	15.1	8.2	7.5	5.2	10.5	5.8	9.4	10.9	21.6	10.1	88.9	1.0
尾花沢	19.2	9.9	5.1	8.2	5.4	13.4	5.1	17.7	10.0	13.1	11.5	33.1	11.7	50.3	2.0
筑波	31.8	18.5	18.6	13.5	14.9	14.5	8.1	11.5	8.7	4.6	*	42.7	13.9	126	1.3
赤城	27.7	22.3	14.9	2.4	*	11.5	4.9	14.7	3.8	11.2	10.1	28.1	13.2	170	0.2
小笠原	8.7	2.9	2.4	3.0	1.1	1.8	0.5	3.3	3.7	7.1	5.5	10.5	4.1	51.5	0.0
佐渡関岬	*	9.5	10.2	10.6	1.0	8.8	10.6	23.7	14.3	20.8	25.2	42.2	10.9	757	0.0
新潟巻	22.4	8.7	10.4	14.5	5.7	10.9	10.5	20.0	16.6	13.7	24.4	25.1	14.5	167	1.8
八方尾根	18.1	6.5	8.5	11.3	3.5	4.4	7.2	9.7	9.1	7.7	12.9	16.5	9.0	147	0.0
越前岬	30.0	9.4	8.1	7.9	8.0	4.6	6.5	22.6	11.6	19.8	19.6	27.4	14.1	230	0.0
伊自良湖	13.6	16.6	11.4	11.5	*	14.5	4.0	14.5	4.8	11.4	10.2	19.4	12.4	168	2.0
犬山	28.2	13.0	10.4	9.9	14.4	32.0	33.0	53.2	11.3	21.7	16.1	24.0	16.3	370	1.9
潮岬	26.5	10.8	9.1	16.2	2.8	8.4	3.6	4.9	5.8	12.1	15.8	21.0	8.5	279	0.0
京都八幡	18.5	10.9	9.3	18.2	7.1	3.1	4.1	9.7	4.7	8.4	14.3	25.0	9.9	138	0.8
尼崎	16.1	10.7	11.5	19.6	7.5	7.8	3.4	8.7	6.9	11.5	21.2	24.0	9.9	98.7	1.1
倉橋島	13.3	13.1	13.8	21.6	5.3	11.3	6.7	12.7	4.9	34.9	16.0	24.6	12.1	163	1.2
隠岐	27.5	8.6	8.0	11.0	4.4	3.5	5.8	33.6	15.8	25.5	23.4	31.4	12.9	399	0.0
蟠竜湖	29.5	9.4	7.7	9.7	9.1	9.8	7.9	22.5	10.5	28.4	55.1	39.8	14.1	88.6	0.3
栲原	5.2	5.4	4.8	8.6	2.6	3.7	2.4	7.0	4.1	25.5	7.8	17.4	5.4	289	0.0
筑後小郡	71.0	10.4	13.1	12.5	12.2	11.4	3.4	16.4	7.9	29.6	21.6	20.4	13.4	233	1.6
大分久住	17.6	10.2	3.6	17.1	11.8	7.5	6.5	66.4	4.9	31.8	10.3	25.9	10.9	104	1.4
対馬	18.2	13.0	30.7	22.1	14.8	9.4	14.9	18.5	11.7	*	*	*	14.0	141	0.0
五島	15.4	13.5	5.7	6.2	5.8	5.6	5.5	11.7	10.0	28.9	11.7	*	9.2	221	0.0
えびの	24.3	9.2	6.9	26.3	3.2	4.6	1.6	14.4	6.2	18.6	9.2	20.9	8.6	189	0.2
屋久島	16.7	*	7.8	12.1	6.8	8.1	5.8	13.6	15.7	25.2	13.3	22.4	9.7	117	2.4
辺戸岬	15.3	4.7	*	7.4	8.3	*	56.6	9.7	28.4	26.0	22.3	26.6	25.2	781	0.0
最大値 <sup>1)</sup>	191	22.3	30.7	26.3	14.9	32.0	56.6	66.4	28.4	34.9	55.1	42.7	25.2	781	4.3
最小値 <sup>1)</sup>	5.2	2.9	2.4	2.4	1.0	1.8	0.5	3.3	3.7	4.6	5.5	8.3	4.1	50.3	0.0
全国平均	28.0	11.9	10.9	12.8	6.8	9.1	9.5	17.1	10.1	18.4	16.4	25.2	11.9		
標準偏差	33.9	5.1	5.7	5.8	3.8	5.7	10.8	13.2	5.4	8.4	9.5	8.3	3.7		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 NO<sub>3</sub><sup>-</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	13.8	8.2	16.7	10.0	8.2	4.2	14.7	10.1	9.8	18.0	15.6	9.5	10.8	92.0	0.8
札幌	20.6	23.5	15.9	9.2	5.0	8.6	12.7	9.9	9.7	*	12.4	21.9	12.1	87.2	3.0
落石岬	36.8	18.6	10.5	9.7	4.6	7.6	10.2	11.0	16.0	36.6	14.7	10.1	13.1	279	0.1
竜飛岬	192	24.7	22.4	22.5	6.7	7.4	12.4	13.3	12.4	15.8	*	*	14.6	407	0.8
八幡平	*	13.5	20.7	8.3	5.2	8.5	5.0	11.4	9.7	13.8	14.7	39.7	10.9	116	0.5
籠岳	23.0	11.5	13.9	18.5	9.9	7.9	5.0	12.9	6.0	9.2	16.3	30.4	12.3	159	0.9
尾花沢	20.5	10.5	9.8	11.4	7.2	11.0	4.4	13.3	7.7	10.1	14.9	38.4	12.4	72.2	1.7
筑波	32.7	27.6	24.8	28.6	23.4	17.7	7.8	14.5	9.7	8.5	*	39.5	17.2	191	0.6
赤城	37.6	20.1	20.5	5.0	*	13.4	6.2	30.8	5.7	4.9	21.1	76.6	18.2	265	0.2
小笠原	10.5	4.3	3.6	3.4	0.7	2.2	0.8	3.7	3.6	6.2	4.3	8.3	3.9	39.6	0.0
佐渡関岬	*	7.8	17.9	12.8	2.4	11.1	13.5	22.6	13.7	22.1	19.7	57.9	12.6	345	0.0
新潟巻	19.4	11.1	13.4	13.7	7.4	14.3	8.8	18.7	17.2	13.2	25.1	35.9	15.3	177	2.4
八方尾根	19.3	13.3	9.4	10.3	4.6	5.2	4.0	6.1	4.9	6.2	7.6	22.3	8.4	264	0.4
越前岬	24.1	8.0	12.9	11.7	12.2	8.8	7.9	29.4	12.7	28.9	17.3	34.5	16.3	341	0.0
伊自良湖	15.4	13.4	12.5	16.6	*	23.2	5.6	17.4	7.1	19.2	16.3	29.0	15.4	175	2.1
犬山	34.8	14.2	14.4	15.2	26.9	58.5	38.1	76.1	27.3	45.1	30.0	22.8	23.1	489	2.5
潮岬	20.7	8.8	10.4	15.1	2.5	7.7	6.6	3.2	8.3	18.2	19.0	18.7	8.6	402	0.5
京都八幡	21.7	13.3	15.2	29.3	10.9	5.8	6.0	12.4	9.9	16.0	21.2	29.7	13.6	138	1.2
尼崎	18.6	11.6	14.5	14.9	6.0	9.8	6.2	9.1	11.7	24.6	23.5	28.2	11.9	106	1.3
倉橋島	14.2	10.5	13.2	29.1	8.6	11.7	10.4	16.7	8.4	75.3	17.0	29.2	13.2	302	0.0
隠岐	25.9	10.3	9.6	19.8	6.5	6.3	11.0	99.6	20.2	32.4	14.6	36.0	16.8	570	1.3
蟠竜湖	27.2	10.7	9.3	15.0	13.6	9.2	8.4	32.4	16.3	59.3	53.4	51.1	17.2	167	2.6
栲原	5.8	4.4	4.9	6.5	3.0	3.2	3.0	4.6	7.2	42.9	9.6	14.7	5.5	119	0.0
筑後小郡	59.6	11.7	15.3	19.1	19.4	8.6	6.7	18.1	9.0	34.7	18.0	20.9	14.6	421	0.0
大分久住	11.6	7.2	3.2	8.0	8.9	4.7	4.2	18.5	5.8	28.0	6.9	15.9	7.6	76.6	2.0
対馬	17.9	9.6	48.7	19.1	15.2	10.8	14.9	19.1	12.5	*	*	*	13.2	243	1.8
五島	13.6	12.8	6.4	8.0	7.6	6.4	6.1	10.8	15.1	41.4	13.0	*	10.3	347	0.5
えびの	14.4	5.6	8.5	12.7	2.5	3.2	2.4	9.0	4.2	15.0	7.5	14.5	6.0	215	0.0
屋久島	11.9	*	6.1	9.0	7.5	8.6	8.2	15.0	18.9	21.7	14.5	16.7	9.9	139	1.5
辺戸岬	12.2	7.5	*	7.6	2.3	*	6.7	8.1	21.4	19.4	13.9	20.2	13.3	322	0.0
最大値 <sup>1)</sup>	192	27.6	48.7	29.3	26.9	58.5	38.1	99.6	27.3	75.3	53.4	76.6	23.1	570	3.0
最小値 <sup>1)</sup>	5.8	4.3	3.2	3.4	0.7	2.2	0.8	3.2	3.6	4.9	4.3	8.3	3.9	39.6	0.0
全国平均	27.7	12.2	14.0	14.0	8.5	10.5	8.6	19.3	11.4	24.5	17.1	28.6	12.6		
標準偏差	34.1	5.8	8.6	6.9	6.3	10.2	6.6	20.3	5.6	16.7	9.3	15.6	4.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 Cl<sup>-</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	155	35.4	18.7	12.6	82.7	453	575	556	388	287	666	167	266	5050	2.8
札幌	159	14.6	9.0	19.2	9.2	32.5	310	291	203	*	280	153	142	1290	3.4
落石岬	126	204	39.1	12.1	260	299	261	493	1500	951	1220	408	320	5960	8.4
竜飛岬	641	74.2	219	29.6	102	147	235	341	393	523	*	*	210	69000	3.1
八幡平	*	4.2	4.6	2.5	15.9	19.7	8.9	106	22.8	55.6	232	63.0	34.2	3070	0.0
籠岳	15.7	7.6	12.0	5.1	39.6	16.9	7.8	9.3	30.0	67.1	47.6	9.6	13.9	950	0.5
尾花沢	37.2	3.9	3.0	4.5	11.8	8.4	6.0	64.3	73.8	99.2	147	172	51.9	288	1.1
筑波	46.3	15.1	17.7	20.2	17.2	25.3	12.6	38.2	86.1	21.6	*	87.2	24.6	762	1.4
赤城	34.4	3.9	9.5	2.5	*	6.3	2.5	12.4	3.3	19.4	16.1	23.1	7.6	154	0.2
小笠原	282	70.7	106	83.0	120	112	121	107	182	163	77.7	141	132	2680	19.8
佐渡関岬	*	17.8	84.4	89.6	54.2	160	192	239	581	1370	1420	665	273	33300	0.4
新潟巻	113	10.2	11.3	31.1	18.9	401	200	145	293	343	464	185	143	8410	1.0
八方尾根	11.7	49.2	3.2	4.7	2.8	2.6	3.6	9.6	12.5	11.2	10.9	19.8	8.3	222	0.4
越前岬	57.3	7.0	11.4	19.8	113	8.4	193	198	262	808	603	298	211	1970	0.4
伊自良湖	18.7	6.1	27.2	13.0	*	23.2	24.9	21.6	25.6	55.3	43.6	27.0	22.4	148	2.1
犬山	37.7	9.0	9.4	9.2	56.2	38.1	63.4	49.8	24.6	24.0	7.2	19.2	25.2	297	1.5
潮岬	861	110	75.2	139	108	486	1130	86.1	49.7	38.8	175	152	336	22500	2.7
京都八幡	15.9	8.5	16.3	8.3	15.5	2.9	7.9	10.1	6.7	18.8	10.0	21.0	10.9	270	1.1
尼崎	13.5	22.0	28.5	19.6	176	10.3	5.1	11.3	42.0	22.7	13.6	25.7	31.1	1430	1.1
倉橋島	81.9	16.9	7.1	62.0	157	34.5	29.6	18.4	6.8	47.0	10.9	30.7	35.5	342	1.2
隠岐	49.0	27.1	39.7	21.0	131	172	521	1130	359	1250	1100	586	337	9180	3.9
幡竜湖	92.8	6.4	99.2	64.6	60.1	112	286	98.9	146	438	377	262	146	2250	3.6
栲原	8.7	3.2	14.8	10.0	47.0	43.7	10.0	21.6	16.1	60.4	9.0	17.5	26.1	436	0.0
筑後小郡	55.2	4.2	16.7	38.2	29.9	12.5	13.8	14.4	14.8	223	168	29.7	28.8	3170	0.7
大分久住	7.3	4.0	4.4	14.3	24.2	11.4	9.6	45.2	5.1	14.9	7.6	25.9	12.7	92.8	0.6
対馬	25.2	9.6	16.4	98.1	49.9	182	82.3	61.2	32.7	*	*	*	68.1	859	1.3
五島	224	76.4	24.8	157	163	375	38.9	62.4	63.5	160	55.7	*	135	1800	3.8
えびの	25.2	8.3	15.1	15.7	23.7	25.6	2.9	14.4	8.6	35.3	40.7	28.7	19.6	518	0.5
屋久島	86.8	*	159	69.9	67.9	260	304	157	348	212	148	210	229	3500	22.6
辺戸岬	124	57.7	*	26.0	278	*	3780	147	832	722	347	548	925	21000	14.1
最大値 <sup>1)</sup>	861	204	219	157	278	486	3780	1130	1500	1370	1420	665	925	69000	22.6
最小値 <sup>1)</sup>	7.3	3.2	3.0	2.5	2.8	2.6	2.5	9.3	3.3	11.2	7.2	9.6	7.6	92.8	0.0
全国平均	122	30.6	38.0	36.7	79.8	120	281	152	200	287	285	162	141		
標準偏差	193	43.4	51.1	40.7	73.5	150	703	232	317	387	395	188	185		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 NH<sub>4</sub><sup>+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	25.6	12.1	26.4	19.1	11.4	3.7	27.7	14.3	12.0	16.0	26.2	19.7	16.1	103	0.0
札幌	37.4	26.9	26.6	14.8	8.6	13.8	35.7	21.3	19.3	*	23.3	35.2	21.2	179	5.2
落石岬	28.0	19.8	9.8	8.2	3.3	4.8	8.4	9.7	15.8	21.6	7.5	9.9	11.1	563	0.0
竜飛岬	252	21.2	27.1	29.2	5.4	4.5	12.4	8.7	9.7	18.2	*	*	13.6	832	0.0
八幡平	*	22.3	31.9	12.5	5.0	8.6	4.9	9.8	6.7	10.2	9.9	39.2	11.5	122	0.0
籠岳	21.0	17.0	19.3	19.2	8.5	6.5	6.1	8.4	5.6	10.0	23.0	23.0	13.1	128	2.3
尾花沢	24.0	14.2	9.0	13.4	9.8	10.6	5.6	14.2	9.1	12.8	9.5	41.7	13.4	62.6	2.0
筑波	34.6	27.0	28.6	25.4	15.9	13.9	5.0	8.3	19.2	3.7	*	51.6	15.6	195	0.8
赤城	42.4	30.1	23.9	55.8	*	15.3	5.9	34.8	6.3	10.2	23.6	61.2	20.8	553	0.0
小笠原	15.7	5.3	4.1	3.2	4.6	1.9	3.3	4.6	3.3	6.6	6.0	11.9	5.7	40.6	0.8
佐渡関岬	*	10.4	17.2	10.0	1.0	7.6	11.6	18.6	12.4	31.7	28.3	51.5	12.0	1060	0.0
新潟巻	24.8	9.8	15.4	17.0	5.3	9.7	7.0	19.2	13.0	12.2	25.5	28.7	14.8	189	1.0
八方尾根	18.9	4.5	12.5	13.1	3.6	3.9	6.9	5.8	5.2	5.4	8.7	17.7	8.3	206	0.1
越前岬	28.4	5.4	5.7	8.6	9.6	2.9	7.5	23.8	8.3	36.6	17.1	28.9	14.2	210	0.0
伊自良湖	14.3	18.6	21.2	15.1	*	13.6	2.5	9.0	3.7	11.6	8.2	21.6	13.9	132	0.8
犬山	34.0	17.4	17.9	19.7	22.3	39.8	21.5	56.4	19.8	32.8	21.5	27.9	22.5	468	4.2
潮岬	31.0	11.9	10.3	28.0	4.0	4.3	3.2	0.9	1.0	3.4	4.9	15.6	7.2	318	0.0
京都八幡	22.3	13.0	12.0	28.3	10.3	4.3	2.5	6.5	7.1	15.1	17.9	36.7	12.0	181	0.0
尼崎	21.6	11.0	13.8	22.2	6.4	7.2	5.0	9.5	7.7	24.1	20.6	28.4	11.3	134	0.0
倉橋島	12.3	13.4	13.7	21.8	6.4	8.0	5.1	10.9	3.9	43.3	11.6	27.7	11.6	259	0.5
隠岐	23.6	6.0	7.9	11.5	3.6	3.2	6.5	30.8	11.9	15.9	12.1	35.3	10.7	368	0.0
蟠竜湖	28.6	8.0	6.2	9.8	6.1	4.5	4.7	18.5	9.9	34.7	53.2	50.9	12.7	109	0.5
栲原	5.7	4.1	4.9	10.7	2.2	2.9	1.1	6.2	3.9	24.4	4.4	16.5	4.9	211	0.0
筑後小郡	81.0	13.0	22.2	28.4	29.8	11.0	7.8	22.7	10.9	45.4	28.4	27.8	19.6	502	0.9
大分久住	22.7	10.2	2.2	8.3	8.9	5.4	3.6	36.4	3.9	28.2	4.8	23.8	9.0	128	0.0
対馬	21.7	15.0	42.8	26.6	17.3	9.6	13.8	24.9	10.3	*	*	*	15.8	152	2.1
五島	18.2	13.8	9.5	9.2	8.2	5.4	5.0	6.6	8.2	24.6	8.3	*	10.0	350	0.0
えびの	23.2	8.1	12.5	42.6	4.7	5.4	3.4	12.4	3.2	13.5	7.9	20.6	9.2	226	0.5
屋久島	14.6	*	5.5	8.4	3.4	9.8	5.7	12.2	18.2	22.0	10.8	26.3	9.2	91.5	0.0
辺戸岬	16.3	6.3	*	5.4	0.7	*	31.2	7.6	6.5	10.5	13.5	18.5	15.0	401	0.0
最大値 <sup>1)</sup>	252	30.1	42.8	55.8	29.8	39.8	35.7	56.4	19.8	45.4	53.2	61.2	22.5	1060	5.2
最小値 <sup>1)</sup>	5.7	4.1	2.2	3.2	0.7	1.9	1.1	0.9	1.0	3.4	4.4	9.9	4.9	40.6	0.0
全国平均	33.7	13.7	15.9	18.2	8.1	8.3	9.0	15.8	9.2	19.5	16.2	29.5	12.9		
標準偏差	44.8	7.0	9.8	11.4	6.5	7.1	8.7	11.8	5.2	11.7	10.8	13.1	4.3		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 Na<sup>+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	133	32.2	17.2	11.4	75.2	420	507	513	334	252	598	148	238	4700	1.9
札幌	131	8.3	6.2	15.5	7.3	27.2	257	249	171	*	237	126	119	1050	1.7
落石岬	113	180	34.5	11.1	227	257	229	428	1350	852	1050	385	282	5170	9.2
竜飛岬	597	66.6	180	23.4	84.2	123	196	288	337	449	*	*	179	57000	2.3
八幡平	*	1.9	2.3	1.4	13.8	16.6	6.9	95.6	19.5	49.3	202	52.9	29.5	2790	0.3
籠岳	13.5	3.8	10.2	6.1	34.9	17.9	9.5	7.5	25.4	57.4	36.3	10.1	12.7	886	0.0
尾花沢	31.2	1.4	3.6	4.9	8.2	8.5	5.4	53.8	64.6	83.9	121	152	44.1	253	1.0
筑波	44.4	12.4	15.5	17.4	17.2	22.9	11.4	30.8	60.4	20.5	*	73.5	21.4	593	1.2
赤城	22.5	2.4	3.3	0.6	*	3.7	2.0	2.8	1.4	17.3	11.2	18.4	4.5	150	0.0
小笠原	256	66.5	97.0	75.4	103	99.5	114	102	167	150	69.1	131	121	2430	18.3
佐渡関岬	*	13.6	70.6	79.2	46.1	137	165	203	517	1200	1210	537	235	28400	0.3
新潟巻	99.1	8.3	9.8	27.5	16.8	348	172	130	255	348	398	162	127	8290	0.3
八方尾根	10.2	8.4	1.2	3.1	1.3	1.5	2.8	7.1	10.1	9.4	8.9	17.9	6.1	195	0.3
越前岬	52.6	6.6	8.9	19.8	96.4	8.1	172	168	221	680	509	230	177	1690	0.4
伊自良湖	14.8	4.9	23.8	10.1	*	19.4	21.4	18.0	22.1	43.9	36.5	22.0	18.7	133	1.6
犬山	37.4	8.5	9.5	9.4	49.1	38.3	54.8	58.4	24.0	26.8	6.6	16.8	23.1	297	1.3
潮岬	633	87.9	63.8	133	90.8	366	805	68.5	41.6	34.2	144	129	251	16500	2.6
京都八幡	14.2	6.3	10.9	7.0	12.3	2.2	6.3	7.0	6.3	14.6	8.7	16.3	8.4	214	0.0
尼崎	12.5	18.4	23.6	13.7	155	8.5	3.9	5.4	34.4	14.8	11.9	22.0	26.4	1280	0.4
倉橋島	62.2	8.9	4.8	44.8	121	26.5	22.2	15.9	5.7	33.6	9.7	22.9	26.2	274	0.8
隠岐	45.0	26.1	37.6	19.7	145	152	471	982	338	1100	944	502	301	8100	3.5
幡竜湖	79.8	4.6	82.0	48.3	49.6	91.8	249	86.6	123	375	332	222	124	1990	2.1
栲原	7.1	2.6	12.3	8.8	41.8	37.0	8.4	18.2	13.3	49.0	7.1	13.5	22.4	474	0.0
筑後小郡	45.9	4.3	14.5	33.1	24.9	10.7	10.7	13.2	11.9	174	139	24.7	24.0	2660	1.7
大分久住	6.2	3.5	3.5	3.2	20.8	13.7	8.7	30.7	4.8	9.3	5.3	7.8	10.4	74.2	0.9
対馬	23.1	8.9	10.8	88.2	41.1	164	74.6	49.3	25.6	*	*	*	60.6	805	0.4
五島	203	72.9	23.4	139	145	347	125	53.9	56.4	152	54.7	*	133	1720	0.3
えびの	20.9	5.6	11.1	12.8	20.3	21.8	2.6	9.8	7.4	27.5	34.4	22.4	16.1	443	0.2
屋久島	77.2	*	130	48.6	66.3	231	248	129	272	174	126	183	190	3010	15.7
辺戸岬	94.3	41.3	*	20.2	234	*	3330	116	786	670	302	497	820	19400	9.5
最大値 <sup>1)</sup>	633	180	180	139	234	420	3330	982	1350	1200	1210	537	820	57000	18.3
最小値 <sup>1)</sup>	6.2	1.4	1.2	0.6	1.3	1.5	2.0	2.8	1.4	9.3	5.3	7.8	4.5	74.2	0.0
全国平均	103	24.8	31.8	31.2	69.6	104	243	131	177	252	245	139	122		
標準偏差	157	38.5	42.7	36.9	64.1	129	612	203	287	342	339	162	162		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 K<sup>+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	5.1	1.9	1.4	0.9	1.7	9.8	12.3	12.0	7.5	6.1	13.8	4.0	6.0	103	0.1
札幌	5.5	1.7	1.1	0.7	0.4	0.9	7.4	5.7	4.2	*	6.2	5.2	3.5	27.1	0.3
落石岬	4.5	4.6	1.6	0.7	4.6	5.5	5.0	9.2	29.7	19.7	22.5	9.1	6.5	114	0.4
竜飛岬	37.9	2.4	4.6	1.2	1.5	2.4	4.4	8.7	8.1	9.2	*	*	4.4	1130	0.1
八幡平	*	0.6	1.0	0.3	0.4	0.6	0.5	2.3	0.7	1.4	4.3	3.2	1.0	54.2	0.0
籠岳	0.8	0.4	0.4	0.7	1.5	1.4	0.7	0.5	0.9	1.1	1.5	1.0	0.8	29.3	0.0
尾花沢	2.4	1.6	0.3	0.3	0.1	1.3	0.9	2.1	1.7	2.2	2.8	5.7	1.7	7.3	0.0
筑波	2.4	3.1	2.5	1.1	2.3	1.0	0.7	2.9	15.3	0.8	*	4.0	2.0	37.0	0.2
赤城	2.1	2.3	0.8	0.6	*	1.9	0.5	1.8	0.4	0.7	1.3	3.1	1.4	19.5	0.0
小笠原	6.5	1.6	2.1	2.1	2.8	2.3	2.5	2.4	3.8	3.9	2.3	3.5	3.0	51.3	0.4
佐渡関岬	*	0.6	3.0	4.3	1.2	2.9	3.8	5.7	11.7	24.3	26.0	15.8	5.7	819	0.0
新潟巻	2.9	0.8	1.0	1.0	0.7	7.4	3.7	3.4	5.5	8.6	8.5	4.7	3.2	174	0.1
八方尾根	1.3	1.0	0.6	0.6	0.1	0.1	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	1.6	0.5	19.9	0.0
越前岬	3.8	0.8	0.5	0.9	3.0	0.6	4.4	5.6	4.8	19.9	12.0	6.5	5.1	66.9	0.0
伊自良湖	1.1	0.9	0.9	0.7	*	0.8	0.7	1.1	0.8	1.4	1.1	0.9	0.9	10.9	0.0
犬山	2.2	0.9	0.8	0.9	1.8	2.2	1.7	3.8	2.4	1.6	1.3	1.7	1.4	37.8	0.3
潮岬	15.6	2.7	2.0	8.6	2.0	6.7	17.4	0.1	0.5	0.7	3.2	3.7	5.5	352	0.0
京都八幡	1.4	0.5	1.2	1.5	0.9	0.5	0.5	0.6	0.4	1.2	0.7	1.9	0.8	10.6	0.0
尼崎	1.6	1.0	0.4	0.8	3.1	0.4	0.2	0.9	1.3	0.9	0.8	2.0	1.0	19.4	0.0
倉橋島	2.1	0.7	0.8	3.2	2.4	1.1	1.0	1.0	0.3	2.8	0.7	2.0	1.1	15.1	0.2
隠岐	3.8	3.3	1.5	0.9	4.2	8.0	16.0	36.3	8.9	30.2	21.3	13.7	9.7	192	0.2
蟠竜湖	3.7	0.5	1.8	1.3	1.1	2.1	5.5	3.3	3.1	11.4	9.3	7.4	3.3	43.8	0.2
栲原	0.6	0.3	0.6	0.7	1.0	1.4	0.3	1.2	0.5	2.3	0.4	1.5	0.9	34.5	0.0
筑後小郡	7.8	1.3	2.4	3.0	2.6	2.6	2.8	3.5	1.7	8.7	6.6	3.9	2.8	86.3	0.5
大分久住	1.2	0.7	0.2	0.6	1.0	0.9	0.3	2.0	0.1	1.8	0.4	1.4	0.8	5.5	0.0
対馬	2.0	2.8	1.7	3.9	2.5	3.6	1.5	0.9	0.6	*	*	*	2.6	19.6	0.0
五島	5.5	3.3	2.1	3.7	2.9	7.0	2.0	1.4	1.5	4.6	2.0	*	3.5	31.8	0.0
えびの	1.8	0.4	0.6	1.6	1.0	1.3	0.5	0.7	0.5	1.4	1.3	1.8	1.0	18.7	0.1
屋久島	2.8	*	3.1	1.8	1.8	5.6	5.4	2.6	8.7	6.0	2.9	5.9	4.6	63.9	0.5
辺戸岬	2.4	0.6	*	0.5	4.7	*	89.7	5.9	27.7	24.2	8.5	20.0	24.6	483	0.0
最大値 <sup>1)</sup>	37.9	4.6	4.6	8.6	4.7	9.8	89.7	36.3	29.7	30.2	26.0	20.0	24.6	1130	0.5
最小値 <sup>1)</sup>	0.6	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.9	0.5	5.5	0.0
全国平均	4.7	1.5	1.4	1.6	1.9	2.8	6.4	4.3	5.1	7.0	6.0	5.0	3.6		
標準偏差	7.2	1.1	1.0	1.7	1.3	2.7	16.4	6.7	7.5	8.6	7.3	4.7	4.5		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 Ca<sup>2+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	9.6	2.4	2.9	0.9	1.7	10.6	14.6	14.5	9.4	8.1	17.5	6.3	7.6	114	0.0
札幌	20.3	8.0	3.8	2.6	1.4	2.0	10.2	8.0	5.8	*	8.3	8.8	6.1	40.8	0.8
落石岬	16.7	10.6	4.1	1.3	5.3	7.0	7.9	11.2	36.0	34.7	38.4	12.3	10.2	171	0.6
竜飛岬	138	7.4	9.8	2.3	2.2	3.1	6.2	7.2	10.3	15.0	*	*	6.5	1530	0.0
八幡平	*	1.4	2.1	0.7	1.3	1.9	2.6	3.7	2.7	4.4	8.8	9.3	2.8	60.3	0.2
籠岳	5.6	2.3	1.8	2.7	2.6	2.8	1.2	2.2	1.3	4.0	7.6	5.0	2.6	45.1	0.0
尾花沢	6.9	2.0	1.0	1.4	1.5	1.4	1.9	3.7	2.8	3.8	6.0	14.3	3.6	28.6	0.0
筑波	11.8	4.7	3.3	2.7	3.3	2.5	1.1	3.4	6.9	1.7	*	8.7	3.2	63.2	0.4
赤城	14.8	7.2	2.5	1.8	*	2.3	0.8	2.4	1.3	2.4	5.7	14.6	3.8	60.7	0.1
小笠原	6.1	1.7	2.6	1.8	1.6	2.1	1.7	1.8	3.0	2.7	1.4	2.9	2.3	80.9	0.0
佐渡関岬	*	2.1	4.2	2.6	1.0	4.2	5.0	10.4	14.3	34.4	34.3	25.4	7.6	882	0.0
新潟巻	8.4	3.0	3.2	1.4	1.1	11.5	4.8	4.1	8.6	10.7	14.8	11.6	5.6	194	0.4
八方尾根	13.6	12.2	2.3	1.0	0.4	0.4	0.7	1.3	1.5	1.9	3.8	10.0	2.7	168	0.0
越前岬	10.6	1.4	0.6	1.2	3.4	1.4	5.1	6.3	6.8	19.3	14.2	11.7	6.5	136	0.0
伊自良湖	4.2	1.2	1.0	1.9	*	1.2	0.7	1.7	0.4	4.4	3.8	5.0	2.0	91.3	0.0
犬山	14.2	3.1	2.4	2.9	3.8	8.4	6.2	18.2	7.5	16.3	4.2	4.4	4.7	259	0.1
潮岬	23.8	4.8	2.5	5.3	2.3	9.0	18.2	1.7	2.9	2.3	7.8	5.1	7.3	464	0.2
京都八幡	10.4	2.1	1.5	3.9	2.1	0.5	0.5	1.2	1.6	3.7	7.4	7.3	2.8	49.9	0.0
尼崎	9.3	3.2	6.6	2.7	7.5	1.6	0.8	1.8	2.8	4.7	9.4	6.3	4.0	69.4	0.3
倉橋島	5.4	1.4	0.8	5.4	3.3	1.7	1.3	1.7	1.1	7.4	5.2	5.3	2.3	57.8	0.2
隠岐	17.0	2.9	2.3	1.9	4.8	4.6	13.6	37.1	9.3	29.9	27.3	21.3	10.8	224	0.3
蟠竜湖	15.8	1.4	2.4	1.9	1.5	2.6	6.4	4.4	3.8	14.2	20.9	18.6	5.7	63.6	0.3
栲原	2.3	1.5	0.9	1.0	1.2	1.6	0.5	0.9	1.3	5.2	2.4	4.6	1.5	354	0.0
筑後小郡	37.6	2.9	3.9	4.5	5.8	4.7	3.4	7.4	4.6	19.0	12.8	7.1	5.7	132	1.0
大分久住	5.2	1.1	0.3	1.1	1.5	0.4	0.3	8.8	0.7	3.4	2.6	4.3	1.4	23.6	0.0
対馬	5.2	2.9	5.9	5.6	3.0	5.2	3.4	3.2	3.8	*	*	*	4.0	111	0.5
五島	8.3	4.9	1.6	4.1	3.5	6.2	3.9	6.6	4.2	8.5	4.2	*	4.5	65.1	0.0
えびの	5.6	1.0	1.4	1.5	1.0	1.2	0.5	1.1	1.3	2.7	2.5	3.9	1.6	71.2	0.1
屋久島	3.5	*	4.2	2.3	1.9	7.1	6.0	3.8	8.2	6.5	5.5	8.7	5.6	87.3	1.0
辺戸岬	5.8	3.2	*	1.7	5.6	*	72.9	3.7	24.3	22.1	13.4	22.6	23.0	936	1.0
最大値 <sup>1)</sup>	138	12.2	9.8	5.6	7.5	11.5	72.9	37.1	36.0	34.7	38.4	25.4	23.0	1530	1.0
最小値 <sup>1)</sup>	2.3	1.0	0.3	0.7	0.4	0.4	0.3	0.9	0.4	1.7	1.4	2.9	1.4	23.6	0.0
全国平均	15.6	3.6	2.8	2.4	2.7	3.8	6.7	6.1	6.3	10.5	10.8	9.8	5.3		
標準偏差	25.2	2.9	2.0	1.4	1.8	3.1	13.3	7.2	7.5	9.9	9.6	6.1	4.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 nss-C a<sup>2+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	6.7	1.7	2.5	0.7	0.3	1.5	3.6	3.4	2.2	2.7	4.6	3.1	2.4	33.2	0.0
札幌	17.5	7.8	3.7	2.2	1.2	1.4	4.6	2.6	2.1	*	3.2	6.0	3.5	40.2	0.0
落石岬	14.3	6.7	3.3	1.1	0.6	1.5	3.0	2.0	6.7	16.3	15.8	3.4	4.1	137	0.0
竜飛岬	125	6.0	6.2	1.9	0.4	0.6	2.0	1.0	3.0	5.3	*	*	2.7	303	0.0
八幡平	*	1.4	2.1	0.7	1.0	1.5	2.5	1.6	2.3	3.3	4.5	8.2	2.1	49.6	0.0
籠岳	5.3	2.2	1.6	2.6	1.9	2.4	1.0	2.1	0.8	2.8	6.8	4.8	2.3	42.7	0.0
尾花沢	6.3	2.0	0.9	1.3	1.3	1.2	1.8	2.6	1.4	1.9	3.3	11.0	2.7	24.7	0.0
筑波	10.9	4.5	3.0	2.3	2.9	2.0	0.8	2.7	5.6	1.3	*	7.2	2.7	50.4	0.0
赤城	14.3	7.1	2.4	1.8	*	2.3	0.8	2.3	1.3	2.0	5.5	14.2	3.7	59.6	0.0
小笠原	1.1	0.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	28.7	0.0
佐渡関岬	*	1.8	2.7	0.9	0.2	1.3	1.5	6.0	3.2	8.4	8.5	13.8	2.6	312	0.0
新潟巻	6.3	2.8	3.0	0.8	0.7	4.0	1.1	1.3	3.1	3.2	6.2	8.1	2.8	66.0	0.1
八方尾根	13.4	12.0	2.3	0.9	0.4	0.3	0.6	1.1	1.3	1.7	3.7	9.6	2.6	166	0.0
越前岬	9.5	1.2	0.4	0.7	1.4	1.2	1.4	2.7	2.1	4.7	3.2	6.7	2.7	120	0.0
伊自良湖	3.9	1.1	0.5	1.7	*	0.7	0.3	1.3	0.4	3.4	3.0	4.5	1.7	90.4	0.0
犬山	13.4	3.0	2.2	2.7	2.7	7.6	5.0	16.9	7.0	15.8	4.1	4.0	4.2	252	0.1
潮岬	10.1	2.9	1.1	2.4	0.4	1.2	0.9	0.2	2.0	1.5	4.7	2.3	1.8	107	0.0
京都八幡	10.1	1.9	1.3	3.8	1.8	0.5	0.4	1.0	1.4	3.3	7.2	6.9	2.6	49.7	0.0
尼崎	9.0	2.8	6.1	2.4	4.2	1.4	0.7	1.7	2.0	4.4	9.1	5.9	3.4	68.3	0.2
倉橋島	4.1	1.2	0.7	4.5	1.0	1.1	0.9	1.4	1.0	6.7	5.0	4.8	1.8	56.5	0.0
隠岐	16.1	2.3	1.5	1.5	1.6	1.4	3.5	15.8	2.5	6.2	6.9	10.5	4.3	192	0.0
蟠竜湖	14.1	1.3	0.7	0.8	0.4	0.6	1.0	2.5	1.2	6.1	13.8	13.8	3.0	52.5	0.0
栲原	2.2	1.4	0.7	0.8	0.3	0.8	0.3	0.5	1.0	4.1	2.2	4.3	1.1	344	0.0
筑後小郡	36.6	2.8	3.6	3.8	5.3	4.5	3.2	7.2	4.3	15.3	9.8	6.5	5.2	127	0.9
大分久住	5.1	1.0	0.2	1.0	1.1	0.1	0.1	8.1	0.6	3.2	2.5	4.1	1.2	23.1	0.0
対馬	4.7	2.7	5.7	3.7	2.1	1.9	1.8	2.1	3.2	*	*	*	2.7	109	0.0
五島	4.0	3.3	1.1	1.1	0.6	0.9	1.2	5.4	3.1	5.2	3.0	*	2.1	63.6	0.0
えびの	5.1	0.8	1.2	1.3	0.5	0.7	0.5	0.9	1.2	2.1	1.7	3.4	1.2	70.3	0.0
屋久島	1.8	*	1.3	1.2	0.5	2.1	0.8	1.1	2.3	2.7	2.7	4.7	1.6	22.3	0.0
辺戸岬	3.8	2.3	*	1.2	0.5	*	1.9	1.2	7.4	7.6	6.9	11.9	5.5	516	0.0
最大値 <sup>1)</sup>	125	12.0	6.2	4.5	5.3	7.6	5.0	16.9	7.4	16.3	15.8	14.2	5.5	516	0.9
最小値 <sup>1)</sup>	1.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	22.3	0.0
全国平均	13.4	3.0	2.2	1.7	1.3	1.6	1.6	3.3	2.5	5.0	5.5	6.8	2.7		
標準偏差	23.1	2.6	1.7	1.1	1.2	1.5	1.3	4.1	1.9	4.3	3.6	3.7	1.2		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 Mg<sup>2+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	16.4	3.4	2.4	1.3	6.7	51.0	55.2	58.4	37.0	28.4	70.7	17.4	27.4	540	0.0
札幌	15.4	2.4	1.5	1.7	1.0	3.0	29.2	26.7	19.4	*	26.0	14.7	13.5	124	0.4
落石岬	15.7	21.2	5.1	1.4	25.4	29.8	29.1	48.7	152	100	120	44.5	32.9	612	0.8
竜飛岬	89.9	8.3	21.8	3.3	9.8	14.8	24.6	32.2	38.7	55.9	*	*	21.2	6490	0.0
八幡平	*	0.7	1.4	0.5	1.8	2.4	2.0	10.7	2.7	5.7	24.0	7.4	3.9	281	0.2
籠岳	2.9	1.1	1.6	1.4	4.3	2.8	1.4	1.5	2.8	6.6	6.2	2.9	2.1	96.4	0.0
尾花沢	5.2	0.9	0.5	0.8	1.2	0.9	0.7	6.3	7.3	9.4	13.5	18.4	5.3	30.8	0.1
筑波	6.8	2.5	2.2	2.2	2.3	2.8	1.5	4.3	7.6	2.4	*	8.7	2.8	71.5	0.2
赤城	6.0	1.8	1.3	0.9	*	1.3	0.4	1.1	1.0	2.0	2.2	3.7	1.4	16.1	0.0
小笠原	27.5	6.4	10.1	7.8	10.5	10.3	10.8	10.1	17.5	16.3	7.6	13.7	12.5	242	1.7
佐渡関岬	*	2.4	9.0	8.5	5.3	15.9	19.8	24.0	56.7	139	136	60.6	26.9	3110	0.0
新潟巻	11.8	1.4	2.4	3.1	2.1	41.7	20.4	14.9	30.3	40.8	47.8	20.0	15.3	947	0.1
八方尾根	3.3	12.9	0.8	0.3	0.2	0.2	0.4	1.1	1.7	1.3	1.9	3.5	1.3	29.9	0.0
越前岬	7.4	0.9	0.7	2.1	9.8	1.3	16.3	18.8	24.4	71.7	58.9	27.4	19.6	195	0.0
伊自良湖	2.6	0.8	2.3	1.6	*	1.8	1.9	1.3	2.3	4.8	4.7	3.0	2.1	18.5	0.4
犬山	6.3	1.3	0.8	1.1	5.2	5.1	8.1	7.6	3.1	3.8	1.3	2.3	2.9	71.7	0.1
潮岬	71.0	10.0	7.1	12.7	10.1	37.7	86.8	7.3	4.7	4.0	16.4	14.0	27.2	1790	0.4
京都八幡	3.1	1.0	1.6	1.7	1.5	0.3	0.7	0.9	0.8	1.2	1.7	3.2	1.3	27.2	0.0
尼崎	2.2	2.1	2.9	2.6	15.5	0.7	0.6	0.8	3.8	2.1	2.3	3.3	3.0	122	0.0
倉橋島	7.2	1.5	0.6	4.9	12.8	2.7	2.4	1.8	0.6	4.4	1.7	3.5	3.0	27.2	0.1
隠岐	4.6	3.5	4.6	2.5	17.1	16.9	53.4	121	38.5	126	108	59.1	34.8	947	0.0
蟠竜湖	10.9	0.5	9.2	5.4	5.5	10.2	28.6	10.7	14.1	44.3	38.1	27.0	14.4	213	0.3
栲原	1.1	0.4	1.6	1.2	4.6	4.2	1.0	2.1	1.7	7.2	1.3	2.1	2.7	57.6	0.0
筑後小郡	10.7	0.9	1.8	4.2	2.3	2.0	1.5	2.8	2.1	22.5	19.1	3.9	3.5	338	0.3
大分久住	1.6	0.9	0.7	1.2	2.0	1.1	0.8	6.7	0.6	1.7	0.8	1.4	1.2	8.4	0.0
対馬	3.4	2.3	6.1	11.7	6.2	18.3	8.7	5.4	4.2	*	*	*	7.7	80.8	0.8
五島	23.3	8.6	3.2	16.0	13.3	34.0	13.2	6.7	5.8	18.0	6.0	*	14.0	191	0.0
えびの	3.2	0.7	1.7	1.5	2.5	2.7	0.4	1.2	0.9	3.3	4.1	2.9	2.1	49.3	0.1
屋久島	8.4	*	15.3	6.0	7.1	27.1	28.6	14.9	31.0	20.5	14.9	21.7	22.1	350	2.5
辺戸岬	10.5	4.8	*	2.7	23.2	*	349	13.8	92.8	78.7	40.8	61.7	90.8	3140	1.4
最大値 <sup>1)</sup>	89.9	21.2	21.8	16.0	25.4	51.0	349	121	152	139	136	61.7	90.8	6490	2.5
最小値 <sup>1)</sup>	1.1	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.4	0.8	0.6	1.2	0.8	1.4	1.2	8.4	0.0
全国平均	13.5	3.6	4.2	3.7	7.5	11.8	26.6	15.5	20.2	29.4	28.7	16.7	14.0		
標準偏差	20.2	4.6	4.9	3.9	6.6	14.5	64.2	24.4	32.6	39.3	38.5	18.8	18.0		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 H<sup>+</sup>濃度 月・年平均値

単位：μmol/L

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	6.1	10.2	19.7	15.0	16.7	6.0	17.2	16.2	15.9	21.4	14.7	18.8	14.0	74.1	1.4
札幌	7.3	21.7	15.6	11.5	7.8	23.7	11.4	14.8	16.5	*	17.9	39.4	17.8	72.4	1.6
落石岬	18.5	26.8	14.8	30.3	13.1	19.7	16.6	25.8	25.1	22.2	4.9	11.1	20.2	162	2.6
竜飛岬	19.5	34.3	23.2	37.4	18.8	16.5	22.5	20.9	22.5	29.7	*	*	24.4	148	2.0
八幡平	*	25.8	21.8	14.8	9.7	23.0	11.6	27.0	18.5	20.2	15.7	51.4	20.2	132	1.2
籠岳	30.3	14.8	17.2	27.4	16.5	13.2	10.9	22.6	10.3	11.0	6.0	34.2	17.9	219	3.1
尾花沢	23.7	12.3	11.2	14.7	11.9	27.5	10.0	39.0	26.3	23.5	37.3	49.9	22.5	60.3	1.4
筑波	37.3	27.3	26.9	29.8	27.0	29.5	14.4	19.0	8.6	10.2	*	63.6	22.8	178	0.3
赤城	34.2	19.6	31.6	1.0	*	21.5	11.0	33.3	10.7	17.2	11.7	39.8	20.6	138	0.3
小笠原	12.0	7.2	6.0	9.9	3.7	5.5	4.1	9.6	9.7	15.6	13.0	17.7	9.5	89.1	0.4
佐渡関岬	*	16.1	20.3	25.4	6.5	23.1	23.3	38.6	25.5	33.0	27.5	50.6	20.5	110	2.2
新潟巻	26.4	14.4	12.9	23.8	13.1	20.4	18.3	34.6	29.7	18.6	32.9	32.5	22.4	136	0.5
八方尾根	7.2	3.3	9.7	18.8	8.4	10.3	16.0	17.3	15.4	13.9	15.8	18.2	13.7	186	0.1
越前岬	30.9	15.0	17.0	18.4	20.3	10.0	17.2	44.4	23.8	43.5	28.1	38.6	24.5	251	1.3
伊自良湖	18.7	22.5	14.5	18.7	*	41.6	11.6	37.0	10.2	22.9	18.0	33.5	22.3	151	0.8
犬山	23.5	17.1	16.9	12.2	28.1	52.1	63.4	64.6	13.0	26.1	33.6	33.9	24.2	174	0.5
潮岬	21.8	14.0	17.7	9.3	7.6	17.3	8.2	9.4	11.3	28.2	25.7	32.3	14.3	316	0.1
京都八幡	10.4	15.3	20.4	33.5	8.3	4.7	10.2	24.9	7.1	11.0	13.8	26.4	14.6	126	0.6
尼崎	8.8	15.6	13.5	20.5	6.6	16.8	9.5	13.3	15.3	17.1	17.2	38.4	14.1	195	1.0
倉橋島	14.4	23.0	25.6	31.2	14.6	27.5	16.0	33.0	16.7	99.5	29.7	38.4	23.4	229	1.7
隠岐	17.1	10.4	12.8	25.9	9.2	6.9	12.2	48.6	30.0	34.5	22.9	29.4	17.2	263	1.4
蟠竜湖	18.8	14.7	14.4	17.4	20.2	18.1	12.4	42.5	23.7	58.8	67.1	44.5	21.4	170	5.1
栲原	9.6	9.6	9.6	15.7	8.8	9.0	8.6	14.1	9.5	60.8	17.9	33.4	12.1	269	1.4
筑後小郡	36.9	16.2	15.3	12.9	12.8	13.2	3.8	11.6	8.4	40.5	22.5	20.5	14.9	132	1.8
大分久住	15.9	20.8	7.6	39.8	25.8	13.9	12.6	81.3	10.7	52.7	17.0	45.0	20.1	100	4.2
対馬	16.9	13.5	*	20.7	22.8	14.6	15.5	21.4	19.2	*	*	*	16.7	158	1.0
五島	16.0	16.6	7.1	7.4	8.5	9.9	8.2	15.5	12.5	45.5	19.3	*	12.5	219	1.1
えびの	31.7	17.5	10.6	26.4	6.0	8.0	5.6	30.0	14.9	44.4	17.7	32.2	15.0	209	0.8
屋久島	20.3	*	11.5	40.8	9.9	6.9	10.5	20.3	37.3	56.7	29.0	32.1	16.7	339	3.8
辺戸岬	14.5	11.1	*	14.3	12.4	*	4.1	9.9	26.7	26.8	17.1	14.6	14.5	224	0.2
最大値 <sup>1)</sup>	37.3	34.3	31.6	40.8	28.1	52.1	63.4	81.3	37.3	99.5	67.1	63.6	24.5	339	5.1
最小値 <sup>1)</sup>	6.1	3.3	6.0	1.0	3.7	4.7	3.8	9.4	7.1	10.2	4.9	11.1	9.5	60.3	0.1
全国平均	19.6	16.8	15.9	20.8	13.4	17.6	13.9	28.0	17.5	32.3	22.0	34.1	18.2		
標準偏差	9.1	6.6	6.2	9.9	6.8	10.9	10.5	16.7	7.8	20.0	12.1	12.4	4.2		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

平成16年度 pH 月・年平均値

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	5.21	4.99	4.71	4.82	4.78	5.22	4.77	4.79	4.80	4.67	4.83	4.73	4.86	5.84	4.13
札幌	5.14	4.66	4.81	4.94	5.11	4.62	4.94	4.83	4.78	*	4.75	4.40	4.75	5.80	4.14
落石岬	4.73	4.57	4.83	4.52	4.88	4.71	4.78	4.59	4.60	4.65	5.31	4.96	4.70	5.59	3.79
竜飛岬	4.71	4.47	4.63	4.43	4.73	4.78	4.65	4.68	4.65	4.53	*	*	4.61	5.70	3.83
八幡平	*	4.59	4.66	4.83	5.01	4.64	4.94	4.57	4.73	4.70	4.80	4.29	4.70	5.91	3.88
籠岳	4.52	4.83	4.77	4.56	4.78	4.88	4.96	4.65	4.99	4.96	5.22	4.47	4.75	5.51	3.66
尾花沢	4.63	4.91	4.95	4.83	4.92	4.56	5.00	4.41	4.58	4.63	4.43	4.30	4.65	5.84	4.22
筑波	4.43	4.56	4.57	4.53	4.57	4.53	4.84	4.72	5.07	4.99	*	4.20	4.64	6.46	3.75
赤城	4.47	4.71	4.50	5.98	*	4.67	4.96	4.48	4.97	4.77	4.93	4.40	4.69	6.53	3.86
小笠原	4.92	5.15	5.22	5.01	5.43	5.26	5.39	5.02	5.01	4.81	4.89	4.75	5.02	6.41	4.05
佐渡関岬	*	4.79	4.69	4.60	5.19	4.64	4.63	4.41	4.59	4.48	4.56	4.30	4.69	5.66	3.96
新潟巻	4.58	4.84	4.89	4.62	4.88	4.69	4.74	4.46	4.53	4.73	4.48	4.49	4.65	6.27	3.87
八方尾根	5.14	5.48	5.02	4.73	5.07	4.99	4.80	4.76	4.81	4.86	4.80	4.74	4.86	7.19	3.73
越前岬	4.51	4.82	4.77	4.73	4.69	5.00	4.77	4.35	4.62	4.36	4.55	4.41	4.61	5.90	3.60
伊自良湖	4.73	4.65	4.84	4.73	*	4.38	4.93	4.43	4.99	4.64	4.74	4.48	4.65	6.12	3.82
犬山	4.63	4.77	4.77	4.91	4.55	4.28	4.20	4.19	4.89	4.58	4.47	4.47	4.62	6.27	3.76
潮岬	4.66	4.86	4.75	5.03	5.12	4.76	5.09	5.03	4.95	4.55	4.59	4.49	4.85	7.05	3.50
京都八幡	4.98	4.82	4.69	4.48	5.08	5.33	4.99	4.60	5.15	4.96	4.86	4.58	4.84	6.21	3.90
尼崎	5.05	4.81	4.87	4.69	5.18	4.78	5.02	4.88	4.82	4.77	4.76	4.42	4.85	6.01	3.71
倉橋島	4.84	4.64	4.59	4.51	4.83	4.56	4.80	4.48	4.78	4.00	4.53	4.42	4.63	5.76	3.64
隠岐	4.77	4.98	4.89	4.59	5.03	5.16	4.91	4.31	4.52	4.46	4.64	4.53	4.76	5.84	3.58
蟠竜湖	4.73	4.83	4.84	4.76	4.70	4.74	4.91	4.37	4.63	4.23	4.17	4.35	4.67	5.29	3.77
栲原	5.02	5.02	5.02	4.80	5.06	5.04	5.06	4.85	5.02	4.22	4.75	4.48	4.92	5.85	3.57
筑後小郡	4.43	4.79	4.82	4.89	4.89	4.88	5.42	4.93	5.07	4.39	4.65	4.69	4.83	5.75	3.88
大分久住	4.80	4.68	5.12	4.40	4.59	4.86	4.90	4.09	4.97	4.28	4.77	4.35	4.70	5.38	4.00
対馬	4.77	4.87	*	4.68	4.64	4.84	4.81	4.67	4.72	*	*	*	4.78	6.00	3.80
五島	4.80	4.78	5.15	5.13	5.07	5.01	5.09	4.81	4.90	4.34	4.71	*	4.90	5.97	3.66
えびの	4.50	4.76	4.98	4.58	5.22	5.10	5.25	4.52	4.83	4.35	4.75	4.49	4.82	6.08	3.68
屋久島	4.69	*	4.94	4.39	5.01	5.16	4.98	4.69	4.43	4.25	4.54	4.49	4.78	5.42	3.47
辺戸岬	4.84	4.96	*	4.84	4.91	*	5.38	5.00	4.57	4.57	4.77	4.84	4.84	6.75	3.65
最大値 <sup>1)</sup>	5.21	5.48	5.22	5.98	5.43	5.33	5.42	5.03	5.15	4.99	5.31	4.96	5.02	7.19	4.22
最小値 <sup>1)</sup>	4.43	4.47	4.50	4.39	4.55	4.28	4.20	4.09	4.43	4.00	4.17	4.20	4.61	5.29	3.47
全国平均	4.76	4.81	4.83	4.75	4.93	4.83	4.93	4.62	4.80	4.56	4.71	4.50	4.75		
標準偏差	0.22	0.20	0.18	0.30	0.22	0.26	0.24	0.24	0.20	0.25	0.23	0.18	0.11		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。

## 平成16年度 電気伝導率 月・年平均値

単位：mS/m

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 <sup>2)</sup>	最小値 <sup>2)</sup>
利尻	3.12	1.34	1.69	1.17	2.09	7.16	9.33	9.01	6.51	5.51	6.27	3.76	4.52	39.1	0.23
札幌	3.61	2.00	1.39	1.16	0.72	1.69	5.44	5.06	3.95	*	5.12	4.60	3.22	19.2	0.58
落石岬	3.38	4.25	1.41	1.78	4.27	5.11	4.60	8.10	22.1	13.3	16.9	6.63	5.54	79.7	0.92
竜飛岬	16.6	2.97	4.49	2.54	2.28	2.46	4.44	5.78	6.68	8.99	*	*	4.19	117	0.60
八幡平	*	1.47	1.64	0.87	0.74	1.41	0.77	2.77	1.23	2.01	4.41	3.87	1.54	42.7	0.18
籠岳	2.10	1.03	1.24	1.70	1.49	1.01	0.69	1.35	0.92	1.98	1.45	2.28	1.25	12.3	0.26
尾花沢	2.00	0.93	0.74	0.97	0.82	1.64	0.63	2.55	2.02	2.61	3.41	5.03	1.87	5.73	0.28
筑波	3.32	2.08	2.18	2.32	2.15	2.05	1.07	1.76	2.06	0.97	*	4.39	1.80	13.0	0.26
赤城	2.59	0.95	1.81	1.05	*	1.30	0.64	2.03	0.57	1.18	0.98	3.31	1.25	9.74	0.19
小笠原	4.27	1.39	1.81	1.63	1.96	1.73	1.98	1.91	3.08	3.17	1.74	2.91	2.35	40.3	0.53
佐渡関岬	*	1.15	2.36	2.45	1.09	3.32	3.96	5.42	8.44	15.5	11.5	9.31	3.95	140	0.22
新潟巻	3.26	1.02	1.10	1.83	0.89	6.85	3.62	2.98	4.68	6.15	5.46	3.81	2.90	21.6	0.30
八方尾根	1.18	1.19	0.75	1.12	0.48	0.57	0.85	1.03	0.99	0.93	1.13	1.62	0.93	10.6	0.11
越前岬	3.15	1.03	1.20	1.41	2.73	0.75	3.69	5.19	4.98	13.1	9.84	6.27	4.32	30.3	0.19
伊自良湖	1.49	1.47	1.34	1.39	*	2.12	0.89	1.99	0.84	2.26	1.82	2.31	1.56	10.0	0.47
犬山	2.42	1.40	1.31	1.15	2.62	3.98	4.45	5.39	1.43	2.43	2.14	2.33	2.01	15.1	0.36
潮岬	11.9	1.93	1.93	2.89	1.80	6.56	13.0	1.59	1.31	2.06	3.80	3.97	4.70	215	0.36
京都八幡	1.42	1.08	1.30	2.02	0.87	0.37	0.61	1.32	0.60	1.17	1.27	2.35	1.08	9.95	0.21
尼崎	1.36	1.38	1.43	1.74	3.01	1.15	0.66	1.03	1.52	1.64	1.76	2.70	1.43	20.3	0.21
倉橋島	1.85	1.26	1.24	2.37	2.77	1.79	1.19	1.97	0.87	5.66	1.78	2.59	1.61	14.7	0.46
隠岐	2.25	1.13	1.30	1.73	2.86	2.54	7.83	18.5	6.35	19.8	16.7	11.0	5.82	159	0.40
蟠竜湖	3.05	0.98	2.18	1.85	1.90	2.44	4.66	3.74	3.33	9.33	9.84	6.75	3.30	37.4	0.56
栲原	0.69	0.65	0.83	1.13	1.10	1.12	0.61	1.09	0.83	3.95	1.07	1.96	1.05	13.4	0.12
筑後小郡	4.60	1.03	1.35	1.60	1.51	1.02	0.51	1.29	0.83	5.44	3.92	1.65	1.44	52.0	0.26
大分久住	1.42	1.19	0.48	2.12	1.67	0.92	0.77	5.02	0.64	3.20	1.07	2.68	1.27	6.43	0.28
対馬	1.66	1.16	*	2.80	2.01	3.54	2.54	2.31	1.46	*	*	*	2.11	14.2	0.42
五島	4.40	2.25	0.86	2.71	2.85	6.08	2.45	1.89	1.68	5.03	2.04	*	2.91	25.3	0.25
えびの	2.16	0.92	0.80	1.95	0.61	0.73	0.26	1.51	0.68	2.36	1.39	2.21	1.00	13.7	0.10
屋久島	2.61	*	2.75	2.90	1.68	4.06	4.34	3.60	6.27	5.62	3.42	4.76	3.89	54.4	0.83
辺戸岬	2.50	1.25	*	1.08	4.33	*	50.8	2.41	12.4	10.5	4.54	8.28	13.0	148	0.59
最大値 <sup>1)</sup>	16.6	4.25	4.49	2.90	4.33	7.16	50.8	18.5	22.1	19.8	16.9	11.0	13.0	215	0.92
最小値 <sup>1)</sup>	0.69	0.65	0.48	0.87	0.48	0.37	0.26	1.03	0.57	0.93	0.98	1.62	0.93	5.73	0.10
全国平均	3.37	1.44	1.53	1.78	1.90	2.60	4.58	3.65	3.64	5.57	4.62	4.20	2.93		
標準偏差	3.29	0.73	0.79	0.62	1.02	2.01	9.23	3.49	4.52	4.94	4.53	2.43	2.38		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「\*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>：月・年平均値の最大値、最小値。最大値<sup>2)</sup>、最小値<sup>2)</sup>：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値<sup>1)</sup>、最小値<sup>1)</sup>、全国平均、標準偏差は参考値を含む。