

平成18年度 SO₄²⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	13.5	25.4	17.2	8.4	18.7	12.7	27.6	42.0	31.3	37.6	42.1	49.7	22.8	348	0.0
札幌	27.0	17.6	35.5	11.6	15.5	13.0	33.8	35.6	22.4	34.1	30.2	37.3	27.4	84.7	5.2
落石岬	40.3	17.3	21.3	15.0	8.4	23.6	62.8	26.6	30.3	76.5	78.7	54.6	28.6	1230	3.6
竜飛岬	57.5	67.5	21.8	14.7	8.0	20.7	40.5	41.1	36.9	42.5	104	70.1	36.4	445	2.5
八幡平	28.3	10.9	14.4	6.5	4.6	*	8.6	42.6	34.5	18.3	14.7	41.4	15.7	291	0.3
籠岳	25.0	10.8	15.1	9.1	14.7	7.8	3.7	9.4	4.5	4.2	35.2	36.8	10.8	133	0.5
尾花沢	19.8	19.2	16.7	3.7	15.1	4.5	2.1	11.8	11.3	22.2	25.5	39.7	13.0	81.9	0.5
筑波	26.5	17.0	13.7	9.0	7.1	7.2	4.3	10.0	5.3	8.2	23.6	39.7	10.9	541	1.2
赤城	17.8	27.1	11.5	7.9	12.1	4.2	15.4	4.7	3.2	3.3	27.9	23.1	11.4	129	0.6
小笠原	12.2	10.5	5.1	4.3	8.6	3.9	14.9	14.3	14.4	10.6	22.5	16.9	11.3	223	2.9
佐渡関岬	72.1	12.2	20.9	6.4	13.8	5.7	17.0	51.7	38.5	59.3	106	52.2	28.6	1600	2.1
新潟巻	49.2	18.3	9.9	7.2	12.8	11.7	11.9	32.8	43.3	70.3	60.5	41.8	25.8	664	0.6
八方尾根	30.9	12.8	19.1	3.0	17.2	3.3	2.6	11.2	12.0	23.8	15.3	20.7	9.8	125	0.0
越前岬	33.6	16.3	13.2	9.5	31.7	5.8	17.4	31.6	51.7	79.0	55.8	49.3	25.1	366	0.0
伊自良湖	*	18.2	18.5	26.0	27.5	17.6	13.0	17.8	6.0	26.6	29.7	31.9	22.0	94.5	4.7
犬山	22.9	13.8	13.5	12.7	17.8	21.1	11.2	14.5	7.2	17.8	25.1	34.6	16.3	247	1.5
潮岬	36.1	30.8	18.0	21.0	16.7	11.6	14.5	36.4	11.7	23.1	51.3	45.9	23.2	158	3.2
京都八幡	53.6	43.1	41.3	14.4	21.2	7.7	8.2	12.5	9.8	22.7	19.1	29.2	15.1	103	1.6
尼崎	28.0	12.3	14.9	12.1	19.3	9.7	9.5	14.8	16.4	35.0	22.3	35.2	16.7	187	1.2
倉橋島	16.2	13.7	10.7	14.1	10.4	11.8	30.0	19.2	17.1	26.0	33.3	34.8	15.5	94.9	2.8
隠岐	32.4	12.7	27.0	4.8	18.6	19.7	32.6	47.9	92.1	109	75.3	96.6	32.9	1000	1.2
蟠竜湖	18.4	11.1	6.0	14.1	12.7	16.6	20.3	57.6	60.1	61.3	57.9	43.9	20.0	193	3.1
栲原	14.4	6.4	5.7	8.4	11.0	7.3	10.9	8.1	18.6	47.2	16.1	18.3	10.2	170	0.3
筑後小郡	26.2	22.3	15.7	33.6	26.2	35.9	48.9	26.3	44.4	31.6	44.6	43.6	27.5	100	7.6
大分久住	23.8	11.1	8.2	14.0	8.6	17.9	24.0	17.1	18.5	32.3	28.3	22.2	13.6	87.8	2.8
対馬	28.3	25.2	9.6	38.0	*	*	44.2	24.2	63.8	54.5	43.2	28.9	29.6	204	0.0
五島	20.3	19.5	21.9	36.0	17.2	12.9	62.9	17.6	64.9	78.6	28.1	27.5	24.7	823	0.9
えびの	28.0	19.3	8.7	9.2	10.8	21.8	24.7	10.9	25.6	51.9	27.1	25.5	14.3	293	0.8
屋久島	19.1	22.9	6.2	10.4	18.2	16.4	39.8	22.8	26.1	38.9	27.8	33.5	21.3	145	5.9
辺戸岬	14.8	12.9	9.7	27.2	6.1	20.4	22.7	13.9	35.9	26.4	20.2	22.1	17.9	1360	2.6
最大値 ¹⁾	72.1	67.5	41.3	38.0	31.7	35.9	62.9	57.6	92.1	109	106	96.6	36.4	1600	7.6
最小値 ¹⁾	12.2	6.4	5.1	3.0	4.6	3.3	2.1	4.7	3.2	3.3	14.7	16.9	9.8	81.9	0.0
全国平均	28.8	19.3	15.7	13.7	14.8	13.3	22.7	24.2	28.6	39.1	39.7	38.2	19.9		
標準偏差	14.1	11.8	8.3	9.5	6.5	7.6	16.7	14.4	21.6	25.4	24.4	16.3	7.5		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 nss-SO₄²⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	9.5	24.2	16.5	8.0	17.4	9.6	13.8	19.4	20.6	13.7	29.4	21.7	16.0	157	0.0
札幌	23.6	16.9	34.9	11.5	15.0	12.2	31.6	24.9	14.7	15.1	22.5	24.9	21.0	82.4	4.2
落石岬	15.4	12.7	18.9	12.5	6.8	7.8	3.7	9.0	9.5	7.2	13.1	20.0	11.0	206	0.0
竜飛岬	35.6	58.6	20.3	6.7	6.7	4.6	13.4	16.7	10.4	16.0	33.6	39.4	18.2	315	0.0
八幡平	27.3	10.6	14.1	6.4	4.3	*	8.4	40.8	31.6	17.0	11.7	39.0	14.9	279	0.3
籠岳	23.5	9.7	13.9	8.9	13.1	6.8	2.5	8.4	3.2	3.0	25.3	24.4	9.2	124	0.4
尾花沢	18.9	18.4	16.6	3.6	14.9	3.7	1.8	8.7	9.0	14.4	18.0	28.5	10.0	81.0	0.4
筑波	25.0	15.6	13.2	8.9	6.5	6.0	3.9	8.7	4.7	7.2	22.4	29.8	9.9	539	1.1
赤城	17.4	26.5	11.2	7.5	11.4	3.9	14.3	4.5	2.6	2.7	27.1	21.7	10.8	127	0.6
小笠原	10.1	8.6	1.7	2.7	1.4	1.6	1.3	0.7	2.8	4.8	8.7	8.6	4.3	76.7	0.0
佐渡関岬	46.2	11.1	18.7	5.4	12.5	3.9	2.7	20.4	16.2	19.7	37.4	36.6	15.0	315	0.0
新潟巻	42.7	17.7	9.7	7.0	11.9	8.7	6.5	14.4	28.6	37.7	30.4	32.5	17.6	627	0.5
八方尾根	30.3	12.6	19.0	2.9	17.1	3.3	2.3	10.8	11.8	23.5	15.0	20.4	9.6	122	0.0
越前岬	24.8	15.4	12.9	8.9	29.8	5.1	14.6	19.4	25.7	37.6	34.1	33.4	17.0	341	0.0
伊自良湖	*	17.3	18.1	25.8	26.4	17.2	12.6	16.2	3.8	17.6	25.6	29.2	20.8	91.4	3.8
犬山	22.1	13.3	13.2	12.4	17.3	20.1	10.8	13.6	6.9	15.2	22.6	32.0	15.6	244	1.4
潮岬	20.6	20.1	10.4	13.3	10.6	8.8	9.3	22.1	9.3	18.4	21.8	17.5	13.8	120	1.7
京都八幡	50.5	40.7	39.9	13.9	20.9	7.5	7.8	11.9	9.6	21.7	18.1	26.9	14.5	101	1.3
尼崎	27.1	11.7	14.7	11.5	19.0	9.5	9.2	14.0	15.9	33.4	20.3	30.6	15.9	186	0.8
倉橋島	15.4	12.9	10.3	13.7	9.4	11.3	29.0	18.5	16.8	25.3	30.0	30.7	14.7	93.1	2.6
隠岐	21.5	11.7	24.5	3.9	15.3	9.5	17.8	21.9	34.6	46.6	39.9	58.3	18.0	336	0.9
蟠竜湖	14.6	10.6	5.9	13.1	11.6	11.3	11.0	40.1	47.7	54.3	52.2	41.1	16.8	160	3.0
栲原	13.8	5.9	5.6	8.2	9.9	6.1	10.5	7.4	17.4	43.7	15.6	17.6	9.5	155	0.3
筑後小郡	25.3	21.4	15.1	32.8	25.7	35.4	46.2	24.5	40.0	28.3	43.2	41.0	26.6	95.3	6.6
大分久住	23.3	10.8	7.8	13.6	8.4	17.5	23.3	16.3	17.8	28.5	27.8	21.5	13.2	80.2	2.4
対馬	26.3	22.4	9.2	36.8	*	*	40.0	17.7	55.7	48.2	39.4	25.2	26.3	191	0.0
五島	15.6	16.7	18.4	25.0	9.8	10.6	33.6	14.5	53.3	57.0	23.7	20.4	18.9	262	0.0
えびの	27.2	18.8	8.4	8.8	10.6	20.2	23.6	9.4	24.3	42.8	26.4	24.6	13.6	239	0.7
屋久島	16.9	20.7	5.5	7.2	14.8	11.0	32.0	15.5	19.3	29.6	20.7	25.7	16.3	101	3.9
辺戸岬	9.4	9.1	4.4	4.3	2.4	7.6	14.0	7.2	12.7	14.3	14.7	10.1	8.7	155	0.6
最大値 ¹⁾	50.5	58.6	39.9	36.8	29.8	35.4	46.2	40.8	55.7	57.0	52.2	58.3	26.6	627	6.6
最小値 ¹⁾	9.4	5.9	1.7	2.7	1.4	1.6	1.3	0.7	2.6	2.7	8.7	8.6	4.3	76.7	0.0
全国平均	23.4	17.4	14.4	11.5	13.1	10.0	15.1	15.9	19.2	24.8	25.7	27.8	14.9		
標準偏差	10.2	10.3	8.2	8.3	6.8	7.0	12.1	8.9	14.7	15.4	10.1	10.1	5.0		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 NO₃⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	9.2	19.7	18.1	7.6	14.9	10.5	7.5	15.2	12.9	9.6	26.1	14.5	13.3	122	1.3
札幌	14.7	12.1	30.9	13.0	16.7	8.5	16.7	20.5	11.2	11.2	25.9	28.2	18.2	97.1	4.0
落石岬	10.5	11.4	18.9	8.1	5.1	9.3	3.8	12.4	8.3	8.4	25.3	13.7	10.7	311	0.0
竜飛岬	37.9	45.1	27.2	16.2	8.7	7.2	18.3	23.1	19.2	25.9	38.6	51.7	22.8	249	1.6
八幡平	23.6	9.9	13.4	7.2	4.3	*	4.2	52.2	31.6	26.8	12.3	54.0	16.5	439	0.6
籠岳	28.9	11.8	15.7	12.7	15.0	9.0	3.1	12.2	4.8	4.5	51.8	30.6	12.1	295	0.5
尾花沢	20.4	21.7	14.2	5.7	15.5	6.0	2.4	8.8	6.9	11.5	11.4	26.0	9.4	94.1	0.7
筑波	35.7	27.2	17.3	21.0	8.0	8.2	6.0	18.4	6.3	18.2	37.6	60.7	16.5	419	2.3
赤城	25.5	24.1	19.5	29.1	25.2	20.8	35.0	7.8	6.2	1.7	52.1	37.2	22.2	385	1.1
小笠原	8.5	4.3	2.9	3.5	1.7	3.9	0.9	3.4	5.3	5.6	8.2	11.6	4.9	240	0.0
佐渡関岬	50.5	13.7	20.0	7.5	17.6	7.9	7.5	23.8	24.7	37.7	49.9	34.1	19.3	394	1.9
新潟巻	38.5	19.1	9.6	9.6	16.2	12.6	8.4	13.6	30.0	38.7	28.3	29.3	18.5	528	0.6
八方尾根	17.0	8.0	12.5	3.7	14.1	4.3	2.4	9.4	8.3	21.4	10.3	14.4	7.3	90.4	0.0
越前岬	26.1	16.3	18.3	13.5	42.5	7.2	16.7	23.8	30.9	51.7	31.3	29.9	19.9	385	0.0
伊自良湖	*	29.7	17.4	29.8	33.2	21.1	21.4	26.3	3.9	20.6	25.3	30.9	25.3	164	3.9
犬山	20.9	22.9	23.5	21.0	22.3	31.3	16.6	30.5	8.7	17.9	37.7	28.2	22.5	320	2.1
潮岬	14.9	17.6	7.1	8.3	8.6	11.6	9.4	31.8	13.5	21.2	25.2	10.5	11.8	289	1.4
京都八幡	92.7	76.4	46.1	17.3	54.2	17.5	13.3	18.1	11.0	32.7	21.3	27.3	20.5	259	2.6
尼崎	21.5	13.4	20.9	14.0	35.9	16.6	13.8	21.3	20.3	47.9	22.4	25.8	19.9	220	3.0
倉橋島	15.0	13.7	11.5	12.5	10.0	11.2	39.3	18.2	15.5	40.2	33.6	24.3	14.7	117	2.5
隠岐	21.6	12.8	32.5	5.6	17.6	10.6	27.8	27.4	42.8	63.7	39.7	57.4	21.2	321	0.7
蟠竜湖	13.3	12.9	6.8	11.0	15.9	12.6	11.2	46.2	71.6	67.0	61.1	33.2	18.8	160	3.3
栲原	9.7	5.1	4.8	5.1	7.9	4.7	9.3	8.8	15.5	45.1	13.2	14.7	7.6	244	0.3
筑後小郡	19.4	16.9	19.8	29.6	31.2	23.9	27.7	30.0	47.7	40.2	35.4	40.3	25.2	136	6.9
大分久住	15.3	5.8	8.1	7.7	5.1	9.5	18.9	18.9	13.9	23.7	13.9	15.5	8.8	82.1	1.4
対馬	22.5	13.6	9.1	50.2	*	*	18.3	21.6	54.9	58.1	39.4	14.5	22.8	336	0.0
五島	14.2	14.0	14.1	19.0	8.7	7.5	67.1	15.2	95.9	59.7	18.3	16.8	17.0	850	0.7
えびの	17.2	8.2	7.1	6.2	6.4	8.2	12.2	11.1	18.1	26.0	12.6	16.6	8.8	168	0.5
屋久島	14.0	12.6	5.7	12.6	12.6	10.0	31.3	19.9	20.0	19.0	12.0	18.7	13.9	76.4	4.2
辺戸岬	10.0	9.7	4.7	4.8	3.2	7.5	16.7	7.8	10.0	9.5	11.1	11.4	8.3	194	0.5
最大値 ¹⁾	<u>92.7</u>	<u>76.4</u>	<u>46.1</u>	<u>50.2</u>	54.2	<u>31.3</u>	67.1	<u>52.2</u>	95.9	67.0	<u>61.1</u>	60.7	25.3	850	6.9
最小値 ¹⁾	8.5	4.3	2.9	3.5	1.7	<u>3.9</u>	<u>0.9</u>	<u>3.4</u>	<u>3.9</u>	1.7	8.2	10.5	<u>4.9</u>	76.4	0.0
全国平均	23.1	17.7	15.9	13.8	16.5	11.4	16.2	19.9	22.3	28.8	27.7	27.4	16.0		
標準偏差	16.7	13.9	9.5	10.2	12.5	6.4	13.9	10.9	21.4	18.8	14.4	14.1	5.9		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 Cl⁻濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	75.2	20.1	14.8	6.9	22.8	56.6	271	437	200	525	241	530	131	5560	1.8
札幌	61.3	14.4	15.8	4.3	18.3	15.2	43.8	213	154	360	148	238	124	518	3.3
落石岬	504	88.9	45.0	48.6	33.1	298	1120	336	381	1340	1280	614	341	22800	2.9
竜飛岬	408	168	27.7	148	21.7	304	514	461	514	488	1320	548	342	6910	5.4
八幡平	19.3	6.9	6.1	3.2	5.7	*	5.8	27.2	56.1	21.4	58.3	57.1	17.2	1120	0.6
籠岳	28.4	19.0	20.4	5.6	32.8	22.0	25.9	21.9	25.5	14.4	209	222	31.3	798	0.5
尾花沢	17.2	17.7	4.2	1.8	5.8	16.7	4.7	60.8	46.4	152	148	220	57.4	558	0.8
筑波	31.9	26.2	11.7	4.4	14.9	22.9	8.4	26.0	10.5	18.1	25.2	190	20.2	1320	1.6
赤城	10.3	11.3	6.0	4.4	10.6	5.5	23.0	4.8	7.2	15.0	18.1	25.5	10.6	212	1.4
小笠原	40.6	35.3	68.0	28.6	146	44.2	278	259	227	111	275	154	138	4750	13.5
佐渡関岬	494	20.9	40.7	17.0	23.7	34.7	284	608	419	749	1280	284	258	28600	1.0
新潟巻	125	12.3	4.9	5.8	18.0	60.1	106	363	289	627	587	181	160	11600	0.7
八方尾根	12.1	3.5	3.3	1.8	4.0	1.4	6.1	10.7	5.7	8.4	5.6	5.7	4.6	60.3	0.5
越前岬	152	14.3	7.4	12.5	38.6	12.5	55.4	223	468	777	408	279	148	5200	0.0
伊自良湖	*	18.5	7.9	7.6	23.3	9.3	8.6	31.2	42.3	169	80.2	51.9	25.2	194	1.2
犬山	15.7	9.7	6.4	6.4	11.0	16.5	7.2	11.7	2.9	41.6	42.0	45.1	13.6	235	0.8
潮岬	322	233	156	154	115	51.4	100	275	44.1	91.7	556	550	189	1750	2.8
京都八幡	57.5	41.5	29.3	9.1	8.4	4.9	6.8	12.7	4.6	19.0	19.2	42.1	12.3	148	1.4
尼崎	19.4	13.4	7.2	11.7	8.8	4.8	8.7	21.3	17.5	27.5	38.0	78.3	16.7	253	1.2
倉橋島	13.7	15.6	8.2	7.6	18.8	9.4	20.4	16.0	9.1	18.0	75.3	93.6	17.7	346	0.8
隠岐	211	18.1	47.1	16.4	54.3	193	277	480	1090	1120	655	709	280	16300	4.7
蟠竜湖	73.5	10.6	3.2	18.2	18.6	98.0	180	336	236	132	105	50.5	59.8	1030	1.8
梶原	11.8	9.1	3.2	3.4	20.1	24.6	6.4	16.0	25.4	65.7	10.2	14.6	12.9	1380	0.3
筑後小郡	16.6	18.2	12.2	16.5	10.0	13.2	63.3	34.1	99.9	66.9	30.3	49.4	18.4	929	4.2
大分久住	7.2	4.5	6.9	7.0	4.6	8.4	13.6	10.5	13.7	73.3	9.7	12.7	7.8	183	1.9
対馬	34.4	51.6	5.1	22.7	*	*	76.8	123	142	114	68.9	66.6	59.9	1450	0.0
五島	86.6	50.6	63.6	196	103	16.9	509	53.2	208	456	77.1	126	101	9240	3.8
えびの	17.4	12.3	5.5	6.9	3.7	36.6	16.7	22.8	19.6	163	14.7	17.5	12.0	1050	0.3
屋久島	40.5	40.2	13.9	56.5	67.2	111	137	137	131	180	136	150	96.2	846	12.7
辺戸岬	103	73.7	103	433	70.8	246	163	128	446	231	105	230	176	25700	13.1
最大値 ¹⁾	504	233	156	433	146	304	1120	608	1090	1340	1320	709	342	28600	13.5
最小値 ¹⁾	7.2	3.5	3.2	1.8	3.7	1.4	4.7	4.8	2.9	8.4	5.6	5.7	4.6	60.3	0.0
全国平均	104	36.0	25.2	42.2	32.2	62.1	145	159	178	272	268	195	96.0		
標準偏差	144	49.7	34.3	88.5	35.8	88.3	233	177	235	346	390	200	102		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 NH₄⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	11.0	30.2	23.4	10.5	23.6	5.4	13.9	16.3	15.9	7.1	35.3	23.3	17.0	182	0.0
札幌	27.4	26.5	49.2	18.3	17.2	11.8	36.3	26.5	17.1	20.7	28.1	28.6	25.9	92.2	6.1
落石岬	9.0	12.2	24.4	7.3	3.3	38.6	2.2	4.0	10.6	2.6	10.0	10.9	14.8	1560	0.0
竜飛岬	37.0	54.4	29.0	6.8	5.6	4.0	12.7	17.6	11.5	12.4	33.0	50.3	18.7	328	0.0
八幡平	33.1	13.8	24.2	11.4	7.3	*	8.5	83.8	27.7	17.9	11.8	46.0	19.7	296	1.1
籠岳	27.7	14.3	24.4	19.2	16.5	8.5	6.6	11.2	7.8	7.4	40.5	33.1	14.9	189	3.7
尾花沢	31.5	24.3	26.4	9.8	19.9	4.6	2.8	8.5	8.2	12.7	16.0	25.8	11.4	89.9	0.9
筑波	38.1	24.7	22.6	18.9	21.8	8.7	4.1	12.9	6.8	6.6	31.0	54.3	16.1	634	0.7
赤城	47.1	50.3	17.5	21.9	38.4	14.1	35.2	14.3	11.3	3.3	81.4	31.0	26.7	429	0.6
小笠原	11.8	2.7	1.3	2.8	0.9	2.1	3.3	4.8	3.5	5.2	9.9	12.7	4.9	150	0.0
佐渡関岬	47.1	7.4	30.4	8.1	16.7	2.9	6.2	21.6	22.3	31.6	39.5	45.1	18.2	339	0.1
新潟巻	46.3	16.9	15.4	8.8	14.7	8.8	8.1	11.4	24.1	35.6	31.9	26.6	17.5	674	0.9
八方尾根	25.1	9.6	24.3	3.5	20.8	3.3	2.3	7.3	5.8	17.9	11.9	22.0	8.8	135	0.0
越前岬	19.2	13.6	17.1	14.2	66.8	4.3	16.2	18.6	34.3	47.7	35.4	36.2	19.3	467	0.0
伊自良湖	*	20.7	20.7	31.2	30.2	15.1	15.7	21.3	3.2	17.2	23.5	32.6	23.3	139	2.5
犬山	24.1	18.9	22.3	20.5	22.3	30.7	13.8	19.8	9.7	15.5	30.1	34.8	21.3	551	1.1
潮岬	17.7	16.3	5.6	9.4	6.8	3.9	3.6	12.8	4.5	9.6	18.8	11.8	9.3	125	0.7
京都八幡	68.0	63.4	44.9	18.2	28.9	9.5	11.6	13.9	9.4	23.7	22.3	30.9	18.2	150	3.3
尼崎	21.0	13.9	16.8	9.1	19.7	8.2	10.8	13.9	21.8	32.6	20.1	34.4	16.1	240	0.0
倉橋島	11.3	10.9	12.2	15.7	10.2	6.7	22.1	13.5	10.7	19.7	19.3	23.9	12.9	112	0.6
隠岐	17.6	9.1	40.8	3.4	13.8	4.7	11.4	19.6	27.0	32.5	24.7	53.3	14.8	762	0.0
蟠竜湖	11.5	8.9	6.8	11.7	7.5	7.6	9.1	29.7	50.9	54.8	45.6	37.3	14.6	148	2.6
梶原	13.0	4.9	5.2	6.9	7.9	2.8	5.1	3.5	11.5	33.9	11.4	16.0	7.7	185	0.0
筑後小郡	31.5	28.0	30.6	45.7	37.8	28.5	56.6	31.8	56.7	71.0	67.0	50.0	37.2	134	3.3
大分久住	28.5	10.7	12.0	16.8	8.8	15.2	39.2	24.6	14.0	32.6	22.4	23.3	15.5	88.7	3.2
対馬	31.1	14.4	8.0	33.4	*	*	35.5	19.5	43.0	47.0	37.2	25.8	25.6	192	0.2
五島	20.3	13.6	18.7	26.7	8.9	7.3	45.7	12.3	73.7	44.9	18.4	20.2	18.9	1210	0.8
えびの	32.0	14.4	9.4	9.7	16.7	20.3	22.9	10.3	20.3	28.8	22.3	35.2	14.7	263	0.1
屋久島	17.3	14.7	4.3	7.2	8.1	6.2	20.4	12.2	13.2	26.7	16.5	24.4	13.1	86.5	2.2
辺戸岬	11.4	10.2	4.8	6.6	4.4	7.7	9.9	6.9	8.8	10.8	16.2	14.1	8.8	175	0.4
最大値 ¹⁾	68.0	63.4	49.2	45.7	66.8	38.6	56.6	83.8	73.7	71.0	81.4	54.3	37.2	1560	6.1
最小値 ¹⁾	9.0	2.7	1.3	2.8	0.9	2.1	2.2	3.5	3.2	2.6	9.9	10.9	4.9	86.5	0.0
全国平均	26.5	19.1	19.8	14.5	17.4	10.4	16.4	17.5	19.5	24.3	27.7	30.5	16.9		
標準偏差	13.8	14.2	12.0	9.8	13.6	9.0	14.3	14.4	17.0	16.8	16.1	12.3	6.6		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つもない）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 Na⁺濃度 月・年平均値単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	65.9	18.9	12.1	5.6	21.0	51.8	<u>230</u>	<u>376</u>	177	447	211	464	114	4730	1.8
札幌	56.2	12.5	10.0	1.5	8.1	13.0	36.7	177	129	314	128	205	105	447	1.4
落石岬	414	76.5	39.1	41.4	<u>27.4</u>	263	<u>1070</u>	293	344	1160	1090	574	298	19700	2.0
竜飛岬	363	<u>148</u>	25.2	132	20.2	269	448	404	452	<u>440</u>	1160	509	303	6290	5.0
八幡平	16.0	5.0	4.4	1.5	4.5	*	4.0	29.4	48.5	20.9	50.1	40.1	<u>13.4</u>	667	0.2
籠岳	25.8	17.4	18.9	3.1	<u>25.9</u>	16.0	20.8	17.0	22.2	18.5	<u>165</u>	206	26.9	722	0.0
尾花沢	13.9	14.5	2.3	0.7	4.4	14.1	4.9	50.4	39.2	130	124	185	48.5	461	0.3
筑波	25.5	22.2	8.6	<u>1.7</u>	11.3	20.1	6.7	22.1	8.8	17.3	19.8	164	16.7	1080	0.3
赤城	7.1	<u>9.7</u>	4.0	<u>6.5</u>	<u>10.7</u>	<u>6.0</u>	18.1	<u>2.8</u>	10.9	11.1	13.4	<u>23.1</u>	<u>9.2</u>	213	0.0
小笠原	35.9	30.7	58.4	26.0	<u>127</u>	<u>38.4</u>	<u>241</u>	<u>225</u>	197	96.6	229	137	<u>119</u>	4090	12.8
佐渡関岬	429	18.5	38.0	16.4	22.2	31.3	249	520	373	656	1130	260	227	25900	1.5
新潟巻	108	10.9	3.5	4.1	14.0	50.0	89.1	306	245	<u>541</u>	499	154	136	9940	0.2
八方尾根	10.8	2.8	0.9	0.9	<u>2.0</u>	0.6	4.6	7.5	<u>3.9</u>	<u>5.2</u>	4.4	4.8	3.3	52.6	0.0
越前岬	145	14.2	5.5	10.3	<u>31.4</u>	11.2	46.8	201	434	687	360	264	134	4490	0.0
伊自良湖	*	<u>15.6</u>	5.7	3.6	17.3	6.5	6.0	26.0	<u>35.7</u>	149	67.3	44.1	20.3	190	0.4
犬山	13.2	8.5	4.9	5.5	8.4	<u>15.8</u>	7.3	14.5	4.9	42.9	41.0	43.1	12.7	205	0.5
潮岬	258	178	126	126	101	46.7	86.3	<u>238</u>	38.8	78.8	490	471	156	1520	2.7
京都八幡	<u>51.1</u>	<u>39.3</u>	<u>24.4</u>	7.3	5.8	3.9	5.7	10.5	3.6	16.7	16.3	37.7	<u>10.3</u>	122	1.1
尼崎	16.2	9.7	3.4	10.1	5.5	3.6	5.8	12.8	8.6	25.9	<u>33.8</u>	75.2	13.1	243	0.3
倉橋島	12.4	13.3	7.1	6.8	16.6	8.0	16.2	11.9	6.4	11.3	54.6	68.7	14.2	255	0.5
隠岐	182	15.9	42.3	15.2	54.7	169	245	433	953	1040	587	635	247	14000	3.1
蟠竜湖	62.5	8.9	2.0	16.5	17.0	87.1	153	290	205	116	<u>94.2</u>	47.8	52.2	947	1.2
梶原	10.0	7.7	2.6	2.8	18.1	19.9	5.4	11.5	21.0	<u>56.8</u>	7.7	12.1	10.9	1060	0.4
筑後小郡	13.6	14.3	10.0	13.2	<u>8.4</u>	<u>7.9</u>	45.2	<u>30.3</u>	<u>73.4</u>	54.5	24.3	<u>42.6</u>	14.7	714	1.8
大分久住	8.3	4.2	6.2	6.5	3.6	7.0	10.0	13.3	12.6	62.0	7.3	11.1	7.1	173	0.7
対馬	33.1	<u>46.7</u>	6.2	19.6	*	*	69.4	<u>108</u>	135	104	63.6	60.9	<u>54.9</u>	1130	2.1
五島	77.2	45.8	57.0	182	152	<u>71.9</u>	486	52.0	192	358	72.1	119	101	9310	4.2
えびの	14.5	8.9	5.2	6.3	2.8	27.6	18.6	<u>25.0</u>	20.6	<u>150</u>	11.6	15.1	10.5	974	0.4
屋久島	36.8	<u>37.1</u>	<u>12.0</u>	52.3	55.6	89.8	<u>128</u>	120	112	155	<u>118</u>	<u>130</u>	<u>82.8</u>	722	10.4
辺戸岬	89.9	62.7	88.9	380	61.2	212	145	111	385	201	91.4	199	153	22300	11.1
最大値 ¹⁾	429	178	126	380	152	269	<u>1070</u>	520	953	1160	1160	635	303	25900	12.8
最小値 ¹⁾	7.1	2.8	0.9	0.7	<u>2.0</u>	0.6	<u>4.0</u>	<u>2.8</u>	3.6	<u>5.2</u>	4.4	4.8	3.3	52.6	0.0
全国平均	89.5	30.6	21.1	36.9	29.6	55.8	130	138	156	239	232	173	83.8		
標準偏差	122.8	40.3	28.9	78.2	37.5	77.3	219	153	207	306	341	181	89.6		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 K⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	1.4	2.1	4.4	3.3	0.9	2.8	5.4	10.6	4.4	9.1	6.7	10.2	3.8	104	0.1
札幌	2.1	1.4	3.8	4.0	1.2	1.6	3.3	7.0	3.4	7.0	4.2	5.2	4.2	9.6	0.0
落石岬	9.4	3.1	2.7	2.0	1.0	10.9	19.8	8.3	7.9	24.7	23.4	12.7	8.0	440	0.0
竜飛岬	9.7	7.9	2.6	2.8	0.3	5.3	9.6	9.4	11.1	9.4	24.2	12.8	7.3	298	0.0
八幡平	1.6	0.6	1.4	0.2	0.1	*	0.3	17.5	2.5	0.9	1.4	3.0	1.0	25.1	0.0
籠岳	1.0	0.9	0.9	0.3	0.8	0.7	0.8	0.7	1.0	0.3	4.3	4.0	0.9	44.7	0.1
尾花沢	1.3	1.4	1.1	0.2	0.5	0.4	0.1	1.3	1.1	3.1	3.1	4.8	1.4	10.5	0.1
筑波	2.5	2.3	1.8	1.1	1.6	1.4	0.8	0.7	0.5	0.9	1.2	8.4	1.4	39.2	0.2
赤城	1.8	1.9	2.5	0.7	2.6	0.2	1.1	0.5	1.1	1.9	1.9	4.3	1.7	13.0	0.0
小笠原	1.6	1.0	1.8	0.8	2.6	0.7	6.0	5.0	4.0	2.4	5.0	3.8	2.8	111	0.2
佐渡関岬	12.7	0.9	2.7	0.6	1.1	0.5	4.4	12.0	8.2	14.6	25.4	7.3	5.5	501	0.0
新潟巻	5.0	1.4	0.5	0.3	0.5	1.3	2.1	7.2	7.0	12.8	12.4	4.8	3.8	218	0.0
八方尾根	2.1	0.5	1.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.5	1.2	0.7	1.4	0.5	15.7	0.0
越前岬	4.5	1.3	1.2	4.5	1.5	0.4	1.5	5.3	10.6	16.4	9.5	7.2	4.8	95.8	0.0
伊自良湖	*	0.7	1.0	0.6	0.8	0.3	0.6	2.1	1.0	3.9	2.6	2.3	1.1	7.3	0.2
犬山	1.2	0.6	0.9	0.6	0.8	1.1	0.5	1.1	0.4	2.2	2.0	2.8	1.0	25.0	0.1
潮岬	6.3	4.5	2.8	3.1	2.5	1.0	1.5	5.6	0.8	1.7	11.3	10.9	3.7	35.6	0.1
京都八幡	4.0	4.4	2.5	1.8	1.9	1.1	1.0	2.0	1.3	2.0	1.8	4.1	1.8	11.4	0.6
尼崎	1.5	1.0	1.5	1.2	1.5	0.7	0.9	1.3	0.9	2.3	1.6	2.5	1.3	20.3	0.0
倉橋島	1.2	0.7	0.7	0.5	0.9	0.5	0.8	0.7	0.6	1.0	2.6	2.6	0.9	9.4	0.2
隠岐	5.5	1.2	6.6	0.7	2.0	4.6	7.5	13.6	23.6	27.2	16.9	22.4	7.4	316	0.2
蟠竜湖	2.2	0.6	0.1	0.6	0.4	1.8	3.4	9.0	7.6	6.0	5.2	3.7	1.8	23.5	0.0
栲原	1.1	0.8	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.4	1.1	3.5	0.8	1.2	0.7	143	0.0
筑後小郡	3.8	3.3	1.8	2.4	2.8	2.3	4.1	4.0	6.8	5.9	5.0	3.8	2.9	15.9	0.0
大分久住	1.9	0.6	0.7	0.5	0.4	0.8	1.9	1.6	1.8	3.3	1.7	2.0	0.8	8.5	0.0
対馬	3.4	3.7	1.9	3.8	*	*	2.9	3.9	7.2	5.2	3.3	3.1	3.4	31.4	0.5
五島	3.0	1.7	2.4	6.8	2.7	0.9	23.0	2.3	10.5	15.2	3.3	4.1	3.6	826	0.1
えびの	2.0	0.8	0.5	0.5	0.5	1.3	1.1	1.5	2.3	6.9	1.6	1.9	0.9	51.7	0.1
屋久島	1.8	1.4	0.5	1.3	1.3	2.0	3.3	2.5	2.6	4.8	4.1	3.8	2.3	26.9	0.5
辺戸岬	3.0	2.1	2.2	8.8	1.8	5.3	4.1	3.9	8.6	5.5	4.2	5.0	4.0	499	0.6
最大値 ¹⁾	12.7	7.9	6.6	8.8	2.8	10.9	23.0	17.5	23.6	27.2	25.4	22.4	8.0	826	0.6
最小値 ¹⁾	1.0	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.4	0.3	0.7	1.2	0.5	7.3	0.0
全国平均	3.4	1.8	1.8	1.8	1.3	1.8	3.7	4.7	4.7	6.7	6.4	5.5	2.8		
標準偏差	2.9	1.6	1.4	2.1	0.8	2.3	5.3	4.5	5.0	6.9	7.1	4.5	2.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 Ca²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	6.7	8.0	1.7	0.8	1.2	1.8	7.0	10.6	4.9	13.4	9.6	14.8	4.8	115	0.1
札幌	14.2	6.9	5.3	1.4	2.8	2.5	4.9	7.2	4.7	11.7	10.9	18.0	7.6	38.2	0.9
落石岬	18.4	6.0	3.3	3.8	1.7	8.4	23.4	8.5	10.7	37.9	41.6	20.3	10.5	427	0.4
竜飛岬	33.5	21.5	5.2	4.5	0.8	7.3	14.0	12.9	12.3	15.6	31.8	34.2	13.3	183	0.6
八幡平	12.5	4.3	2.3	0.8	0.7	*	2.5	15.0	5.4	9.3	2.7	41.7	7.6	390	0.0
籠岳	13.3	3.0	3.5	1.6	3.1	2.5	2.4	2.2	2.2	3.5	10.1	17.8	4.0	97.3	0.0
尾花沢	8.8	5.8	1.3	0.4	1.0	0.6	0.2	1.6	1.3	7.4	3.7	17.2	3.0	38.9	0.0
筑波	16.5	12.4	3.3	2.3	1.9	2.8	2.2	2.4	2.0	13.4	3.2	27.7	4.9	180	0.4
赤城	6.3	13.9	2.5	1.7	1.9	1.8	3.2	1.0	0.6	2.1	5.7	15.9	3.0	80.1	0.0
小笠原	3.7	2.2	1.8	1.4	3.5	2.0	10.4	5.4	4.8	3.3	6.5	5.8	4.0	174	0.5
佐渡関岬	48.9	8.3	6.9	1.4	2.0	2.4	7.0	17.2	11.6	21.2	35.2	19.9	11.0	596	0.4
新潟巻	31.2	13.4	1.4	0.5	1.0	1.8	2.3	7.9	8.3	14.3	13.7	19.4	7.4	293	0.1
八方尾根	26.5	15.3	6.1	1.2	1.8	1.2	0.9	1.5	1.5	2.8	1.2	7.2	5.3	95.6	0.0
越前岬	20.0	6.7	3.3	5.6	2.9	0.8	2.0	7.6	12.1	23.7	13.2	19.4	8.5	185	0.0
伊自良湖	*	3.4	1.5	0.9	3.7	1.0	1.0	3.7	1.1	8.0	4.8	9.4	2.8	33.2	0.4
犬山	14.9	5.0	2.5	1.3	1.9	2.4	1.5	3.6	1.9	9.3	5.9	10.8	4.4	216	0.2
潮岬	14.5	9.9	3.6	3.2	2.8	1.4	1.9	8.0	1.5	8.3	14.0	13.9	5.9	87.9	0.4
京都八幡	58.6	27.7	10.5	2.3	6.2	1.9	1.6	2.4	1.6	17.8	3.3	21.3	4.6	65.9	0.0
尼崎	11.1	2.7	4.1	2.3	3.8	2.3	2.1	4.8	3.8	20.4	5.7	15.6	4.8	75.9	0.6
倉橋島	8.6	2.1	1.0	0.8	1.5	0.7	2.4	1.7	2.4	4.4	3.4	10.2	2.9	45.6	0.3
隠岐	24.8	9.9	12.2	1.3	3.4	4.7	1.0	9.5	26.6	35.1	20.6	56.6	13.0	391	0.1
蟠竜湖	11.1	4.1	0.4	3.0	2.7	2.2	4.1	23.7	15.9	11.0	9.1	23.6	5.8	69.8	0.1
栲原	7.8	1.6	0.9	0.8	1.2	1.1	0.9	1.9	2.4	10.8	1.5	4.7	2.3	64.9	0.2
筑後小郡	13.3	6.9	3.9	5.2	8.4	4.3	8.6	8.1	13.2	7.8	10.3	18.2	7.1	63.3	2.0
大分久住	10.1	1.1	1.8	0.5	0.1	0.3	1.9	6.9	3.7	9.4	2.1	7.1	2.0	35.6	0.0
対馬	9.1	5.5	1.4	4.4	*	*	8.4	6.5	13.7	11.8	6.5	4.1	6.6	89.0	0.0
五島	8.4	4.4	3.4	7.0	1.9	1.4	19.6	4.5	22.7	18.6	3.8	6.5	5.5	317	0.0
えびの	7.4	2.0	0.8	0.7	0.8	1.6	1.6	3.7	6.1	14.0	2.2	6.1	2.0	112	0.2
屋久島	6.8	2.3	1.2	4.1	2.3	2.8	5.4	3.9	4.1	10.2	4.3	5.5	4.0	32.2	1.0
辺戸岬	5.7	2.8	2.7	10.7	2.3	5.6	4.6	12.8	35.7	11.5	8.1	8.2	9.1	499	0.5
最大値 ¹⁾	58.6	27.7	12.2	10.7	8.4	8.4	23.4	23.7	35.7	37.9	41.6	56.6	13.3	596	2.0
最小値 ¹⁾	3.7	1.1	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	1.0	0.6	2.1	1.2	4.1	2.0	32.2	0.0
全国平均	16.3	7.3	3.3	2.5	2.4	2.5	5.0	6.9	8.0	12.9	9.8	16.7	5.9		
標準偏差	12.9	6.2	2.7	2.3	1.7	1.9	5.6	5.3	8.4	8.4	10.1	11.6	3.1		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 nss-C a²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	5.2	7.6	1.4	0.6	0.7	0.7	2.2	2.5	1.1	3.7	5.0	4.7	2.4	63.2	0.0
札幌	13.0	6.7	5.1	1.4	2.6	2.2	4.1	3.4	1.9	4.9	8.1	13.6	5.3	36.3	0.5
落石岬	9.5	4.4	2.5	2.9	1.1	2.7	1.8	2.2	3.3	13.4	18.0	7.9	4.1	195	0.0
竜飛岬	25.7	18.3	4.7	1.7	0.4	1.5	4.3	4.1	2.6	6.1	6.7	23.3	6.7	142	0.0
八幡平	12.2	4.2	2.2	0.8	0.6	*	2.4	14.4	4.4	8.8	1.6	40.8	7.3	386	0.0
籠岳	12.8	2.7	3.1	1.5	2.5	2.2	1.9	1.9	1.7	3.1	6.5	13.5	3.5	95.2	0.0
尾花沢	8.5	5.5	1.2	0.4	0.9	0.3	0.1	0.5	0.4	4.6	1.0	13.2	1.9	38.2	0.0
筑波	15.9	11.9	3.1	2.2	1.7	2.4	2.1	1.9	1.8	13.1	2.8	24.2	4.6	180	0.1
赤城	6.1	13.7	2.4	1.6	1.6	1.8	2.9	0.9	0.5	1.8	5.4	15.4	2.8	79.3	0.0
小笠原	3.0	1.5	0.5	0.8	0.7	1.2	5.2	0.5	0.7	1.2	1.6	2.8	1.4	85.7	0.0
佐渡関岬	39.6	7.9	6.1	1.1	1.5	1.7	1.6	6.0	3.7	7.0	10.7	14.3	6.1	224	0.0
新潟巻	28.9	13.2	1.3	0.4	0.7	0.8	0.6	1.3	3.2	3.1	2.9	16.1	4.5	292	0.0
八方尾根	26.3	15.3	6.1	1.1	1.7	1.2	0.8	1.3	1.4	2.7	1.1	7.1	5.2	95.3	0.0
越前岬	16.9	6.4	3.2	5.3	2.2	0.6	1.0	3.2	3.0	8.8	5.4	13.7	5.6	154	0.0
伊自良湖	*	3.0	1.3	0.8	3.4	0.9	0.9	3.2	0.3	4.8	3.4	8.5	2.4	32.4	0.3
犬山	14.6	4.9	2.4	1.2	1.8	2.1	1.3	3.3	1.8	8.4	5.0	9.9	4.2	214	0.2
潮岬	8.9	6.0	0.9	0.5	0.7	0.4	0.2	2.8	0.6	6.6	3.4	3.7	2.5	86.3	0.0
京都八幡	57.5	26.9	10.0	2.1	6.0	1.9	1.5	2.2	1.6	17.5	3.0	20.5	4.4	65.2	0.0
尼崎	10.8	2.5	4.0	2.1	3.7	2.3	2.0	4.5	3.6	19.8	4.9	14.0	4.5	74.5	0.5
倉橋島	8.3	1.8	0.8	0.6	1.1	0.6	2.1	1.4	2.3	4.2	2.2	8.7	2.6	43.7	0.2
隠岐	20.8	9.5	11.3	1.0	2.2	1.2	0.5	2.8	6.0	12.6	7.9	42.9	8.0	275	0.0
蟠竜湖	9.8	3.9	0.4	2.7	2.4	0.4	0.8	17.5	11.4	8.5	7.0	22.6	4.6	59.2	0.0
栲原	7.6	1.4	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.7	2.0	9.6	1.3	4.4	2.1	64.0	0.2
筑後小郡	13.0	6.6	3.7	5.0	8.2	4.1	7.6	7.4	11.6	6.6	9.8	17.2	6.8	61.8	1.7
大分久住	10.0	1.0	1.6	0.4	0.1	0.3	1.7	6.6	3.4	8.0	2.0	6.8	1.9	31.9	0.0
対馬	8.5	4.5	1.3	4.0	*	*	6.9	4.2	10.7	9.6	5.1	2.8	5.4	84.2	0.0
五島	6.7	3.4	2.1	3.1	0.9	1.1	9.1	3.3	18.6	10.9	2.3	4.0	3.6	115	0.0
えびの	7.1	1.9	0.7	0.6	0.7	1.0	1.2	3.1	5.7	10.8	1.9	5.8	1.8	108	0.0
屋久島	6.0	1.5	0.9	3.0	1.1	0.9	2.7	1.3	1.7	6.9	1.7	2.7	2.3	23.2	0.7
辺戸岬	3.7	1.5	0.8	2.5	1.0	1.0	1.4	10.5	27.4	7.2	6.1	3.9	5.8	202	0.0
最大値 ¹⁾	<u>57.5</u>	<u>26.9</u>	11.3	5.3	<u>8.2</u>	<u>4.1</u>	9.1	17.5	27.4	19.8	18.0	42.9	8.0	386	1.7
最小値 ¹⁾	3.0	1.0	0.4	0.4	0.1	0.3	0.1	0.5	<u>0.3</u>	1.2	1.0	<u>2.7</u>	<u>1.4</u>	23.2	0.0
全国平均	14.4	6.6	2.9	1.7	1.8	1.4	2.4	4.0	4.6	7.8	4.8	13.0	4.1		
標準偏差	11.8	5.9	2.7	1.3	1.7	0.9	2.2	3.9	6.0	4.4	3.6	10.2	1.8		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 Mg²⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	8.0	3.4	1.9	0.9	2.5	5.4	25.5	42.6	20.4	51.3	25.6	51.9	13.0	551	0.1
札幌	7.3	2.2	2.2	0.3	1.5	1.9	4.4	20.1	14.1	35.0	15.4	24.1	12.2	50.9	0.3
落石岬	48.8	8.6	5.2	5.3	3.6	31.7	106	32.8	38.4	128	126	64.7	33.4	2170	0.6
竜飛岬	42.6	19.9	3.9	14.9	2.0	30.6	52.0	46.7	50.9	48.1	130	58.5	34.8	680	0.6
八幡平	4.0	1.4	1.0	0.4	0.6	*	1.3	6.4	6.4	3.3	6.2	9.5	2.6	86.4	0.0
籠岳	5.2	2.5	2.7	0.7	3.8	2.0	1.9	2.2	1.5	1.5	19.1	19.6	3.1	40.5	0.0
尾花沢	2.9	2.8	0.5	0.2	0.6	1.3	0.3	5.4	4.2	14.6	13.8	22.8	5.5	54.0	0.0
筑波	5.0	3.8	1.6	1.0	1.7	4.0	2.2	2.7	1.3	1.5	2.3	22.8	2.9	132	0.2
赤城	2.1	3.5	1.4	1.4	1.3	0.5	7.6	0.8	0.6	1.2	2.4	5.0	2.4	80.8	0.0
小笠原	4.6	3.4	6.0	2.9	13.8	4.8	28.8	24.8	20.8	10.8	26.4	16.3	13.3	481	1.4
佐渡関岬	53.1	3.5	5.4	1.8	2.5	4.0	27.8	60.1	41.9	70.7	129	31.1	26.1	2870	0.2
新潟巻	16.0	2.9	0.7	0.5	1.6	5.7	9.8	34.7	28.0	51.9	55.8	19.3	15.5	1080	0.0
八方尾根	3.5	1.4	1.0	0.1	0.7	0.2	0.8	0.9	0.6	1.4	0.8	1.7	0.8	15.1	0.0
越前岬	15.9	2.5	1.1	2.1	3.8	1.2	4.7	22.2	46.3	75.0	39.4	31.7	15.1	507	0.0
伊自良湖	*	2.4	0.9	0.6	2.3	0.8	0.7	3.5	3.9	17.1	8.1	6.3	2.6	23.6	0.0
犬山	3.6	2.0	0.9	0.7	1.1	1.9	0.9	1.7	0.5	5.3	5.2	6.0	2.0	42.1	0.1
潮岬	30.2	20.8	14.1	14.3	11.0	4.7	9.1	26.9	3.9	9.4	55.9	53.9	17.7	171	0.3
京都八幡	14.4	7.9	3.9	1.3	1.1	0.5	0.9	1.4	0.3	2.8	2.0	6.5	1.7	16.5	0.0
尼崎	3.7	2.0	1.2	1.6	1.2	0.9	1.2	2.3	1.4	4.4	4.1	9.2	2.3	29.7	0.2
倉橋島	2.4	1.7	0.8	0.8	1.9	0.5	2.1	1.5	0.9	1.7	6.6	9.0	1.9	29.0	0.0
隠岐	23.6	2.9	7.7	2.0	6.8	19.5	29.9	49.0	109	120	66.0	75.6	29.1	1580	0.6
蟠竜湖	8.4	1.7	0.2	2.3	2.1	9.5	17.0	35.2	25.8	15.0	12.8	9.2	6.6	108	0.1
栲原	2.2	1.2	0.4	0.3	2.2	2.4	0.8	1.5	2.5	8.0	1.1	2.0	1.5	129	0.0
筑後小郡	3.6	3.3	1.7	2.1	1.6	1.6	5.8	5.6	10.5	8.8	5.7	7.2	2.8	81.3	0.0
大分久住	2.1	0.4	0.4	0.2	0.3	0.4	2.5	3.3	1.7	7.6	1.4	2.6	0.7	23.4	0.0
対馬	5.1	5.3	0.9	3.4	*	*	11.0	12.3	15.9	13.7	8.0	7.0	6.9	123	0.0
五島	9.6	5.7	6.6	15.0	4.7	1.6	47.3	5.8	23.4	42.0	8.2	12.6	9.0	687	0.0
えびの	2.6	1.3	0.7	0.8	0.5	3.2	2.0	4.0	3.6	18.8	1.7	3.1	1.5	123	0.0
屋久島	5.3	4.5	1.5	6.1	6.6	10.5	15.3	14.0	13.1	18.6	13.7	15.3	9.8	85.1	1.2
辺戸岬	10.6	7.4	10.1	44.4	7.3	27.7	17.5	12.7	43.7	22.8	10.1	22.9	17.7	3220	1.3
最大値 ¹⁾	53.1	20.8	14.1	44.4	13.8	31.7	106	60.1	109	128	130	75.6	34.8	3220	1.4
最小値 ¹⁾	2.1	0.4	0.2	0.1	0.3	0.2	0.3	0.8	0.3	1.2	0.8	1.7	0.7	15.1	0.0
全国平均	11.9	4.4	2.9	4.3	3.1	6.4	14.6	16.1	17.9	27.0	26.7	20.9	9.8		
標準偏差	14.3	4.8	3.3	8.7	3.2	9.3	22.1	17.3	23.4	33.6	38.5	20.3	10.0		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 H⁺濃度 月・年平均値

単位：μmol L⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	9.2	19.4	25.3	9.3	27.8	16.9	16.3	29.4	36.0	19.1	37.6	25.6	22.0	174	2.2
札幌	7.6	12.2	47.3	17.8	36.4	20.7	40.4	37.3	29.0	21.4	33.3	25.0	28.7	95.5	1.4
落石岬	9.9	15.5	25.5	21.6	12.3	10.7	6.5	13.9	14.4	3.7	6.6	23.9	13.8	102	0.0
竜飛岬	21.9	50.0	34.7	18.1	17.6	13.8	22.6	33.3	22.6	23.2	32.2	22.9	25.1	195	1.3
八幡平	23.7	14.7	19.3	12.5	10.3	*	12.3	2.6	72.6	32.1	22.6	24.0	18.5	120	0.7
籠岳	21.2	14.1	18.1	13.2	20.0	12.5	4.4	14.1	6.8	1.8	39.9	16.1	12.1	123	0.0
尾花沢	17.9	26.2	24.0	11.8	32.0	12.1	5.6	12.7	11.1	14.7	31.3	23.9	14.9	100	0.6
筑波	14.6	12.8	15.7	17.7	4.0	6.5	5.7	21.2	8.6	13.1	52.8	13.1	12.8	295	0.6
赤城	7.7	0.8	28.4	30.8	7.8	11.9	17.4	6.3	5.2	1.7	13.5	13.3	15.7	265	0.1
小笠原	13.1	16.6	7.8	7.4	7.3	6.8	2.9	4.8	11.2	11.4	18.0	13.9	10.1	105	1.8
佐渡関岬	12.8	9.1	17.9	9.7	35.1	9.4	6.8	36.0	41.6	51.8	43.5	27.9	22.2	166	0.2
新潟巻	17.9	7.2	12.2	13.9	30.9	18.2	12.3	22.7	47.9	67.4	44.4	27.7	24.4	263	0.3
八方尾根	10.7	4.0	14.0	7.1	29.3	8.6	7.4	20.3	22.2	41.1	24.3	17.2	11.0	148	0.1
越前岬	16.6	15.3	23.0	8.8	141	13.4	33.7	46.4	66.6	72.7	54.6	39.1	27.0	407	0.2
伊自良湖	*	28.4	25.6	43.1	41.9	37.1	27.3	25.9	7.4	25.9	45.6	36.7	34.3	132	5.2
犬山	14.5	22.6	27.3	26.8	36.9	46.8	26.8	31.3	12.8	17.5	37.5	34.9	26.8	209	0.1
潮岬	19.7	24.3	19.2	24.3	21.8	24.5	24.9	51.5	26.5	35.0	39.5	21.8	23.7	263	1.5
京都八幡	4.0	28.8	51.3	22.4	49.3	19.5	15.7	23.5	17.8	19.8	30.3	14.4	22.6	166	1.5
尼崎	22.7	17.1	27.9	22.3	53.6	20.9	19.6	30.0	29.8	46.5	32.7	24.5	26.9	191	1.8
倉橋島	13.2	24.0	17.3	22.6	14.5	24.9	59.0	32.4	26.8	51.7	57.0	30.4	22.7	138	2.3
隠岐	5.9	9.0	12.9	8.2	25.9	18.4	33.4	31.9	56.1	72.5	57.6	25.2	20.4	282	0.1
蟠竜湖	9.2	12.7	9.4	20.1	21.2	22.4	17.8	41.3	76.3	83.3	94.0	21.6	23.1	170	1.2
梶原	12.1	11.1	9.1	14.3	15.8	12.0	20.5	15.4	34.2	60.1	27.2	24.0	14.7	195	0.9
筑後小郡	16.7	18.9	16.4	50.6	34.5	60.2	53.6	30.0	40.2	16.2	42.9	25.5	32.5	155	0.4
大分久住	22.0	17.2	11.7	20.5	12.7	25.8	32.5	20.0	28.8	24.6	38.3	20.1	18.3	117	1.9
対馬	13.3	14.9	10.1	56.2	*	*	41.6	21.4	92.7	62.1	49.1	28.2	25.9	178	1.0
五島	9.8	23.9	25.1	30.2	16.2	17.1	51.0	21.0	64.8	81.6	39.7	19.9	24.0	257	1.1
えびの	29.5	28.9	14.9	16.3	16.7	35.2	31.9	10.9	30.8	36.4	38.1	20.6	20.4	229	0.1
屋久島	21.8	38.7	13.3	15.2	33.8	23.2	56.9	33.1	41.9	37.7	34.3	43.3	29.8	145	1.7
辺戸岬	11.8	15.2	5.9	6.3	3.3	12.1	24.0	8.7	11.4	17.7	17.7	12.8	11.2	170	0.0
最大値 ¹⁾	29.5	50.0	51.3	56.2	141	60.2	59.0	51.5	92.7	83.3	94.0	43.3	34.3	407	5.2
最小値 ¹⁾	4.0	0.8	5.9	6.3	3.3	6.5	2.9	2.6	5.2	1.7	6.6	12.8	10.1	95.5	0.0
全国平均	14.9	18.5	20.4	20.0	27.9	20.1	24.4	24.3	33.1	35.5	37.9	23.9	21.2		
標準偏差	6.1	10.1	10.6	12.3	25.4	12.3	16.3	12.2	23.2	24.3	16.4	7.6	6.6		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 pH 月・年平均値

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	5.04	4.71	4.60	5.03	4.56	4.77	4.79	4.53	4.44	4.72	4.42	4.59	4.66	5.66	3.76
札幌	5.12	4.92	4.33	4.75	4.44	4.69	4.39	4.43	4.54	4.67	4.48	4.60	4.54	5.84	4.02
落石岬	5.00	4.81	4.59	4.67	4.91	4.97	5.19	4.86	4.84	5.44	5.18	4.62	4.86	7.95	3.99
竜飛岬	4.66	4.30	4.46	4.74	4.75	4.86	4.65	4.48	4.65	4.64	4.49	4.64	4.60	5.87	3.71
八幡平	4.63	4.83	4.72	4.90	4.99	*	4.91	5.59	4.14	4.49	4.64	4.62	4.73	6.17	3.92
籠岳	4.67	4.85	4.74	4.88	4.70	4.90	5.35	4.85	5.17	5.74	4.40	4.79	4.92	7.39	3.91
尾花沢	4.75	4.58	4.62	4.93	4.49	4.92	5.25	4.90	4.96	4.83	4.50	4.62	4.83	6.22	4.00
筑波	4.84	4.89	4.81	4.75	5.40	5.18	5.24	4.67	5.07	4.88	4.28	4.88	4.89	6.19	3.53
赤城	5.11	6.11	4.55	4.51	5.11	4.93	4.76	5.20	5.28	5.76	4.87	4.88	4.80	7.10	3.58
小笠原	4.88	4.78	5.11	5.13	5.14	5.17	5.54	5.32	4.95	4.94	4.74	4.86	4.99	5.74	3.98
佐渡関岬	4.89	5.04	4.75	5.01	4.45	5.03	5.17	4.44	4.38	4.29	4.36	4.55	4.65	6.68	3.78
新潟巻	4.75	5.14	4.91	4.86	4.51	4.74	4.91	4.64	4.32	4.17	4.35	4.56	4.61	6.56	3.58
八方尾根	4.97	5.40	4.85	5.15	4.53	5.06	5.13	4.69	4.65	4.39	4.61	4.76	4.96	6.87	3.83
越前岬	4.78	4.82	4.64	5.05	3.85	4.87	4.47	4.33	4.18	4.14	4.26	4.41	4.57	6.61	3.39
伊自良湖	*	4.55	4.59	4.37	4.38	4.43	4.56	4.59	5.13	4.59	4.34	4.44	4.46	5.28	3.88
犬山	4.84	4.65	4.56	4.57	4.43	4.33	4.57	4.50	4.89	4.76	4.43	4.46	4.57	6.85	3.68
潮岬	4.70	4.61	4.72	4.62	4.66	4.61	4.60	4.29	4.58	4.46	4.40	4.66	4.62	5.83	3.58
京都八幡	5.40	4.54	4.29	4.65	4.31	4.71	4.80	4.63	4.75	4.70	4.52	4.84	4.65	5.82	3.78
尼崎	4.64	4.77	4.55	4.65	4.27	4.68	4.71	4.52	4.53	4.33	4.49	4.61	4.57	5.75	3.72
倉橋島	4.88	4.62	4.76	4.64	4.84	4.60	4.23	4.49	4.57	4.29	4.24	4.52	4.64	5.63	3.86
隠岐	5.23	5.05	4.89	5.08	4.59	4.74	4.48	4.50	4.25	4.14	4.24	4.60	4.69	6.86	3.55
蟠竜湖	5.04	4.90	5.03	4.70	4.67	4.65	4.75	4.38	4.12	4.08	4.03	4.67	4.64	5.91	3.77
栲原	4.92	4.96	5.04	4.84	4.80	4.92	4.69	4.81	4.47	4.22	4.56	4.62	4.83	6.06	3.71
筑後小郡	4.78	4.72	4.79	4.30	4.46	4.22	4.27	4.52	4.40	4.79	4.37	4.59	4.49	6.40	3.81
大分久住	4.66	4.76	4.93	4.69	4.90	4.59	4.49	4.70	4.54	4.61	4.42	4.70	4.74	5.71	3.93
対馬	4.88	4.83	5.00	4.25	*	*	4.38	4.67	4.03	4.21	4.31	4.55	4.59	5.98	3.75
五島	5.01	4.62	4.60	4.52	4.79	4.77	4.29	4.68	4.19	4.09	4.40	4.70	4.62	5.95	3.59
えびの	4.53	4.54	4.83	4.79	4.78	4.45	4.50	4.96	4.51	4.44	4.42	4.69	4.69	7.19	3.64
屋久島	4.66	4.41	4.88	4.82	4.47	4.63	4.24	4.48	4.38	4.42	4.46	4.36	4.53	5.77	3.84
辺戸岬	4.93	4.82	5.23	5.20	5.49	4.92	4.62	5.06	4.94	4.75	4.75	4.89	4.95	7.39	3.77
最大値 ¹⁾	<u>5.40</u>	<u>6.11</u>	5.23	5.20	5.49	5.18	<u>5.54</u>	<u>5.59</u>	5.28	5.76	<u>5.18</u>	4.89	<u>4.99</u>	7.95	4.02
最小値 ¹⁾	4.53	<u>4.30</u>	<u>4.29</u>	<u>4.25</u>	<u>3.85</u>	<u>4.22</u>	4.23	<u>4.29</u>	4.03	4.08	<u>4.03</u>	<u>4.36</u>	4.46	5.28	3.39
全国平均	4.87	4.82	4.74	4.77	4.68	4.76	4.73	4.69	4.59	4.60	4.47	4.64	4.70		
標準偏差	0.20	0.33	0.22	0.25	0.34	0.24	0.36	0.30	0.34	0.44	0.22	0.14	0.15		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。

平成18年度 電気伝導率 月・年平均値

単位：mS m⁻¹

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均値	最大値 ²⁾	最小値 ²⁾
利尻	1.84	1.91	1.74	0.79	1.88	1.79	4.54	7.38	4.40	7.76	5.41	8.36	3.06	74.0	0.32
札幌	2.11	1.38	3.11	1.14	1.96	1.33	2.86	4.92	3.53	5.94	3.94	4.85	3.37	8.44	0.77
落石岬	7.39	2.28	2.34	1.73	1.04	5.15	15.6	5.28	5.50	9.06	24.7	10.2	5.24	54.7	0.66
竜飛岬	7.49	5.61	2.57	3.06	1.28	4.95	8.12	7.88	8.31	7.44	18.7	9.52	6.08	88.3	0.55
八幡平	2.07	0.90	1.21	0.67	0.53	*	0.65	3.37	3.77	1.92	1.86	4.13	1.39	18.3	0.18
籠岳	2.23	1.19	1.58	0.95	1.71	1.06	0.67	1.17	0.82	0.70	5.32	5.00	1.32	11.6	0.16
尾花沢	1.65	1.69	1.57	0.50	1.48	0.82	0.43	1.79	1.48	3.12	3.62	4.68	1.71	8.75	0.25
筑波	1.85	1.43	1.18	1.12	0.67	0.82	0.51	1.43	0.63	1.17	3.04	4.48	1.14	25.6	0.20
赤城	1.32	1.63	1.69	1.76	1.24	0.85	1.67	0.57	0.54	0.45	2.42	2.09	1.35	15.8	0.15
小笠原	1.47	1.43	1.29	0.93	2.33	1.11	1.51	3.86	3.66	2.18	4.36	2.81	2.35	10.1	0.61
佐渡関岬	8.57	1.10	2.09	0.93	2.28	1.14	4.26	8.25	6.99	12.7	18.9	6.32	4.53	91.0	0.38
新潟巻	3.96	1.23	0.87	0.89	1.86	1.82	2.14	6.09	6.41	11.9	6.09	4.69	3.52	37.7	0.18
八方尾根	1.75	0.78	1.27	0.40	1.69	0.45	0.42	1.17	1.20	2.35	1.38	1.43	0.81	8.63	0.13
越前岬	3.78	1.37	1.49	1.06	8.54	0.83	2.31	4.99	9.33	14.5	8.71	6.85	3.62	66.6	0.21
伊自良湖	*	2.19	1.74	2.69	3.04	2.10	1.63	2.11	1.02	3.95	3.52	3.08	2.43	9.26	0.70
犬山	1.72	1.61	1.69	1.57	2.12	2.70	1.42	1.90	0.82	1.94	3.07	3.06	1.82	12.4	0.28
潮岬	5.67	4.49	3.13	3.35	2.77	1.93	2.58	6.56	1.95	3.13	10.3	8.77	3.86	29.0	0.62
京都八幡	3.23	3.70	3.43	1.45	3.06	1.12	1.05	1.45	1.07	1.99	2.04	2.25	1.58	10.0	0.25
尼崎	2.03	1.33	1.75	1.43	3.12	1.27	1.17	1.87	1.82	3.64	2.57	3.13	1.86	13.1	0.29
倉橋島	1.22	1.50	1.13	1.42	1.19	1.37	3.40	1.93	1.65	2.92	3.83	3.11	1.55	9.35	0.30
隠岐	3.89	1.10	2.08	0.79	2.49	2.49	5.52	8.33	19.6	23.1	12.3	12.4	5.26	212	0.33
蟠竜湖	2.03	1.11	0.67	1.49	1.55	2.70	3.46	7.43	7.81	7.02	7.34	3.15	2.35	20.4	0.38
栲原	1.13	0.79	0.63	0.83	1.25	1.00	1.29	1.12	2.13	4.45	1.71	1.69	1.08	19.6	0.14
筑後小郡	1.81	1.76	1.37	2.85	2.59	3.56	4.47	2.64	4.48	2.82	3.58	3.15	2.36	16.2	0.60
大分久住	1.84	1.07	0.95	1.34	0.84	1.65	1.93	1.51	1.88	2.88	2.41	1.73	1.29	7.29	0.36
対馬	1.90	1.75	0.75	3.39	*	*	4.18	3.47	7.40	5.60	4.15	3.04	2.74	20.8	0.25
五島	2.25	2.25	2.54	4.63	2.31	1.22	11.1	2.15	7.82	11.6	3.53	3.36	2.99	49.0	0.13
えびの	2.16	1.66	0.84	0.87	0.97	2.22	2.12	1.07	2.11	3.64	2.35	1.94	1.26	16.5	0.10
屋久島	1.95	2.40	0.87	1.73	2.60	2.56	4.81	3.61	4.02	4.74	3.71	4.38	2.89	19.1	0.84
辺戸岬	2.19	1.85	1.93	6.75	1.32	4.05	3.58	2.57	7.31	4.18	2.42	3.55	3.17	310	0.56
最大値 ¹⁾	8.57	5.61	3.43	6.75	8.54	5.15	15.6	8.33	19.6	23.1	24.7	12.4	6.08	310	0.84
最小値 ¹⁾	1.13	0.78	0.63	0.40	0.53	0.45	0.42	0.57	0.54	0.45	1.38	1.43	0.81	7.29	0.10
全国平均	2.84	1.82	1.65	1.75	2.06	1.93	3.31	3.60	4.32	5.62	5.91	4.57	2.60		
標準偏差	1.98	1.06	0.75	1.38	1.45	1.23	3.31	2.48	3.98	4.96	5.71	2.78	1.38		

網掛けの数値：参考値（月間値または年間値が有効判定基準で棄却されたもの）を表す。

「*」：欠測（該当する月間に測定データが1つも無い）を表す。

最大値¹⁾、最小値¹⁾：月・年平均値の最大値、最小値。

最大値²⁾、最小値²⁾：サンプルの最大値、最小値。

(注)最大値¹⁾、最小値¹⁾、全国平均、標準偏差は参考値(下線を付す)を含む。