ダイオキシン受容体の機能と 炎症性疾患

Functional Contribution of Dioxin Receptor to Pathogenesis of Inflammatory Diseases

東北大学医学系研究科
医化学分野

本橋ほづみ
Hozumi Motohashi

私たちをとりまく様々な 化学物質と生体防御機構 Cytoprotective Mechanisms against Environmental Chemicals

第1相反応
Phase 1 Reaction

CYP450

酸化・還元・水酸化などの反応により
反応性の高い中間体を生成する

第2相反応
Phase 2 Reaction

GST, UGT etc

グルタチオン、グルクロン酸、などとの抱
合反応

排泄 Excretion

芳香族炭化水素の解毒に関する転写因子

Transcription Factors Inducing Detoxifying Enzyme Genes

AhRによる転写制御メカニズム

Transcriptional Activation by AhR

動物種による AhR分子のダイオキシン親和性の違い

Affinity of AhR to Dioxins

	LD50 ($\mu\text{g}/\text{kg}$)	Kd (nM) of AhR	
Guinea Pig	1-2	0.06 ^a	
Monkey	70	0.26 ^a	^a Hepatic AhR
Hamster	5,500	0.33 ^a	
Rat Sprague-Dawley	25~60		
Rat Han/Wistar	>9,600		
Mouse C57B6	132	0.27 ^b	
Mouse DBA/2	620	1.66 ^b	^b Recombinant AhR
Human		1.58 ^b	

(Ema et al, J Biol Chem 1994; Hahn et al, Rev Toxicol 1998)

低親和性AhRをもつマウスでは ダイオキシンによる奇形がおこりにくい Adverse Effects of Dioxins Depends on AhR Function

野生型マウス
マウス型AhRをもつ
マウス

ヒト型AhRをもつ
マウス

(Moriguchi et al., PNAS 2003)

Cleft Palate

生体に対するダイオキシン類の影響

Biological Effect of Dioxins

ダイオキシン Dioxins

AhR制御系の活性化 Activation of AhR Pathway

解毒系酵素の誘導
Induction of
Detoxifying
Enzymes

発がん
Cancer Promotion

奇形
Anomaly

肝障害 Liver Dysfunction

免疫抑制
Immunosuppression

炎症性疾患と環境異物

Inflammatory Diseases & Environmental Chemicals

ディーゼル排気(DEP)と喘息・鼻炎との関係

喫煙と喘息・鼻炎との関係

芳香族炭化水素と過敏性皮膚炎との関係

環境異物はアレルギー性疾患のリスクファクターの一つである
Environmental chemicals are one of the risk factors of allergic disorders.

喘息、アトピー性皮膚炎、花粉症など、いずれかのアレルギー性疾患に罹患している患者は、国民の3割以上に上る。
(平成16年度版厚生労働白書)

環境化学物質への曝露によりアレルギー性疾患は増悪するか？
Do the environmental chemicals exacerbate allergic disorders?

AhR制御系の活性化は炎症を惹起するか？
Activation of AhR Pathway Provokes Inflammation?

生体に対する芳香族炭化水素類の影響

Biological Effects of Arylhydrocarbons Other than Dioxins

AhR制御系の活性化は炎症を惹起するか？

Activation of AhR Pathway Provokes Inflammation?

リガンドの種類(Which ligand?)
AhRを介さない応答系の存在

リガンド非存在下で恒常的活性化
状態にあるAhR変異体を利用
Constitutively activated AhR

AhRが活性化される細胞系列
(Which cell lineage?)

最初に環境異物に暴露される
皮膚ケラチノサイトに着目
Keratinocytes

実験の戦略

皮膚特異的な活性化型AhR過剰発現マウスの作製

Generation of Constitutively Activated AhR-Expressing Transgenic Mice

(Tauchi et al., Mol Cell Biol 2003)

トランスジェニックマウスにおける CYP1A1の発現 Target Gene Expression in Transgenic Mice

活性化型AhR高発現ライン239の症状

TG Mice Developed Postnatal Spontaneous Dermatitis

かゆみを伴う炎症症状 TG Mice Suffer from Severe Itchiness

活性化型AhRによる 皮膚の組織学的変化

Histology of Dermatitis
in TG Mice

1 week

4 weeks

活性化型AhRによる 皮膚の組織学的変化 Histology of Dermatitis in TG Mice

肥満細胞の浸潤
Mast Cell
Infiltration

TG

WT

1 week

4 weeks

Alcian Blue Staining

活性化型AhRの発現と皮膚症状の関係

Correlation between Active AhR Pathway and Dermatitis

活性化型AhRの発現と 皮膚症状の関係

Correlation between Active AhR Pathway and Dermatitis

Line 234

HE staining

Anti-CYP1A1

皮膚における遺伝子発現の変化～生後10日齢～

Transcriptome Analysis of Skin at Day 10

1. Interleukins/chemokines/receptors (11%)

2. Structural proteins (10%)

3. Kinases/phosphatases (7%)

4. Detoxifying enzymes (7%)

5. Transcription factors (7%)

6. Immunological proteins (6%)

7. Proteases/protease inhibitors (6%)

8. Metabolizing enzymes (5%)

9. Others (43%)

トランスジェニックマウスで
4倍以上増加した遺伝子～
Genes increased in TG mice
by more than 4-fold

皮膚における遺伝子発現の変化～生後10日齢～

Transcriptome Analysis of Skin at Day 10

皮膚における遺伝子 発現の変化

～生後10日齢～

Transcriptome Analysis of
Skin at Day 10

局所の炎症と全身の免疫機能

Local Inflammation and Systemic Immune Response

未分化ヘルパーTリンパ球
(naïve CD4+ helper T cell)

刺激

Th1細胞

IL-2
 γ -IFN産生
末梢血IgG2a高値
末梢血IgG3高値
末梢血IgM高値

乾癬など
自己免疫疾患
Autoimmune Diseases
(e.g. Psoriasis)

Th2細胞

IL-4
IL-5産生
末梢血IgE高値
末梢血IgG1高値

アトピー性皮膚炎など
アレルギー性疾患
Allergic Diseases
(e.g. Atopic Dermatitis)

トランスジェニックマウスでは Th2優位の反応がおこる

～末梢血中免疫グロブリン～

Serum IgE and IgG1 Are Elevated in TG Mice

トランスジェニックマウスでは Th2優位の反応がおこる

～脾臓リンパ球の反応性～

Production of IL-4 and IL-5 Is Elevated in TG Mice

AhR過剰発現マウスの表現型のまとめ

Summary

遺伝子導入マウス

活性化型AhRが皮膚で特異的に発現

かゆみを伴う湿疹様の皮膚炎を生後に発症する。
Eczematous dermatitis with severe itchiness is developed postnatally.

全身の免疫系のバランスがTh2優位になる。
Th2-dominant immune response accompanies.

皮膚におけるCCL20の役割

Roles of CCL20 in Skin

ケラチノサイトの障害

外傷、感染、刺激性化学物質への曝露etc.

ケラチノサイトからのproinflammatory cytokineの(IL-1, TNF α)放出

ケラチノサイトの
CCL20の合成増加

CCL20の作用

ランゲルハンス細胞の遊走を促進

T細胞の皮膚・粘膜へのホーミングを促進

Promote migration of skin dendritic cells

Promote homing of T cells to skin

皮膚ケラチノサイトでのAhR過剰発現の作用点

Consequences of AhR Pathway Activation in Skin

ケラチノサイトにおけるAhR制御系の活性化
AhR Pathway Activation in Keratinocytes

局所の炎症(Primary Inflammation)

全身の免疫系バランスの異常
(Permissive Condition for Secondary
Inflammation)

Tリンパ球におけるAhR制御系の活性化

AhR Pathway Activation in T Cells

細胞外細菌・真菌
自己免疫疾患／アレルギー性疾患(?)

細胞内病原体
自己免疫疾患

ダイオキシン類

免疫寛容
免疫応答調節

(Veldhoen et al., Nature 2008;
Quintana et al., Nature 2008)

細胞外寄生虫
アレルギー性疾患

謝辞

筑波大学

田内 雅史

日田 安寿美

勝岡 史城

野田 秀平

細谷 朋方

藤井 義明

持田製薬株式会社

根岸 孝昭

東京大学

油田 浩幸

東北大学

山本 雅之

国立環境研究所

青木 康展

弘前大学

三村 純正

東京大学

遠山 千春