

## 水質汚濁に係る農薬登録保留基準の設定に関する資料

## キザロホップエチル

## I. 評価対象農薬の概要

## 1. 物質概要

化学名	エチル= (RS) - 2 - [ 4 - ( 6 - クロロキノキサリン - 2 - イルオキシ ) フェノキシ ] プロピオナート				
分子式	C <sub>19</sub> H <sub>17</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>4</sub>	分子量	372.8	CAS NO.	76578-14-8
構造式					

## 2. 作用機構等

キザロホップエチルは、フェノキシ酸系除草剤であり、その作用機構は、脂質合成阻害により細胞構造又は細胞膜機能の急激な変化をもたらすことと考えられている。本邦での初回登録は1989年である。

製剤は水和剤が、適用農作物等は野菜、いも、豆等がある。

原体の国内生産量は、13.4t（平成24年度※）、21.3t（平成25年度※）であった。

※年度は農薬年度（前年10月～当該年9月）、出典：農薬要覧・2014（（社）日本植物防疫協会）

## 3. 各種物性等

外観・臭気	白色結晶性固体、無臭	土壌吸着係数	$K_{F^{ads}_{OC}}=980-1,700$
融点	92.5-94.5℃	オクタノール ／水分配係数	$\log Pow=4.28$ (23℃)
沸点	270℃	生物濃縮性	$BCF_{ss}=200$ (0.02 mg/L) =190 (0.002 mg/L)
蒸気圧	$8.6 \times 10^{-7}$ Pa (20℃)	密度	1.4 g/cm <sup>3</sup> (20℃)
加水分解性	半減期 12.2 日 (25℃、pH2) 359.6 日 (25℃、pH5) 156.7 日 (25℃、pH7) 3.7 日 (25℃、pH9)	水溶解度	0.19 mg/L (20℃)
水中光分解性	半減期 69 日 (滅菌緩衝液、pH5、25℃、約 16 W/m <sup>2</sup> 、300-400 nm) 0.7 日 (東京春季太陽光換算 2.2 日) (滅菌自然水、pH7.9、25℃、300 W/m <sup>2</sup> 、300-800 nm)		

## II. 安全性評価

一日摂取許容量 (ADI)	0.009 mg/kg 体重/日
<p>食品安全委員会は、平成 26 年 4 月 8 日付けで、キザロホップエチル及びキザロホップ P テフリルのグループ ADI を 0.009 mg/kg 体重/日と設定する食品健康影響評価の結果を厚生労働省に通知した。</p> <p>なお、この値はキザロホップエチルを被験物質とし、ラットを用いた 2 年間慢性毒性/発がん性併合試験における無毒性量 0.9 mg/kg 体重/日を安全係数 100 で除して設定された。</p>	

### Ⅲ. 水質汚濁予測濃度（水濁 PEC）

#### 1. 水田使用時の水濁 PEC(Tier1)

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	10%水和剤	$I$ : 単回の農薬使用量（有効成分 g /ha）	100
農薬量	100mL/10a	$N_{app}$ : 総使用回数（回）	1
希釈水量	100L/10a	$A_p$ : 農薬使用面積（ha）	50
地上防除/航空防除	地 上		
適用農作物等	いぐさ		
使用方法	雑草茎葉散布 （落水）		
総使用回数	1 回		

#### 2. 非水田使用時の水濁 PEC(Tier1)

使用方法		各パラメーターの値	
剤 型	7%水和剤	$I$ : 単回の農薬使用量（有効成分 g /ha）	210
農薬量	300mL/10a	$N_{app}$ : 総使用回数（回）	2
希釈水量	100L/10a	$A_p$ : 農薬使用面積（ha）	37.5
地上防除/航空防除	地 上	$R_u$ : 畑地からの農薬流出率（%）	0.02
適用農作物等	野菜	$F_u$ : 施用方法による農薬流出補正係数	1
使用方法	雑草茎葉散布	$D_{river}$ : 河川ドリフト率（%）	0.2
総使用回数	2 回	$Z_{river}$ : 河川ドリフト面積（ha）	0.11

## 3. 水濁 PEC 算出結果

使用場面	水濁 PEC (mg/L)
水田使用時(Tier1)	0.00133120 …
非水田使用時(Tier1)	0.00000715 …
うち地表流出寄与分	0.00000713 …
うち河川ドリフト寄与分	0.00000002 …
合 計 <sup>1)</sup>	0.00133835 … ≒ <u>0.0013 (mg/L)</u>

<sup>1)</sup> 水濁 PEC の値は有効数字 2 桁とし、3 桁目を四捨五入して算出した。

## IV. 総合評価

## 1. 水質汚濁に係る登録保留基準値

登録保留基準値	<b>0.02 mg/L</b>
以下の算出式により登録保留基準値を算出した。 <sup>1)</sup>	
0.009 (mg/kg 体重/日) ADI	× 53.3 (kg) × 0.1 / 2 (L/人/日) = 0.0239...(mg/L) 平均体重 10%配分 飲料水摂取量

<sup>1)</sup> 登録保留基準値は、体重を 53.3kg、飲用水を 1 日 2L、有効数字は 1 桁（ADI の有効数字桁数）とし、2 桁目を切り捨てて算出した。

## &lt;参考&gt; 水質に関する基準値等

(旧)水質汚濁に係る農薬登録保留基準 <sup>1)</sup>	0.2 mg/L
水質要監視項目 <sup>2)</sup>	なし
水質管理目標設定項目 <sup>3)</sup>	0.02 mg/L
ゴルフ場暫定指導指針 <sup>4)</sup>	なし
WHO 飲料水水質ガイドライン <sup>5)</sup>	なし

<sup>1)</sup> 平成 17 年 8 月 3 日改正前の「農薬取締法第 3 条第 1 項第 4 号から第 7 号までに掲げる場合に該当するかどうかの基準を定める等の件」（昭和 46 年 3 月 2 日農林省告示 346 号）第 4 号に基づき設定された基準値。

<sup>2)</sup> 水質汚濁に係る要監視項目として、直ちに環境基準とはせず、引き続き知見の集積に努めるべきとされた物質に係る指針値。

<sup>3)</sup> 水道法に基づく水質基準とするには至らないが、水道水質管理上留意すべき項目として設定された物質に係る目標値（その他農薬）。

<sup>4)</sup> 「ゴルフ場で使用される農薬による水質汚濁の防止に係る暫定指導指針の一部改定について」（平成 22 年 9 月 29 日付け環水大土第 100929001 号環境省水・大気環境局長通知）において設定された指針値。

<sup>5)</sup> Guidelines for drinking-water quality, fourth edition, incorporating first and second addenda

## 2. リスク評価

水濁 PEC は 0.0013 mg/L であり、登録保留基準値 0.02 mg/L を超えないことを確認した。

(参考) 食品経由の農薬理論最大一日摂取量\*と対 ADI 比

農薬理論最大一日摂取量* (mg/人/日)	対 ADI 比 (%)
0.1121	22.6

出典:平成 27 年 3 月 13 日開催の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会農薬・動物用医薬品部会資料

\*キザロホップエチル及びキザロホップPテフリルの代謝物キザロホップをキザロホップエチルに換算した値。

## &lt;検討経緯&gt;

平成 27 年 5 月 26 日 中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第 45 回）