

令和 6 年度（2024 年度）化学物質環境実態調査結果報告書 （案）

(案)

令和 7 年度版

化 学 物 質 と 環 境

CHEMICALS IN THE ENVIRONMENT

令和 年 月

環境省 環境保健部 化学物質安全課

Chemical Safety Division
Environmental Health Department
Ministry of the Environment

目 次

2023 年度化学物質環境実態調査結果	
2023 年度初期環境調査結果	7
1. 調査目的	9
2. 調査対象物質	9
3. 調査地点及び実施方法	14
4. 調査結果の概要	33
2023 年度詳細環境調査結果	71
1. 調査目的	73
2. 調査対象物質	73
3. 調査地点及び実施方法	81
4. 調査結果の概要	99
2023 年度モニタリング調査結果	139
1. 調査目的	141
2. 調査対象物質	141
3. 調査地点及び実施方法	156
4. モニタリング調査としての継続性に関する考察	189
5. 経年分析の方法	224
6. 調査結果の概要	227
参考資料 1 継続的調査としての継続性に関する考察	436
参考資料 2 経年分析の方法等に関する補足説明	480
参考資料 3 カワウの卵の測定結果	484
参考資料 4 大気中の POPs 残留状況の高頻度監視結果	486

注：各調査の詳細な目次は各調査の冒頭に掲載している。

2024 年度 初期環境調査結果

1. 調査目的	9
2. 調査対象物質	9
3. 調査地点及び実施方法	14
(1) 試料採取機関	14
(2) 調査地点及び調査対象物質	15
(3) 試料の採取方法	15
(4) 分析法	15
(5) 検出下限値	15
表 1-1 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（水質）	17
表 1-2 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（底質）	18
図 1-1 2024 年度初期環境調査地点（水質・底質）	19
図 1-2 2024 年度初期環境調査地点（水質・底質）詳細	20
表 1-3 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（大気）	27
図 1-3 2024 年度初期環境調査地点（大気）	28
図 1-4 2024 年度初期環境調査地点（大気）詳細	29
4. 調査結果の概要	33
表 2 2024 年度初期環境調査検出状況・検出下限値一覧表	34
[1] アリルアルコール	35
[2] 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	38
[3] 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	41
[4] ジフェニルエーテル（別名：フェノキシベンゼン）	43
[5] トリブチルアミン	45
[6] ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル	47
[7] 4-tert-ブチルフェノール	49
[8] N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	51
[9] プロパナール（別名：プロピオンアルデヒド）	53
[10] リン酸トリエステル類	55
[10-1] リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル)（別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル)）	55
[10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)	56
[10-3] リン酸トリス(2-ブトキシエチル)	59
[10-4] リン酸トリブチル	61

1. 調査目的

初期環境調査は、環境リスクが懸念される化学物質について、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得することにより、「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 86 号）（以下「化管法」という。）の指定化学物質の指定、その他化学物質による環境リスクに係る施策について検討する際のばく露の可能性について判断するための基礎資料等とすることを目的としている。

2. 調査対象物質

2024 年度の初期環境調査においては、10 物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との組合せは次のとおりである。






物質 調査 番号	調査対象物質	化審法指定区分 ^{注1、2}		化管法指定区分 ^{注3}			調査媒体		
		改正前	改正後	2000 年～	2008 年～	2021 年～	水 質	底 質	大 気
[1]	アリルアルコール			第一種 22	第一種 28	第一種 28			○
[2]	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	第二種監視		第一種 23	第一種 29	第一種 29			○
[3]	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル				第一種 143	第一種 163	○		
[4]	ジフェニルエーテル（別名：フェノキシベンゼン）	第三種監視			第一種 204	第二種 55	○		
[5]	トリブチルアミン				第一種 292	第一種 335	○	○	
[6]	ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル	第二種監視			第一種 359	第二種 97	○		
[7]	4-tert-ブチルフェノール	第二種監視			第一種 368	第二種 106	○		
[8]	N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	第三種監視		第一種 282	第一種 372	第二種 109	○		
[9]	プロパナール（別名：プロピオンアルデヒド）								○
[10]	りん酸トリエステル類								
	[10-1] りん酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル)（別名：りん酸トリス(2-クロロイソプロピル)）						○		
	[10-2] りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)						○		○
	[10-3] りん酸トリス(2-ブトキシエチル)						○		
	[10-4] りん酸トリブチル	第二種監視		第一種 354	第一種 462	第一種 515	○	○	○

（注 1）「化審法」とは「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）をいう。以下同じ。





（注 2）「化審法指定区分」における「改正前」とは 2009 年 5 月 20 日の法律改正（2011 年 4 月 1 日施行）前の指定を、「改正後」とは同改正後の指定をそれぞれ意味する。

（注 3）「化管法指定区分」における「2000 年～」とは 2000 年 6 月 7 日の政令制定時の指定を、「2008 年～」とは 2008 年 11 月 21 日の政令改正後の指定を、「2021 年～」とは 2021 年 10 月 20 日の政令改正後の指定をそれぞれ意味する。なお、それぞれの欄における数字は第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質としての政令番号を意味する。





初期環境調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。

[1] アリルアルコール Allyl alcohol 	分子式 : C₃H₆O CAS : 107-18-6 既存化 : 2-260 MW : 58.08 mp : -50°C¹⁾ bp : 96~97°C¹⁾ sw : 混和¹⁾ 比重等 : 0.8540 (20°C/4°C)¹⁾ logPow : 0.17¹⁾
[2] 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン 1-Allyloxy-2,3-epoxypropane 	分子式 : C₆H₁₀O₂ CAS : 106-92-3 既存化 : 2-393 MW : 114.14 mp : -100°C (凝固点)²⁾ bp : 154°C (760 mmHg)²⁾ sw : 128 g/L (20.2°C)²⁾ 比重等 : 0.9698 g/cm³ (20°C)²⁾ logPow : 0.34²⁾
[3] 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル 4,4'-Diaminodiphenyl ether 	分子式 : C₁₂H₁₂N₂O CAS : 101-80-4 既存化 : 3-854 MW : 200.24 mp : 191.5°C³⁾ bp : 396.8°C (731 mmHg)³⁾ sw : 48 mg/L (20°C、pH=6.49~6.71)³⁾ 比重等 : 1.3 g/cm³ (20°C)³⁾ logPow : 1.36 (pH=7.4)³⁾
[4] ジフェニルエーテル (別名 : フェノキシベンゼン) Diphenyl ether (synonym: Phenoxybenzene) 	分子式 : C₁₂H₁₀O CAS : 101-84-8 既存化 : 3-650 MW : 170.21 mp : 28°C⁴⁾ bp : 257°C⁴⁾ sw : 18 mg/L (25°C)⁵⁾ 比重等 : 1.075 (20°C/4°C)⁵⁾ logPow : 4.21 (25°C)⁵⁾
[5] トリブチルアミン Tributylamine 	分子式 : C₁₂H₂₇N CAS : 102-82-9 既存化 : 2-142 MW : 185.35 mp : -90°C以下⁶⁾ bp : 208°C (101 kPa)⁶⁾ sw : 80 mg/L (20°C)⁶⁾ 比重等 : 0.7770 g/cm³ (20°C)⁶⁾ logPow : 3.34 (20°C)⁶⁾

(略称) 「CAS」とは CAS 登録番号を、「既存化」とは既存化学物質名簿における番号を、「MW」とは分子量を、「mp」は融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「比重等」とは比重(単位なし)又は密度(単位あり)を、「logPow」とはオクタノール/水分配係数をそれぞれ意味する。

[6] ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル Butyl-2,3-epoxypropyl ether 	分子式 : C₇H₁₄O₂ CAS : 22916-47-8 既存化 : 2-392 MW : 130.19 mp : -100℃未満⁵⁾ bp : 169℃ (101 kPa)⁷⁾ sw : 20 g/L (20℃)⁷⁾ 比重等 : 0.918 g/cm³ (20℃)⁷⁾ logPow : 0.63⁷⁾
[7] 4-<i>tert</i>-ブチルフェノール 4-<i>tert</i>-Butylphenol 	分子式 : C₁₀H₁₄O CAS : 98-54-4 既存化 : 3-503^{注1} MW : 150.22 mp : 99.2℃⁵⁾ bp : 238.3℃ (101 kPa)⁵⁾ sw : 607.2 mg/L (25℃)⁵⁾ 比重等 : 0.38 g/cm³ (22℃)⁵⁾ logPow : 3.0 (23℃)⁵⁾
[8] <i>N</i>-(<i>tert</i>-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド <i>N</i>-(<i>tert</i>-Butyl)-2-benzothiazolesulfenamide 	分子式 : C₁₁H₁₄N₂S₂ CAS : 95-31-8 既存化 : 5-3417 MW : 238.37 mp : 104℃⁸⁾ bp : 207℃で分解⁵⁾ sw : 1.74 mg/L (20℃)⁵⁾ 比重等 : 1.290 (25℃/4℃)⁸⁾ logPow : 3.36 (25℃)⁵⁾
[9] プロパナール (別名: プロピオンアルデヒド) Propanal (synonym: Propionaldehyde) 	分子式 : C₃H₆O CAS : 123-38-6 既存化 : 2-486 MW : 58.08 mp : -81℃⁹⁾ bp : 47.6℃ (101 kPa)⁵⁾ sw : 200 g/L⁹⁾ 比重等 : 0.8047 g/cm³ (20℃)⁵⁾ logPow : 0.59 (20℃)⁵⁾

(注1) モノアルキルフェノール (アルキル基の炭素数が3から9までのもの)

[10] リン酸トリエステル類 Phosphate triesters	
[10-1] リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル)) Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (synonym: Tris(2-chloroisopropyl) phosphate) 	分子式： $C_9H_{18}Cl_3O_4P$ CAS： 13674-84-5 既存化： 2-1941^{注2}、2-2951^{注3} MW： 327.57 mp： -20℃未満¹⁰⁾ bp： 288℃¹⁰⁾ sw： 1,080 mg/L (20℃)¹⁰⁾ 比重等： 1.288 (20℃)¹⁰⁾ logPow： 2.68¹⁰⁾
[10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル) Tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate 	分子式： $C_9H_{15}Cl_6O_4P$ CAS： 13674-87-8 既存化： 2-1914^{注2} MW： 430.91 mp： -20℃未満¹¹⁾ bp： 約 326℃¹⁰⁾ sw： 18.1 mg/L (20℃)¹¹⁾ 比重等： 1.513 (20℃)¹¹⁾ logPow： 3.69 (20℃)¹¹⁾
[10-3] リン酸トリス(2-ブトキシエチル) Tris(2-butoxyethyl) phosphate 	分子式： $C_{18}H_{37}O_7P$ CAS： 78-51-3 既存化： 2-2022 MW： 398.48 mp： -70℃⁵⁾ bp： 218～288℃⁵⁾ sw： 663.5 mg/L (20℃)⁵⁾ 比重等： 1.02 (20℃)⁵⁾ logPow： 3.75⁵⁾
[10-4] リン酸トリブチル Tributyl phosphate 	分子式： $C_{12}H_{27}O_4P$ CAS： 126-73-8 既存化： 2-2021 MW： 266.32 mp： -80℃未満¹³⁾ bp： 289℃で分解¹³⁾ sw： 280 mg/L (25℃)¹³⁾ 比重等： 0.976 (25℃/25℃)¹³⁾ logPow： 4.00¹³⁾

(注2) ブロモ又はクロロアルキル又はアルケニル-ホスフェート

(注3) 塩素化アルキル又は塩素化アルケニルリン酸エステル (アルキル基又はアルケニル基の炭素数が3から24までのもの)

参考文献

- 1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、アリルアルコール、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 80 (2007)
- 2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 18 巻 (2020)
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 15 巻 (2017)
- 4) International Labour Organization (ILO), Diphenyl ether, International Chemical Safety Cards (ICSCs), 0791 (2014)
- 5) European Chemicals Agency (ECHA), REACH registered substance factsheets (<https://echa.europa.eu/>、2025 年 10 月閲覧)
- 6) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 22 巻 (2024)
- 7) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 20 巻 (2022)
- 8) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 22 (2005)
- 9) International Labour Organization (ILO), Propionaldehyde, International Chemical Safety Cards (ICSCs), 0550 (2003)
- 10) OECD, Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2009)
- 11) OECD, Tris[2-chloro-1-(chloro methyl)ethyl] phosphate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2009)
- 13) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、りん酸トリ-*n*-ブチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 141 (2008)

3. 調査地点及び実施方法

(1) 試料採取機関

初期環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託し、一部の分析は民間分析機関においても実施した。

試料採取機関名 ^{注1}	調査媒体		
	水質	底質	大気
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所		○	○
札幌市衛生研究所	○		
岩手県環境保健研究センター	○	○	
宮城県保健環境センター	○		
仙台市衛生研究所	○	○	○
秋田県健康環境センター	○	○	
山形県環境科学研究センター			○
福島県環境創造センター	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	○
栃木県保健環境センター	○		
埼玉県環境科学国際センター			○
さいたま市健康科学研究センター	○		○
千葉県環境研究センター	○	○	
東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所	○	○	○
神奈川県環境科学センター			○
横浜市環境創造局環境科学研究所	○	○	○
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○
新潟県保健環境科学研究所	○	○	
石川県保健環境センター	○	○	
福井県衛生環境研究センター	○		○
長野県環境保全研究所	○		○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○	
愛知県環境調査センター	○	○	○
名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター			○
三重県保健環境研究所	○	○	○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○	
京都府保健環境研究所	○	○	
京都市衛生環境研究所	○	○	○
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課	○	○	○ ^{注2}
大阪市立環境科学研究センター	○	○	
兵庫県環境部水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター			○
神戸市環境局環境保全課及び神戸市健康科学研究所	○	○	
奈良県景観・環境総合センター	○	○	
和歌山県環境衛生研究センター	○	○	
岡山県環境保健センター	○		
広島県立総合技術研究所保健環境センター	○	○	
山口県環境保健センター	○	○	○
徳島県立保健製薬環境センター			○
香川県環境保健研究センター	○	○	○
愛媛県立衛生環境研究所	○		○
福岡県保健環境研究所	○		
北九州市保健環境研究所	○	○	○
福岡市保健環境研究所	○		
佐賀県環境センター	○		○
熊本県保健環境科学研究所	○		○
大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター	○	○	○
宮崎県衛生環境研究所			○
沖縄県衛生環境研究所		○	

(注1) 試料採取機関名は、2024年度末のものである。

(注2) 民間分析機関による試料採取への協力を行った。

（２）調査地点及び調査対象物質

初期環境調査における調査媒体別の調査対象物質数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。

それぞれ媒体ごとでの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質について表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質について表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、大気について表 1-3、図 1-3 及び図 1-4 に示した。

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 20 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。2024 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位であった地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点数	調査地点ごとの検体数
水質	39	7	54	1
底質	28	2	36	3
大気	27 ^注	4	33	3
全媒体	48	10	90	

（注）27団体のうち1団体は民間分析機関による試料採取への協力を行った。

（３）試料の採取方法

試料の採取は、原則として、秋期（９月～１１月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（令和２年度版）」（2021 年 3 月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。

（４）分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「初期環境調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

（５）検出下限値

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告された分析値を次の２つの手順で取りまとめた。


１）高感度の分析における検出値の不検出扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を参照）。

２）感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されないときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照、欠測であった結果と合わせて「欠測扱い」という。）。

なお、初期環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下「初期環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定値より小さいときには、初期環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。



分析値を取りまとめる際の概念図

表 1-1 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質 ^{注1}						
		[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[10]
札幌市	豊平川中沼（札幌市）	○			○			
	新川第一新川橋（札幌市）	○			○			
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）			○				○ ^{注2}
宮城県	迫川二ツ屋橋（登米市）							○ ^{注2}
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）				○			○ ^{注2}
秋田県	秋田運河（秋田市）			○	○			○
福島県	小名浜港							○ ^{注3}
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）			○				
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）		○					
さいたま市	鴨川中土手橋（さいたま市）							○
千葉県	市原・姉崎海岸					○		○
東京都	荒川河口（江東区）							○
	隅田川河口（港区）			○	○			○
横浜市	鶴見川亀の子橋（横浜市）			○	○			○
	横浜港							○
	柏尾川吉倉橋（横浜市）			○	○			
川崎市	多摩川河口（川崎市）		○	○	○			○ ^{注3}
	川崎港京浜運河千鳥町地先		○					
	川崎港京浜運河扇町地先		○	○	○			○
新潟県	信濃川下流（新潟市）		○	○	○			
石川県	犀川河口（金沢市）		○	○	○			○
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）							○ ^{注3}
長野県	諏訪湖湖心			○	○			
静岡県	清水港							○
	天竜川掛塚橋（磐田市）			○	○			
愛知県	衣浦港							○
	名古屋港潮見ふ頭西			○	○			○
三重県	四日市港			○	○			○
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	○						○
	琵琶湖唐崎沖中央	○						○
京都府	宮津港				○			
	木津川御幸橋（八幡市）			○		○		
京都市	桂川宮前橋（京都市）			○	○			○
大阪府	大和川河口（堺市）			○	○			○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）							○
	大阪港							○
神戸市	神戸港中央			○	○			
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	○	○		○			
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）			○	○			○
岡山県	笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市）		○	○	○			○
	水島沖		○	○				○
広島県	広島湾大竹市御幸町地先			○				
山口県	徳山湾							○
	萩沖							○
香川県	高松港		○					
愛媛県	新居浜港							○
	沢津漁港				○			○
福岡県	雷山川加布羅橋（糸島市）		○	○		○	○	
	大牟田沖		○	○		○	○	
北九州市	洞海湾				○			○
福岡市	博多湾			○				
佐賀県	伊万里湾			○	○			○
熊本県	緑川平木橋（宇土市）							○ ^{注3}
大分県	大分川河口（大分市）			○	○			○

(注1) 調査対象物質の欄の番号は以下の調査対象物質であることを意味する。

[3] 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、[4] ジフェニルエーテル (別名：フェノキシベンゼン)、[5] トリブチルアミン、[6] ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル、[7] 4-tert-ブチルフェノール、[8] N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、[10] リン酸トリエステル類

(注2) [10] リン酸トリエステル類のうち、[10-1] リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル))、[10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)及び[10-3] リン酸トリス(2-ブトキシエチル)のみを調査した地点

(注3) [10] リン酸トリエステル類のうち、[10-4] リン酸トリブチルのみを調査した地点

表 1-2 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧 (底質)

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	
		[5] トリブチルアミン	[10-4] リン酸トリブチル
北海道	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	○	○
岩手県	豊沢川豊沢橋 (花巻市)	○	
仙台市	広瀬川広瀬大橋 (仙台市)	○	
秋田県	秋田運河 (秋田市)	○	○
茨城県	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	○	
千葉県	市原・姉崎海岸	○	○
東京都	荒川河口 (江東区)	○	○
	隅田川河口 (港区)	○	○
横浜市	横浜港		○
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	○	○
	川崎港京浜運河扇町地先	○	○
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	○	
石川県	犀川河口 (金沢市)	○	○
静岡県	清水港		○
	天竜川掛塚橋 (磐田市)	○	
愛知県	衣浦港	○	○
	名古屋港潮見ふ頭西	○	○
三重県	四日市港	○	○
	鳥羽港		○
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央		○
	琵琶湖唐崎沖中央		○
京都府	宮津港	○	
京都市	桂川宮前橋 (京都市)	○	○
大阪府	大和川河口 (堺市)	○	○
大阪市	大川毛馬橋 (大阪市)		○
	大阪港		○
神戸市	神戸港中央	○	
奈良県	大和川大正橋 (王寺町)	○	○
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	○	
広島県	広島湾大竹市御幸町地先	○	○
山口県	徳山湾	○	○
	萩沖		○
香川県	高松港	○	○
北九州市	洞海湾	○	○
大分県	大分川河口 (大分市)	○	
沖縄県	那覇港		○



図 1-1 2024 年度初期環境調査地点（水質・底質）




図 1-2 (1/7) 2024 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




図 1-2 (2/7) 2024 年度初期環境調査地点(水質・底質) 詳細




図 1-2 (3/7) 2024 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




図 1-2 (4/7) 2024 年度初期環境調査地点（水質・底質）詳細




図 1-2 (5/7) 2024 年度初期環境調査地点 (水質・底質) 詳細




図 1-2 (6/7) 2024 年度初期環境調査地点（水質・底質）詳細

表 1-3 2024 年度初期環境調査地点・対象物質一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質 ^注			
		[1]	[2]	[9]	[10]
北海道	北海道立総合研究機構エネルギー・環境・地質研究所（札幌市）				○
仙台市	榴岡公園（仙台市）	○	○		
山形県	米沢金池一般環境大気測定局（米沢市）	○		○	
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）		○		○
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	○			
さいたま市	さいたま市保健所（さいたま市）	○	○		○
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	○	○	○	○
	小笠原父島（小笠原村）	○	○	○	
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	○	○	○	○
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）		○		
川崎市	大師一般環境大気測定局（川崎市）	○			
福井県	三国一般環境大気測定局（坂井市）	○			
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）		○	○	○
愛知県	豊川市役所局（豊川市）				○
	東海市名和町一般環境大気測定局（東海市）	○			○
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	○	○	○	○
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）				○
京都市	京都市衛生環境研究所（京都市）				○
大阪府	大阪合同庁舎 2 号館別館（大阪市）	○			○
兵庫県	六甲山山頂（神戸市）			○	
	兵庫県環境研究センター（神戸市）			○	○
	網干一般環境大気測定局（姫路市）		○		
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	○		○	
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）			○	
香川県	香川県環境保健研究センター（高松市）		○		
	香川県高松合同庁舎（高松市）				○
愛媛県	味生一般環境大気測定局（松山市）		○		
	松山市立垣生小学校（松山市）	○			
北九州市	北九州市保健環境研究所（北九州市）				○
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	○	○	○	○
熊本県	水俣保健所（水俣市）		○		
大分県	大分市立三佐小学校（大分市）	○	○	○	○
宮崎県	延岡保健所（延岡市）	○			

（注）調査対象物質の欄の番号は以下の調査対象物質であることを意味する。

[1] アリルアルコール、[2] 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン、[9] プロパナール（別名：プロピオンアルデヒド）、[10] リン酸トリエステル類



図 1-3 2024 年度初期環境調査地点 (大気)




図 1-4 (1/4) 2024 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細




図 1-4 (2/4) 2024 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細




図 1-4 (3/4) 2024 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細




図 1-4 (4/4) 2024 年度初期環境調査地点 (大気) 詳細

4. 調査結果の概要

検出状況・検出下限値一覧を表2に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。

水質については、7調査対象物質（群）中、次の1物質群が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法において測定できる方法ごとに一物質群とした。

- ・[10] リン酸トリエステル類
 - [10-1] リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル)（別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル)）：32地点中31地点
 - [10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)：32地点中31地点
 - [10-3] リン酸トリス(2-ブトキシエチル)：33地点中23地点
 - [10-4] リン酸トリブチル：全32地点

底質については、2調査対象物質中、次の1物質が検出された。

- ・[5] トリブチルアミン：27地点中22地点

大気については、全4調査対象物質（群）が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法において測定できる方法ごとに一物質群とした。

- ・[1] アリルアルコール：17地点中3地点
- ・[2] 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン：15地点中5地点
- ・[9] プロパナール（別名：プロピオンアルデヒド）：全12地点
- ・[10] リン酸トリエステル類
 - [10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)：16地点中4地点
 - [10-4] リン酸トリブチル：16地点中4地点

表2 2024年度初期環境調査検出状況・検出下限値一覧表

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (ng/L)		底質 (ng/g-dry)		大気 (ng/m ³)	
		範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値
[1]	アリルアルコール ※					nd~37 3/17	16
[2]	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン ※					nd~94 5/15	2.3
[3]	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	nd 0/5	3.0				
[4]	ジフェニルエーテル (別名: フェノキシベンゼン) ※	nd 0/12	3.1				
[5]	トリブチルアミン ※	nd 0/25	11	nd~28 22/27	0.28		
[6]	ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル	nd 0/26	190				
[7]	4-tert-ブチルフェノール	nd 0/4	3.4				
[8]	N-(tert-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミ ド	nd 0/2	12				
[9]	プロパナール (別名: プロピオンアルデヒド) ※					64~1,200 12/12	16
[11]	りん酸トリエステル類 ※						
	[10-1] りん酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名: りん酸トリス(2-クロロイソプロピル))	nd~480 31/32	1.5				
	[10-2] りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)	nd~92 31/32	0.29			nd~3.3 4/16	1.1
	[10-3] りん酸トリス(2-ブトキシエチル)	nd~35 23/33	0.33				
	[10-4] りん酸トリブチル	0.12~450 32/32	0.11	nd 0/22	4.7	nd~3.3 4/16	1.1

(注1) 検出頻度は検出地点数/調査地点数 (測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一したことで集計の対象から除外された地点数は含まない。)を示す。1地点につき複数の検体を測定した場合において、1検体でも検出されたとき、その地点は「検出地点」となる。

(注2) 範囲は全ての検体における最小値から最大値の範囲で示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd~となることがある。

(注3) は調査対象外の媒体であることを意味する。

(注4) ※は排出に関する情報を考慮した地点も含めて調査した調査対象物質であることを意味する。

物質別の調査結果は、次のとおりである。

なお、同一地点で過年度に調査が実施されている場合には、両者の結果に差異が生じているか検討を加えている。また、参考文献のうち、全物質共通のものは i)、ii)、iii)等で示している（調査結果の最後にまとめて記載）。その他の参考文献は、1)、2)、3)等で示している（各物質ごとに記載）。

[1] アリルアルコール（CAS 登録番号：107-18-6）

【2024 年度調査媒体：大気】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

<大気>

大気について 17 地点を調査し、検出下限値 16 ng/m³において 3 地点で検出され、検出濃度は 37 ng/m³までの範囲であった。

1995 年度には 6 地点を調査し、検出下限値 50 ng/m³において欠測扱いとなった 1 地点を除く 5 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は 60 ng/m³までの範囲であった。2011 年度には 11 地点を調査し、検出下限値 16 ng/m³において 6 地点で検出され、検出濃度は 86 ng/m³までの範囲であった。

○アリルアルコールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	1995	3/15	1/5	nd～60	50
	2011	11/33	6/11	nd～86	16
	2024	5/51	3/17	nd～37	16

2024 年度に調査を行った地点のうち 5 地点は、1995 年度又は 2011 年度にも同一地点で調査を行っており、いずれの地点も過年度に検出された。2024 年度は、1 地点で検出され、他の 4 地点は不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/m ³)			報告時検出下限値 (ng/m ³)
①	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	2011	nd	18	86	14
		2024	26	31	nd	13
②	神奈川県環境科学センター（平塚市）	1995	60	50	50	30
		2011	※15	nd	※15	14
		2024	nd	nd	nd	13
③	大師一般環境大気測定局（川崎市）	2011	33	nd	nd	14
		2024	nd	nd	nd	13
④	大分市立三佐小学校（大分市）	2011	22	18	21	14
		2024	nd	nd	nd	13
⑤	延岡保健所（延岡市）	2011	nd	18	※15	14
		2024	nd	nd	nd	13

(注) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）

【参考：アリルアルコール】

- ・用 途 : アリルグリシジルエーテル、エピクロロヒドリン、ジアリルフタレート樹脂、医薬品、香料及び難燃化剤の合成原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019年度 : X t^{注3)}
 2020年度 : X t
 2021年度 : X t
 2022年度 : X t
 2023年度 : X t
- ・P R T R 排 出 量 : PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	48,596	7,631	0	0	56,228	0	56,228
2002	5,320	2,048	0	0	7,368	0	7,368
2003	7,280	11,248	0	0	18,528	0	18,528
2004	6,346	10,120	0	0	16,467	1	16,468
2005	3,590	1,560	0	0	5,150	-	5,150
2006	1,749	1,254	0	0	3,004	-	3,004
2007	1,746	130	0	0	1,876	2	1,878
2008	3,080	971	0	0	4,051	-	4,051
2009	2,862	1,038	0	0	3,900	-	3,900
2010	2,232	2,530	0	0	4,762	-	4,762
2011	2,496	1,929	0	0	4,425	20	4,445
2012	2,043	2,430	0	0	4,473	28	4,501
2013	2,048	2,523	0	0	4,572	25	4,597
2014	2,002	1,427	0	0	3,429	28	3,457
2015	1,831	999	0	0	2,830	35	2,865
2016	2,085	1,020	0	0	3,106	36	3,142
2017	2,018	1,325	0	0	3,343	3	3,346
2018	2,064	1,228	0	0	3,293	3	3,296
2019	1,876	1,210	0	0	3,086	3	3,089
2020	2,128	1,002	0	0	3,130	3	3,133
2021	1,609	1,400	0	0	3,009	1	3,010
2022	1,279	1,100	0	0	2,379	-	2,379
2023	1,428	1,400	0	0	2,828	-	2,828

(注) - : 推計値がないことを意味する。

- ・生 分 解 性 : 分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度 : 86.0 %、TOC による分解度 : 95.5 %、GC による分解度 : 100 %）^{1) 注1)}
- ・濃 縮 性 : BCF はオクタノール/水分配係数 log Kow の値 0.17 から 3.2 と計算されており、水生生物への濃縮性は低いと推定される。²⁾
- ・媒体別分配予測 : 水質 46.4 %、底質 0.0887 %、大気 0.552 %、土壌 52.9 %^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 64 mg/kg、ラット（経口）²⁾³⁾⁴⁾
 LC₅₀ = 140 ~ 180 mg/m³（8 時間）、300 ~ 330 mg/m³（4 時間）、1,900 ~ 2,130 mg/m³（8 時間）、ラット（吸入）^{4)5)v)}
- ・反復投与毒性等 : 無毒性量等（経口） = 0.48 mg/kg/日（根拠 : NOAEL = 4.8 mg/kg/日、試験期間が短いことから 10 で除した。）³⁾
 NOAEL = 4.8 mg/kg/日 : ラットの雄に 0、4.8、8.3、14.0 又は 48.2 mg/kg/日を、雌に 0、6.2、6.9、17.1 又は 58.4 mg/kg/日を 15 週間飲水経口投与した結果、雄では 8.3 mg/kg/日以上で、雌では 6.9 mg/kg/日以上で摂餌量の減少、体重増加の抑制並びに肝臓、腎臓及び脾臓では用量に依存した相対重量の有意な増加を認めた。血液及び臨床化学検査で目立った変化はなく、臓器組織の病変もなかったが、雄の 8.3 mg/kg/日以上で雌の 17.1 mg/kg/日以上で腎機能障害を認めた。²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾
 無毒性量（吸入） = 1.87 mg/kg/日（根拠 : NOAEL = 12.1 mg/m³、ばく露状況（7 時間/日、5 日/週）で補正し、ラットの呼吸量（0.26 m³/日）及び体重（0.35 kg）から換算した。）²⁾
 NOAEL = 12.1 mg/kg/日（5 ppm） : ラットの雄に、0、1、2、5、20、40、60、100 又は 150 ppm を 12 週間（7 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、100 ppm 群で 6 匹、150 ppm 群で全数が死亡し、20 ppm 以上の群で有意な体重増加の抑制を認め、臓器重量の検討は 60 ppm 群までであったが、40 ppm 以上の群で肺の、60 ppm 群で腎臓の相対重量の有意な増加を認め、40 ppm 以上の群の肺及び肝臓で軽度の鬱血もみられた。また、40 ppm 以上の群で眼、鼻の刺激症状がみられ、40 ppm 群では数日で収まったが、60 ppm 以上の群では眼の刺激症状が一貫してみられた。²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾

- ・発 がん 性 : GHS 分類: 分類できない (発がん性に関する根拠が不十分)。⁴⁾
- ・生 態 影 響 : PNEC = 0.0032 mg/L (根拠: 96h-LC₅₀ (ファットヘッドミノー) = 0.32 mg/L、アセスメント係数 100)³⁾
 96h-LC₅₀ = 0.32 mg/L: ファットヘッドミノー (*Pimephales promelas*)^{2)3)v)}
 48h-LC₅₀ = 0.33~1 mg/L: ゴカイ科の一種 (*Ophryotrocha diadema*)³⁾⁵⁾
 21d-NOEC = 0.919 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害^{2)3)4)5)v)vi)}
 72h-NOEC = 0.93 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{5)v)}
 72h-EC₅₀ = 5.4 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{5)v)}

・規制

[化管法]

法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正前) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (22 アリルアルコール)

法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (28 アリルアルコール)

法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (28 アリルアルコール)

[大防法] 注 4)

法第 2 条第 4 項、揮発性有機化合物 (その他 (アルコール系))

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1976 年 5 月 28 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、アリルアルコール、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 80 (2007)
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 3 巻 (2014)
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アリルアルコール (2017 年度)
- 5) OECD, 2-Propen-1-ol, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2016)

[2] 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン (CAS登録番号：106-92-3)

【2024年度調査媒体：大気】

・調査要望理由

化管法

2021年10月20日の政令改正では継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

＜大気＞

大気について15地点を調査し、検出下限値2.3 ng/m³において5地点で検出され、検出濃度は94 ng/m³までの範囲であった。

2015年度には16地点を調査し、検出下限値8.6 ng/m³において3地点で検出され、検出濃度は14 ng/m³までの範囲であった。

○1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパンの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	2015	6/48	3/16	nd～14	8.6
	2024	8/45	5/15	nd～94	2.3

2024年度に調査を行った地点のうち8地点は、2015年度にも同一地点で調査を行っており、2015年度は2地点で検出され、6地点が不検出であったが、この6地点中2地点では統一した検出下限値未満の濃度で検出されたと報告があった。2015年度に検出された2地点は2024年度も検出された。2015年度に検出下限値未満の濃度で検出されたと報告があった2地点では、2024年度に不検出であった。2015年度に不検出であった他の4地点では、2024年度も不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/m ³)			報告時検出下限値 (ng/m ³)
①	さいたま市保健所 (さいたま市)	2015	8.9	9.1	nd	6.2
		2024	70	47	7.7	2.4
②	東京都環境科学研究所 (江東区)	2015	※7.6	nd	nd	6.1
		2024	nd	nd	nd	2.3
③	小笠原父島 (小笠原村)	2015	nd	nd	nd	6.1
		2024	nd	nd	nd	2.3
④	神奈川県環境科学センター (平塚市)	2015	nd	nd	nd	6.0
		2024	nd	nd	nd	2.3
⑤	長野県環境保全研究所 (長野市)	2015	nd	nd	nd	6.0
		2024	nd	nd	nd	2.3
⑥	網干一般環境大気測定局 (姫路市)	2015	nd	nd	nd	8.6
		2024	nd	nd	nd	2.3
⑦	味生一般環境大気測定局 (松山市)	2015	14	12	9.5	5.9
		2024	22	nd	nd	2.3
⑧	佐賀県環境センター (佐賀市)	2015	nd	※6.0	※8.0	6.0
		2024	nd	nd	nd	2.3

(注) ※：参考値 (測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満)

【参考：1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン】

- ・用 途 : ガラス繊維強化プラスチック処理剤（シランカップリング剤）、水処理剤（凝集剤）、エピクロルヒドリンゴム、飽和ポリエステル樹脂及びアルキッド樹脂改質剤の合成原料¹⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019年度：X t^{注3)}
 2020年度：X t
 2021年度：X t
 2022年度：X t
 2023年度：X t

- ・P R T R 排 出 量 : PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	4,001	0	0	0	4,001	6	4,007
2002	3,078	0	0	160	3,238	-	3,238
2003	2,673	8	0	0	2,681	-	2,681
2004	1,894	10	0	0	1,904	-	1,904
2005	1,626	11	0	0	1,637	-	1,637
2006	2,133	14	0	0	2,147	-	2,147
2007	2,195	13	0	0	2,208	-	2,208
2008	218	0	0	0	218	-	218
2009	271	0	0	0	271	-	271
2010	360	0	0	0	360	680	1,040
2011	331	0	0	0	331	734	1,065
2012	308	0	0	0	308	600	908
2013	315	0	0	0	315	862	1,177
2014	335	0	0	0	335	594	929
2015	330	0	0	0	330	504	834
2016	388	0	0	0	388	474	862
2017	434	0	0	0	434	462	896
2018	484	0	0	0	484	462	946
2019	497	0	0	0	497	418	915
2020	526	0	0	0	526	398	924
2021	567	0	0	0	567	440	1,007
2022	828	0	0	0	828	480	1,308
2023	862	0	0	0	862	420	1,282

(注) -: 推計値がないことを意味する。

- ・生 分 解 性 : 難分解性（標準法（試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、BODによる分解度：35%、42%、33%、TOCによる分解度：55%、65%、59%、GCによる分解度：72%、74%、74%、被験物質は水中で一部加水分解し、3-アリルオキシ-1,2-プロパンジオールを生成した。）^{1) 注1)}
- ・濃 縮 性 : 高濃縮性ではないと判断される物質（1-オクタノールと水との間の分配係数試験（フラスコ振とう法）、log Pow：0.34（平均値））¹⁾
- ・媒体別分配予測 : 水質 41.2%、底質 0.0893%、大気 0.670%、土壌 58.1%^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 390 mg/kg、マウス（経口）^{2)3)4)v)}
 LC₅₀ = 308 ppm（1,460 mg/m³、7時間）、ラット（吸入）^{3)5)v)}
- ・反復投与毒性等 : 無毒性量等（吸入）= 0.084 mg/m³（0.018 ppm、根拠：NOAEC=1 ppm、ばく露状況（6時間/日、5日/週）で補正し、慢性ばく露への補正が必要なことから10で除した。）²⁾
 NOAEC = 1 ppm²⁾ : マウス雌雄各10匹を1群とし、0、1、4、10又は30 ppmを13週間（6時間/日、5日/週）吸入させた結果、1 mg/m³群の雄3匹、雌2匹が死亡したが、その他の群で死亡はなかった。4 mg/m³以上の群の雌雄で体重増加の抑制を認めたが、各群で肝臓の重量に影響はなかった。鼻腔では、4 mg/m³以上の群の雌雄で呼吸上皮及び嗅上皮の扁平上皮化生、粘膜の慢性炎症の発生率（4/10以上）に有意な増加を認め、扁平上皮化生は鼻腔の前部ほど重度であり、1 mg/m³群で扁平上皮化生が雌雄各1匹、慢性炎症が雌2匹にみられたが、有意な所見数と判断できなかった。²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾
- ・発 がん 性 : GHS分類：区分2（ヒトに対する発がん性が疑われる。）⁵⁾
- ・生態影響 : PNEC = 0.2 mg/L（根拠：72h-NOEC（緑藻類）= 20 mg/L、アセスメント係数100）²⁾
 72h-NOEC = 20 mg/L : 緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{2)4)5)v)}
 96h-LC₅₀ = 30 mg/L : キンギョ（*Carassius auratus*）²⁾³⁾⁵⁾
 48h-EC₅₀ = 50 mg/L : オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{2)4)v)}
 72h-EC₅₀ = 79 mg/L 超 : 緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{2)4)v)}

・規制

[化審法]	法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（385 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン）
[化管法]	法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（22 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン） 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（29 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン） 法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（29 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン）
[大防法]	法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申、別表 1）（13 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン）

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1995 年 12 月 28 日）
- 2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 18 巻 (2020)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 68 (2005)
- 4) OECD, Allyl 2,3-epoxypropyl ether, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2007)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン（2021 年度）

[3] 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル (CAS 登録番号：101-80-4)

【2024 年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について 5 地点を調査し、検出下限値 3.0 ng/L において 5 地点全てで不検出であった。

2008 年度には 11 地点を調査し、検出下限値 3.2 ng/L において 11 地点全てで不検出であった。

○4,4'-ジアミノジフェニルエーテルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2008	0/33	0/11	nd	3.2
	2024	0/5	0/5	nd	3.0

【参考：4,4'-ジアミノジフェニルエーテル】

・用途：有機合成の中間体及びポリイミド樹脂の原料ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

2019 年度：X t^{注3)}

2020 年度：X t

2021 年度：X t

2022 年度：X t

2023 年度：3,000 t

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	0	0	0	0	0	-	0
2011	0	0	0	0	0	-	0
2012	0	0	0	0	0	-	0
2013	0	0	0	0	0	-	0
2014	0	0	0	0	0	-	0
2015	0	0	0	0	0	-	0
2016	0	0	0	0	0	-	0
2017	0	0	0	0	0	-	0
2018	0	0	0	0	0	-	0
2019	0	0	0	0	0	-	0
2020	0	0	0	0	0	-	0
2021	1	0	0	0	1	-	1
2022	0	0	0	0	0	-	0
2023	0	0	0	0	0	-	0

(注) -：推計値がないことを意味する。

・生分解性：分解率：7.6 % (Closed Bottle 法 (試験期間 28 日間、被試験物質 2 mg/L))^{1) 注1)}

・濃縮性：不詳

・媒体別分配予測：水質 12.7 %、底質 0.314 %、大気 0.000365 %、土壌 86.9 %^{iv) 注2)}

・急性毒性等：LD₅₀ = 650 mg/kg、モルモット (経口)¹⁾

- ・反復投与毒性等：無毒性量等（経口）＝1.0 mg/kg/日（根拠：NOAEL＝10 mg/kg/日、LOAEL であることから 10 で除した。）¹⁾
LOAEL＝10 mg/kg/日（200 ppm）：ラット雌雄各 60 匹を 1 群とし、0、200 又は 400 ppm を 23 ヶ月間投与した結果、雄の 200 ppm 以上の群及び雌の 400 ppm で体重増加の有意な抑制を認め、400 ppm 群では雄の生存率が有意に低かったが、雌の生存率は有意に高かった。雄の 200 ppm 以上の群でヘモグロビン濃度の、400 ppm 群で赤血球、好酸球比、ヘマトクリット値及び平均赤血球ヘモグロビン濃度の有意な減少を認め、雌の 400 ppm 群で好酸球比の有意な減少がみられた。雄の 200 ppm 以上の群の雄で心臓、脾臓、肝臓及び脳の相対重量が、雌の 400 ppm 群で肝臓、腎臓及び脳の相対重量が有意に低かった。雌雄の 200 ppm 以上の群で用量依存性の肝疾患（巣状の血管拡張や肝細胞変性）、雌雄の 400 ppm 群でびまん性の網膜変性の発生率に有意な増加を認め、重度の網膜変性は白内障を伴う場合が多かった。¹⁾
LOAEL＝10 mg/kg/日（200 ppm）：ラット雌雄各 50 匹を 1 群とし、0、200、400 又は 500 ppm を 103 週間混餌投与した結果、雌雄の 200 ppm 以上の群で体重増加の抑制を認め、雌の 500 ppm 群では全数で努力性呼吸がみられ、生存率は有意に低かった。投与に関連した組織への影響を甲状腺及び腎臓で認め、甲状腺では雌雄の 400 ppm 以上の群で濾胞の過形成が、雌雄の 400 ppm 群で濾胞嚢胞が、腎臓では雌の 200 ppm 以上の群及び雄の 400 ppm 以上の群で鉍質沈着が、雌雄の 400 ppm 以上の群で腎盂上皮の過形成の発生率増加がそれぞれみられた。¹⁾²⁾
- ・発がん性：GHS 分類：区分 1B（ヒトに対して恐らく発がん性がある化学物質）²⁾
- ・生態影響：PNEC＝0.0092 mg/L（根拠：48h-LC₅₀（オオミジンコ）＝0.92 mg/L、アセスメント係数 100）¹⁾
7d-NOEC＝0.018 mg/L：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）、繁殖阻害^{v)}
48h-LC₅₀＝0.92 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）^{1)3)v)}
72h-NOEC＝3.75 mg/L 未満：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{1)v)}
7d-NOEC＝5 mg/L：フアットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）、成長率^{v)}
72h-EC₅₀＝21.7 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{1)v)}
96h-LC₅₀＝22 mg/L：フアットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）^{v)}
- ・規制
 - 〔化管法〕 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（143 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル）
法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（163 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル）
 - 〔大防法〕 法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申、別表 1）（67 4,4'-ジアミノジフェニルエーテル）

参考文献

- 1) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 15 巻 (2017)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル（2017 年度）
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル（2022 年度）

[4] ジフェニルエーテル (別名：フェノキシベンゼン、CAS登録番号：101-84-8)

【2024年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021年10月20日の政令改正では第一種指定化学物質から第二種指定化学物質に変更されたが、ある程度の環境排出が認められる物質であり、今後も継続して環境中の存在状況を把握し、監視する必要があるため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について12地点を調査し、検出下限値3.1 ng/Lにおいて12地点全てで不検出であった。

1976年度には22地点を調査し、検出下限値600～5,000 ng/Lにおいて22地点全てで不検出であった。

1984年度には8地点を調査し、検出下限値20～80 ng/Lにおいて8地点全てで不検出であった。

○ジフェニルエーテル (別名：フェノキシベンゼン) の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1976	0/88	0/22	nd	600～5,000
	1984	0/24	0/8	nd	20～80
	2024	0/12	0/12	nd	3.1

【参考：ジフェニルエーテル (別名：フェノキシベンゼン)】

- ・用途：石けん用香料及び熱媒体ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 - 2019年度：1,000 t 以上 2,000 t 未満
 - 2020年度：1,000 t 以上 2,000 t 未満
 - 2021年度：1,000 t 以上 2,000 t 未満
 - 2022年度：1,000 t 以上 2,000 t 未満
 - 2023年度：1,000 t 以上 2,000 t 未満
- ・PRTR排出量：PRTR集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	510	0	0	0	510	7	517
2011	0	0	0	0	0	5	5
2012	15	0	0	0	15	0	15
2013	7	0	0	0	7	0	7
2014	15	0	0	0	15	0	15
2015	15	0	0	0	15	0	15
2016	15	0	0	0	15	1	16
2017	104	0	0	0	104	1	105
2018	1	0	0	0	1	1	2
2019	45	0	0	0	45	1	46
2020	56	0	0	0	56	1	57
2021	1	0	0	0	1	-	1
2022	26	0	0	0	26	-	26

(注) -: 推計値がないことを意味する。

- ・生分解性：難分解性 (標準法、BODによる分解度：6.3%、GCによる分解度：-% (負の値のため「-」と記載))^{i) 注1)}
- ・濃縮性：高濃縮性ではないと判断される物質 (コイ BCF：第1濃度区142倍～468倍 (0.3 mg/L、8週間)、第2濃度区241倍～269倍 (0.03 mg/L、8週間))¹⁾
- ・媒体別分配予測：水質18.3%、底質1.15%、大気2.86%、土壌77.7%^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 2,786 mg/kg、ラット (経口)²⁾

- ・反復投与毒性等 : GHS 分類 : 分類できない (反復ばく露に関するデータがない。) 。²⁾
- ・発 がん 性 : GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータがない。) 。²⁾
- ・生態影響 : 72h-NOEC = 0.24 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 、生長阻害^{v)}
 72h-EC₅₀ = 0.455 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 、生長阻害^{v)}
 96h-LC₅₀ = 1.8 mg/L : メダカ (*Oryzias latipes*)^{vi)}
 48h-EC₅₀ = 2.0 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*) 、遊泳阻害^{v) vi)}
- ・規制
 - [化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正前) 第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質 (98 フェノキシベンゼン)
 - [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (204 ジフェニルエーテル)
 法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 2、第二種指定化学物質 (55 ジフェニルエーテル)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1978 年 12 月 12 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、ジフェニルエーテル (2006 年度)

[5] トリブチルアミン (CAS 登録番号：102-82-9)

【2024 年度調査媒体：水質、底質】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

<水質>

水質について 27 地点を調査し、検出下限値 11 ng/L において欠測扱いとなった 2 地点を除く 25 地点全てで不検出であった。

1986 年度には 10 地点を調査し、検出下限値 3,000 ng/L において 10 地点全てで不検出であった。

○トリブチルアミンの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1986	0/30	0/10	nd	3,000
	2024	0/25	0/25	nd	11

<底質>

底質について 27 地点を調査し、検出下限値 0.28 ng/g-dry において 22 地点で検出され、検出濃度は 28 ng/g-dry までの範囲であった。

1986 年度には 9 地点を調査し、検出下限値 80 ng/g-dry において 9 地点全てで不検出であった。

○トリブチルアミンの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	1986	0/27	0/9	nd	80
	2024	62/81	22/27	nd~28	0.28

2024 年度に調査を行った 27 地点のうち 4 地点は、1986 年度にも同一地点で調査を行っており、いずれの地点も 1986 年度に不検出であった。2024 年度は検出下限値を下げて測定し、4 地点全てにおいて検出された。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
①	多摩川河口 (川崎市)	1986	nd	nd	nd	70
		2024	1.0	0.81	0.84	0.21
②	川崎港京浜運河扇町地先	1986	nd	nd	nd	70
		2024	12	2.3	9.0	0.3
③	大和川河口 (堺市)	1986	nd	nd	nd	30
		2024	2.0	0.51	3.9	0.21
④	洞海湾	1986	nd	nd	nd	80
		1986	3.0	3.1	5.7	0.23

【参考：トリブチルアミン】

- ・用 途 : 農薬の原料及び防錆剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019年度: 1,000 t 未満
 2020年度: 1,000 t 未満
 2021年度: 1,000 t 未満
 2022年度: 1,000 t 未満
 2023年度: 1,000 t 未満

- ・PRTR 排出量 : PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	4,220	2	0	0	4,222	-	4,222
2011	3,883	11	0	0	3,893	812	4,705
2012	22	4	0	0	25	948	973
2013	25	4	0	0	29	1,444	1,473
2014	40	35	0	0	75	77	152
2015	1,229	12	0	0	1,241	59	1,300
2016	3,706	24	0	0	3,730	86	3,816
2017	14	3	0	0	17	397	414
2018	6	4	0	0	10	59	69
2019	9	26	0	0	35	417	452
2020	8	74	0	0	82	496	578
2021	8	2	0	0	10	-	10
2022	9	0	0	0	9	8	17
2023	0	21	0	0	21	442	463

(注) -: 推計値がないことを意味する。

- ・生 分 解 性 : 難分解性 (標準報 (試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L)、BOD による分解度: 1%、0%、4% (平均 2%)、GC による分解度: 16%、0%、17% (平均 11%)) ^{1) 注 1)}
- ・濃 縮 性 : 高濃縮性ではないと判断される物質 (コイ BCF: 第 1 濃度区 0.32 倍以下~18 倍 (0.1 mg/L、28 日間)、第 2 濃度区 3.2 倍以下~47 倍 (0.01 mg/L、28 日間)) ¹⁾
- ・媒体別分配予測 : 水質 23.8%、底質 0.966%、大気 0.507%、土壌 74.8% ^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 114 mg/kg、ラット (経口) ²⁾
 LC₅₀ = 500 mg/m³ (4 時間)、ラット (吸入) ^{3)v)}
- ・反復投与毒性等 : NOAEL = 75 mg/kg/日: ラットの雌雄各 10 匹を 1 群とし、0、25、75 又は 225 mg/kg/日を 90 日間経口投与 (雌の 225 mg/kg/日群は早期死亡により 50 日目から 150 mg/kg/日に変更) した結果、225mg/kg/日群で雄 1 匹、雌 4 匹に試験項目関連の死亡が認められた。全投与群における肝臓重量および病理組織学 (中心葉病理組織学) に対する影響は、回復期間中に雌で完全に可逆的、雄で部分的に可逆的であり、適応性はあるが有害性はないと判断され。その他の毒性学的所見は確認されなかった。^{v)}
 LOAEL = 223 mg/kg/日: ラットに 223、477 又は 923 mg/m³を 19 日 (6 時間/日、5 日/週) 吸入させた結果、223 mg/m³群でわずかな嗜眠が、477 mg/m³群でより顕著な嗜眠が、923 mg/m³で鼻に対する刺激性、不穏、協調運動失調及び振戦が見られた。^{2)v)}
- ・発 がん 性 : GHS 分類: 分類できない (発がん性に関するデータがない。)²⁾
- ・生態影響 : PNEC = 0.016 mg/L (根拠: 72h-NOEC (緑藻類) = 1.65 mg/L、アセスメント係数 100) ⁴⁾
 72h-NOEC = 1.65 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{3)v)}
 48h-EC₅₀ = 8 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害^{3)4)5)v)}
 96h-LC₅₀ = 16.3 mg/L: メダカ (*Oryzias latipes*) ^{3)4)v)}
 72h-EC₅₀ = 10.1 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{4)v)}
- ・規制
 [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (292 トリブチルアミン)
 法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 1、第二種指定化学物質 (335 トリブチルアミン)

参考文献

- 1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、既存化学物質安全性点検データ、経済産業公報 (2002 年 3 月 26 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、トリブチルアミン (2008 年度)
- 3) OECD, Tributylamine (TBA), Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2014)
- 4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 22 巻 (2024)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、トリブチルアミン (2018 年度)

[6] ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル (CAS 登録番号：2426-08-6)

【2024 年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では第一種指定化学物質から第二種指定化学物質に変更されたが、ある程度の環境排出が認められる物質であり、今後も継続して環境中の存在状況を把握し、監視する必要があるため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について 26 地点を調査し、検出下限値 190 ng/L において 26 地点全てで不検出であった。

1984 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 500～700 ng/L において 8 地点全てで不検出であった。

○ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1984	0/24	0/8	nd	500～700
	2024	0/26	0/26	nd	190

【参考：ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル】

・用 途：高分子改質剤ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

2019 年度：1,000 t 未満

2020 年度：1,000 t 未満

2021 年度：1,000 t 未満

2022 年度：1,000 t 未満

2023 年度：1,000 t 未満

・P R T R 排 出 量：PRTR 集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	157	0	0	0	157	8	165
2011	112	0	0	0	112	13	125
2012	96	0	0	0	96	2	98
2013	114	0	0	0	114	2	116
2014	145	0	0	0	145	3	148
2015	293	0	0	0	293	-	293
2016	4,697	0	0	0	4,697	-	4,697
2017	3,569	0	0	0	3,569	-	3,569
2018	4,950	0	0	0	4,950	-	4,950
2019	216	0	0	0	216	-	216
2020	105	0	0	0	105	1	106
2021	184	0	0	0	184	-	184
2022	117	0	0	0	117	-	117

(注) -：推計値がないことを意味する。

・生 分 解 性：分解性が良好と判断される化学物質（標準法（試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：35 %、46 %、39 %、TOC による分解度：52 %、63 %、53 %、GC による分解度：67 %、69 %、69 %、被験物質は水中で加水分解し、生じた変化物が一部系中に残留していると考えられ、試験液を GC/MS で分析した結果、3-ブトキシ-1,2-プロパンジオール及び 3-ブトキシ-2-クロロプロパノールあるいは 1-ブトキシ-3-クロロ-2-プロパノールが認められた。）^{1) 注1)}

・濃 縮 性：不詳

・媒体別分配予測：水質 37.7 %、底質 0.0923 %、大気 1.83 %、土壌 60.4 %^{iv) 注2)}

・急性毒性等：LD₅₀ = 1,530 mg/kg、マウス（経口）^{2)v)}

LC₅₀ = 260 mg/m³、マウス（吸入）²⁾

- ・反復投与毒性等：無毒性量等（吸入）＝0.47 mg/m³（0.089 ppm、根拠：LOAEC＝5 ppm、ばく露状況（6時間/日、5日/週）で補正し、LOAECであることから10で除した。）²⁾
LOAEC＝5 ppm：マウスに0、5、15又は45 ppmを104週間（6時間/日、5日/週）吸入させた結果、雌雄の45 ppm群で体重増加の有意な抑制を認め、雄の45 ppm群の体重は5週以降から試験期間を通して一貫して低く、体重増加の抑制が著明であり、雌の45 ppm群の生存率はやや低かった。雄の45 ppm群でヘマトクリット値の増加及び白血球の減少が、雌雄の45 ppm群で血清のA/G比の増加及びALPの上昇などに有意差を認めた。組織への影響は主に鼻腔で見られ、雄の5 ppm以上の群及び雌の15 ppm以上の雌で呼吸上皮の立方化、雌の5 ppm以上の群及び雄の15 ppm以上の群で嗅上皮の呼吸上皮化生、雌雄の15 ppm以上の群で粘膜下腺の呼吸上皮化生、雄の15 ppm以上の群及び雌の45 ppm群で血管拡張、雌雄の45 ppm群で移行上皮の結節状過形成、浸出液、雄の45 ppm群で呼吸上皮の好酸性変化の発生率に有意な増加を認めた。²⁾
- ・発がん性：GHS分類：区分1B（ヒトに対して恐らく発がん性がある化学物質）³⁾
- ・生態影響：PNEC＝0.039 mg/L（根拠：48h-EC₅₀（オオミジンコ）＝3.9 mg/L、アセスメント係数100）²⁾
48h-EC₅₀＝3.9 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害²⁾
96h-EC₅₀＝35 mg/L：緑藻類（*Raphidocelis subcapitata*）、生長阻害^{2)v)}
96h-LC₅₀＝65 mg/L：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）^{2)v)}
- ・規制
 - [化審法] 法（平成21年5月20日改正前）第2条第5項、第二種監視化学物質（1027 *n*-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル）
 - [化管法] 法第2条第2項、施行令（平成20年11月21日改正後）第1条別表第1、第一種指定化学物質（359 *n*-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル）
法第2条第2項、施行令（令和3年10月20日改正後）第1条別表第2、第二種指定化学物質（97 *n*-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル）
 - [大防法] 法第2条第9項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010年中央環境審議会答申、別表1）（191 *n*-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル）

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1986年12月27日）
- 2) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第20巻(2022)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、*n*-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテル（2021年度）

[7] 4-tert-ブチルフェノール (CAS 登録番号：98-54-4)

【2024年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021年10月20日の政令改正では第一種指定化学物質から第二種指定化学物質に変更されたが、ある程度の環境排出が認められる物質であり、今後も継続して環境中の存在状況を把握し、監視する必要があるため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について4地点を調査し、検出下限値3.4 ng/Lにおいて4地点全てで不検出であった。

1976年度には20地点を調査し、検出下限値200～5,000 ng/Lにおいて20地点全てで不検出であった。1996年度には56地点を調査し、検出下限値714 ng/Lにおいて56地点全てで不検出であった。1997年度には56地点を調査し、検出下限値80 ng/Lにおいて欠測扱いとなった9地点を除く47地点中2地点で検出され、検出濃度は100 ng/Lまでの範囲であった。

○4-tert-ブチルフェノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1976	0/68	0/20	nd	200～5,000
	1996	0/168	0/56	nd	714
	1997	6/141	2/47	nd～100	80
	2024	0/4	0/4	nd	3.4

2024年度に調査を行った地点のうち2地点は、1976年度及び1997年度にも同一地点で調査を行っているが、両地点は1976年度及び1997年度に不検出で、2024年度は検出下限値を下げて測定したが不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	市原・姉崎海岸	1976	nd	nd	nd	270
		1997	nd	nd	nd	76
		2024	nd	nd	nd	3.4
②	大牟田沖	1976	nd	nd	nd	270
		1997	nd	nd	nd	76
		2024		nd		1.2

【参考：4-tert-ブチルフェノール】

- ・用途：油溶性フェノール樹脂、農薬、紫外線吸収剤及び界面活性剤の原料^①
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値^②
モノアルキルフェノール（アルキル基の炭素数が3から9までのもの）として
2019年度：10,000 t以上20,000 t未満
2020年度：10,000 t以上20,000 t未満
2021年度：10,000 t以上20,000 t未満
2022年度：10,000 t以上20,000 t未満
2023年度：10,000 t以上20,000 t未満

・P R T R 排 出 量 : PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	2,465	8	0	0	2,472	-	2,472
2011	190	6	0	0	196	29	225
2012	175	2	0	0	177	48	225
2013	131	1	0	0	131	40	171
2014	93	0	0	0	94	55	149
2015	54	3	170	0	227	39	266
2016	82	0	0	0	82	21	103
2017	164	3	170	0	337	21	358
2018	90	5	0	0	95	19	114
2019	75	2	0	0	77	35	112
2020	88	5	0	0	93	28	121
2021	136	7	0	0	143	30	173
2022	202	2	0	0	204	21	225

(注) -: 推計値がないことを意味する。

- ・生 分 解 性 : 分解性が良好でないとは判断される物質 (標準法 (試験期間 14 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L)、BOD による分解度: 0%、TOC による分解度: 1.2%、GC による分解度: -% (負の値のため「-」と記載)) ^{i) 注 1)}
- ・濃 縮 性 : 濃縮性が無い又は低いとは判断される物質 (コイ BCF: 第 1 濃度区 20 倍~43 倍 (0.04 mg/L、8 週間)、第 2 濃度区 48 倍未満~88 倍 (0.004 mg/L、8 週間)) ¹⁾
- ・媒体別分配予測 : 水質 17.9%、底質 1.29%、大気 0.258%、土壌 80.5% ^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 801 mg/kg、ラット (経口) ^{2)v)}
LC₅₀ = 5,600 mg/m³ 超 (4 時間)、ラット (吸入) ^{2)3)4)5)v)}
- ・反復投与毒性等 : 無毒性量等 (経口) = 7 mg/kg/日 (根拠: NOAEL = 70 mg/kg/日、試験期間が短いことから 10 で除した。) ⁴⁾
NOAEL = 70 mg/kg/日: ラットに交尾前 10 週から授乳期の終わりまで 0、70、200 又は 600 mg/kg/日を混餌添加した 2 世代試験の結果、親世代 (F0) の雌雄の 200 mg/kg/日以上で体重増加の抑制、雌の 200 mg/kg/日以上で副腎及び卵巣重量の減少、雄の 600 mg/kg/日群で肝臓及び腎臓重量の増加、雌の 600 mg/kg/日群で下垂体重量の減少、膈上皮の萎縮の発生率増加に有意差を認めた。仔世代 (F1) では、雄の 200 mg/kg/日以上で副腎及び卵巣重量の減少、肝臓重量の増加、600 mg/kg/日群で腎臓、卵巣、子宮等の重量の減少に有意差を認め、雌雄の 600 mg/kg/日群で脾臓重量の減少もみられた。雌の 600 mg/kg/日群で膈上皮の萎縮がみられ、その程度は F1 の方が重度であった。 ²⁾³⁾⁴⁾⁶⁾
- ・発 がん 性 : GHS 分類: 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。) ³⁾
- ・生 態 影 響 : PNEC = 0.0032 mg/L (根拠: 72h-NOEC (緑藻類) = 0.32 mg/L、アセスメント係数 100) ⁴⁾
72h-NOEC = 0.32 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 ^{2)3)4)v)}
21d-NOEC = 0.73 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害 ^{4)5)6)v)}
48h-EC₅₀ = 3.9 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害 ^{2)4)5)v)}
96h-LC₅₀ = 5.1 mg/L: メダカ (*Oryzias latipes*) ^{2)4)5)6)v)}
72h-EC₅₀ = 14 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 ^{2)4)v)}
- ・規制
 - [化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正前) 第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質 (828 4-tert-ブチルフェノール)
 - [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (368 4-tert-ブチルフェノール)
法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 2、第二種指定化学物質 (106 4-tert-ブチルフェノール)
 - [水濁法] ^{注 5)} 法第 2 条第 2 項第 2 号、施行令第 3 条、生活環境項目 (55 フェノール類及びその塩類)
法第 2 条第 4 項、施行令第 3 条第 3 項、指定物質 (55 フェノール類及びその塩類)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1977 年 11 月 30 日)
- 2) European Union, Risk Assessment Report - *p-tert-Butylphenol* (2008)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、4-tert-ブチルフェノール (2015 年度)
- 4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 13 巻 (2015)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、4-tert-ブチルフェノール、有害性評価書 Ver. 1.0 No. 215 (2017)
- 6) OECD, *p-tert-Butylphenol*, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2012)

[8] *N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド (CAS 登録番号：95-31-8)

【2024 年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では第一種指定化学物質から第二種指定化学物質に変更されたが、ある程度の環境排出が認められる物質であり、今後も継続して環境中の存在状況を把握し、監視する必要があるため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について 2 地点を調査し、検出下限値 12 ng/L において 2 地点とも不検出であった。

1998 年度には 13 地点を調査し、検出下限値 100 ng/L において 13 地点全てで不検出であった。

○*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミドの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1998	0/39	0/13	nd	100
	2024	0/2	0/2	nd	12

【参考：*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド】

- ・用 途：ゴムの加硫促進剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019 年度：3,000 t 以上 4,000 t 未満
 2020 年度：2,000 t 以上 3,000 t 未満
 2021 年度：3,000 t 以上 4,000 t 未満
 2022 年度：3,000 t 以上 4,000 t 未満
 2023 年度：2,000 t 以上 3,000 t 未満
- ・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	0	0	0	0	0	95,828	95,828
2002	0	0	0	0	0	2,539	2,539
2003	0	0	0	0	0	8,157	8,157
2004	0	0	0	0	0	-	0
2005	0	0	0	0	0	-	0
2006	0	0	0	0	0	-	0
2007	0	0	0	0	0	-	0
2008	350	0	0	0	350	-	350
2009	210	0	0	0	210	-	210
2010	0	0	0	0	0	-	0
2011	0	0	0	0	0	-	0
2012	0	0	0	0	0	-	0
2013	0	0	0	0	0	-	0
2014	0	0	0	0	0	-	0
2015	0	0	0	0	0	-	0
2016	0	0	0	0	0	-	0
2017	0	0	0	0	0	-	0
2018	0	0	0	0	0	35	35
2019	0	0	0	0	0	2,031	2,031
2020	0	0	0	0	0	680	680
2021	0	0	0	0	0	532	532
2022	2	0	0	0	2	1,161	1,163

(注) -: 推計値がないことを意味する。

- ・生 分 解 性 : 難分解性 (標準報 (試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30 mg/L)、BODによる分解度 : 0%、0%、0% (平均 0%)、HPLCによる分解度 : 80%、81%、100% (平均 87%)、試験終了後に変化物として予想される 2-メルカプトベンゾチアゾール、ジ(ベンゾチアゾール-2)ジスルフィド及び *tert*-ブチルアミンも分析し、*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、2-メルカプトベンゾチアゾール及びジ(ベンゾチアゾール-2)ジスルフィドから求めた物質収支は 88%、77%、66%で、*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド及び *tert*-ブチルアミンから求めた物質収支はほぼ 100%であった。) ^{1) 注 1)}
- ・濃 縮 性 : 分解物である *tert*-ブチルアミンは高濃縮性ではないと判断される物質 (コイ BCF : 第 1 濃度区 0.36 倍以下~1.3 倍 (1 mg/L、28 日間)、第 2 濃度区 3.8 倍以下~16 倍 (0.1 mg/L、28 日間)) ¹⁾
- ・媒体別分配予測 : 水質 10.3%、底質 6.83%、大気 0.00575%、土壌 82.9% ^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 5,000 mg/kg 超、ラット (経口) ²⁾³⁾
- ・反復投与毒性等 : 無毒性量等 (経口) = 40 mg/kg/日 (根拠 : NOAEL = 4.8 mg/kg/日) ³⁾
 NOAEL = 40 mg/kg/日 : ラットに 0、40、200 又は 1,000 mg/kg/日を雄には 2 週間の交配期間を含む 6 週間、雌には交配 2 週間前から交配、妊娠期間を通して分娩後 3 日まで強制経口投与した結果、雌雄の 200 mg/kg/日以上に群に一過性の流涎、肝臓の小葉中心性肝細胞肥大、1,000 mg/kg/日群に肝臓の相対重量増加がみられた。また、雄の 40 mg/kg/日以上に群に腎臓尿細管の好酸性小体の増加、200 mg/kg/日以上に群に血清総ビリルビン濃度の増加、脾臓のヘモジデリン沈着の増加、1,000 mg/kg/日群に摂餌量の低下及び体重増加の抑制、血清総コレステロール濃度の増加、ヘモグロビン濃度及びヘマトクリット値の低下 (溶血性貧血)、腎臓の絶対・相対重量の増加、門脈周囲性の肝細胞脂肪化の減弱がみられた。雌の 200 mg/kg/日以上に群に近位尿細管の空胞変性、1,000 mg/kg/日群に交配前及び妊娠期の摂餌量の低下、妊娠初期の体重増加抑制、腎臓の相対重量の増加傾向、脾臓のヘモジデリン沈着の増加傾向がみられている。しかし、雄の 40 mg/kg/日以上に群でみられた腎臓の好酸性小体の増加は、40 mg/kg/日及び 200 mg/kg/日群での腎臓重量及び血液化学的検査上の異常は伴わず、*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミドによる悪影響とは判断しなかった。 ²⁾³⁾⁴⁾
 無毒性量 (吸入) = 7.7 mg/kg/日 (根拠 : NOAEL = 58 mg/m³、ばく露状況 (6 時間/日、5 日/週) で補正し、ラットの呼吸量 (0.26 m³/日) 及び体重 (0.35 kg) から換算した。) ³⁾
 NOAEL = 58 mg/m³ : ラットに 0、58、172、524 mg/m³の濃度で、4 週間 (6 時間/日、5 日/週) 吸入ばく露した結果、雌雄の 172 mg/m³以上の群に血清アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ (AST) 活性の増加がみられた。雌雄の 524 mg/m³群に腸間膜リンパ節の褐色色素を貪食した類洞マクロファージの出現頻度増加及び赤血球の貪食がみられた。肝臓には限局性または多発性の巣状壊死 (3/20 匹) がみられ、うち 2 匹は急性炎症性細胞浸潤を伴っていた。しかし、腸間膜リンパ節の変化は、対照群でもみられ、偶発的変化の可能性を排除できないと著者らは述べている。 ²⁾³⁾⁴⁾
- ・発 がん 性 : GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。) ²⁾
- ・生 態 影 響 : 72h-NOEC = 0.023 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 ^{2)4) vi)}
 89d-NOEC = 0.041 mg/L : ニジマス (*Oncorhynchus mykiss*)、繁殖阻害 ^{v)}
 14d-NOEC = 0.042 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害 ³⁾
 72h-EC₅₀ = 0.071 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 ^{2)4) vi)}
 48h-EC₅₀ = 1.3 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害 ^{2)3) vii)}
 96h-LC₅₀ = 1.4 mg/L : メダカ (*Oryzias latipes*) ^{2)3) vii)}
- ・規制
 - [化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正前) 第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質 (258 *N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド)
 - [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正前) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (282 *N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド)
 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (372 *N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド)
 法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 2、第二種指定化学物質 (109 *N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド)

参考文献

- 1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、既存化学物質安全性点検データ、経済産業公報 (2001 年 5 月 10 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、*N*-(1,3-ベンゾチアゾール-2-イルスルファニル)-*tert*-ブチルアミン (2023 年度)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 22 (2005)
- 4) OECD, *N*-*tert*-butylbenzothiazole-2-sulphenamid, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2003)

[9] プロパナール (別名：プロピオンアルデヒド、CAS 登録番号：123-38-6)

【2024 年度調査媒体：大気】

・調査要望理由

環境リスク初期評価

化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で、ばく露情報等が不足している物質であるため。

・調査内容及び結果

<大気>

大気について 12 地点を調査し、検出下限値 16 ng/m³において 12 地点全てで検出され、検出濃度は 64～1,200 ng/m³の範囲であった。

1987 年度には 12 地点を調査し、検出下限値 800 ng/m³において 7 地点で検出され、検出濃度は 14,000 ng/m³までの範囲であった。

○プロパナール (別名：プロピオンアルデヒド) の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	1987	23/66	7/12	nd～14,000	800
	2024	36/36	12/12	64～1,200	16

2024 年度に調査を行った ~~12~~ 地点のうち 3 地点は、1987 年度にも同一地点で調査を行っており、この 3 地点はいずれも 1987 年度に検出されている。2024 年度も 3 地点全てで検出され、うち 2 地点では 2024 年度に検出された濃度が 1987 年度に対して低値であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/m ³)			報告時検出下限値 (ng/m ³)
①	長野県環境保全研究所 (長野市)	1987 夏季	※400	nd	※660	310
		1987 冬季	1,800	※780	1,500	310
		2024	200	150	140	16
②	六甲山山頂 (神戸市)	1987 夏季	8,000	14,000	8,000	2,000
		1987 冬季	---	---	---	2,000
		2024	160	95	84	16
③	兵庫県環境研究センター (神戸市)	1987 夏季	2,000	2,000	---	2,000
		1987 冬季	---	---	---	2,000
		2024	240	170	100	16

(注 1) ※：参考値 (測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満)

(注 2) ---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体 (欠測扱い)

【参考：プロパナール (別名：プロピオンアルデヒド) 】

・用途：医薬及び樹脂の原料並びに食品添加物 (香料、香辛料) ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値 ⁱⁱ⁾

2019 年度：X t ^{注 3)}

2020 年度：X t

2021 年度：1,000 t 未満

2022 年度：1,000 t 未満

2023 年度：1,000 t 未満

・P R T R 排出量：届出及び推計の対象外

- ・生 分 解 性 : 分解性が良好と判断される化学物質 (標準法 (試験期間 28 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L)、BOD による分解度 : 91 %、97 %、94 %、TOC による分解度 : 95 %、98 %、98 %、GC による分解度 : 100 %、100 %、100 %) ^{1) 注 1)}
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 49.0 %、底質 0.0916 %、大気 3.31 %、土壌 0.0916 % ^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 雄 2,000 mg/kg、雌 1,690 mg/kg、ラット (経口) ^{2) 3) v)}
LC₅₀ = 26,000 ppm (30 分間)、ラット (吸入) ^{2) 3)}
- ・反復投与毒性等 : ラットを用いた 90 日間強制経口投与毒性試験において、1,000 mg/kg/day で、体重増加抑制、食道から空腸の壊死又は潰瘍、細胞浸潤及び出血等、精巣の精細胞減少、精母細胞の変性、尿 pH の低値並びに尿細管上皮細胞の変性、壊死及び好塩基性化がみられた。²⁾
ラットの雄には 52 日間、雌には妊娠 20 日目までの 38～48 日間、150 ppm、750 ppm 又は 1,500 ppm を吸入ばく露した結果、雄の 1,500 ppm 群で、赤血球数、単球数、ヘマトクリット及びヘモグロビン含量の増加並びに腎相対重量の増加がみられた。また、鼻腔嗅覚上皮細胞に雄の 150 ppm 群及び 750 ppm 群並びに雌の 150 ppm 以上の群で空砲化が、雄の 750 ppm 以上の群及び雌の 1,500 ppm 群では委縮が観察され、雄の 750 ppm 以上の群では扁平上皮化が認められた。^{2) 4) v)}
- ・発 がん 性 : GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。)。²⁾
- ・生態影響 : 96h-LC₅₀ = 14 mg/L : ファットヘッドミノール (*Pimephales promelas*) ^{2) 3) v)}
48h-EC₅₀ = 88.7 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害 ^{v)}
72h-EC₅₀ = 260 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*)、生長阻害 ^{v)}
- ・規制
[大防法] 法第 2 条第 4 項、揮発性有機化合物 (プロピオンアルデヒド)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1990 年 12 月 28 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、プロピオンアルデヒド (2015 年度)
- 3) OECD, Propanal, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、プロピオンアルデヒド (2008 年度)

[10] リン酸トリエステル類

[10-1] リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル)、CAS登録番号：13674-84-5)

【2024年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

環境リスク初期評価

化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で、ばく露情報等が不足している物質であるため。

・調査内容及び結果

<水質>

水質について本調査としては2024年度が初めての調査であり、32地点を調査し、検出下限値1.5 ng/Lにおいて31地点で検出され、検出濃度は480 ng/Lまでの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

○リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル)) の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	31/32	31/32	nd～480	1.5

【参考：リン酸トリス(2-クロロ-1-メチルエチル) (別名：リン酸トリス(2-クロロイソプロピル))】

・用途：難燃剤ⁱⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

ブロモ又はクロロアルキル又はアルケニル-ホスフェートとして

2019年度：7,000 t 以上 8,000 t 未満

2020年度：7,000 t 以上 8,000 t 未満

2021年度：8,000 t 以上 9,000 t 未満

2022年度：7,000 t 以上 8,000 t 未満

2023年度：5,000 t 以上 6,000 t 未満

塩素化アルキル又は塩素化アルケニルリン酸エステル（アルキル基又はアルケニル基の炭素数が3から24までのもの）として

2019年度：X t^{注3)}

2020年度：X t

2021年度：X t

2022年度：1,000 t 未満

2023年度：1,000 t 未満

・P R T R 排出量：届出及び推計の対象外

・生分解性：難分解性（標準報（試験期間28日間、被試験物質100 mg/L、活性汚泥30 mg/L）、BODによる分解度：0%、0%、0%、TOCによる分解度：5%、6%、6%、GCによる分解度：0%、5%、1%、被試験物質の純度は74.4%で、異性体が不純物として25.6%含まれており、不純物のGCによる分解度は、0%、3%、0%であった。）^{1) 注1)}

・濃縮性：蓄積性がない又は低いと判断される化学物質（コイBCF：第1濃度区主成分0.8倍～2.8倍、異性体1.3倍以下～2.1倍（0.2 mg/L、6週間）、第2濃度区主成分1.9倍以下～4.6倍、異性体5.7倍以下～14倍以下（0.02 mg/L、6週間）、被試験物質の純度は74.4%で、異性体が不純物として25.6%含まれていた。）¹⁾

・媒体別分配予測：水質9.63%、底質1.05%、大気0.0177%、土壌89.3%^{iv) 注2)}

・急性毒性等：LD₅₀=雄500 mg/kg 超、雌632 mg/kg、ラット（経口）^{2) 3) v)}
LC₅₀=7,000 mg/m³ 超（30分間）、ラット（吸入）^{2) 3) v)}

- ・反復投与毒性等 : LOAEL = 52 mg/kg/日^{3)vi}: ラット雌雄各 20 匹を 1 群とし、0、800、2,500、7,500 又は 20,000 ppm の濃度 (雄は 0、52、160、481 又は 1,349 mg/kg/日、雌は 0、62、171、570 又は 1,745 mg/kg/日に相当) で 13 週間混餌投与した結果、肝重量の増加が雄の全投与群及び雌の 7,500 ppm 以上の群の雌でみられた。雌の 7,500 ppm 以上の群では、肝門部周囲の腫脹がみられ、腎皮質尿管に軽度の変性変化 (ヒアリン液滴形成) が認められ、雌の 20,000 ppm 群では空胞化が認められた。甲状腺濾胞上皮細胞の過形成が雄の全投与群及び雌の 20,000 ppm 群でみられた。^{2)3)vi}
- ・発がん性 : GHS 分類: 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。)²⁾
- ・生態影響 : PNEC = 0.26 mg/L (根拠: 72h-NOEC (緑藻類) = 13 mg/L、アセスメント係数 50)³⁾
72h-NOEC = 13 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{3)vi}
21d-NOEC = 32 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害^{3)vi}
96h-LC₅₀ = 51 mg/L: ファットヘッドミノー (*Pimephales promelas*)^{2)3)vi}
72h-EC₅₀ = 82 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{3)vi}
48h-EC₅₀ = 131 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害^{3)vi}
- ・規制
[水濁法] 法第 2 条第 2 項第 2 号、施行令第 3 条、生活環境項目 (12 窒素又はりんものの含有量 (湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。))

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1989 年 12 月 28 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート (2013 年度)
- 3) European Communities, Risk Assessment Report - Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate (TCPP) (2008)

[10-2] リン酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル) (CAS 登録番号: 13674-87-8)

【2024 年度調査媒体: 水質、大気】

・調査要望理由

環境リスク初期評価

化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で、ばく露情報等が不足している物質であるため。

・調査内容及び結果

<水質>

水質について 32 地点を調査し、検出下限値 0.29 ng/L において 31 地点で検出され、検出濃度は 92 ng/L までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

1975 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 20~250 ng/L において 20 地点全てで不検出であった。1978 年度には 36 地点を調査し、検出下限値 1~500 ng/L において 36 地点全てで不検出であった。1984 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 250~1,000 ng/L において 8 地点全てで不検出であった。1999 年度には 14 地点を調査し、検出下限値 100 ng/L において 14 地点全てで不検出であった。

○りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1975	0/100	0/20	nd	20～250
	1978	0/108	0/36	nd	1～500
	1984	0/24	0/8	nd	250～1,000
	1999	0/42	0/14	nd	100
	2024	31/32	31/32	nd～92	0.29

2024 年度に調査を行った地点のうち 14 地点は、1978 年度、1984 年度又は 1999 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度に不検出であった。2024 年度は検出下限値を下げて測定して 14 地点全てで検出された。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	荒川河口 (江東区)	1999	nd	nd	nd	7.8
		2024		25		0.29
②	隅田川河口 (港区)	1999	nd	nd	nd	7.8
		2024		25		0.29
③	横浜港	1978	nd	nd	nd	150
		1984	nd	nd	nd	250
		2024		5.3		0.29
④	川崎港京浜運河扇町地先	1978	nd	nd	nd	150
		2024		6.2		0.29
⑤	犀川河口 (金沢市)	1999	nd	nd	nd	100
		2024		7.5		0.29
⑥	衣浦港	1978	nd	nd	nd	20
		2024		4.8		0.29
⑦	名古屋港潮見ふ頭西	1978	nd	nd	nd	20
		1999	nd	nd	nd	100
		2024		3.8		0.29
⑧	四日市港	1978	nd	nd	nd	20
		1984	nd	nd	nd	400
		2024		3.0		0.29
⑨	大川毛馬橋 (大阪市)	1978	nd	nd	nd	500
		2024		12		0.29
⑩	大阪港	1978	nd	nd	nd	500
		2024		23		0.29
⑪	水島沖	1978	nd	nd	nd	20
		1984	nd	nd	nd	1,000
		1999	nd	nd	nd	100
		2024		0.64		0.29
⑫	徳山湾	1999	nd	nd	nd	100
		2024		0.58		0.29
⑬	萩沖	1999	nd	nd	nd	100
		2024		0.92		0.29
⑭	洞海湾	1978	nd	nd	nd	500
		2024		2.5		0.29

< 大気 >

大気について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、17 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/m³ において欠測扱いとなった 1 地点を除く 16 地点中 4 地点で検出され、検出濃度は 3.3 ng/m³ までの範囲であった。

○りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	2024	4/48	4/16	nd～3.3	1.1

【参考：りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)】

- ・用途：難燃剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019年度：1,000 t 未満
 2020年度：1,000 t 未満
 2021年度：X t^{注3)}
 2022年度：X t
 2023年度：X t
- ・P R T R 排出量：届出及び推計の対象外
- ・生分解性：難分解性（標準報（試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L）、BOD による分解度：0%、4%、0%、GC による分解度：0%、0%、0%）^{1) 注1)}
- ・濃縮性：濃縮性がない又は低いと判断される物質（コイ BCF：第 1 濃度区 (0.30)^{注倍}～(3.3)^{注倍} (0.02 mg/L、6 週間)、第 2 濃度区 2.2 倍以下～(22)^{注倍} (0.002 mg/L、6 週間)）¹⁾
 （注）括弧付きで示した値は、精度よく定量できない範囲の値であることを意味する。
- ・媒体別分配予測：水質 3.77%、底質 4.89%、大気 0.00671%、土壌 91.3%^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 2,359 mg/kg、ラット（経口）^{2)3)v)}
 LC₅₀ = 5,220 mg/m³ 超（4 時間）、ラット（吸入）^{2)3)v)}
- ・反復投与毒性等：LOAEL = 5 mg/kg/日^{3)v)}：ラット雌雄に 0、5、20 又は 80 mg/kg/日を 24 ヶ月間混餌投与した結果、雄の高 80mg/kg/日群で有意に高い死亡率が記録された。80mg/kg/日群では、試験期間を通じて体重に明らかな悪影響が認められ、投与終了時の体重は対照群より 20%以上減少した。また、80mg/kg/日群では赤血球パラメーターの有意な低下が認められた。腎臓、肝臓及び甲状腺の絶対及び相対重量も 20mg/kg/日以上で増加した。雄の全投与群で腎臓尿管上皮の過形成の発生率が増加し、胚上皮の萎縮、精子過少、精嚢萎縮など精巣への影響が認められた。^{2)3)v)}
- ・発がん性：GHS 分類：区分 2（ヒトに対する発がん性が疑われる。）⁵⁾
- ・生態影響：PNEC = 0.01 mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ）= 0.5 mg/L、アセスメント係数 50）³⁾
 182d-NOEC = 0.004 mg/L：ゼブラフィッシュ（*Danio rerio*）、繁殖阻害⁵⁾
 21d-NOEC = 0.5 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、繁殖阻害^{3)v)}
 96h-LC₅₀ = 1.1 mg/L：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）^{2)3)v)}
 72h-NOEC = 1.2 mg/L 以上：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{3)v)}
 48h-EC₅₀ = 3.8 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{3)v)}
 72h-EC₅₀ = 4.5 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{v)}
- ・規制
 [水濁法] 法第 2 条第 2 項第 2 号、施行令第 3 条、生活環境項目（12 窒素又はりん含有量（湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。））

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1980 年 12 月 25 日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート（2010 年度）
- 3) European Communities, Risk Assessment Report - Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate (TDCP) (2008)
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、トリス(1-クロロ-2-プロピル)=ホスファート（2021 年度）
- 5) Qiangwei Wang *et al.*, Developmental exposure to the organophosphorus flame retardant tris(1,3-dichloro-2-propyl) phosphate: Estrogenic activity, endocrine disruption and reproductive effects on zebrafish, *Aquatic Toxicology*, Volume 160 (2015)

[10-3] リン酸トリス(2-ブトキシエチル) (CAS登録番号：78-51-3)

【2024年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

環境リスク初期評価

化学物質の環境リスク初期評価を実施する上で、ばく露情報等が不足している物質であるため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について 32 地点を調査し、検出下限値 0.11 ng/L において 32 地点全てで検出され、検出濃度は 0.12 ～450 ng/L の範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

1975 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 20～500 ng/L において 20 地点全てで不検出であった。1978 年度には 36 地点を調査し、検出下限値 5～1,500 ng/L において 36 地点全てで不検出であった。1993 年度には 56 地点を調査し、検出下限値 500 ng/L において欠測扱いとなった 1 地点を除く 55 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は 2,800 ng/L までの範囲であった。

○リン酸トリス(2-ブトキシエチル)の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1975	0/100	0/20	nd	20～500
	1978	0/108	0/36	nd	5～1,500
	1993	12/165	5/55	nd～2,800	500
	2024	32/32	32/32	0.12～450	0.11

2024 年度に調査を行った地点のうち 23 地点は、1978 年度又は 1993 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 2 地点で検出され、21 地点が不検出であったが、この 21 地点中 4 地点では統一した検出下限値未満の濃度で検出されたと報告があった。過年度に検出された 2 地点は 2024 年度も検出され、うち 1 地点では 2024 年度に検出された濃度が過年度に対して低値であった。過年度に検出下限値未満の濃度で検出されたと報告があった 4 地点を含めた過年度に不検出であった 21 地点では、2024 年度に検出下限値を下げて測定して 21 地点全てで検出された。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	豊沢川豊沢橋 (花巻市)	1993	nd	nd	nd	14
		2024		0.54		0.11
②	市原・姉崎海岸	1993	nd	nd	nd	120
		2024		2.6		0.11
③	荒川河口 (江東区)	1993	nd	nd	nd	120
		2024		120		0.11
④	隅田川河口 (港区)	1993	※120	※150	nd	120
		2024		170		0.11
⑤	横浜港	1978	nd	nd	nd	1,500
		1993	nd	nd	nd	120
		2024		11		0.11

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
⑥	川崎港京浜運河扇町地先	1978	nd	nd	nd	1,500
		1993	nd	nd	nd	290
		2024		20		0.11
⑦	犀川河口 (金沢市)	1993	※240	※240	※240	120
		2024		150		0.11
⑧	清水港	1993	nd	nd	nd	120
		2024		3.4		0.11
⑨	衣浦港	1978	nd	nd	nd	50
		1993	nd	nd	nd	120
		2024		4.5		0.11
⑩	名古屋港潮見ふ頭西	1978	nd	nd	nd	50
		1993	nd	nd	nd	120
		2024		14		0.11
⑪	四日市港	1978	nd	nd	nd	40
		1993	nd	nd	nd	50
		2024		3.2		0.11
⑫	琵琶湖唐崎沖中央	1993	nd	nd	nd	120
		2024		0.75		
⑬	大和川河口 (堺市)	1993	※330	※300	※370	120
		2024		39		
⑭	大川毛馬橋 (大阪市)	1978	nd	nd	nd	1,000
		1993	※110	※54	※100	50
		2024		27		0.11
⑮	大阪港	1978	nd	nd	nd	1,000
		1993	520	※480	580	50
		2024		54		0.11
⑯	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	1993	850	510	※440	260
		2024		2.0		0.11
⑰	水島沖	1978	nd	nd	nd	30
		1993	nd	nd	nd	500
		2024		2.4		0.11
⑱	徳山湾	1993	nd	nd	nd	120
		2024		0.47		0.11
⑲	萩沖	1993	nd	nd	nd	120
		2024		9.0		0.11
⑳	新居浜港	1993	nd	nd	nd	120
		2024		0.12		0.11
㉑	洞海湾	1978	nd	nd	nd	1,000
		1993	nd	nd	nd	200
		2024		8.0		0.11
㉒	伊万里湾	1993	nd	nd	nd	320
		2024		1.1		0.11
㉓	大分川河口 (大分市)	1993	nd	nd	nd	200
		2024		15		0.11

(注) ※：参考値 (測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満)

【参考：りん酸トリス(2-ブトキシエチル)】

- ・用 途：可塑剤、消泡剤及びレベリング剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 - 2019年度：1,000 t 未満
 - 2020年度：1,000 t 未満
 - 2021年度：1,000 t 未満
 - 2022年度：1,000 t 未満
 - 2023年度：1,000 t 未満
- ・P R T R 排 出 量：届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性：難分解性 (標準報 (試験期間 28 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L)、BODによる分解度：0%、0%、0%、TOCによる分解度：1%、2%、1%、GCによる分解度：0%、0%、0%)¹⁾
注 1)
- ・濃 縮 性：蓄積性がない又は低いと判断される化学物質 (コイ BCF：第 1 濃度区 0.6 倍以下～4.1 倍 (0.2 mg/L、6 週間)、第 2 濃度区 5.8 倍以下 (0.02 mg/L、6 週間))¹⁾

- ・媒体別分配予測：水質 18.3 %、底質 0.540 %、大気 0.000415 %、土壌 81.2 %^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 2,000 mg/kg 超、ラット（経口）^{v)}
LC₅₀ = 6,400 mg/m³ 超（4 時間）、ラット（吸入）^{v)}
- ・反復投与毒性等：NOEL = 100 mg/kg/日：ラットに 0、100、300 又は 1,000 mg/kg/日を 28 日間経口強制投与した結果、雌雄において血漿中のコリンエステラーゼ活性が用量依存的に低下する傾向があり、雌雄の 1,000 mg/kg/日群で有意差が認められた。雌の 300 mg/kg 日以上の群及び雄の 1,000 mg/kg/日群で肝臓の絶対及び相対重量が有意に増加した。雌の 300 mg/kg/日群で肝臓の小肉芽腫の変化の程度が有意に増強し、小葉周辺帯の肝細胞の微細空胞化の発生頻度及び程度がともに増強する傾向にあり、雌の 1,000mg/kg/日群では、統計学的に有意な差が認められた。²⁾
- ・発がん性：不詳
- ・生態影響：72h-NOEC = 7.6 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{v)}
48h-EC₅₀ = 33 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{vi)}
72h-EC₅₀ = 61 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害^{v)}
96h-LC₅₀ = 21 mg/L：メダカ（*Oryzias latipes*）^{vi)}
- ・規制
[水濁法] 法第 2 条第 2 項第 2 号、施行令第 3 条、生活環境項目（12 窒素又はりん含有量（湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。））

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1990 年 12 月 28 日）
- 2) 財団法人食品薬品安全センター秦野研究所、厚生省生活衛生局委託、りん酸トリス(2-ブトキシエチル)エステルのラットにおける 28 日間反復経口投与毒性試験（回復 14 日間）、1995 年試験実施

[10-4] りん酸トリブチル（CAS 登録番号：126-73-8）

【2024 年度調査媒体：水質、底質、大気】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正では継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていないため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

<水質>

水質について 33 地点を調査し、検出下限値 0.33 ng/L において 23 地点で検出され、検出濃度は 35 ng/L までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

1975 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 10～100 ng/L において 6 地点で検出され、検出濃度は 710 ng/L までの範囲であった。1977 年度には 39 地点を調査し、検出下限値 6～500 ng/L において 18 地点で検出され、検出濃度は 580 ng/L までの範囲であった。1993 年度には 56 地点を調査し、検出下限値 11 ng/L において欠測扱いとなった 5 地点を除く 51 地点中 26 地点で検出され、検出濃度は 260 ng/L までの範囲であった。2006 年度には 19 地点を調査し、検出下限値 10 ng/L において 10 地点で検出され、検出濃度は 84 ng/L までの範囲であった。2008 年度には 48 地点を調査し、検出下限値 7.9 ng/L において欠測扱いとなった 5 地

点を除く 43 地点中 29 地点で検出され、検出濃度は 94 ng/L までの範囲であった。

また、水質・底質モニタリングにおいて 1988 年度から 1992 年度及び 1994 年度から 1998 年度に各年度で 15～22 地点を調査し、最も多い年度には 5 地点で検出され、水質・底質モニタリングが実施された全期間を通じての検出濃度は 560 ng/L までの範囲であった。

○りん酸トリブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1975	21/100	6/20	nd～710	10～100
	1977	39/117	18/39	nd～580	6～500
	1988	5/22	5/22	nd～560	不詳 (53) 注
	1989	2/15	2/15	nd～180	不詳 (16) 注
	1990	3/17	3/17	nd～130	不詳 (78) 注
	1991	3/17	3/17	nd～220	不詳 (65) 注
	1992	4/17	4/17	nd～330	不詳 (13) 注
	1993	66/148	26/51	nd～260	11
	1994	4/17	4/17	nd～450	不詳 (25) 注
	1995	4/18	4/18	nd～72	不詳 (17) 注
	1996	1/18	1/18	nd～62.5	不詳 (62.5) 注
	1997	3/18	3/18	nd～152	不詳 (26) 注
	1998	2/18	2/18	nd～230	不詳 (69) 注
	2006	28/57	10/19	nd～84	10
	2008	29/43	29/43	nd～94	7.9
	2024	23/33	23/33	nd～35	0.33

(注) 水質・底質モニタリングの結果であり、検出下限値に関する記録が残されておらず、検出された場合には参考値として検出されたなかでの最小値を括弧内に記載した。

2024 年度に調査を行った地点のうち 25 地点は、1977 年度、1993 年度、2006 年度又は 2008 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 22 地点で検出され、3 地点が不検出であった。過年度に検出された 22 地点中 17 地点は 2024 年度も検出され、過年度に検出された 22 地点中 5 地点は 2024 年度に検出されなかった。過年度に不検出であった 3 地点は、2024 年度は検出下限値を下げて測定したが不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	市原・姉崎海岸	1993	18	11	12	10
		2006	※6	※8	※7	1
		2024		3.3		0.33
②	荒川河口 (江東区)	1993	nd	nd	12	10
		2008		35		7.9
		2024		19		0.33
③	隅田川河口 (港区)	1993	30	28	28	10
		2008		26		7.9
		2024		22		0.33
④	鶴見川亀の子橋 (横浜市)	2006	78	84	82	1
		2024		35		0.33
⑤	横浜港	1977	30	40	30	記録なし
		1993	13	18	15	10
		2008		15		7.9
		2024		5.5		0.33
⑥	多摩川河口 (川崎市)	1977	60	70	100	記録なし
		1993	nd	nd	nd	11
		2024		9.6		0.33

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
⑦	川崎港京浜運河扇町地先	1977	50	110	60	記録なし
		1993	nd	nd	nd	11
		2008		26		7.9
		2024		6.8		0.33
⑧	犀川河口 (金沢市)	1993	70	100	97	9.6
		2006	33	48	57	4
		2008		31		7.9
		2024		6.2		0.33
⑨	笙の川三島橋 (敦賀市)	1993	nd	nd	nd	9.5
		2008		10		7.9
		2024		nd		0.33
⑩	衣浦港	1977	nd	nd	nd	6
		1993	76	76	49	9.5
		2024		nd		0.33
⑪	名古屋港潮見ふ頭西	1977	nd	8	10	6
		1993	67	63	60	9.5
		2006	19	※6	※4	4
		2008		12		7.9
		2024		nd		0.33
⑫	四日市港	1977	nd	nd	nd	6
		1993	※7.3	nd	nd	5.0
		2006	42	13	30	6
		2008		14		7.9
		2024		1.7		0.33
⑬	琵琶湖唐崎沖中央	1977	nd	nd	nd	10
		1993	nd	nd	nd	9.5
		2008		nd		7.9
		2024		nd		0.33
⑭	桂川宮前橋 (京都市)	2008		94		7.9
		2024		24		0.33
⑮	大和川河口 (堺市)	1993	90	110	120	10
		2008		51		7.9
		2024		15		0.33
⑯	大川毛馬橋 (大阪市)	1993	49	100	140	10
		2006	10	27	15	9
		2024		12		0.33
⑰	大阪港	1977	70	40	150	記録なし
		1993	180	260	250	10
		2006	40	46	29	9
		2008		15		7.9
		2024		19		0.33
⑱	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	1993	54	19	---	14
		2006	nd	nd	nd	4
		2008		9.6		7.9
		2024		5.9		0.33
⑲	水島沖	1977	nd	nd	nd	500
		1993	26	---	---	15
		2008		9.3		7.9
		2024		1.6		0.33
⑳	徳山湾	1993	nd	nd	nd	9.5
		2006	nd	nd	nd	4
		2008		nd		7.9
		2024		nd		0.33
㉑	萩沖	1993	nd	nd	nd	9.5
		2006	nd	nd	nd	4
		2008		31		7.9
		2024		nd		0.33
㉒	新居浜港	1993	nd	nd	nd	10
		2024		nd		0.33
㉓	洞海湾	1977	nd	nd	nd	130
		1993	nd	nd	20	10
		2008		29		7.9
		2024		1.8		0.33

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
㊸	伊万里湾	1993	31	37	39	2.7
		2006	nd	nd	nd	4
		2008		nd		7.9
		2024		nd		0.33
㊹	緑川平木橋 (宇土市)	2008		11		7.9
		2024		3.6		0.33

(注 1) 1988 年度から 1992 年度及び 1994 年度から 1998 年度の水質・底質モニタリングにおいても 2024 年度と同一地点で調査が行われているが、検出下限値に関する記録が残されていないことから比較は行わなかった。

(注 2) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）

(注 3) ---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測扱い）

(注 4) 同一地点で調査が行われたが、欠測等により比較ができない地点は除外した。

<底質>

底質について 27 地点を調査し、検出下限値 4.7 ng/g-dry において欠測扱いとなった 5 地点を除く 22 地点全てで不検出であった。

1975 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 1～25 ng/g-dry において 10 地点で検出され、検出濃度は 350 ng/g-dry までの範囲であった。1977 年度には 39 地点を調査し、検出下限値 1～170 ng/g-dry において 19 地点で検出され、検出濃度は 240 ng/g-dry までの範囲であった。1993 年度には 56 地点を調査し、検出下限値 2 ng/g-dry において欠測扱いとなった 3 地点を除く 53 地点中 22 地点で検出され、検出濃度は 130 ng/g-dry までの範囲であった。2008 年度には 63 地点を調査し、検出下限値 0.73 ng/g-dry において欠測扱いとなった 3 地点を除く 60 地点中 41 地点で検出され、検出濃度は 19 ng/g-dry までの範囲であった。

また、水質・底質モニタリングにおいて 1988 年度から 1992 年度及び 1994 年度から 2001 年度に各年度で 15～20 地点を調査し、最も多い年度には 12 地点で検出され、水質・底質モニタリングが実施された全期間を通じての検出濃度は 130 ng/g-dry までの範囲であった。

〇りん酸トリブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	1975	34/100	10/20	nd～350	1～25
	1977	48/117	19/39	nd～240	1～170
	1988	8/22	8/22	nd～18	不詳 (0.50) 注
	1989	6/15	6/15	nd～8.3	不詳 (2.7) 注
	1990	9/17	9/17	nd～34.3	不詳 (0.32) 注
	1991	8/17	8/17	nd～14	不詳 (1.8) 注
	1992	7/15	7/15	nd～9.9	不詳 (1.9) 注
	1993	51/159	22/53	nd～130	2
	1994	10/17	10/17	nd～4.9	不詳 (0.79) 注
	1995	11/18	11/18	nd～60	不詳 (0.52) 注
	1996	9/18	9/18	nd～14.17	不詳 (0.66) 注
	1997	8/18	8/18	nd～7.84	不詳 (0.08) 注
	1998	10/18	10/18	nd～38	不詳 (2.3) 注
	1999	10/18	10/18	nd～53	不詳 (3.5) 注
	2000	9/17	9/17	nd～13	不詳 (0.61) 注
	2001	12/20	12/20	nd～52	不詳 (2.1) 注
	2008	94/173	41/60	nd～19	0.73
	2024	0/66	0/22	nd	4.7

(注) 水質・底質モニタリングの結果であり、検出下限値に関する記録が残されておらず、検出された場合には参考値として検出されたなかでの最小値を括弧内に記載した。

2024 年度に調査を行った地点のうち 22 地点は、1977 年度、1993 年度又は 2008 年度にも同一地点で調査

を行っており、過年度は 20 地点で検出され、2 地点が不検出であった。2024 年度はいずれの地点も不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
①	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	1977	nd	nd	nd	8
		1993	nd	nd	nd	0.8
		2008	---	---	---	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
②	市原・姉崎海岸	1993	※1.4	※1.2	2.5	1.0
		2008	0.94	0.88	---	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
③	荒川河口 (江東区)	1993	2.1	2.8	2.3	1.0
		2008	2.7	2.1	1.9	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
④	隅田川河口 (港区)	1993	2.0	2.7	※1.4	1.0
		2008	1.4	2.1	2.2	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑤	横浜港	1977	4.0	4.4	7.4	記録なし
		1993	4.8	2.9	7.8	1.0
		2008	nd	nd	1.0	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑥	多摩川河口 (川崎市)	1977	2.7	4.3	3.3	記録なし
		1993	nd	nd	nd	0.98
		2008	1.6	1.1	1.3	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑦	川崎港京浜運河扇町地先	1977	6.7	6.7	1.9	記録なし
		1993	nd	nd	nd	1.3
		2008	2.1	2.6	1.6	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑧	清水港	1993	nd	nd	nd	2.0
		2008	0.82	0.77	nd	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑨	衣浦港	1977	4.6	6.6	6.8	記録なし
		1993	nd	nd	nd	0.74
		2008	1.2	1.1	7.2	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑩	名古屋港潮見ふ頭西	1977	4.5	4.5	6.7	記録なし
		1993	nd	nd	nd	0.67
		2008	1.3	1.7	2.5	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑪	琵琶湖南比良沖中央	2008	1.2	0.88	1.1	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑫	琵琶湖唐崎沖中央	1977	nd	nd	nd	1
		1993	nd	nd	nd	1.6
		2008	0.82	0.99	0.88	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑬	桂川宮前橋 (京都市)	2008	nd	nd	0.74	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑭	大大川毛馬橋 (大阪市)	1993	4	8	6	3
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑮	大阪港	1977	nd	nd	nd	1
		1993	130	110	110	8
		2008	2.3	1.8	2.0	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑯	大和川大正橋 (王寺町)	2008	1.5	nd	nd	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑰	徳山湾	1993	nd	nd	nd	0.33
		2008	4.4	2.9	1.8	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
⑮	萩沖	1993	nd	nd	nd	0.33
		2008	nd	nd	nd	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑯	高松港	1993	4.7	※1.3	6.6	0.4
		2008	3.8	1.6	1.6	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
⑳	洞海湾	1977	nd	nd	nd	170
		1993	8.9	7.0	9.5	3.4
		2008	1.5	1.0	1.1	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7
㉑	那覇港	1993	nd	nd	nd	1
		2008	nd	1.7	1.6	0.73
		2024	nd	nd	nd	4.7

(注 1) 1988 年度から 1992 年度及び 1994 年度から 2001 年度の水質・底質モニタリングにおいても 2024 年度と同一地点で調査が行われているが、検出下限値に関する記録が残されていないことから比較は行わなかった。

(注 2) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）

(注 3) ---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測扱い）

(注 4) 同一地点で調査が行われたが、欠測等により比較ができない地点は除外した。

< 大気 >

大気について 17 地点を調査し、検出下限値 0.067 ng/m³ において欠測扱いとなった 1 地点を除く 16 地点中 11 地点で検出され、検出濃度は 0.35 ng/m³ までの範囲であった。

1993 年度には 18 地点を調査し、検出下限値 1 ng/m³ において欠測扱いとなった 4 地点を除く 14 地点中 6 地点で検出され、検出濃度は 45 ng/m³ までの範囲であった。1997 年度には 17 地点を調査し、検出下限値 0.2 ng/m³ において欠測扱いとなった 2 地点を除く 15 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は 7.5 ng/m³ までの範囲であった。

○りん酸トリブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	1993	9/39	6/14	nd～45	1
	1998	29/40	13/15	nd～7.5	0.2
	2024	18/48	11/16	nd～0.35	0.067

2024 年度に調査を行った ~~18~~ 地点のうち 3 地点は、1993 年度又は 1998 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 2 地点で検出され、1 地点が不検出であった。過年度に検出された 2 地点中 1 地点は 2024 年度に過年度に対して低値の濃度で検出され、他の 1 地点は、2024 年度過年度に検出された濃度に対して低値の検出下限値において不検出であったことから、両地点においては減少が示唆される。過年度に不検出であった 1 地点は、2024 年度は検出下限値を下げて測定して検出された。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/m ³)			報告時検出下限値 (ng/m ³)
①	神奈川県環境科学センター（平塚市）	1993	※0.4	※0.6	※0.5	0.2
		1998	3.5	7.5	0.5	0.1
		2024	0.071	nd	nd	0.067
②	長野県環境保全研究所（長野市）	1993	4.2	5.0	3.1	1.0
		1998	0.61	0.61	1.1	0.30
		2024	nd	nd	nd	0.067
③	兵庫県環境研究センター（神戸市）	1993	nd	nd	nd	1.0
		2024	0.11	nd	0.097	0.067

- (注1) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）
 (注2) ---：測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことにより集計の対象から除外された検体（欠測扱い）
 (注3) 同一地点で調査が行われたが、欠測等により比較ができない地点は除外した。

【参考：りん酸トリブチル】

- ・用途：希金属（白金、ウラン）の抽出溶媒、製紙用及び繊維加工用の消泡剤並びに合成ゴム用可塑剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 2019年度：1,000 t 未満
 2020年度：1,000 t 未満
 2021年度：1,000 t 未満
 2022年度：1,000 t 未満
 2023年度：1,000 t 未満

・PRTR排出量：PRTR集計結果（kg/年）ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	0	1,164	0	0	1,164	6,229	7,393
2002	0	1,246	0	0	1,246	71	1,317
2003	1	1,081	0	0	1,082	1,215	2,297
2004	1	320	0	0	321	2	323
2005	1	20	0	0	21	-	21
2006	1	17	0	0	18	-	18
2007	1	15	0	0	16	7	23
2008	1	18	0	0	19	1	20
2009	0	0	0	0	0	197	197
2010	2,100	12	0	0	2,113	0	2,113
2011	1	7	0	0	7	14	21
2012	70	6	0	0	76	18	94
2013	54	6	0	0	60	12	72
2014	33	6	0	0	39	-	39
2015	0	5	0	0	5	-	5
2016	0	5	0	0	5	-	5
2017	0	5	0	0	6	-	6
2018	0	9	0	0	9	-	9
2019	2	6	0	0	8	-	8
2020	0	6	0	0	6	0	6
2021	0	6	0	0	6	0	6
2022	0	4	0	0	4	0	4
2023	0	0	0	0	0	6	6

(注) -：推計値がないことを意味する。

- ・生分解性：難分解性（標準報（試験期間 14 日間、被試験物質 30mg/L、活性汚泥 100mg/L）、BODによる分解度：(41)^注 %、0 %、TOCによる分解度：2 %、4 %、GCによる分解度：11 %、9 %）^{1) 注1)}
 (注) 括弧付きで示した値は、参考値とされた値であることを意味する。
- ・濃縮性：濃縮性がない又は低いと判断される物質（コイ BCF：第1濃度区(5.5)^注倍～10倍（0.06 mg/L、6週間）、第2濃度区(6.9)^注倍～(20)^注倍（0.006 mg/L、6週間）¹⁾
 (注) 括弧付きで示した値は精度よく定量できない範囲の値であることを意味する。
- ・媒体別分配予測：水質 27.1 %、底質 1.35 %、大気 0.525 %、土壌 71.0 %^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 400～1,240 mg/kg、マウス（経口）²⁾³⁾
 LC₅₀ = 1,300 mg/m³、マウス（吸入）²⁾³⁾⁴⁾
- ・反復投与毒性等：無毒性量等（経口）= 8.9 mg/kg/日（根拠：NOEL = 8.9 mg/kg/日）⁴⁾
 NOEL = 雄は 8.9 mg/kg/日、雌は 12 mg/kg/日（200 ppm）^{3)4)v)}；ラットに 0、200、700 又は 3,000 ppm の濃度（雄は 0、8.9、33 又は 143 mg/kg/日、雌は 0、12、42 又は 182 mg/kg/日に相当）で 2 年間混餌投与した結果、雌雄の 300 ppm 群で体重増加の有意な抑制を認め、雄の 700 ppm 群でも軽度な体重増加の抑制がみられた。また、700 ppm 以上の群の膀胱移行上皮で用量に依存した過形成の発生がみられ、雄の 700 ppm 以上の群及び雌の 3,000 ppm 群で有意な発生率であった。^{2)3)4)5)v)}
- ・発がん性：GHS 分類：区分 2（ヒトに対する発がん性が疑われる。）⁵⁾

- ・生態影響：PNEC = 0.021 mg/L（根拠：72h-LC₅₀（オオミジンコ）= 2.1 mg/L、アセスメント係数 100）⁴⁾
 95d-NOEC = 0.82 mg/L：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）、成長阻害^{2)3)5)v)}
 21d-NOEC = 0.87 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、繁殖阻害²⁾³⁾
 72h-EC₁₀ = 0.92 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害²⁾
 96h-LC₅₀ = 1.7 mg/L：ヨコエビ（*Gammarus pseudolimnaeus*）²⁾³⁾⁵⁾
 72h-LC₅₀ = 2.1 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）²⁾⁴⁾
 72h-EC₅₀ = 2.8 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害²⁾⁴⁾
 96h-LC₅₀ = 6.4 mg/L：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）^{v)}
- ・規制
 - [化審法] 法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（394 リン酸トリブチル）
 - [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（354 リン酸トリ-*n*-ブチル）
 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（462 リン酸トリ-*n*-ブチル）
 法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（515 リン酸トリブチル）
 - [水濁法] 法第 2 条第 2 項第 2 号、施行令第 3 条、生活環境項目（12 窒素又はりんの含有量（湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。））

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1980 年 12 月 25 日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、リン酸トリ-*n*-ブチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 141 (2008)
- 3) OECD, Tributyl Phosphate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2004)
- 4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 4 巻 (2015)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、リン酸トリ-*n*-ブチル（2019 年度）

- 注 1) 分解性は、分解度試験によって得られた結果。分解度試験とは「新規化学物質等に係る試験の方法について（昭和 49 年 7 月 13 日 環 保 業 第 5 号、薬 発 第 615 号、49 基 局 第 392 号）」若しくは「新規化学物質等に係る試験の方法について（平成 15 年 11 月 21 日 薬 食 発 第 1121002 号、平成 15・11・13 製 局 第 2 号、環 保 企 発 第 031121002 号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをいい、「標準法」、「逆転法」、「Closed Bottle 法」及び「修正 SCAS 法」とはそれぞれ OECD テストガイドラインの 301C、302C、301D 及び 302A に準拠して実施されたものをいう。
- 注 2) 媒体別分配予測は、U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 における Level III Fugacity Model では、水質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合における媒体別分配を予測している。
- 注 3) 生産量・輸入量において、届出がなされている物質ではあるが、届出事業者数が 2 社以下の場合に事業者の秘密保持のために「X t」と表示している。
- 注 4) 「大防法」とは「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）をいう。
- 注 5) 「水濁法」とは「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）をいう。

●参考文献（全物質共通）

- i) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、化学物質総合情報提供システム（NITE-CHIRP）
（https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop、2024 年 10 月閲覧）
- ii) 経済産業省、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）に基づく監視化学物質、優先評価化学物質、一般化学物質届出結果の公表値
（http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/volume_index.html、2024 年 10 月閲覧）
- iii) 環境省、「化管法ホームページ（PRTR インフォメーション広場）」「全国の届出排出量・移動量」及び「届出外排出量」、「対象化学物質一覧」（<http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html>、2024 年 10 月閲覧）
- iv) U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 （<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-tm-estimation-program-interface>）における Level III Fugacity Model
- v) European Chemicals Agency (ECHA), REACH registered substance factsheets （<https://echa.europa.eu/>、2025 年 10 月閲覧）
- vi) 環境省、生態影響試験結果一覧（令和 7 年 3 月版）（<http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html>、2025 年 10 月閲覧）

2024 年度 詳細環境調査結果

1. 調査目的	73
2. 調査対象物質	73
3. 調査地点及び実施方法	81
(1) 試料採取機関	81
(2) 調査地点及び調査対象物質	82
(3) 試料の採取方法	82
(4) 分析法	82
(5) 検出下限値	82
表 1-1 2024 年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（水質）	84
表 1-2 2024 年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（底質）	85
図 1-1 2024 年度詳細環境調査地点（水質・底質）	86
図 1-2 2024 年度詳細環境調査地点（水質・底質）詳細	87
表 1-3 2024 年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（大気）	95
図 1-3 2024 年度詳細環境調査地点（大気）	96
図 1-4 2024 年度詳細環境調査地点（大気）詳細	97
4. 調査結果の概要	99
表 2 2024 年度詳細環境調査検出状況・検出下限値一覧表	100
[1] アクリル酸及びそのエステル類	102
[1-1] アクリル酸	102
[1-2] アクリル酸メチル	102
[1-3] アクリル酸エチル	108
[1-4] アクリル酸ブチル	110
[1-5] アクリル酸イソブチル	112
[1-6] アクリル酸 <i>tert</i> -ブチル	113
[1-7] アクリル酸オクチル	114
[1-8] アクリル酸イソオクチル類	115
[1-8-1] アクリル酸2-エチルヘキシル	116
[1-9] アクリル酸イソノニル類	117
[1-10] アクリル酸デシル	118
[1-11] アクリル酸ドデシル	119
[1-12] アクリル酸オクタデシル	120
[2] アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が10から16までのもの）	121
[2-1] 1-デカノール	121
[2-2] 1-ウンデカノール	123
[2-3] 1-ドデカノール	124
[2-4] 1-トリデカノール	126
[2-5] 1-テトラデカノール	127
[2-6] 1-ペンタデカノール	128
[2-7] 1-ヘキサデカノール	128
[3] アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8、9、10、12、14、16又は18のもの）及びその塩類	130
[3-1] オクチル硫酸及びその塩類	130
[3-2] ノニル硫酸及びその塩類	130
[3-3] デシル硫酸及びその塩類	130
[3-4] ドデシル硫酸及びその塩類	131
[3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類	131
[3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類	131
[3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類	131
[4] <i>N,N,N</i> -トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類	135

1. 調査目的

詳細環境調査は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（1973 年法律第 117 号）（以下「化審法」という。）の優先評価化学物質のリスク評価等を行うため、一般環境中における全国的なばく露評価について検討するための資料とすることを目的としている。

2. 調査対象物質

2024 年度の詳細環境調査においては、4 物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との組合せは次のとおりである。





物質 調査 番号	調査対象物質	化審法指定区分 ^{注1}		化管法指定区分 ^{注2, 3}			調査媒体		
		改正前	改正後	2000 年～	2008 年～	2021 年～	水 質	底 質	大 気
[1]	アクリル酸及びそのエステル類								
	[1-1] アクリル酸		優先評価	第一種 3	第一種 4	第一種 6	○		○
	[1-2] アクリル酸メチル	第二種監視	優先評価	第一種 6	第一種 8	第一種 10	○		
	[1-3] アクリル酸エチル	第二種監視	優先評価	第一種 4	第一種 3	第一種 4	○		
	[1-4] アクリル酸ブチル	第三種監視			第一種 7	第一種 9	○		
	[1-5] アクリル酸イソブチル						○		
	[1-6] アクリル酸 <i>tert</i> -ブチル						○		
	[1-7] アクリル酸オクチル						○		
	[1-8] アクリル酸イソオクチル類						○		
	[1-8-1] アクリル酸 2-エチルヘキシル					第一種 5	○		
	[1-9] アクリル酸イソノニル類						○		
	[1-10] アクリル酸デシル						○		
	[1-11] アクリル酸ドデシル						○		
	[1-12] アクリル酸オクタデシル						○		
[2]	アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が 10 から 16 までのもの）		優先評価						
	[2-1] 1-デカノール				第一種 257	第一種 34		○	
	[2-2] 1-ウンデカノール							○	
	[2-3] 1-ドデカノール				第一種 273	第一種 315		○	
	[2-4] 1-トリデカノール							○	
	[2-5] 1-テトラデカノール							○	
	[2-6] 1-ペンタデカノール							○	
	[2-7] 1-ヘキサデカノール							○	
[3]	アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が 8、9、10、12、14、16 又は 18 のもの）及びその塩類		優先評価						
	[3-1] オクチル硫酸及びその塩類						○		
	[3-2] ノニル硫酸及びその塩類						○		
	[3-3] デシル硫酸及びその塩類						○		
	[3-4] ドデシル硫酸及びその塩類				第一種 275	第一種 318	○		
	[3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類						○		
	[3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類						○		
	[3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類						○		
[4]	<i>N,N,N</i> -トリメチルドデカン-1-アミンウムの塩類		優先評価			第一種 341	○		

（注 1）「化審法指定区分」における「改正前」とは 2009 年 5 月 20 日の法律改正（2011 年 4 月 1 日施行）前の指定を、「改正後」とは同改正後の指定をそれぞれ意味する。

（注 2）「化管法」とは「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 86 号）をいう。以下同じ。






（注 3）「化管法指定区分」における「2000 年～」とは 2000 年 6 月 7 日の政令制定時の指定を、「2008 年～」とは 2008 年 11 月 21 日の政令改正後の指定を、「2021 年～」とは 2021 年 10 月 20 日の政令改正後の指定をそれぞれ意味する。なお、それぞれの欄における数字は第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質としての政令番号を意味する。

詳細環境調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。





[1] アクリル酸及びそのエステル類 Acrylic acid and its esters	
[1-1] アクリル酸 Acrylic acid	 分子式 : C₃H₄O₂ CAS : 79-10-7 既存化 : 2-984 MW : 72.06 mp : 14℃¹⁾ bp : 141℃ (101 kPa)²⁾ sw : 混和¹⁾ 比重等 : 1.0621 (16℃/4℃)¹⁾ logPow : 0.46 (20℃)²⁾
[1-2] アクリル酸メチル Methyl acrylate	 分子式 : C₄H₆O₂ CAS : 96-33-3 既存化 : 2-987 MW : 86.09 mp : -76.5℃³⁾ bp : 80.5℃³⁾ sw : 49.4 g/L (25℃)³⁾ 比重等 : 0.9561 (20℃/4℃)³⁾ logPow : 0.739 (25℃)²⁾
[1-3] アクリル酸エチル Ethyl acrylate	 分子式 : C₅H₈O₂ CAS : 140-88-5 既存化 : 2-988 MW : 100.12 mp : -71.2℃²⁾ bp : 99.8℃ (101 kPa)²⁾ sw : 20 g/L (20℃)⁴⁾ 比重等 : 0.9405 (20℃/4℃)⁵⁾ logPow : 1.18 (25℃)²⁾
[1-4] アクリル酸ブチル Butyl acrylate	 分子式 : C₇H₁₂O₂ CAS : 141-32-2 既存化 : 2-989^{註1)} MW : 128.17 mp : -64.6℃⁴⁾ bp : 138～148℃ (760 mmHg)⁴⁾ sw : 1.7 g/L (20℃)²⁾ 比重等 : 0.8898 g/cm³ (20℃)⁴⁾ logPow : 2.38 (25℃)²⁾

(注1) アクリル酸アルキル (アルキル基の炭素数が3又は4のもの)






(略称) 「CAS」とはCAS登録番号を、「既存化」とは既存化学物質名簿における番号を、「MW」とは分子量を、「mp」は融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「比重等」とは比重(単位なし)又は密度(単位あり)を、「logPow」とはオクタノール/水分分配係数をそれぞれ意味する。






[1-5] アクリル酸イソブチル Isobutyl acrylate		分子式 : C₇H₁₂O₂ CAS : 106-63-8 既存化 : 2-989^{註1} MW : 128.17 mp : -61°C²⁾ bp : 135°C (101 kPa)²⁾ sw : 1.8 g/L (25°C)²⁾ 比重等 : 0.8896 (20°C/4°C)²⁾ logPow : 2.38 (25°C)²⁾
[1-6] アクリル酸 <i>tert</i>-ブチル <i>tert</i>-Butyl acrylate		分子式 : C₇H₁₂O₂ CAS : 1663-39-4 既存化 : 2-989^{註1} MW : 128.17 mp : -69°C²⁾ bp : 119.2°C (101 kPa)²⁾ sw : 2.01 g/L (25°C)²⁾ 比重等 : 0.89 g/cm³ (10°C)、0.87 g/cm³ (30°C)²⁾ logPow : 2.32 (25°C)²⁾
[1-7] アクリル酸オクチル Octyl acrylate		分子式 : C₁₁H₂₀O₂ CAS : 2499-59-4 既存化 : 2-990^{註2} MW : 184.28 mp : 不詳 bp : 229.0°C (760 mmHg)⁶⁾ sw : 不詳 比重等 : 0.9±0.1 g/cm³⁶⁾ logPow : 不詳
[1-8] アクリル酸イソオクチル類 Isooctyl acrylates		分子式 : C₁₁H₂₀O₂ CAS : 29590-42-9 既存化 : 2-990^{註2} MW : 184.28 mp : -90°C未満 (100.4 kPa)²⁾ bp : 196.8 (761.8 mmHg)²⁾ sw : 12.44 mg/L (23.1°C)²⁾ 比重等 : 0.885 g/cm³ (20°C)²⁾ logPow : 4.5~4.7 (25°C)²⁾
[1-8-1] アクリル酸 2-エチルヘキシル 2-Ethylhexyl acrylate		分子式 : C₁₁H₂₀O₂ CAS : 103-11-7 既存化 : 2-990^{註2} MW : 184.28 mp : -90°C²⁾ bp : 215°C (101 kPa)²⁾ sw : 9.6 mg/L (25°C)²⁾ 比重等 : 0.88 (20°C)²⁾ logPow : 4.64 (25°C)²⁾

(注2) アクリル酸アルキル (アルキル基の炭素数が8から18までのもの)





[1-9] アクリル酸イソノニル類 Isononyl acrylates		分子式 : C₁₂H₂₂O₂ CAS : 51952-49-9 既存化 : 2-990^{注2} MW : 198.30 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 不詳
[1-10] アクリル酸デシル Decyl acrylate		分子式 : C₁₃H₂₄O₂ CAS : 2156-96-9 既存化 : 2-990^{注2} MW : 212.33 mp : -100°C⁷⁾ bp : 158°C (50 mmHg)⁷⁾ sw : 溶けにくい⁸⁾ 比重等 : 0.8900 (20°C/4°C)⁷⁾ logPow : 不詳
[1-11] アクリル酸ドデシル Dodecyl acrylate		分子式 : C₁₅H₂₈O₂ CAS : 2156-97-0 既存化 : 2-990^{注2} MW : 240.38 mp : -8°C²⁾ bp : 119.65°C (0.099 kPa)²⁾ sw : 1 µg/L 以下 (20°C)²⁾ 比重等 : 0.872 (20°C/4°C)²⁾ logPow : 6.5 超 (23°C)²⁾
[1-12] アクリル酸オクタデシル Octadecyl acrylate		分子式 : C₂₁H₄₀O₂ CAS : 4813-57-4 既存化 : 2-990^{注2} MW : 324.54 mp : 20°C (101 kPa)²⁾ bp : 160°C (0.3 kPa)²⁾ sw : 20 µg/L 未満²⁾ 比重等 : 0.904 (20°C/4°C)²⁾ logPow : 6.5 超 (23°C)²⁾
[2] アルカノール類 (アルキル基が直鎖で炭素数が 10 から 16 までのもの) Alkanols (The alkyl group is linear with 10 - 16 carbon atoms.)	[2-1] 1-デカノール 1-Decanol	分子式 : C₁₀H₂₂O CAS : 112-30-1 既存化 : 2-217^{注3} MW : 158.28 mp : 6.4°C⁹⁾ bp : 229°C (101.3 kPa)⁹⁾ sw : 36 mg/L (20°C)⁹⁾ 比重等 : 0.83 g/cm³²⁾ logPow : 4.5⁹⁾

(注3) アルカノール (アルキル基の炭素数が 5 から 38 までのもの)

[2-2] 1-ウンデカノール 1-Undecanol		分子式 : $C_{11}H_{24}O$ CAS : 112-42-5 既存化 : 2-217^{注3} MW : 172.31 mp : 12.5°C (1 atm)²⁾ bp : 247°C (101 kPa)²⁾ sw : 6.3 mg/L (20°C)²⁾ 比重等 : 0.83 g/cm³ (20°C)²⁾ logPow : 4.72 (25°C)²⁾
[2-3] 1-ドデカノール 1-Dodecanol		分子式 : $C_{12}H_{26}O$ CAS : 112-53-8 既存化 : 2-217^{注3} MW : 186.34 mp : 24°C (101 kPa)²⁾ bp : 229°C (101 kPa)²⁾ sw : 1 mg/L (23°C)²⁾ 比重等 : 0.9003 g/cm³ (16°C)²⁾ logPow : 5.4 (23°C)²⁾
[2-4] 1-トリデカノール 1-Tridecanol		分子式 : $C_{13}H_{28}O$ CAS : 112-70-9 既存化 : 2-217^{注3} MW : 200.37 mp : 32°C (97.69 kPa)²⁾ bp : 233.3°C (97.59 kPa)²⁾ sw : 131.86 mg/L (25°C)²⁾ 比重等 : 0.82 g/cm³ (20°C)²⁾ logPow : 4.25 (25°C)²⁾
[2-5] 1-テトラデカノール 1-Tetradecanol		分子式 : $C_{14}H_{30}O$ CAS : 112-72-1 既存化 : 2-217^{注3} MW : 214.39 mp : 39°C (約 1 atm)²⁾ bp : 294°C (約 1 atm)²⁾ sw : 1.3 mg/L (23°C)²⁾ 比重等 : 0.9005 g/cm³ (16°C)²⁾ logPow : 5.5 (25°C)²⁾
[2-6] 1-ペンタデカノール 1-Pentadecanol		分子式 : $C_{15}H_{32}O$ CAS : 629-76-5 既存化 : 2-217^{注3} MW : 228.42 mp : 43.9°C¹⁰⁾ bp : 300°C (760 mmHg)¹⁰⁾ sw : 0.103 mg/L (25°C)¹¹⁾ 比重等 : 0.829 (50°C)¹⁰⁾ logPow : 不詳

[2-7] 1-ヘキサデカノール 1-Hexadecanol 	分子式 : $C_{16}H_{34}O$ CAS : 36653-82-4 既存化 : 2-217^{注3} MW : 242.45 mp : 51°C (約 101 kPa)²⁾ bp : 319°C (101 kPa)²⁾ sw : 1 mg/L 未満 (23°C)²⁾ 比重等 : 0.889 g/cm³ (16°C)²⁾ logPow : 6.7²⁾
[3] アルキル硫酸 (アルキル基の炭素数が 8、9、10、12、14、16 又は 18 のもの) 及びその塩類 Alkyl sulfates (The alkyl group has 8, 9, 10, 12, 14, 16 or 18 carbon atoms.) and those salts	
[3-1] オクチル硫酸及びその塩類 Octyl sulfate and its salts 	分子式 : $C_8H_{18}O_4S$ CAS : 110-11-2、142-31-4 等 既存化 : 2-1679^{注4} MW : 210.29 mp : 210°C (ナトリウム塩)¹⁾ bp : 218°C で分解 (103.6 kPa、ナトリウム塩)²⁾ sw : 450 g/L 超 (20°C、ナトリウム塩)²⁾ 比重等 : 1.268 (20°C/4°C、ナトリウム塩)²⁾ logPow : -2.31 以下 (20°C、ナトリウム塩)²⁾
[3-2] ノニル硫酸及びその塩類 Nonyl sulfate and its salts 	分子式 : $C_9H_{20}O_4S$ CAS : 63283-24-9、1072-15-7 等 既存化 : 2-1679^{注4} MW : 224.32 mp : 181°C で分解 (ナトリウム塩)²⁾ bp : 同上 sw : 180 g/L (20°C、ナトリウム塩)²⁾ 比重等 : 1.207 (20°C/4°C、ナトリウム塩)²⁾ logPow : 不詳
[3-3] デシル硫酸及びその塩類 Decyl sulfate and its salts 	分子式 : $C_{10}H_{22}O_4S$ CAS : 142-98-3、142-87-0 等 既存化 : 2-1679^{注4} MW : 238.35 mp : 168°C 以上で分解 (ナトリウム塩)²⁾ bp : 約 215°C で分解 (102.6 kPa、ナトリウム塩)²⁾ sw : 330 g/L 超 (20°C、ナトリウム塩)²⁾ 比重等 : 1.209 (20°C/4°C、ナトリウム塩)²⁾ logPow : 1.72 (25°C、ナトリウム塩)²⁾
[3-4] ドデシル硫酸及びその塩類 Dodecyl sulfate and its salts 	分子式 : $C_{12}H_{26}O_4S$ CAS : 151-41-7、151-21-3 等 既存化 : 2-1679^{注4} MW : 266.40 mp : 205°C (ナトリウム塩)²⁾ bp : 約 216°C (102.2 kPa、ナトリウム塩)²⁾ sw : 130 g/L 超 (20°C、ナトリウム塩)²⁾ 比重等 : 0.63 g/cm³ (ナトリウム塩)²⁾ logPow : -2.03 以下 (20°C、ナトリウム塩)²⁾

(注 4) アルカノール又はアルケノールのモノ又はジ硫酸エステル及びその塩 (アルカノール又はアルケノールの炭素数は 6 から 24 までのもので、かつ、ナトリウム、カリウム、マグネシウム又はカルシウム塩に限る。)

[3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類 Tetradecyl sulfate and its salts		分子式 : C₁₄H₃₀O₄S CAS : 4754-44-3、1191-50-0 等 既存化 : 2-1679 ^{注4} MW : 294.46 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 2.37 g/L (25℃、ナトリウム塩) ¹²⁾ 比重等 : 不詳 logPow : 0.7 (ナトリウム塩) ¹²⁾
[3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類 Hexadecyl sulfate and its salts		分子式 : C₁₆H₃₄O₄S CAS : 143-02-2、1120-01-0 等 既存化 : 2-1679 ^{注4} MW : 322.51 mp : 193℃ (ナトリウム塩) ¹²⁾ bp : 不詳 sw : 300 mg/L (30℃、ナトリウム塩) ¹²⁾ 比重等 : 1 (20℃、ナトリウム塩) ¹⁰⁾ logPow : 不詳
[3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類 Octadecyl sulfate and its salts		分子式 : C₁₈H₃₈O₄S CAS : 143-03-3、1120-04-3 等 既存化 : 2-1679 ^{注4} MW : 350.56 mp : 176～180℃又は211～213℃ (ナトリウム塩) ⁶⁾ bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 不詳
[4] <i>N,N,N</i>-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類 <i>N,N,N</i>-Trimethyldodecan-1-aminium salts	 X⁻はハロゲン等の陰イオンを意味する。	分子式 : C₁₅H₃₄ClN (塩化物)、 C₁₅H₃₄BrN (臭化物) CAS : 112-00-5、1119-94-4 等 既存化 : 2-184 ^{注5}、9-1971 ^{注6} MW : 263.89 (塩化物)、308.35 (臭化物) mp : 246℃ (塩化物)、217℃ (101 kPa、臭化物) ²⁾ bp : 不詳 sw : 954 g/L 超 (20℃、臭化物) ²⁾ 比重等 : 1.00 g/cm³ (20℃、塩化物)、1.17 (20℃/4℃、臭化物) ²⁾ logPow : -1.6～-1.2 (20℃、臭化物) ²⁾

(注5) *N,N,N*-テトラアルキル又はアルケニル第4級アンモニウム塩 (アルキル基又はアルケニル基の1以上は炭素数が8から24までで、他は炭素数が1から5までのもの)

(注6) 脂肪族アルキル第4級アンモニウム塩 (脂肪族アルキル基の1以上は炭素数が8から24までで、他は炭素数が1から5までのもの)

参考文献

- 1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、アクリル酸、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 108 (2008)
- 2) European Chemicals Agency (ECHA), REACH registered substance factsheets (<https://echa.europa.eu/>、2025 年 10 月閲覧)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、アクリル酸メチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 95 (2008)
- 4) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 11 巻 (2013)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)、アクリル酸エチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 59 (2007)
- 6) Royal Society of Chemistry, ChemSpider (<http://www.chemspider.com/>、2025 年 10 月閲覧)
- 7) 消防庁、危険物災害等情報支援システム (<https://internal.fdma.go.jp/kiken-info/list/list.html>、2025 年 10 月閲覧)
- 8) International Labour Organization (ILO), *n*-Decyl acrylate, International Chemical Safety Cards (ICSCs), ICSC: 0368 (2003)
- 9) 経済産業省、優先評価化学物質通し番号 170 デカン-1-オール、優先評価化学物質のリスク評価 (一次) 生態影響に係る評価 II 物理化学的性状等の詳細資料 (2017 年 11 月)
- 10) U.S. National Library of Medicine, PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>、2025 年 10 月閲覧)
- 11) U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 (<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-tm-estimation-program-interface>)
- 12) OECD, Alkyl sulfates, Alkane sulfonates, alpha-Olefin Sulfonates, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)

3. 調査地点及び実施方法

(1) 試料採取機関

詳細環境調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取及び分析を委託した。

試料採取機関名	調査媒体		
	水質	底質	大気
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所	○	○	
札幌市衛生研究所	○	○	○
岩手県環境保健研究センター	○	○	
宮城県保健環境センター	○		
仙台市衛生研究所		○	○
秋田県健康環境センター	○	○	
山形県環境科学研究所	○		○
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	
栃木県保健環境センター	○		
群馬県衛生環境研究所	○	○	
埼玉県環境科学国際センター	○		○
東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所	○	○	○
横浜市環境創造局環境科学研究所	○		○
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○
新潟県保健環境科学研究所	○		
富山県生活環境文化部環境保全課及び富山県環境科学センター	○	○	
石川県保健環境センター	○	○	
長野県環境保全研究所		○	
静岡県環境衛生科学研究所	○		
愛知県環境調査センター	○	○	○
名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター	○	○	○
三重県保健環境研究所	○		○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所		○	
京都府保健環境研究所			○
京都市衛生環境研究所	○		
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課	○	○	
大阪市立環境科学研究所	○		
兵庫県環境部水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター	○		○
神戸市環境局環境保全課及び神戸市健康科学研究所	○		
奈良県景観・環境総合センター	○		
和歌山県環境衛生研究センター	○	○	
岡山県環境保健センター	○		
広島県立総合技術研究所保健環境センター	○		○
山口県環境保健センター	○		
徳島県立保健製薬環境センター			○
愛媛県立衛生環境研究所	○		
福岡県保健環境研究所	○	○	
佐賀県環境センター	○	○	○
熊本県保健環境科学研究所	○		
大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター	○	○	○
宮崎県衛生環境研究所	○	○	
鹿児島県環境保健センター	○		
沖縄県衛生環境研究所	○	○	

(注) 試料採取機関名は、2024 年度末のものである。

（２）調査地点及び調査対象物質

詳細環境調査における調査媒体別の調査対象物質（群）数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。

それぞれ媒体ごとでの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質について表 1-1、図 1-1 及び図 1-2 に、底質について表 1-2、図 1-1 及び図 1-2 に、大気について表 1-3、図 1-3 及び図 1-4 に示した。

なお、1 物質当たりの調査地点は、概ね 30 地点前後を選択した。また、調査地点の選定は、一般環境中で高濃度が予想される地域においてデータを取得するため、排出に関する情報を考慮して行うこととした。2024 年度調査の地点選定においては、PRTR 届出排出量が得られている物質について、届出排出量が上位であった地点のうち試料の採取が可能とされた地点の周辺を調査地点に含めることとした。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点数	調査地点ごとの検体数
水質	38	3	66	1
底質	22	1	27	3
大気	16	1	18	3
全媒体	43	4	90	

（３）試料の採取方法

試料の採取は、原則として、秋期（９月～１１月）の天候が安定した時期に行った。各調査地点における試料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（令和２年度版）」（２０２１年３月、環境省環境保健部環境安全課）に従って実施した。

（４）分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「詳細環境調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

（５）検出下限値

分析機関が分析データを報告した時の検出下限値は、試料の性状や利用可能な測定装置が異なることから必ずしも同一となっていないため、集計に関しては、統一の検出下限値を設定して、分析機関から報告された分析値を次の２つの手順で取りまとめた。


１）高感度の分析における検出値の不検出扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値を下回る高感度の分析を実施した場合においては、統一の検出下限値を下回った測定値について、全国集計上は不検出として取り扱うこととした（概念図①を参照）。

２）感度不足の分析における不検出値の集計対象からの除外扱い

分析機関における検出下限値が統一の検出下限値より大きい場合において、調査対象物質が検出されないときは集計の対象から除外扱いとした（概念図②を参照、欠測であった結果と合わせて「欠測扱い」という。）。

なお、詳細環境調査の分析法に採用した化学物質分析法開発調査報告書等に記載されている分析法（以下「詳細環境調査分析法」という。）において装置検出下限値（以下「IDL 判定値」という。）及び分析法の検出下限値（以下「MDL」という。）が記載されている場合においては、分析機関で測定した IDL が IDL 判定値より小さいときには、詳細環境調査分析法の MDL を当該分析機関の検出下限値とした。



分析値を取りまとめる際の概念図

表1-1 2024年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質		
		[1] アクリル酸及びそのエステル類	[3] アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8、9、10、12、14、16又は18のもの）及びその塩類	[4] <i>N,N,N</i> -トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）	○	○	○
	石狩川伊納大橋（旭川市）		○	○
	石狩川納内橋（深川市）	○	○	○
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○		○
札幌市	豊平川中沼（札幌市）	○	○	
	新川第一新川橋（札幌市）	○	○	
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）			○
宮城県	迫川二ツ屋橋（登米市）	○		
	白石川さくら歩道橋（柴田町）	○		
秋田県	秋田運河（秋田市）	○	○	○
山形県	最上川基点橋（村山市）			○
茨城県	花園川磯馴橋（北茨城市）		○	
	利根川河口かもめ大橋（神栖市）		○	
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）			○
群馬県	谷田川谷田川橋（館林市）		○	
	石田川古利根橋（太田市）	○	○	○
埼玉県	市野川徒歩橋（吉見町・川島町）	○	○	
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	○	○	
	柳瀬川志木大橋（三芳町）	○	○	○
東京都	荒川河口（江東区）	○	○	○
	隅田川河口（港区）	○	○	○
横浜市	鶴見川亀の子橋（横浜市）	○	○	○
	横浜港		○	○
	柏尾川吉倉橋（横浜市）		○	○
川崎市	多摩川河口（川崎市）		○	○
	川崎港京浜運河千鳥町地先			○
	川崎港京浜運河扇町地先	○	○	○
新潟県	信濃川下流（新潟市）	○		○
富山県	富山湾魚津市沖	○		
	小矢部川城光寺橋（高岡市）		○	
石川県	犀川河口（金沢市）	○	○	○
静岡県	潤井川くすのき橋（富士宮市）	○	○	
	清水港			○
愛知県	衣浦港			○
	名古屋港潮見ふ頭西	○		
名古屋市	新堀川日の出橋（名古屋市）	○	○	○
	堀川港新橋（名古屋市）	○	○	○
三重県	天白川大井の川橋（四日市市）	○		
京都市	桂川宮前橋（京都市）	○		
大阪府	大和川河口（堺市）	○	○	○
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）		○	
	大阪港		○	
兵庫県	高砂西港港口先	○	○	
神戸市	神戸港中央			○
奈良県	岡崎川流末（安堵町）	○		
	大和川大正橋（王寺町）			○
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○		○
岡山県	笹ヶ瀬川笹ヶ瀬橋（岡山市）	○		
	児島湾出崎東沖	○		
	水島沖	○		
広島県	広島湾大竹市御幸町地先		○	

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質		
		[1] アクリル酸及びそのエステル類	[3] アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8から18までのもの）及びその塩類	[4] N,N,N-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類
山口県	笠戸湾東豊井地先		○	
	徳山湾	○		
	萩沖	○		
愛媛県	新居浜港	○		
	沢津漁港	○		○
	伊予灘松前町北川原地先	○		
福岡市	博多湾	○	○	
佐賀県	伊万里湾	○		
熊本県	水無川産島橋（八代市）	○		
大分県	大分川河口（大分市）	○		○
宮崎県	広渡川河口海域		○	
鹿児島県	肝属川河原田橋（鹿屋市）	○	○	○
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	○		
沖縄県	那覇港		○	
	長堂川琉糖橋（豊見城市・南風原町）	○		

表1-2 2024年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質	
		[2] アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が10から16までのもの）	
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○	
札幌市	新川第一新川橋（札幌市）	○	
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	○	
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	○	
秋田県	秋田運河（秋田市）	○	
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○	
群馬県	谷田川谷田川橋（館林市）	○	
東京都	荒川河口（江東区）	○	
	隅田川河口（港区）	○	
川崎市	多摩川河口（川崎市）	○	
	川崎港京浜運河扇町地先	○	
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	○	
石川県	犀川河口（金沢市）	○	
長野県	諏訪湖湖心	○	
愛知県	衣浦港	○	
	名古屋港潮見ふ頭西	○	
名古屋市	新堀川日の出橋（名古屋市）	○	
	堀川港新橋（名古屋市）	○	
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	○	
	琵琶湖唐崎沖中央	○	
大阪府	大和川河口（堺市）	○	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○	
福岡市	博多湾	○	
佐賀県	伊万里湾	○	
大分県	大分川河口（大分市）	○	
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	○	
沖縄県	那覇港	○	



図1-1 2024年度詳細環境調査地点（水質・底質）




図1-2 (1/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図1-2 (2/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質) 詳細




図1-2 (3/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質) 詳細




図1-2 (4/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図1-2 (5/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図1-2 (6/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質) 詳細




図1-2 (7/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細




図1-2 (8/8) 2024年度詳細環境調査地点(水質・底質)詳細

表1-3 2024年度詳細環境調査地点・対象物質一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	調査対象物質
		[1-1] アクリル酸
札幌市	札幌市衛生研究所（札幌市）	○
仙台市	榴岡公園（仙台市）	○
山形県	山形県環境科学研究所（村山市）	○
埼玉県	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	○
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	○
	小笠原父島（小笠原村）	○
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）	○
川崎市	大師一般環境大気測定局（川崎市）	○
愛知県	東海市名和町一般環境大気測定局（東海市）	○
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	○
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	○
京都府	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	○
兵庫県	飾磨自動車排出ガス測定局（姫路市）	○
	網干一般環境大気測定局（姫路市）	○
広島県	大竹油見公園（大竹市）	○
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	○
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	○
大分県	大分市立三佐小学校（大分市）	○



図1-3 2024年度詳細環境調査地点（大気）




図1-4 (1/2) 2024年度詳細環境調査地点(大気)詳細




図1-4 (2/2) 2024年度詳細環境調査地点(大気)詳細

4. 調査結果の概要

検出状況・検出下限値一覧を表2に示す。なお、検出状況の概要は以下のとおりである。

水質については、全3調査対象物質（群）が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法において測定できる方法ごとに一物質群とした。

- ・[1] アクリル酸及びそのエステル類
 - [1-1] アクリル酸：全43地点
 - [1-2] アクリル酸メチル：44地点中1地点
 - [1-5] アクリル酸イソブチル：44地点中1地点
 - [1-7] アクリル酸オクチル：44地点中1地点
 - [1-8-1] アクリル酸2-エチルヘキシル：44地点中3地点
 - [1-10] アクリル酸デシル：41地点中2地点
 - [1-11] アクリル酸ドデシル：42地点中5地点
- ・[3] アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8、9、10、12、14、16又は18のもの）及びその塩類
 - [3-2] ノニル硫酸及びその塩類：35地点中1地点
 - [3-3] デシル硫酸及びその塩類：35地点中2地点
 - [3-4] ドデシル硫酸及びその塩類：35地点中21地点
 - [3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類：35地点中19地点
 - [3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類：35地点中22地点
 - [3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類：35地点中12地点
- ・[4] *N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類：30地点中12地点

底質については、1調査対象物質群が検出された。なお、構造が類似する等、同一の分析法において測定できる方法ごとに一物質群とした。

- ・[2] アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が10から16までのもの）
 - [2-1] 1-デカノール：26地点中25地点
 - [2-2] 1-ウンデカノール：26地点中3地点
 - [2-3] 1-ドデカノール：27地点中25地点
 - [2-4] 1-トリデカノール：27地点中13地点
 - [2-5] 1-テトラデカノール：27地点中26地点
 - [2-6] 1-ペンタデカノール：27地点中24地点
 - [2-7] 1-ヘキサデカノール：全27地点

大気については、1調査対象物質が検出された。

- ・[1] アクリル酸及びそのエステル類
 - [1-1] アクリル酸：全5地点

表2 2024年度詳細環境調査検出状況・検出下限値一覧表

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (ng/L)		底質 (ng/g-dry)		大気 (ng/m ³)	
		範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値
[1]	アクリル酸及びそのエステル類 ※						
	[1-1] アクリル酸	86~1,400 43/43	61			8.2~39 5/5	3.8
	[1-2] アクリル酸メチル	nd~8.8 1/44	8.1				
	[1-3] アクリル酸エチル	nd 0/44	3.6				
	[1-4] アクリル酸ブチル	nd 0/44	4.3				
	[1-5] アクリル酸イソブチル	nd~4.3 1/44	1.1				
	[1-6] アクリル酸 <i>tert</i> -ブチル	nd 0/44	2.1				
	[1-7] アクリル酸オクチル	nd~28 1/44	17				
	[1-8] アクリル酸イソオクチル類	nd 0/26	72				
	[1-8-1] アクリル酸 2-エチルヘキシル	nd~210 3/44	23				
	[1-9] アクリル酸イソノニル類	nd 0/40	48				
	[1-10] アクリル酸デシル	nd~110 2/41	54				
	[1-11] アクリル酸ドデシル	nd~78 5/42	22				
	[1-12] アクリル酸オクタデシル	nd 0/42	17				
[2]	アルカノール類 (アルキル基が直鎖で炭素数が 10 から 16 までのもの) ※						
	[2-1] 1-デカノール			nd~360 25/26	1.1		
	[2-2] 1-ウンデカノール			nd~6.2 3/26	1.4		
	[2-3] 1-ドデカノール			nd~51 25/27	0.72		
	[2-4] 1-トリデカノール			nd~120 13/27	1.1		
	[2-5] 1-テトラデカノール			nd~390 26/27	0.76		
	[2-6] 1-ペンタデカノール			nd~400 24/27	0.91		
	[2-7] 1-ヘキサデカノール			nd~1,200 27/27	0.81		
[3]	アルキル硫酸 (アルキル基の炭素数が 8、9、10、12、14、16 又は 18 のもの) 及びその塩類 ※						
	[3-1] オクチル硫酸及びその塩類	nd 0/35	71				
	[3-2] ノニル硫酸及びその塩類	nd~200 1/35	40				
	[3-3] デシル硫酸及びその塩類	nd~5,000 2/35	69				
	[3-4] ドデシル硫酸及びその塩類	nd~2,800 21/35	81				
	[3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類	nd~1,100 19/35	35				
	[3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類	nd~2,900 22/35	48				
	[3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類	nd~1,600 12/35	25				

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (ng/L)		底質 (ng/g-dry)		大気 (ng/m ³)	
		範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値	範囲 検出頻度	検出 下限値
[4]	N,N,N-トリメチルドデカン-1-アニウムの塩類 ※	nd~6.4 12/30	1.1				

- (注1) 検出頻度は検出地点数/調査地点数（測定値が得られなかった地点数及び検出下限値を統一したことで集計の対象から除外された地点数は含まない。）を示す。1地点につき複数の検体を測定した場合において、1検体でも検出されたとき、その地点は「検出地点」となる。
- (注2) 範囲は全ての検体における最小値から最大値の範囲で示した。そのため、全地点において検出されても範囲がnd~となることがある。
- (注3) ☐は調査対象外の媒体であることを意味する。
- (注4) ※は排出に関する情報を考慮した地点も含めて調査した調査対象物質であることを意味する。
- (注5) [1-8] アクリル酸イソオクチル類の結果は、アクリル酸イソオクチルとして市販されている製品を測定した際のクロマトグラフにおいて一定のリテンションタイム内で検出される複数のピークのうち、[1-7] アクリル酸オクチル及び[1-8-1] アクリル酸2-エチルヘキシルの標準試薬で検出されたピークと同一のリテンションタイムで検出されたピークを除く主要な 5 つのピークについて定量したものである。

物質別の調査結果は、次のとおりである。

なお、同一地点で過年度に調査が実施されている場合には、両者の結果に差異が生じているか検討を加えている。また、参考文献のうち、全物質共通のものは i)、ii)、iii)等で示している（調査結果の最後にまとめて記載）。その他の参考文献は、1)、2)、3)等で示している（各物質ごとに記載）。

[1] アクリル酸及びそのエステル類

・調査要望理由

化審法

アクリル酸について、優先評価化学物質のうちリスクが高い物質としてそのリスク評価を実施し、その結果から、さらなる環境調査の結果が必要とされたため。

環境リスク初期評価

アクリル酸について、化学物質の環境リスク初期評価を改めて実施するか検討するにあたり、最新のばく露情報等を把握する必要があるため。

類縁混合物リスク評価の試行

アクリル酸及びそのエステル類を対象として、類縁混合物の生態リスクの一括した評価を試行する上で、それらの物質が環境中に同時に存在する状況を把握する必要があるため。

・調査内容及び結果

[1-1] アクリル酸（CAS 登録番号：79-10-7）

【2024 年度調査媒体：水質、大気】

<水質>

水質について 44 地点を調査し、検出下限値 61 ng/L において欠測扱いとなった 1 地点を除く 43 地点全てで検出され、検出濃度は 86～1,400 ng/L の範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

2007 年度には 14 地点を調査し、検出下限値 100 ng/L において欠測扱いとなった 4 地点を除く 10 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 2,900 ng/L までの範囲であった。2014 年度には 20 地点を調査し、検出下限値 30 ng/L において欠測扱いとなった 3 地点を除く 17 地点全てで検出され、検出濃度は 100～3,200 ng/L であった。

○アクリル酸の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2007	8/30	3/10	nd～2,900	100
	2014	17/17	17/17	100～3,200	30
	2024	43/43	43/43	86～1,400	61

2024 年度に調査を行った地点のうち 12 地点は、2007 年度又は 2014 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 11 地点で検出され、1 地点が不検出であった。過年度に検出された 11 地点は 2024 年度も検出され、このうち 2 地点においては 2024 年度に検出された濃度が過年度に検出された濃度に対して低値であった。過年度に不検出であった 1 地点は 2024 年度に検出された。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	柳瀬川志木大橋 (三芳町)	2007	2,700	2,900	2,900	23
		2024		250		61
②	荒川河口 (江東区)	2014		830		110
		2024		310		61
③	隅田川河口 (港区)	2014		790		110
		2024		410		61
④	鶴見川亀の子橋 (横浜市)	2014		3,200		100
		2024		790		61
⑤	川崎港京浜運河扇町地先	2007	2,700	2,900	2,900	23
		2024		180		61
⑥	信濃川下流 (新潟市)	2007	nd	nd	nd	100
		2024		150		61
⑦	犀川河口 (金沢市)	2014		100		30
		2024		220		61
⑧	大和川河口 (堺市)	2014		390		100
		2024		140		61
⑨	水島沖	2014		170		110
		2024		130		61
⑩	徳山湾	2014		180		100
		2024		120		61
⑪	博多湾	2007	nd	nd	nd	30
		2014		270		90
		2024		94		61
⑫	五反田川五反田橋 (いちき串木野市)	2007	450	※28	100	23
		2024		130		61

(注 1) ※：参考値 (測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満)

(注 2) 同一地点で調査が行われたが、欠測等により比較ができない地点は除外した。

< 大気 >

大気について 18 地点を調査し、検出下限値 3.8 ng/m³ において欠測扱いとなった 13 地点を除く 5 地点全てで検出され、検出濃度は 8.2～39 ng/m³ の範囲であった。

2007 年度には 8 地点を調査し、検出下限値 16 ng/m³ において欠測扱いとなった 4 地点を除く 4 地点全てで検出され、検出濃度は 180ng/m³ までの範囲であった。

○アクリル酸の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
大気 (ng/m ³)	2007	10/12	4/4	nd～180	16
	2024	10/10	5/5	8.2～39	3.8

2024 年度に調査を行った地点のうち 2 地点は、2007 年度にも同一地点で調査を行っており、両地点はいずれも過年度に検出された。2024 年度も両地点で検出され、このうち 1 地点では 2024 年度に検出された濃度が過年度に検出された濃度に対して低値であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/m ³)			報告時検出下限値 (ng/m ³)
①	札幌市衛生研究所 (札幌市)	2007	110	180	87	11
		2024	8.6	8.2	8.7	4.2
②	三重県保健環境研究所 (四日市市)	2007	85	nd	36	16
		2024	22	16	19	4.3

(注 1) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）

(注 2) 同一地点で調査が行われたが、欠測等により比較ができない地点は除外した。

【参考：アクリル酸】

・用途：高吸水性樹脂（ポリアクリル酸塩）の合成原料（おむつ、水処理剤用）、特殊エステル（塗料、粘着剤、接着剤用）、その他の合成原料（化粧品原料、結合剤、乳化安定剤、皮膜形成剤、親水性増粘剤）及び食品添加物（ポリアクリル酸ナトリウム）の原料ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法優先評価化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

2019 年度：301,033 t

2020 年度：301,257 t

2021 年度：287,576 t

2022 年度：273,347 t

2023 年度：217,005 t

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	278,004	27,030	0	0	305,034	28,569	333,603
2002	197,791	39,712	0	0	237,503	702	238,205
2003	142,383	47,995	0	0	190,378	86	190,464
2004	108,896	1,003	0	0	109,899	10	109,909
2005	71,250	873	0	0	72,123	48	72,171
2006	53,554	478	0	0	54,032	55	54,087
2007	46,572	6,660	0	0	53,232	4,514	57,746
2008	42,003	6,877	0	0	48,880	3,143	52,023
2009	39,598	7,595	0	0	47,193	4,262	51,455
2010	42,544	21,462	0	0	64,006	2,614	66,620
2011	40,362	16,090	0	0	56,451	1,959	58,410
2012	41,240	12,449	0	0	53,689	4,643	58,332
2013	38,077	6,218	0	0	44,295	2,807	47,102
2014	35,810	5,506	0	0	41,316	2,338	43,654
2015	41,304	5,247	0	0	46,551	3,768	50,319
2016	42,304	4,259	0	0	46,563	3,012	49,575
2017	41,859	4,608	0	0	46,466	1,577	48,043
2018	44,655	3,789	0	0	48,443	1,521	49,964
2019	44,619	2,135	0	0	46,754	1,513	48,267
2020	39,303	2,053	0	0	41,356	1,231	42,587
2021	33,346	2,320	0	0	35,666	1,455	37,121
2022	30,977	935	0	0	31,912	1,434	33,346
2023	22,698	96	0	0	22,794	1,338	24,132

(注) 2009 年度以前はアクリル酸として、2010 年度以降はアクリル酸及びその水溶性塩としての集計値

・生分解性：分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：67.8%、GC による分解度：100%、吸光光度計による分解度：100%、TOC による分解度：97.5%）^{1) 注 1)}

・濃縮性：BCF はオクタノール/水分配係数 log Kow の値 0.35 から 3.2 と計算されており、水生生物への濃縮性は低いと推定される。²⁾

・媒体別分配予測：水質 40.8%、底質 0.0728%、大気 2.10%、土壌 57.0%^{iv) 注 2)}

・急性毒性等：LD₅₀ = 33.5 mg/kg、ラット（経口）^{2) 3)}

LC₅₀ = 3,600 mg/m³（4 時間）、ラット（吸入）^{2) 4) 5)}

- ・反復投与毒性等：無毒性量等（経口）＝53 mg/kg/日（根拠：NOAEL＝53 mg/kg/日）³⁾
 NOAEL＝53 mg/kg/日（500 ppm）：ラットに0、500、2,500又は5,000 ppmの濃度で70日間飲水投与した2世代試験の結果、F0及びF1親世代の5,000 ppm群で、体重増加の有意な抑制を認め、腺胃粘膜の軽度な浮腫を伴った前胃境界線の軽度な角化亢進がみられた。F1及びF2仔世代では2,500 ppm以上の群で離乳時の体重が有意に低く、F2仔世代の2,500 ppm群で外耳道の開通が、5,000 ppm群で開眼の時期が有意に遅延した。^{2)3)4)5)v)}
 無毒性量等（吸入）＝0.026 mg/m³（根拠：LOAEC＝5 ppm、ばく露状況（6時間/日、5日/週）で補正し、LOAECであるために10で除し、さらに試験期間が短いことから10で除した。）³⁾
 LOAEC＝5 ppm：ラット及びマウスに0、5、25又は75 ppmを13週間（6時間/日、5日/週）吸入させた結果、ラットの75 ppm群で鼻の嗅上皮で軽度の限局性変性が雄7/10匹、雌10/10匹にみられ、対照群を含む他の群では0/10～1/10匹とわずかであった。マウスでは、雌の25 ppm以上の群で体重増加の有意な抑制を認めた。雄の25 ppm以上の群及び雌の75 ppm群でヘモグロビン濃度の有意な減少がみられた。嗅上皮の限局性の変性は雄の各群の1/10、1/10、11/11、10/10匹、雌の各群の0/10、4/10、9/10、12/12匹にみられ、5 ppm群ではごく軽微であったが、75 ppm群では軽微～中程度で、雄の75 ppm群の10/10匹及び雌の75 ppm群の10/12匹に鼻粘膜の限局性炎症細胞浸潤及び粘膜下腺過形成がみられた。^{3)4)5)v)}
- ・発がん性：GHS分類：分類できない（IARC評価：グループ3（ヒト発がん性については分類することができない）及びACGIH評価：A4（ヒト発がん性因子として分類できない））。²⁾
- ・生態影響：PNEC＝0.0016 mg/L（根拠：72h-NOEC（緑藻類）＝0.016 mg/L、不確実係数積10）⁶⁾
 72h-NOEC＝0.016 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害²⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾
 72h-EC₅₀＝0.13 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^{2)4)5)6)v)}
 45d-NOEC＝10.1 mg/L以上：メダカ（*Oryzias latipes*）、繁殖阻害^{6)v)}
 21d-NOEC＝19 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、繁殖阻害^{6)v)}
 48h-EC₅₀＝95 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{6)v)}
 96h-LC₅₀＝236 mg/L：シブスヘッドミノー（*Cyprinodon variegatus*）⁶⁾
- ・規制
 - [化審法] 法（平成21年5月20日改正後）第2条第5項、優先評価化学物質（94 アクリル酸）
 - [化管法] 法第2条第2項、施行令（平成20年11月21日改正前）第1条別表第1、第一種指定化学物質（3 アクリル酸）
 法第2条第2項、施行令（平成20年11月21日改正後）第1条別表第1、第一種指定化学物質（4 アクリル酸及びその水溶性塩）
 法第2条第2項、施行令（令和3年10月20日改正後）第1条別表第1、第一種指定化学物質（6 アクリル酸及びその水溶性塩）
 - [大防法] 注3) 法第2条第4項、揮発性有機化合物（その他（エステル系））
 - [水濁法] 注4) 法第2条第4項、施行令第3条第3項、指定物質（10 アクリル酸）

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1976年5月28日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、アクリル酸（2014年度）
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第10巻（2012）
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、アクリル酸、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 108（2008）
- 5) European Communities, Risk Assessment Report – Acrylic acid（2002）
- 6) 環境省、優先評価化学物質通し番号 94 アクリル酸、優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅲ 有害性情報の詳細資料（2022年7月）

[1-2] アクリル酸メチル （CAS登録番号：96-33-3）

【2024年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について44地点を調査し、検出下限値8.1 ng/Lにおいて1地点で検出され、検出濃度は8.8 ng/Lであった。

検出された1地点は、排出源を考慮した地点であった。

1980年度には17地点を調査し、検出下限値600～50,000 ng/Lにおいて17地点全てで不検出であった。

2012 年度には 22 地点を調査し、検出下限値 8 ng/L において 2 地点で検出され、検出濃度は 8,900 ng/L までの範囲であった。

○アクリル酸メチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1980	0/51	0/17	nd	600～50,000
	2012	2/22	2/22	nd～8,900	8
	2024	1/44	1/44	nd～8.8	8.1

2024 年度に調査を行った地点のうち 9 地点は、1980 年度又は 2012 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 1 地点で検出され、8 地点が不検出であった。過年度に検出された 1 地点は 2024 年度に不検出であった。過年度に不検出であった 8 地点は 2024 年度も不検出であったが、このうち 1 地点は、調査において統一した検出下限値未満の濃度で検出されたと報告があった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	2012	nd			8
		2024	nd			2.6
②	荒川河口 (江東区) ※※	1980	nd	nd	nd	1,000
		2012		nd		8
		2024		nd		2.6
③	隅田川河口 (港区)	2012		nd		8
		2024		nd		2.6
④	鶴見川亀の子橋 (横浜市)	2012		10		8
		2024		nd		2.6
⑤	犀川河口 (金沢市)	2012		nd		8
		2024		※5.2		2.6
⑥	大和川河口 (堺市)	2012		nd		8
		2024		nd		2.6
⑦	水島沖	1980	nd	nd	nd	600
		2024		nd		2.6
⑧	徳山湾	2012		nd		8
		2024		nd		2.6
⑨	大分川河口 (大分市)	2012		nd		8
		2024		nd		2.6

(注 1) ※：参考値（測定値が、各地点での報告時の検出下限値以上、本書において統一した検出下限値未満）

(注 2) ※※：1980 年度は民間分析機関による調査

【参考：アクリル酸メチル】

- ・用途：アクリル繊維樹脂の副原料、成形樹脂共重合用、塗料用、粘着剤用及び接着剤用のアクリル樹脂原料並びに汚泥処理用凝集剤の原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法優先評価化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 - 2019 年度：22,024 t
 - 2020 年度：21,702 t
 - 2021 年度：26,962 t
 - 2022 年度：25,887 t
 - 2023 年度：25,382 t

・PRTR 排 出 量 : PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	78,101	13,601	0	0	91,702	29,531	121,233
2002	87,178	15,553	0	0	102,731	22,501	125,232
2003	88,101	14,110	0	0	102,211	26,641	128,852
2004	37,124	11,042	0	0	48,166	26,736	74,902
2005	25,402	9,837	0	0	35,239	27,542	62,781
2006	22,315	8,342	0	0	30,657	23,194	53,851
2007	20,456	5,969	0	0	26,425	26,967	53,392
2008	16,547	4,308	0	0	20,855	22,730	43,585
2009	27,122	529	0	0	27,651	18,765	46,416
2010	26,507	745	0	0	27,252	17,784	45,036
2011	20,065	559	0	0	20,623	20,716	41,339
2012	30,897	510	0	0	31,408	20,735	52,143
2013	28,218	617	0	0	28,834	19,748	48,582
2014	45,115	542	0	0	45,657	19,305	64,962
2015	33,882	544	0	0	34,425	18,595	53,020
2016	24,518	582	0	0	25,100	21,911	47,011
2017	31,614	637	0	0	32,250	23,828	56,078
2018	31,423	715	0	0	32,138	22,180	54,318
2019	19,288	372	0	0	19,661	21,232	40,893
2020	18,993	350	0	0	19,343	21,493	40,836
2021	21,925	327	0	0	22,252	21,008	43,260
2022	19,902	435	0	0	20,337	20,150	40,487
2023	19,558	436	0	0	19,994	19,366	39,360

・生 分 解 性 : 分解性の良好な物質 (標準法 (試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L)、BOD による分解度 : 37.0 %、TOC による分解度 : 100 %、GC による分解度 : 58.3 %^{注 1)})

(注) 参考値。アクリル酸メチルの相当ピークのみにより分解度を計算したためこのような値を得た。水系において中間生成物が確認されるが、汚泥系においてほぼ分解されると推定された。

・濃 縮 性 : BCF はオクタノール/水分配係数 log Kow の値 0.80 から 3.2 と計算されており、水生生物への濃縮性は低いと推定される。²⁾

・媒体別分配予測 : 水質 46.9 %、底質 0.0975 %、大気 6.35 %、土壌 46.6 %^{iv)} ^{注 2)}

・急性毒性等 : LD₅₀ = 277 mg/kg、ラット (経口)³⁾⁴⁾

LC₅₀ = 2,500 mg/m³ (4 時間)、ハムスター (吸入)²⁾⁵⁾

・反復投与毒性等 : 無毒性量等 (経口) = 0.5 mg/kg/日 (根拠 : NOAEL = 5 mg/kg/日、試験期間が短いことから 10 で除した。)³⁾

NOAEL = 5 mg/kg/日²⁾³⁾ : ラットに 0、1、5 又は 20 mg/kg/日を 13 週間飲水投与した結果、雌雄の 20 mg/kg/日群で体重増加の抑制及び飲水量の減少を、雌の 20 mg/kg/日群で尿比重及び腎臓相対重量の増加を認めた。また、雌雄の 20 mg/kg/日群で腎臓の尿細管の拡張及び好酸性円柱の発生率増加を認めた。^{2)3)4)5)v)}

無毒性量等 (吸入) = 0.88 mg/m³ (根拠 : LOAEC = 14 ppm、ばく露状況 (6 時間/日、5 日/週) で補正し、LOAEC であるために 10 で除した。)³⁾

LOAEC = 14 ppm (15 ppm 群のばく露濃度を荷重平均値として算出した。)⁴⁾ : ラットに 0、15、45 又は 135 ppm (0、53、158 又は 475 mg/m³) を 2 年間吸入 (6 時間/日、5 日/週、最初の 13 週間は 1/3 濃度でばく露) させた結果、雌雄の 135 ppm 群で軽度だが有意な体重増加の抑制を認め、雄の 45 及び 135 ppm 群で腎臓絶対重量、雌雄の 135 ppm 群で甲状腺の絶対及び相対重量の有意な減少を認めた。雌雄の 15 ppm 以上の群で角膜実質の変性及び新生血管形成、レンズの不透明化及び亀裂並びに白内障の発生率に有意な増加を認めた。また、雌雄の 45 ppm 以上の群で鼻腔の嗅細胞や線毛細胞の消失を伴った基底細胞過形成の発生率に有意な増加を認め、雄の 15 ppm 群で嗅上皮の萎縮の発生率に有意な増加がみられた。^{2)3)4)5)v)}

・発 がん 性 : GHS 分類 : 区分 1B (ヒトに対する発がん性が知られている。)⁵⁾

・生 態 影 響 : PNEC = 0.0036 mg/L (根拠 : 21d-NOEC (オオミジンコ) = 0.36 mg/L、アセスメント係数 100)³⁾

21d-NOEC = 0.136 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害^{v)}

21d-NOEC = 0.36 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害^{2)3)5)vi)}

72h-NOEC = 0.45 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*)、生長阻害^{v)}

96h-LC₅₀ = 1.1 mg/L : シーブスヘッドミノール (*Cyprinodon variegatus*)⁵⁾

48h-EC₅₀ = 2.6 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害^{2)3)v)vi)}

72h-EC₅₀ = 3.1 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害^{3)vi)}

・規制	
[化審法]	法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1043 アクリル酸メチル）
[化管法]	法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（31 アクリル酸メチル） 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（6 アクリル酸メチル） 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（8 アクリル酸メチル） 法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（10 アクリル酸メチル）
[大防法]	法第 2 条第 4 項、揮発性有機化合物（その他（エステル系）） 法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申、別表 1）（5 アクリル酸メチル）

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1975 年 8 月 27 日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、アクリル酸メチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 95 (2008)
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 7 巻（2009）
- 4) OECD, Methyl acrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2008)
- 5) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸メチル（2020 年度）

[1-3] アクリル酸エチル （CAS 登録番号：140-88-5）

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について 44 地点を調査し、検出下限値 3.6 ng/L において 44 地点全てで不検出であった。

1980 年度には 17 地点を調査し、検出下限値 300～50,000 ng/L において 17 地点全てで不検出であった。

○アクリル酸エチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質	1980	0/51	0/17	nd	300～50,000
(ng/L)	2024	0/44	0/44	nd	3.6

【参考：アクリル酸エチル】

- ・用途：塗料、粘着剤、接着剤、成型用共重合樹脂（メチルメタクリレート、メチルメタクリレート/ブタジエン/スチレン共重合）及びアクリルゴム等の重合原料、凝集剤及び加工剤（皮革加工、紙加工、繊維加工）並びに化粧品の原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法優先評価化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 - 2019 年度：20,339 t
 - 2020 年度：17,962 t
 - 2021 年度：23,703 t
 - 2022 年度：18,313 t
 - 2023 年度：16,787 t

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2001	21,096	1,342	0	0	22,438	1,336,397	1,358,835
2002	18,487	839	0	0	19,326	33,241	52,567
2003	18,893	650	0	0	19,542	27,475	47,017
2004	29,590	612	0	0	30,202	26,731	56,933
2005	26,368	663	0	0	27,031	27,542	54,573
2006	19,232	561	0	0	19,793	23,194	42,987
2007	17,235	699	0	0	17,934	27,046	44,980
2008	13,644	1,116	0	0	14,760	22,810	37,570
2009	14,466	366	0	0	14,832	18,836	33,668
2010	18,352	184	0	0	18,535	17,912	36,447
2011	15,294	242	0	0	15,536	20,863	36,399
2012	15,856	212	0	0	16,067	20,798	36,865
2013	15,882	282	0	0	16,164	19,809	35,973
2014	16,383	535	0	0	16,918	19,359	36,277
2015	16,611	575	0	0	17,186	18,647	35,833
2016	15,614	742	0	0	16,356	21,967	38,323
2017	17,322	2,126	0	0	19,448	23,827	43,275
2018	16,970	1,868	0	0	18,838	22,178	41,016
2019	13,507	1,694	0	0	15,201	21,410	36,611
2020	13,132	1,588	0	0	14,720	21,756	36,476
2021	14,040	1,826	0	0	15,866	21,775	37,641
2022	10,336	295	4	0	10,635	20,804	31,439
2023	9,408	795	0	0	10,203	19,989	30,192

・生 分 解 性：分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：51.5 %、TOC による分解度：92.5 %、GC による分解度：100 %）^{1) 注1)}

・濃 縮 性：BCF はオクタノール/水分配係数 log Kow の値 1.32 から 2.1 と計算されており、水生生物への濃縮性は低いと推定される。²⁾

・媒体別分配予測：水質 47.6 %、底質 0.109 %、大気 5.33 %、土壌 46.9 % ^{iv) 注2)}

・急性毒性等：LD₅₀ = 370 mg/kg、ウサギ（経口）²⁾³⁾
LC₅₀ = 4,160～9,070 mg/m³（4 時間）、ラット（吸入）²⁾³⁾⁴⁾

・反復投与毒性等：無毒性量等（経口）= 1.7 mg/kg/日（根拠：NOAEL = 17 mg/kg/日、試験期間が短いことから 10 で除した。）³⁾

NOAEL = 17 mg/kg/日 ²⁾³⁾；ラットの雄 40 匹、雌 20 匹をそれぞれ 1 群とし、0、200、1,000、2,000 又は 4,000 ppm の濃度で 13 週間飲水経口投与（雄で 0、17、70、135 又は 249 mg/kg/日、雌で 0、20、87、161 又は 293 mg/kg/日に相当）した結果、雄の 1,000 ppm 以上の群及び雌の 2,000 ppm 以上の群で胃の相対重量並びに雌雄の 2,000 ppm 以上の群で腎臓の相対重量に有意な増加を認めた。雌雄の前胃では 1,000 ppm 群の半数以上、2,000 ppm 以上の群の全数で扁平上皮のび慢性過形成、雌の 2,000 ppm 群の約半数、雄の 2,000 ppm 以上の群及び雌の 4,000 ppm 群の全数で角質増殖を認めた。²⁾³⁾⁵⁾

無毒性量等（吸入）= 3.6 mg/m³（根拠：NOAEC = 5 ppm、ばく露状況（6 時間/日、5 日/週）で補正した。）³⁾

NOAEC = 5 ppm：ラット及びマウスに 0、25、75 又は 225 ppm を 6 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた後にばく露を中断して 21 ヶ月間飼育した結果、ラット及びマウスの雌雄の 75 ppm 以上の群で体重増加の有意な抑制を認めた。ラットの鼻腔嗅上皮では、25 ppm 以上の群で基底細胞の過形成、上皮内腺の増加、呼吸上皮化生、75 ppm 以上の群で多巢性の石灰化、250 ppm 群でび慢性的の萎縮が高率にみられたが、呼吸上皮には影響はなかった。マウスの鼻腔嗅上皮では、25 ppm 以上の群で粘膜下腺の過形成、呼吸上皮化生が高率にみられた。また、ラット及びマウスに 0 又は 5 ppm を 24 ヶ月間（6 時間/日、5 日/週）吸入させた結果、ラット及びマウスの鼻腔の組織に影響はなかった。^{2)3)5)vi)}

・発 がん 性：GHS 分類：区分 2（ヒトに対する発がん性が疑われる。）⁴⁾

・生態影響：PNEC = 0.0019 mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ）= 0.19 mg/L、アセスメント係数 100）³⁾
21d-NOEC = 0.19 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、繁殖阻害 ^{2)3)4)5)vi)}
72h-NOEC = 0.45 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害 ^{v)}
96h-LC₅₀ = 1.16 mg/L：メダカ（*Oryzias latipes*）^{2)3)4)vi)}
96h-LC₅₀ = 1.86 mg/L：ヨコエビ属（*Gammarus pulex*）³⁾
72h-EC₅₀ = 1.71 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害 ^{v)}

・規制

〔化審法〕	法（平成 21 年 5 月 20 日改正前）第 2 条第 5 項、第二種監視化学物質（1044 アクリル酸エチル） 法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（32 アクリル酸エチル）
〔化管法〕	法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正前）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（4 アクリル酸エチル） 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（3 アクリル酸エチル） 法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（4 アクリル酸エチル）
〔大防法〕	法第 2 条第 9 項、有害大気汚染物質に該当する可能性がある物質（2010 年中央環境審議会答申、別表 1）（3 アクリル酸エチル）

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1975 年 8 月 27 日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構（NITE）、アクリル酸エチル、化学物質の初期リスク評価書 Ver. 1.0 No. 59 (2007)
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 11 巻 (2013)
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸エチル（2020 年度）
- 5) OECD, Ethyl acrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2008)

[1-4] アクリル酸ブチル （CAS 登録番号：141-32-2）

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について 44 地点を調査し、検出下限値 4.3 ng/L において 44 地点全てで不検出であった。

1980 年度には 17 地点を調査し、検出下限値 700～30,000 ng/L において 17 地点全てで不検出であった。

2012 年度には 22 地点を調査し、検出下限値 9 ng/L において 2 地点で検出され、検出濃度は 47 ng/L までの範囲であった。

○アクリル酸ブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1980	0/51	0/17	nd	700～30,000
	2012	2/22	2/22	nd～47	9
	2024	0/44	0/44	nd	4.3

2024 年度に調査を行った地点のうち 9 地点は、1980 年度又は 2012 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 1 地点で検出され、8 地点が不検出であった。過年度に検出された 1 地点は 2024 年度に不検出であった。過年度に不検出であった 8 地点は、2024 年度も不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)		報告時検出下限値 (ng/L)
①	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	2012	nd		9
		2024	nd		4.3
②	荒川河口（江東区）※	1980	nd	nd	1,000
		2012	nd		9
		2024	nd		4.3
③	隅田川河口（港区）	2012	nd		9
		2024	nd		4.3
④	鶴見川亀の子橋（横浜市）	2012	27		9
		2024	nd		4.3
⑤	犀川河口（金沢市）	2012	nd		9
		2024	nd		4.3

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
⑥	大和川河口 (堺市)	2012	nd			9
		2024	nd			4.3
⑦	水島沖	1980	nd	nd	nd	700
		2024	nd			4.3
⑧	徳山湾	2012	nd			9
		2024	nd			4.3
⑨	大分川河口 (大分市)	2012	nd			9
		2024	nd			4.3

(注) ※：1980 年度は民間分析機関による調査

【参考：アクリル酸ブチル】

- ・用途：アクリル樹脂、塗料、接着剤及び乳化剤の原料[㊦]
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値[㊦]
アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が3又は4のもの）として
2019年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2020年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2021年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2022年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2023年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年)[㊦]

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	33,831	849	0	0	34,680	-	34,680
2011	26,996	672	0	0	27,668	82	27,750
2012	29,403	769	0	0	30,172	650	30,822
2013	32,785	702	0	0	33,487	645	34,132
2014	36,076	874	0	0	36,950	894	37,844
2015	33,797	1,055	1	0	34,852	1,354	36,206
2016	26,952	959	0	0	27,910	1,279	29,189
2017	34,243	1,784	0	0	36,027	842	36,869
2018	40,329	1,483	0	0	41,811	926	42,737
2019	34,465	1,388	0	0	35,853	3,127	38,980
2020	37,032	1,325	0	0	38,357	2,770	41,127
2021	38,924	1,338	0	0	40,262	3,226	43,488
2022	36,240	460	0	0	36,700	3,315	40,015
2023	41,231	691	0	0	41,923	3,163	45,086

(注) -：推計値がないことを意味する。

- ・生分解性：分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：61.3 %、TOC による分解度：100 %、GC による分解度：100 %）^{1) 注1)}
- ・濃縮性：log Pow の測定値 2.38 (25℃) 及び BCF の計算値 17.3 から、生物濃縮の可能性は示唆されない。[㊦]
- ・媒体別分配予測：水質 36.6 %、底質 0.110 %、大気 5.57 %、土壌 57.7 %^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 900 mg/kg、ラット（経口）²⁾³⁾
LC₅₀ = 10,300 mg/m³（4 時間）、ラット（吸入）^{2)4)v)}
- ・反復投与毒性等：無毒性量等（経口）= 8.4 mg/kg/日（根拠：NOAEL = 84 mg/kg/日、試験期間が短いことから 10 で除した。）³⁾

NOAEL = 84 mg/kg/日：ラットに 0、150、900 又は 1,500 ppm の濃度で 13 週間飲水投与（雄 0、12、73 又は 84 mg/kg/日、雌 0、15、91 又は 111 mg/kg/日に相当）若しくは 150 mg/kg/日を 13 週間強制経口投与（5 日/週）した結果、飲水投与では雌雄の 150 ppm 以上の群で軽度の飲水量の減少、雌の 1,500 ppm 群で軽度の体重増加の抑制がみられたが、血液や尿、組織の検査に異常はなかった。強制投与では雌雄の 150 mg/kg/日群で肝臓相対重量の有意な増加を認めた。^{2)3)4)v)}
無毒性量等（吸入）= 1.3 mg/m³（根拠：LOAEC = 14 ppm、ばく露状況（6 時間/日、5 日/週）で補正し、LOAEC であるために 10 で除した。）³⁾

LOAEC = 14 ppm（15 ppm 群のばく露濃度を荷重平均値として算出した。）³⁾：ラットに 0、15、45 又は 135 ppm（0、86、258 又は 773 mg/m³）を 2 年間吸入（6 時間/日、5 日/週、最初の 13 週間は 1/3 濃度でばく露）させた結果、一般状態や生存率、体重、血液及び尿の検査に影響はなく、雌の 135 ppm 群で肝臓相対重量及び心臓相対重量の有意な減少を認めたが、組織に影響はなかった。雌雄の 15 ppm 以上の群の鼻腔で嗅上皮の萎縮、嗅細胞や線毛細胞の部分的な消失を伴った基底細胞過形成の発生率に有意な増加を認めた。また、135 ppm 群の雌雄の角膜実質で変性や新生血管形成の発生率に有意な増加を認めた。²⁾³⁾⁴⁾

- ・発 がん 性 : GHS 分類: 分類できない (IARC 評価: グループ 3 (ヒト発がん性については分類することができない) 及び ACGIH 評価: A4 (ヒト発がん性因子として分類できない))。2)
- ・生 態 影 響 : PNEC = 0.010 mg/L (根拠: 21d-NOEC (オオミジンコ) = 1.0 mg/L、アセスメント係数 100) 3)
72h-NOEC = 0.077 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 vi)
21d-NOEC = 0.136 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害 vi)
21d-NOEC = 1.0 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害 3) vi)
72h-EC₅₀ = 1.7 mg/L: 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 vi)
96h-LC₅₀ = 2.1 mg/L: キプリノドン科 (*Cyprinodon variegatus*) 3) 4) vi)
48h-EC₅₀ = 5.2 mg/L: オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害 4) vi)
- ・規制
 - [化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正前) 第 2 条第 5 項、第三種監視化学物質 (274 アクリル酸 *n*-ブチル)
 - [化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (平成 20 年 11 月 21 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (7 アクリル酸 *n*-ブチル)
法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (9 アクリル酸ブチル)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報 (1975 年 8 月 27 日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸 *n*-ブチル (2014 年度)
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 11 巻 (2013)
- 4) OECD, *n*-Butyl acrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2004)

[1-5] アクリル酸イソブチル (CAS 登録番号: 106-63-8)

【2024 年度調査媒体: 水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、44 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/L に
おいて 1 地点で検出され、検出濃度は 4.3 ng/L であった。

○アクリル酸イソブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	1/44	1/44	nd~4.3	1.1

【参考: アクリル酸イソブチル】

- ・用 途 : 塗料、接着剤、合成樹脂の原料、合成ゴムの改質剤の繊維加工助剤 i)
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値 ii)
アクリル酸アルキル (アルキル基の炭素数が 3 又は 4 のもの) として
2019 年度: 100,000 t 以上 200,000 t 未満
2020 年度: 100,000 t 以上 200,000 t 未満
2021 年度: 100,000 t 以上 200,000 t 未満
2022 年度: 100,000 t 以上 200,000 t 未満
2023 年度: 100,000 t 以上 200,000 t 未満

- ・PRTR 排出量 : PRTR 集計結果 (kg/年、アクリル酸ブチルとして) iii)

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2023	41,231	691	0	0	41,923	3,163	45,086

- ・生 分 解 性 : 水中での生分解スクリーニング試験 (ISO 14593、CO₂-Headspace 法) において、容易に生分解した (28 日後に無機炭素理論値に対する全無機炭素測定値が 90~100 %)。v)
- ・濃 縮 性 : log Pow の測定値 2.38 (25℃) 及び BCF の計算値 17.3 から、生物濃縮の可能性は示唆されない。vi)
- ・媒体別分配予測 : 水質 42.0 %、底質 0.129 %、大気 7.37 %、土壌 50.5 % iv) 注 2)

- ・急性毒性等：LD₅₀ = 4,895 mg/kg、ラット（経口）^{1) v)}
LC₅₀ = 10,600 mg/m³（4時間）、ラット（吸入）^{1) 2) v)}
- ・反復投与毒性等：GHS 分類：分類できない（反復ばく露に関するデータがない。）²⁾
- ・発がん性：GHS 分類：分類できない（発がん性に関するデータがない。）²⁾
- ・生態影響：72h-NOEC = 0.82 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^{3) v)}
72h-EC₅₀ = 5.28 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^{1) 3) v)}
48h-EC₅₀ = 8.2 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{v)}
96h-LC₅₀ = 2.09 mg/L：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）^{1) 3) v)}

参考文献

- 1) OECD, *iso*-Butyl acrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2008)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸イソブチル（2009 年度）
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸イソブチル（2023 年度）

[1-6] アクリル酸 *tert*-ブチル（CAS 登録番号：1663-39-4）

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、44 地点を調査し、検出下限値 2.1 ng/L に
おいて 44 地点全てで不検出であった。

○アクリル酸 *tert*-ブチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	0/44	0/44	nd	2.1

【参考：アクリル酸 *tert*-ブチル】

- ・用途：ラジカル重合モノマー並びにラッカー、エナメル及びエマルジョン塗料及び接着剤の原料¹⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が 3 又は 4 のもの）として
2019 年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2020 年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2021 年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2022 年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満
2023 年度：100,000 t 以上 200,000 t 未満

- ・PRTR 排出量：PRTR 集計結果（kg/年、アクリル酸ブチルとして）ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2023	41,231	691	0	0	41,923	3,163	45,086

- ・生分解性：水中での生分解スクリーニング試験（ISO 14593、CO₂-Headspace 法）において、生分解性は中程度とされた（28 日後に/無機炭素理論値に対する全無機炭素測定値が 50～60 %）。^{v)}
- ・濃縮性：log Pow の測定値 2.32（25℃）及び BCF の計算値 15.8 から、生物濃縮の可能性は示唆されない。^{v)}
- ・媒体別分配予測：水質 35.5 %、底質 0.0994 %、大気 4.62 %、土壌 59.8 %^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 1,047 mg/kg、ラット（経口）^{1) 2) v)}
LC₅₀ = 7,000 mg/m³（4時間）、ラット（吸入）^{1) 2) v)}

- ・反復投与毒性等 : NOAEC = 319 mg/m³ : ラットに 106、319 又は 956 mg/m³ を、雄には約 13 週間（交配前 10 週間と交配及び交配後 3 週間）、雌には約 15 週間（交配前 10 週間から、交配、妊娠中及び分娩 4 日後まで）をばく露（6 時間/日、5 日/週）した。雄の 956 mg/m³ 群で眼と上気道の軽微な刺激、体重増加の遅延及び軽度の腎機能障害を引き起こした。雌の 956 mg/m³ 群で妊娠中及び哺乳中に死亡を含む重篤な全身毒性を誘発した。仔の 956 mg/m³ 群で出生前・後の発育は有意に損なわれた。^{2) v)}
- ・発がん性 : GHS 分類 : 分類できない（発がん性に関するデータがない。）。¹⁾
- ・生態影響 : 72h-NOEC = 3.85 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*)、生長阻害^{v)}
72h-EC₅₀ = 14.6 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*)、生長阻害^{2) v)}
48h-EC₅₀ = 8.74 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害^{2) v)}

参考文献

- 1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸 *tert*-ブチル（2009 年度）
- 2) OECD, *tert*-butyl acrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2006)

[1-7] アクリル酸オクチル（CAS 登録番号 : 2499-59-4）

【2024 年度調査媒体 : 水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、44 地点を調査し、検出下限値 17 ng/L において 1 地点で検出され、検出濃度は 28 ng/L であった。

○アクリル酸オクチルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	1/44	1/44	nd~28	17

【参考 : アクリル酸オクチル】

- ・用途 : 塗料、粘着剤及び接着剤の原料並びに樹脂改質剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの）として
2019 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2020 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2021 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2022 年度 : 60,000 t 以上 70,000 t 未満
2023 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排出量 : 届出及び推計の対象外
- ・生分解性 : 不詳
- ・濃縮性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 20.6 %、底質 0.331 %、大気 2.14 %、土壌 76.9 %^{iv) 注 2)}
- ・急性毒性等 : 不詳
- ・反復投与毒性等 : 不詳
- ・発がん性 : 不詳
- ・生態影響 : 不詳

[1-8] アクリル酸イソオクチル類 (CAS 登録番号：29590-42-9)

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、44 地点を調査し、検出下限値 72 ng/L に
おいて欠測扱いとなった 18 地点を除く 26 地点全てで不検出であった。

なお、アクリル酸イソオクチル類の結果は、アクリル酸イソオクチルとして市販されている製品を測定
した際のクロマトグラフにおいて一定のリテンションタイム内で検出される複数のピークのうち、アクリ
ル酸オクチル及びアクリル酸 2-エチルヘキシルの標準試薬で検出されたピークと同一のリテンションタ
イムで検出されたピークを除く主要な 5 つのピークについて定量したものである。

○アクリル酸イソオクチル類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	0/26	0/26	nd	72

(注) [1-8] アクリル酸イソオクチル類の結果は、アクリル酸イソオクチルとして市販さ
れている製品を測定した際のクロマトグラフにおいて一定のリテンションタイム
内で検出される複数のピークのうち、[1-7] アクリル酸オクチル及び[1-8-1] アクリ
ル酸 2-エチルヘキシルの標準試薬で検出されたピークと同一のリテンションタ
イムで検出されたピークを除く主要な 5 つのピークについて定量したものである。

【参考：アクリル酸イソオクチル類】

- ・用 途： 粘着剤及び接着剤の原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量： 化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの）として
2019 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2020 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2021 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2022 年度：60,000 t 以上 70,000 t 未満
2023 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排出量： 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性： 不詳
- ・濃 縮 性： 不詳
- ・媒体別分配予測： 水質 21.5 %、底質 0.300 %、大気 2.38 %、土壌 75.8 %^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等： LD₅₀ = 5,000 mg/kg 超、ラット（経口）^{1)2)v)}
- ・反復投与毒性等： GHS 分類：分類できない（反復ばく露に関するデータ不足のため。）¹⁾
- ・発 が ん 性： GHS 分類：分類できない（発がん性に関するデータがない。）¹⁾
- ・生態影響： 21d-NOEC = 0.13 mg/L 未満：オオミジンコ (*Daphnia magna*)、繁殖阻害^{2)v)}
48h-EC₅₀ = 0.40 mg/L：オオミジンコ (*Daphnia magna*)、遊泳阻害^{1)2)v)}
96h-LC₅₀ = 0.67 mg/L：ファットヘッドミノー (*Pimephales promelas*)^{2)v)}

参考文献

- 1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸イソオクチル (2013 年度)
- 2) OECD, *iso-Octyl acrylate*, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2002)

[1-8-1] アクリル酸 2-エチルヘキシル (CAS 登録番号：103-11-7)

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について 44 地点を調査し、検出下限値 23 ng/L において 3 地点で検出され、検出濃度は 210 ng/L までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、検出された 3 地点中 2 地点は、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点であった。

1980 年度には 17 地点を調査し、検出下限値 1,100～12,000 ng/L において 17 地点全てで不検出であった。

○アクリル酸 2-エチルヘキシルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	1980	0/51	0/17	nd	1,100～12,000
	2024	3/44	3/44	nd～210	23

2024 年度に調査を行った地点のうち 2 地点は、1980 年度にも同一地点で調査を行っており、両地点は過年度に不検出で、2024 年度も検出下限値を下げて測定したが不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/L)			報告時検出下限値 (ng/L)
①	荒川河口 (江東区) ※	1980	nd	nd	nd	5,000
		2024	nd	nd	nd	12
②	水島沖	1980	nd	nd	nd	11,000
		2024	nd	nd	nd	12

(注) ※：1980 年度は民間分析機関による調査

【参考：アクリル酸 2-エチルヘキシル】

・用途：アクリル繊維、塗料及び接着剤の原料ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの）として

2019 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満

2020 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満

2021 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満

2022 年度：60,000 t 以上 70,000 t 未満

2023 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2023	8,395	4	0	0	8,399	800	9,199

・生分解性：分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：51.3 %、TOC による分解度：73.9 %）^{1) 注 1)}

・濃縮性：不詳

・媒体別分配予測：水質 20.8 %、底質 0.313 %、大気 2.04 %、土壌 76.8 %^{iv) 注 2)}

・急性毒性等：LD₅₀ = 約 4,430 mg/kg、ラット（経口）^{2) 3) v)}

LC₅₀ = 7,713 mg/m³ 超（30 分間）、マウス（吸入）²⁾

・反復投与毒性等：NOAEL＝雄 357mg/kg/日、雌 453mg/kg/日：ラットの親世代（F0）に 0、1,500、5,000 又は 12,500ppm を、授乳期には 50%（0、750、2,500、6,250 ppm）に低減して、雄には 27 日間、雌には 62 日間混餌投与（雄は 0、119 mg/kg/日、357 mg/kg/日又は 998 mg/kg/日、雌は、0、135 mg/kg/日、453 mg/kg/日、1,136 mg/kg/日に相当）した。12,500 ppm 群の親世代（F0）及び仔世代（F1）で、局所的な有害作用の徴候が現れ、その後、全身的な影響につながった。12,500 ppm 群及び一部の 5,000 ppm 群の親世代（F0）で摂餌量が減少した。雄の 12,500 ppm 群の親世代（F0）及び仔世代（F1）で体重及び体重変化が有意に減少した。雄の 12,500ppm 群で腎臓の相対重量、肝臓の重量及び前立腺の重量が増加した。^{v)}

NOAEC＝75 mg/m³：ラットに 0、75、225 又は 750 mg/m³ の濃度で 90 日間全身ばく露（6 時間/日、5 日/週）させた結果、225 mg/m³ 以上の群で嗜眠及び眼瞼下垂を示した。雌雄の 750 mg/m³ 群で体重が試験期間中及び終了時に低かった。雌の 225 mg/m³ 群では体重が一過性に減少した。750 mg/m³ 群で 21 日目以降の平均体重（絶対値）は低かった。雌の 750 mg/m³ 群で ALAT およびアルカリホスファターゼ活性が上昇し、総タンパク質、アルブミン及びグルコースが減少した。雌雄の 225 mg/m³ 群においても、タンパク質とアルブミンの減少がみられた。雄の 750 mg/m³ 群で肝臓の絶対重量が減少し、雌雄の 750 mg/m³ 群で副腎の相対重量が減少した。750 mg/m³ 群の全匹で鼻腔前部の嗅粘膜の変性が認められ、225 mg/m³ 群でも嗅粘膜の変性の発生率が増加した。全投与群及び対照群に肝臓の脂肪性変化がみられたが、750 mg/m³ 群では、脂肪性変化の重症度が他の群及び対照群と比較して低かった。肝小葉の門脈周囲における脂質蓄積の重症度グレードの平均が雄の対照群で 2.6 であったのが、750 mg/m³ 群では 1.0 に減少した。^{2)3)4)v)}

- ・発がん性：GHS 分類：区分 2（ヒトに対する発がん性が疑われる。）²⁾
- ・生態影響：PNEC＝0.0013 mg/L（根拠：48h-EC₅₀（オオミジンコ）＝1.3 mg/L、アセスメント係数 1,000）³⁾⁴⁾
72h-NOEC＝0.45 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^{v)}
72h-EC₅₀＝1.71 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^{3)4)v)}
96h-LC₅₀＝1.8 mg/L：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）^{2)3)4)v)}
48h-EC₅₀＝1.3 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^{2)3)4)v)}
- ・規制
〔化管法〕 法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（5 アクリル酸 2-エチルヘキシル）

参考文献

1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1975 年 8 月 27 日）

2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、アクリル酸 2-エチルヘキシル（2020 年度）

3) European Communities, Risk Assessment Report-2-Ethylhexyl acrylate (2005)

4) OECD, 2-Ethylhexylacrylate, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Profile (2004)

[1-9] アクリル酸イソノニル類（CAS 登録番号：51952-49-9）

【2024 年度調査媒体：水質】

＜水質＞

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、42 地点を調査し、検出下限値 48 ng/L に
おいて欠測扱いとなった 2 地点を除く 40 地点全てで不検出であった。

○アクリル酸イソノニル類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	0/40	0/40	nd	48

【参考：アクリル酸イソノニル類】

- ・用 途 : 粘着剤及び接着剤の原料 ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値 ⁱⁱ⁾
 アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が8から18までのもの）として
 2019年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2020年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2021年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2022年度：60,000 t 以上 70,000 t 未満
 2023年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排出量 : 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性 : 不詳
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 19.8 %、底質 0.450 %、大気 2.14 %、土壌 77.6 % ^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等 : 不詳
- ・反復投与毒性等 : 不詳
- ・発 がん 性 : 不詳
- ・生態影響 : 不詳

[1-10] アクリル酸デシル (CAS 登録番号：2156-96-9)

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について本調査としては2024年度が初めての調査であり、42地点を調査し、検出下限値 54 ng/L に
 おいて欠測扱いとなった1地点を除く41地点中2地点で検出され、検出濃度は110 ng/L までの範囲であっ
 た。

○アクリル酸デシルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	2/41	2/41	nd～110	54

【参考：アクリル酸デシル】

- ・用 途 : 樹脂の原料 ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値 ⁱⁱ⁾
 アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が8から18までのもの）として
 2019年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2020年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2021年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
 2022年度：60,000 t 以上 70,000 t 未満
 2023年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排出量 : 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性 : 不詳
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 17.9 %、底質 0.790 %、大気 1.79 %、土壌 79.5 % ^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 6,460 mg/kg、ラット（経口）^{viii)}
- ・反復投与毒性等 : 不詳
- ・発 がん 性 : 不詳
- ・生態影響 : 不詳

[1-11] アクリル酸ドデシル (CAS 登録番号 : 2156-97-0)

【2024 年度調査媒体 : 水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、42 地点を調査し、検出下限値 22 ng/L に
おいて 5 地点で検出され、検出濃度は 78 ng/L までの範囲であった。

○アクリル酸ドデシルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	5/42	5/42	nd~78	22

【参考 : アクリル酸ドデシル】

- ・用 途 : 内部可塑剤、接着剤、繊維処理剤及び紙コーティング剤 ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法一般化学物質届出結果公表値 ⁱⁱ⁾
アクリル酸アルキル (アルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの) として
2019 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2020 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2021 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
2022 年度 : 60,000 t 以上 70,000 t 未満
2023 年度 : 70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排 出 量 : 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性 : 水中での生分解スクリーニング試験 (OECD テストガイドライン 301B、CO₂-Evolution 法) において、炭素数が 12 から 14 のアクリル酸エステル混合物は、容易に生分解した (28 日後に CO₂ 理論値に対する CO₂ 測定値が 90~100 %)。^{v)}
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 16.6 %、底質 2.08 %、大気 1.51 %、土壌 79.8 % ^{iv)} 注 2)
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 5,570 mg/kg 超、ラット (経口) ^{v)}
LC₅₀ = 690 mg/m³ 超 (8 時間)、ラット (吸入) ^{v)}
- ・反復投与毒性等 : NOEL = 300 mg/kg/日、NOAEL = 1,000 mg/kg/日 : ラットの雄には交配前 14 日から 42 日間、交配群の雌には交配前 14 日から交配期間、妊娠期間及び授乳 4 までの 41~54 日間それぞれ 0、100、300 又は 1,000 mg/kg/日を、非交配群の雌には 42 日間 0 又は 1,000 mg/kg/日を経口投与した。雄の 1,000 ppm 群で肝臓の相対重量が、非交配雌の 1,000 ppm 群で肝臓の絶対及び相対重量の高値が認められたが、その程度は軽微で組織学的な異常がなかった。¹⁾
- ・発 がん 性 :
- ・生態影響 : 72h-EC₅₀ = 0.000274 mg/L 未満 : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*)、生長阻害 ^{v)}
30d-NOEC = 0.001 mg/L : ゼブラフィッシュ (*Danio rerio*)、繁殖阻害 ^{v)}
96h-LC₅₀ = 約 460 mg/L : コイ科の一種 (*Leuciscus idus*)、被験物質はアルキル基の炭素数が 12 から 14 までのものの混合物 ^{v)}

参考文献

- 1) 株式会社ホゾリサーチセンター、経済産業省委託、ドデシル=アクリラートのラットを用いた経口投与による反復投与毒性・生殖発生毒性合併試験、最終報告書 (2012 年 3 月)

[1-12] アクリル酸オクタデシル (CAS 登録番号：4813-57-4)

【2024 年度調査媒体：水質】

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、42 地点を調査し、検出下限値 17 ng/L において 42 地点全てで不検出であった。

○アクリル酸オクタデシルの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	0/42	0/42	nd	17

【参考：アクリル酸オクタデシル】

- ・用途：内部可塑剤、接着剤の原料、繊維処理剤及び塗料改質剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法一般化学物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アクリル酸アルキル（アルキル基の炭素数が 8 から 18 までのもの）として
2019 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2020 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2021 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
2022 年度：60,000 t 以上 70,000 t 未満
2023 年度：70,000 t 以上 80,000 t 未満
- ・PRTR 排出量：届出及び推計の対象外
- ・生分解性：水中での生分解スクリーニング試験（OECD テストガイドライン 301B、CO₂-Evolution 法）において、アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物は、28 日後に CO₂ 理論値に対する CO₂ 測定値が 50～60 %であった。^{v)}
- ・濃縮性：不詳
- ・媒体別分配予測：水質 24.0 %、底質 1.83 %、大気 0.698 %、土壌 73.5 %^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 2,000 mg/kg 超、ラット（経口、アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物）^{v)}
- ・反復投与毒性等：不詳
- ・発がん性：不詳
- ・生態影響：NOEC = 100 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害、アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物^{v)}
72h-EC₅₀ = 278 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害、アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物^{v)}
48h-EC₅₀ = 100 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害、被験物質はアルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物^{v)}
96h-LC₅₀ = 100 mg/L 以上：ゼブラフィッシュ（*Danio rerio*）、被験物質はアルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物^{v)}

[2] アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が 10 から 16 までのもの）

【2023 年度調査媒体：底質】

・調査要望理由

化審法

優先評価化学物質に指定され第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績がないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされたため。

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正ではデカノール及び 1-ドデカノールが継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

[2-1] 1-デカノール（CAS 登録番号：112-30-1）

<底質>

底質について 28 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/g-dry において欠測扱いとなった 2 地点を除く 26 地点中 25 地点で検出され、検出濃度は 360 ng/g-dry までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

1979 年度には 9 地点を調査し、検出下限値 300～1,000 ng/g-dry において 9 地点全てで不検出であった。

2017 年度には 24 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/g-dry において 17 地点で検出され、検出濃度は 520 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-デカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	1979	0/27	0/9	nd	300～1,000
	2017	50/71	17/24	nd～520	1.1
	2024	68/76	25/26	nd～360	1.1

2024 年度に調査を行った地点のうち 15 地点は、1979 年度又は 2017 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度は 11 地点で検出され、4 地点が不検出であった。過年度に検出された 11 地点は 2024 年度も検出された。過年度に不検出であった 4 地点のうち 3 地点は 2024 年度に検出され、他の 1 地点は 2024 年度も不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
①	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	1979	nd	nd	nd	300
		2017	220	13	140	1.1
		2024	3.7	8.1	29	0.69
②	秋田運河（秋田市）	2017	2.3	30	320	1.1
		2024	4.7	5.0	4.6	1.0

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
③	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	2017	3.4	160	5.7	1.1
		2024	65	30	6.5	0.74
④	荒川河口 (江東区)	2017	160	140	69	1.1
		2024	190	360	200	0.85
⑤	隅田川河口 (港区)	2017	27	16	43	1.1
		2024	77	31	36	1.0
⑥	犀川河口 (金沢市)	2017	18	20	10	1.1
		2024	81	97	80	0.72
⑦	諏訪湖湖心	1979	nd	nd	nd	500
		2024	7.9	8.3	8.2	1.9
⑧	名古屋港潮見ふ頭西	2017	4.4	4.5	3.6	1.1
		2024	1.5	2.5	3.7	0.78
⑨	琵琶湖南比良沖中央	2017	nd	nd	nd	1.1
		2024	5.1	4.6	5.5	1.6
⑩	琵琶湖唐崎沖中央	2017	nd	nd	nd	1.1
		2024	2.5	2.8	4.9	1.1
⑪	大和川河口 (堺市)	2017	11	3.9	6.3	1.1
		2024	90	30	41	0.72
⑫	博多湾	2017	18	11	33	1.1
		2024	8.3	7.8	12	0.87
⑬	伊万里湾	2017	4.6	8.6	8.2	1.1
		2024	5.4	5.9	4.3	1.0
⑭	大分川河口 (大分市)	2017	nd	nd	10	1.1
		2024	25	6.1	21	0.71
⑮	大淀川河口 (宮崎市)	2017	nd	nd	nd	1.1
		2024	nd	nd	nd	0.72

【参考：1-デカノール】

・用途：可塑剤の原料、潤滑剤、界面活性剤及び農薬（植物成長阻害剤）ⁱ⁾

・生産量・輸入量：化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾

2019年度：9,627 t

2020年度：9,767 t

2021年度：11,521 t

2022年度：10,023 t

2023年度：10,028 t

農薬原体の国内生産及び輸入の数量¹⁾

2021農薬年度：国内生産 36,210 kg、輸入 0 kg

2022農薬年度：国内生産 36,150 kg、輸入 54,400 kg

2023農薬年度：国内生産 24,080 kg、輸入 26,900 kg

・PRTR排出量：PRTR集計結果 (kg/年)ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	280	8	0	0	288	151,877	152,165
2011	12	13	0	0	25	158,568	158,593
2012	329	49	0	0	378	83,941	84,319
2013	478	22	0	0	500	109,437	109,937
2014	465	19	0	0	484	115,926	116,410
2015	766	119	0	0	885	115,714	116,599
2016	413	235	0	0	648	101,673	102,321
2017	447	175	0	0	622	102,918	103,540
2018	437	238	0	0	675	100,097	100,772
2019	422	233	0	0	655	93,427	94,082
2020	430	172	0	0	601	94,169	94,770
2021	450	162	0	0	612	180,122	180,734
2022	417	146	0	0	563	118,182	118,745
2023	441	22	0	0	463	51,956	52,419

・生分解性：良分解性（類似化学物質（1-オクタノール、1-トリデカノール、1-ヘキサデカノール及び1-ヘキサコサノール）の分解性との比較により判定）²⁾

・濃縮性：不詳

・媒体別分配予測：水質 28.1 %、底質 0.163 %、大気 2.60 %、土壌 69.1 %^{iv)} 注 2)

- ・急性毒性等：LD₅₀ = 4,720 mg/kg、ラット（経口）³⁾
LC₅₀ = 4,000 mg/m³（2時間）、マウス（吸入）³⁾
- ・反復投与毒性等：ラット及びウサギに 200、600 又は 800 mg/m³ の濃度で 2 ヶ月間（2 時間/日）吸入させた結果、200 mg/m³ 以上の群で血清のコリンエステラーゼ活性の低下が、600 mg/m³ の群で限局的な刺激症状がみられた。^{3) 4)}
- ・発がん性：GHS 分類：分類できない（発がん性に関する知見がない。）⁴⁾
- ・生態影響：PNEC = 0.0034 mg/L（根拠：21d-NOEC（オオミジンコ）= 0.034 mg/L、不確実計数積 10）⁵⁾
21d-NOEC = 0.034 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）繁殖阻害⁵⁾
72h-NOEC = 0.04mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）生長阻害⁵⁾
33d-NOEC = 0.26mg/L：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）成長阻害^{5) vi)}
72h-EC₅₀ = 0.86mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）生長阻害⁵⁾
48h-EC₅₀ = 1.35mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）遊泳阻害^{5) 6) vi)}
96h-LC₅₀ = 2.4mg/L：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）^{5) 6)}
- ・規制
 - 〔化審法〕 法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（170 デカン-1-オール、171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14 のいずれかを含むものに限る。））
 - 〔化管法〕 法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（257 デシルアルコール（別名デカノール））
法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（34 アルカノール（炭素数が 10 のものに限る。）（別名デカノール））

参考文献

- 1) 農林水産省、農薬原体の国内生産及び輸入の数量（令和 3 農薬年度、令和 4 農薬年度及び令和 5 農薬年度）
- 2) 平成 24 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第 122 回審査部会 第 129 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料（2012 年 12 月 21 日）
- 3) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 6 巻（2008）
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、デカン-1-オール（2018 年度）
- 5) 環境省、優先評価化学物質通し番号 170 デカン-1-オール、優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ 有害性情報の詳細資料（2017 年 11 月）
- 6) 環境省環境保健部環境リスク評価室、化学物質の環境リスク評価、第 7 巻（2009）

[2-2] 1-ウンデカノール（CAS 登録番号：112-42-5）

<底質>

底質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 1.4 ng/g-dry において欠測扱いとなった 2 地点を除く 26 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は 6.2 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-ウンデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	2024	8/75	3/26	nd～6.2	1.4

【参考：1-ウンデカノール】

- ・用途：香料、医薬の中間体及び溶剤ⁱⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱⁱ⁾
アルカノール（アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのもの又はアルキル基の炭素数が 11 から 14 までのいずれかを含むものに限る。）として
2019 年度：105,088 t
2020 年度：98,923 t
2021 年度：109,077 t
2022 年度：103,996 t
2023 年度：99,103 t

- ・P R T R 排 出 量 : 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性 : 良分解性(類似化学物質(1-オクタノール、1-トリデカノール、1-ヘキサデカノール及び 1-ヘキサコサノール)の分解性との比較により判定)¹⁾
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 26.3 %、底質 0.225 %、大気 2.59 %、土壌 70.9 %^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 3,000 mg/kg、ラット(経口)^{vii)} viii)
LC₅₀ = 4,000 mg/m³ 超(6時間)、ラット(吸入)²⁾³⁾
- ・反復投与毒性等 : GHS 分類: 分類できない(反復ばく露に関する知見がない。)²⁾
- ・発 がん 性 : GHS 分類: 分類できない(発がん性に関する知見がない。)²⁾
- ・生態影響 : 96h-LC₅₀ = 1.04mg/L: ファットヘッドミノー (*Pimephales promelas*)^{2)3)xi)}
- ・規制
[化審法] 法(平成21年5月20日改正後)第2条第5項、優先評価化学物質(171 アルカノール(C=10~16)(C=11~14のいずれかを含むものに限る。))

参考文献

- 1) 平成24年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第122回審査部会第129回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料(2012年12月21日)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、ウンデカン-1-オール(2011年度)
- 3) OECD, Long Chain Alcohols, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)

[2-3] 1-ドデカノール (CAS 登録番号: 112-53-8)

<底質>

底質について本調査としては2024年度が初めての調査であり、28地点を調査し、検出下限値 0.72 ng/g-dry において欠測扱いとなった1地点を除く27地点中25地点で検出され、検出濃度は 51 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-ドデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	2024	68/79	25/27	nd~51	0.72

【参考: 1-ドデカノール】

- ・用 途 : アルコール、合成樹脂滑剤、合成洗剤の原料、安定剤、可塑剤、香粧品香料の溶剤及び食品香料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アルカノール(アルキル基の炭素数が10から16までのもの又はアルキル基の炭素数が11から14までのいずれかを含むものに限る。)として
2019年度: 105,088 t
2020年度: 98,923 t
2021年度: 109,077 t
2022年度: 103,996 t
2023年度: 99,103 t

・PRTR 排出量：PRTR 集計結果 (kg/年) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	18,856	2	0	0	18,858	4,709	23,567
2011	88,321	46	0	0	88,367	5,585	93,952
2012	96,703	34	0	0	96,737	4,799	101,536
2013	96,408	45	0	0	96,452	5,176	101,628
2014	99,460	40	0	0	99,500	5,402	104,902
2015	100,262	92	0	0	100,353	12,255	112,608
2016	95,960	236	0	0	96,196	10,138	106,334
2017	94,998	31	0	0	95,030	5,188	100,218
2018	104,504	33	0	0	104,536	5,408	109,944
2019	93,127	32	0	0	93,159	5,993	99,152
2020	77,822	29	0	0	77,851	5,806	83,657
2021	73,259	22	0	0	73,281	9,501	82,782
2022	87,438	51	0	0	87,489	9,284	96,773
2023	106,479	100	0	0	106,579	5,750	112,329

・生 分 解 性：良分解性（類似化学物質（1-オクタノール、1-トリデカノール、1-ヘキサデカノール及び 1-ヘキサコサノール）の分解性との比較により判定）¹⁾

・濃 縮 性：不詳

・媒体別分配予測：水質 24.3 %、底質 0.413 %、大気 1.34 %、土壌 74.0 % ^{iv)} 注 2)

・急性毒性等：LD₅₀ = 10,600 mg/kg、ラット（経口）²⁾³⁾
LC₅₀ = 71,000mg/m³ 超（1 時間）、ラット（吸入）^{v)}

・反復投与毒性等：ラットを用いた混餌投与による雄で 41～45 日、雌で約 54 日の反復投与毒性・生殖発生毒性併合試験において、100 mg/kg/日以上用量で総白血球数の軽度減少がみられたが、白血球百分比の各値に変動はなく、毒性学的意義は不明とされた。500 mg/kg/日以上用量で赤血球数の減少がみられた。^{2)3)v)}

・発 がん 性：GHS 分類：分類できない（発がん性に関する知見がない。）²⁾

・生 態 影 響：21d-NOEC = 0.014 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）生残、内的自然増加率及び繁殖阻害^{3)4)v)}

48h-EC₅₀ = 0.14 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）遊泳阻害⁴⁾

72h-NOEC = 0.38 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）生長阻害⁴⁾

96h-LC₅₀ = 0.48 mg/L：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）⁴⁾

72h-EC₅₀ = 2.1 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）生長阻害⁴⁾

・規制

〔化審法〕法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14 のいずれかを含むものに限る。））

〔化管法〕法第 2 条第 2 項、施行令（平成 20 年 11 月 21 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（273 1-ドデカノール（別名 *n*-ドデシルアルコール））

法第 2 条第 2 項、施行令（令和 3 年 10 月 20 日改正後）第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質（315 1-ドデカノール（別名 *n*-ドデシルアルコール））

参考文献

- 1) 平成 24 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第 122 回審査部会 第 129 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料（2012 年 12 月 21 日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、ドデカン-1-オール（2018 年度）
- 3) OECD, Long Chain Alcohols, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)
- 4) 環境省、優先評価化学物質通し番号 171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14 のいずれかを含むものに限る。）、優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価 II 有害性情報の詳細資料（中間報告）（2021 年 2 月）

[2-4] 1-トリデカノール (CAS登録番号：112-70-9)

<底質>

底質について 28 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/g-dry において欠測扱いとなった 1 地点を除く 27 地点中 13 地点で検出され、検出濃度は 120 ng/g-dry までの範囲であった。

1977 年度には 2 地点を調査し、検出下限値 6,000 ng/g-dry において両地点で不検出であった。

2024 年度と 1977 年度に同一地点で調査を行った 1 地点は 1977 年度に不検出で、2024 年度は検出下限値を下げて測定したが不検出であった。

○1-トリデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	1977	0/6	0/2	nd	6,000
	2024	34/79	13/27	nd～120	1.1

2024 年度に調査を行った地点のうち 1 地点は、1977 年度にも同一地点で調査を行っており、過年度に不検出で、2024 年度は検出下限値を下げて測定したが不検出であった。

○過去に同一地点で行われた調査結果との比較

地点		実施年度	測定値 (ng/g-dry)			報告時検出下限値 (ng/g-dry)
①	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	1977	nd	nd	nd	6,000
		2024	nd	nd	nd	0.94

【参考：1-トリデカノール】

- ・用 途 : 塩ビ可塑剤、界面活性剤及び潤滑油添加剤の原料並びにグラビアインキ添加剤ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アルカノール (アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのもの又はアルキル基の炭素数が 11 から 14 までのいずれかを含むものに限る。) として
2019 年度 : 105,088 t
2020 年度 : 98,923 t
2021 年度 : 109,077 t
2022 年度 : 103,996 t
2023 年度 : 99,103 t
- ・P R T R 排 出 量 : 届出及び推計の対象外
- ・生 分 解 性 : 分解性が良好 (標準法 (試験期間 14 日間、被試験物質 100mg/L、活性汚泥 30mg/L)、BOD による分解度 : 76.8 %、100 %、GC による分解度 : 100 %) ¹⁾ 注 1)
- ・濃 縮 性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 20.9 %、底質 0.583 %、大気 1.54 %、土壌 77.0 % ^{iv)} 注 2)
- ・急性毒性等 : LD₅₀ = 4,750 mg/kg、ラット (経口) ^{v)}
LC₅₀ = 12,000 mg/m³ 超 (6 時間)、ラット (吸入) ^{v)}
- ・反復投与毒性等 : 不詳
- ・発 がん 性 : 不詳
- ・生態影響 : PNEC = 0.000082mg/L (根拠 : 72d-NOEC (緑藻類) = 0.0041 mg/L、不確実係数積 50) ²⁾
72h-NOEC = 0.0041mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 生長阻害 ²⁾
72h-EC₅₀ = 0.017mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 生長阻害 ²⁾
21d-NOEC = 0.033mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*) 繁殖阻害 ²⁾
48h-EC₅₀ = 0.31mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*) 遊泳阻害 ²⁾
96h-LC₅₀ = 0.55mg/L : ゼブラフィッシュ (*Danio rerio*) ²⁾
- ・規制
[化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正後) 第 2 条第 5 項、優先評価化学物質 (171 アルカノール (C=10 ~16) (C=11~14 のいずれかを含むものに限る。))
[大防法] 法第 2 条第 4 項、揮発性有機化合物 (1-トリデカノール)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報（1978年12月12日）
- 2) 環境省、優先評価化学物質通し番号 171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14のいずれかを含むものに限る。）、優先評価化学物質のリスク評価（一次）生態影響に係る評価Ⅱ 有害性情報の詳細資料（中間報告）（2021年2月）

[2-5] 1-テトラデカノール（CAS登録番号：112-72-1）

<底質>

底質について本調査としては2024年度が初めての調査であり、28地点を調査し、検出下限値 0.76 ng/g-dry において欠測扱いとなった1地点を除く27地点中26地点で検出され、検出濃度は390 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-テトラデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	2024	71/79	26/27	nd～390	0.76

【参考：1-テトラデカノール】

- ・用途：可塑剤の原料、有機合成の中間体並びに洗剤及び化粧品の原料¹⁾
- ・生産量・輸入量：化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
アルカノール（アルキル基の炭素数が10から16までのもの又はアルキル基の炭素数が11から14までのいずれかを含むものに限る。）として
2019年度：105,088 t
2020年度：98,923 t
2021年度：109,077 t
2022年度：103,996 t
2023年度：99,103 t
- ・PRTR排出量：届出及び推計の対象外
- ・生分解性：良分解性（類似化学物質（1-オクタノール、1-トリデカノール、1-ヘキサデカノール及び1-ヘキサコサノール）の分解性との比較により判定）¹⁾
- ・濃縮性：不詳
- ・媒体別分配予測：水質20.1%、底質0.907%、大気1.45%、土壌77.6%^{iv)} 注2)
- ・急性毒性等：LD₅₀=20,000 mg/kg 超、ラット（経口）^{2)3)v)}
LC₅₀=1,500mg/m³ 超（1時間）、ラット（吸入）^{3)v)}
- ・反復投与毒性等：GHS分類：分類できない（反復ばく露に関する知見がない。）²⁾
- ・発がん性：GHS分類：分類できない（発がん性に関する知見がない。）²⁾
- ・生態影響：21d-NOEC=0.0016 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）繁殖阻害^{3)4)v)}
- ・規制
[化審法] 法（平成21年5月20日改正後）第2条第5項、優先評価化学物質（171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14のいずれかを含むものに限る。））

参考文献

- 1) 平成24年度第8回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第122回審査部会第129回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料（2012年12月21日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、テトラデカン-1-オール（2013年度）
- 3) OECD, Long Chain Alcohols, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)
- 4) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、テトラデカン-1-オール（2022年度）

[1-6] 1-ペンタデカノール (CAS 登録番号 : 629-76-5)

<底質>

底質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 0.91 ng/g-dry において欠測扱いとなった 1 地点を除く 27 地点中 24 地点で検出され、検出濃度は 400 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-ペンタデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	2024	66/79	24/27	nd~400	0.91

【参考：1-ペンタカノール】

- ・用途 : 有機合成の原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量 : 化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 アルカノール（アルキル基の炭素数が 10 から 16 までのもの又はアルキル基の炭素数が 11 から 14 までのいずれかを含むものに限る。）として
 2019 年度 : 105,088 t
 2020 年度 : 98,923 t
 2021 年度 : 109,077 t
 2022 年度 : 103,996 t
 2023 年度 : 99,103 t
- ・PRTR 排出量 : 届出及び推計の対象外
- ・生分解性 : 良分解性（類似化学物質（1-オクタノール、1-トリデカノール、1-ヘキサデカノール及び 1-ヘキサコサノール）の分解性との比較により判定）¹⁾
- ・濃縮性 : 不詳
- ・媒体別分配予測 : 水質 19.0 %、底質 1.44 %、大気 1.38 %、土壌 78.1 %^{iv)} 注 2)
- ・急性毒性等 : 不詳
- ・反復投与毒性等 : 不詳
- ・発がん性 : 不詳
- ・生態影響 : 21d-NOEC = 0.0078 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*) 繁殖阻害²⁾
- ・規制
 [化審法] 法（平成 21 年 5 月 20 日改正後）第 2 条第 5 項、優先評価化学物質（171 アルカノール（C=10 ~16）（C=11~14 のいずれかを含むものに限る。））

参考文献

- 1) 平成 24 年度第 8 回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会化学物質審議会第 122 回審査部会 第 129 回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会資料（2012 年 12 月 21 日）
- 2) OECD, Long Chain Alcohols, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)

[1-7] 1-ヘキサデカノール (CAS 登録番号 : 36653-82-4)

<底質>

底質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、28 地点を調査し、検出下限値 0.81 ng/g-dry において欠測扱いとなった 1 地点を除く 27 地点全てで検出され、検出濃度は 1,200 ng/g-dry までの範囲であった。

○1-ヘキサデカノールの検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
底質 (ng/g-dry)	2024	77/79	27/27	nd～1,200	0.81

【参考：1-ヘキサデカノール】

- ・用途：界面活性剤及び化粧品の原料ⁱ⁾
- ・生産量・輸入量：化審法優先評価物質届出結果公表値ⁱⁱ⁾
 アルカノール（アルキル基の炭素数が10から16までのもの又はアルキル基の炭素数が11から14までのいずれかを含むものに限る。）として
 2019年度：105,088 t
 2020年度：98,923 t
 2021年度：109,077 t
 2022年度：103,996 t
 2023年度：99,103 t
- ・PRTR排出量：届出及び推計の対象外
- ・生分解性：難分解性ではない（標準法（試験期間28日間、被試験物質100 mg/L、活性汚泥30 mg/L）、BODによる分解度：73 %、94 %、92 %（平均8 %）、GCによる分解度：86 %、100 %、100 %（平均95 %））^{1) 注1)}
- ・濃縮性：不詳
- ・媒体別分配予測：水質22.0 %、底質2.49 %、大気1.03 %、土壌74.5 %^{iv) 注2)}
- ・急性毒性等：LD₅₀ = 2,000 mg/kg 超、ラット（経口）^{2) 3) v)}
- ・反復投与毒性等：ラットに、0、1、2.5又は5 %の濃度で13週間混餌投与した。5 %の濃度群における体重の増加及び摂餌量の減少が主な所見で、場合によっては2.5 %レベルでも見られた。相対肝重量は、5 %の濃度群の雄で増加したが、顕微鏡所見がないため、この変化の意義は不明である。体重増加及び摂餌量の減少から、NOAELが餌濃度1 %（約750 mg/kg/日に相当）とされた。^{2) 3) v)}
- ・発がん性：GHS分類：分類できない（発がん性に関するデータ不足のため。）²⁾
- ・生態影響：96h-LC₅₀ = 0.4 mg/L 超：ニジマス（*Oncorhynchus mykiss*）^{2) 3) v)}
- ・規制
 [化審法] 法（平成21年5月20日改正後）第2条第5項、優先評価化学物質（171 アルカノール（C=10～16）（C=11～14のいずれかを含むものに限る。））

参考文献

- 1) 経済産業省製造産業局化学物質管理課、既存化学物質安全性点検データ、経済産業公報（2002年3月26日）
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府によるGHS分類結果、1-ヘキサデカンノール（2023年度）
- 3) OECD, Long Chain Alcohols, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2007)

[3] アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が 8、9、10、12、14、16 又は 18 のもの）及びその塩類

【2024 年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化管法

2021 年 10 月 20 日の政令改正ではドデシル硫酸ナトリウムが継続して第一種指定化学物質となったが、近年に実態調査がなされていなかったため、環境実態調査を行い、その結果によっては次回物質見直しにおいて指定の見直しを検討するため。

・調査内容及び結果

[3-1] オクチル硫酸及びその塩類（CAS 登録番号：110-11-2、142-31-4 等）

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 71 ng/L において 35 地点全てで不検出であった。

○オクチル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	0/35	0/35	nd	71

[3-2] ノニル硫酸及びその塩類（CAS 登録番号：63283-24-9、1072-15-7 等）

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 40 ng/L において 1 地点で検出され、検出濃度は 200 ng/L であった。

○ノニル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	1/35	1/35	nd～200	40

[3-3] デシル硫酸及びその塩類（CAS 登録番号：142-98-3、142-87-0 等）

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 69 ng/L において 2 地点で検出され、検出濃度は 5,000 ng/L までの範囲であった。

○デシル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	2/35	2/35	nd～5,000	69

[3-4] ドデシル硫酸及びその塩類 (CAS 登録番号：151-41-7、151-21-3 等)

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 81 ng/L において 21 地点で検出され、検出濃度は 2,800 ng/L までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、排出源を考慮した地点の幾つかで濃度が高かった。

○ドデシル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	21/35	21/35	nd～2,800	81

[3-5] テトラデシル硫酸及びその塩類 (CAS 登録番号：4754-44-3、1191-50-0 等)

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 35 ng/L において 19 地点で検出され、検出濃度は 1,100 ng/L までの範囲であった。

○テトラデシル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	19/35	19/35	nd～1,100	35

[3-6] ヘキサデシル硫酸及びその塩類 (CAS 登録番号：143-02-2、1120-01-0 等)

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 48 ng/L において 22 地点で検出され、検出濃度は 2,900 ng/L までの範囲であった。

○デシル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	22/35	22/35	nd～2,900	48

[3-7] オクタデシル硫酸及びその塩類 (CAS 登録番号：143-03-3、1120-04-3 等)

<水質>

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、35 地点を調査し、検出下限値 25 ng/L において 12 地点で検出され、検出濃度は 1,600 ng/L までの範囲であった。

○オクタデシル硫酸及びその塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	12/35	12/35	nd～1,600	25

【参考：アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8から18までのもの）及びその塩類】

- ・用 途 : オクチル硫酸ナトリウム
 メッキ薬及びイオンクロマトグラフィー用試薬 ⁱ⁾
 ドデシル硫酸ナトリウム
 陰イオン界面活性剤、化粧品用洗浄剤・起泡剤・乳化剤、家庭用合成洗剤基剤 ⁱ⁾
 テトラデシル硫酸ナトリウム
 医薬部外品添加物（化粧品等）、界面活性剤原料 ⁱ⁾
 ヘキサデシル硫酸ナトリウム
 医薬部外品添加物（薬用石けん、化粧品等）、界面活性剤、乳化剤、発泡剤及び洗浄剤 ⁱ⁾
 オクタデシル硫酸ナトリウム
 医薬部外品添加物（化粧品等） ⁱ⁾

- ・生産量・輸入量 : 化審法優先評価化学物質届出結果公表値 ⁱⁱ⁾
 アルキル硫酸（アルキル基の炭素数が8から18までのもの）ナトリウムとして
 2019年度：3,633 t
 2020年度：3,392 t
 2021年度：3,724 t
 2022年度：4,005 t
 2023年度：2,952 t

- ・PRTR 排 出 量 : PRTR 集計結果 (kg/年、ドデシル硫酸ナトリウムとして) ⁱⁱⁱ⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2010	23	15,084	0	0	15,107	1,719,666	1,734,773
2011	24	18,062	0	0	18,086	1,986,620	2,004,706
2012	25	14,360	0	0	14,385	1,911,276	1,925,661
2013	6	13,767	0	0	13,773	1,858,384	1,872,157
2014	7	15,744	0	0	15,750	2,248,363	2,264,113
2015	1	15,533	0	0	15,534	2,652,003	2,667,537
2016	1	16,026	0	0	16,027	2,699,609	2,715,636
2017	1	16,533	0	0	16,534	2,573,394	2,589,928
2018	1	17,903	0	0	17,904	2,666,155	2,684,059
2019	6	15,178	0	0	15,184	2,461,391	2,476,575
2020	1	16,301	0	0	16,302	2,084,664	2,100,966
2021	0	18,442	0	0	18,442	1,998,199	2,016,641
2022	0	15,821	0	0	15,821	1,737,649	1,753,470
2023	1	12,763	0	0	12,764	1,284,371	1,297,135

- ・生 分 解 性 : オクチル硫酸ナトリウム
 水中での生分解スクリーニング試験（OECD テストガイドライン 301B、CO₂-Evolution 法）において、容易に生分解した（29 日後に CO₂ 理論値に対する CO₂ 測定値の平均が 93.5 %）。^{v)}
 デシル硫酸ナトリウム
 水中での生分解スクリーニング試験（OECD テストガイドライン 301D、Closed Bottle 法）において、容易に生分解した（30 日後に DO 理論値に対する BOD 測定値が 92～98 %）。^{v)}
 ドデシル硫酸ナトリウム
 分解性の良好な物質（標準法（試験期間 14 日間、被試験物質 100 mg/L、活性汚泥 30 mg/L）、BOD による分解度：85.0 %、TOC による分解度：99.3 %、吸光光度計による分解度：99.3 %）¹⁾
 注 1)

- ・濃 縮 性 : 不詳

- ・媒体別分配予測 : オクチル硫酸ナトリウム
 水質 20.6 %、底質 0.261 %、大気 0.856 %、土壌 78.2 % ^{iv) 注 2)}
 ノニル硫酸ナトリウム
 水質 20.3 %、底質 0.416 %、大気 0.810 %、土壌 78.5 % ^{iv) 注 2)}
 デシル硫酸ナトリウム
 水質 20.1 %、底質 0.685 %、大気 0.771 %、土壌 78.5 % ^{iv) 注 2)}
 ドデシル硫酸ナトリウム
 水質 19.8 %、底質 1.99 %、大気 0.701 %、土壌 77.5 % ^{iv) 注 2)}
 テトラデシル硫酸ナトリウム
 水質 18.9 %、底質 5.97 %、大気 0.626 %、土壌 74.5 % ^{iv) 注 2)}
 ヘキサデシル硫酸ナトリウム
 水質 16.4 %、底質 16.3 %、大気 0.527 %、土壌 66.8 % ^{iv) 注 2)}
 オクタデシル硫酸ナトリウム
 水質 6.85 %、底質 40.6 %、大気 0.156 %、土壌 52.4 % ^{iv) 注 2)}

- ・急性毒性等： オクチル硫酸ナトリウム
 LD_{50} = 雌 2,000 mg/kg 超、ラット（経口）^㉞
 デシル硫酸ナトリウム
 LD_{50} = 雄 約 580 mg/kg、雌 290～580 mg/kg、ラット（経口）²⁾
 ドデシル硫酸ナトリウム
 LD_{50} = 1,200 mg/kg、ラット（経口）^{2)3)㉞}
 アルキル硫酸ナトリウム（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのものの混合物）
 LD_{50} = 2,800 mg/kg、マウス（経口）²⁾
 アルキル硫酸ナトリウム（アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物）
 LD_{50} = 4,010 mg/kg、ラット（経口）^{2)㉞}
- ・反復投与毒性等： ドデシル硫酸ナトリウム
 ラットの経口投与試験において 1,200 mg/kg/日の用量で下痢、自発運動低下、努力呼吸、呼吸数減少及び昏睡が認められている。³⁾
 アルキル硫酸ナトリウム（アルキル基の炭素数が 12 から 15 までのものの混合物）
 ラットに 0、0.07、0.14、0.28、0.56、1.13 又は 2.25% の濃度で 13 週間混餌投与（雄は 0、58、113、228、470、961 又は 1,944 mg/kg/日、雌は 0、66、131、261、506、1,070 又は 2,218 mg/kg/日に相当）した結果、NOEL は 0.14%（雄は 113 mg/kg/日、雌は 131 mg/kg/日）に、NOAEL は 0.56%（雄は 470 mg/kg/日、雌は 506 mg/kg/日）とした。適応応答として、体重減少及び摂餌量の減少による相対肝重量の増加、肝経皮周囲肥大、血清アルカリホスファターゼ（AP）活性の上昇などが観察された。^{2)㉞}
 アルキル硫酸ナトリウム（アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物）
 ラットに 55、165 又は 495 mg/kg/日を 13 週間強制経口投与した結果、NOAEL は 55 mg/kg/日とされた。165 mg/kg/日群では、食物消費量と体重増加が減少し、相対肝重量が増加した。495 mg/kg/日では、明らかな胃炎の徴候がみられ、肝臓の絶対重量および相対重量が増加した。²⁾
- ・発がん性： ドデシル硫酸ナトリウム
 GHS 分類：分類できない（発がん性に関するデータ不足のため。）。³⁾
- ・生態影響： オクチル硫酸ナトリウム
 $48h-EC_{50}$ = 100 mg/L 超：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^㉞
 $96h-LC_{50}$ = 100 mg/L 超：ゼブラフィッシュ（*Danio rerio*）^㉞
 デシル硫酸ナトリウム
 $72h-EC_{10}$ = 0.95 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^㉞
 $21d-NOEC$ = 1.4 mg/L：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、繁殖阻害^㉞
 $72h-EC_{50}$ = 8.64 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害^㉞
 $24h-LC_{50}$ = 13 mg/L：コイ（*Cyprinodon variegatus*）^㉞
 $24h-EC_{50}$ = 100 mg/L 超：オオミジンコ（*Daphnia magna*）、遊泳阻害^㉞
 ドデシル硫酸ナトリウム
 $96h-EC_{50}$ = 0.12 mg/L：アカルチア（*Acartia tonsa*）、遊泳阻害²⁾³⁾
 $7d-NOEC$ = 0.88 mg/L：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）、繁殖阻害^{2)3)㉞}
 $96h-LC_{50}$ = 1.2 mg/L：トウゴロウイワシ科の一種（*Menidia menidia*）³⁾
 $42d-NOEC$ = 1.36 mg/L 以上：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）、成長阻害、死亡^{2)㉞}
 $72h-EC_{10}$ = 12 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害²⁾
 $72h-EC_{50}$ = 117 mg/L：緑藻類（*Pseudokirchneriella subcapitata*）、生長阻害²⁾
 テトラデシル硫酸ナトリウム
 $7d-NOEC$ = 0.062 mg/L 未満：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）、繁殖阻害²⁾
 $34d-NOEC$ = 0.11 mg/L：ファットヘッドミノー（*Pimephales promelas*）、幼生の生残率、アルキル基の炭素数が 14 及び 15 のものの混合物²⁾
 $72h-NOEC$ = 1.0 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害、アルキル基の炭素数が 14 及び 15 のものの混合物²⁾
 $48h-LC_{50}$ = 1.58 mg/L：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）²⁾
 $48h-LC_{50}$ = 2.5 mg/L：メダカ（*Oryzias latipes*）²⁾
 $72h-EC_{50}$ = 4.9 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害。アルキル基の炭素数が 14 及び 15 のものの混合物²⁾
 ヘキサデシル硫酸ナトリウム
 $48h-LC_{50}$ = 0.15 mg/L：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）²⁾
 $7d-NOEC$ = 0.204 mg/L：ニセネコゼミジンコ（*Ceriodaphnia dubia*）、繁殖阻害²⁾
 $48h-LC_{50}$ = 0.50 mg/L：メダカ（*Oryzias latipes*）²⁾
 $14d-NOEC$ = 1.65 mg/L：ファットヘッドミノー（*Danio rerio*）、死亡、アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物²⁾
 $72h-EC_{50}$ = 34 mg/L：緑藻類（*Desmodesmus subspicatus*）、生長阻害。アルキル基の炭素数が 16 から 18 までのものの混合物²⁾

オクタデシル硫酸ナトリウム

7d-NOEC = 0.602 mg/L : ニセネコゼミジンコ (*Ceriodaphnia dubia*)、繁殖阻害²⁾

48h-LC₅₀ = 0.69 mg/L 超 : ニセネコゼミジンコ (*Ceriodaphnia dubia*)²⁾

48h-LC₅₀ = 270 mg/L 超 : メダカ (*Oryzias latipes*)²⁾

・規制

[化審法]

法(平成21年5月20日改正後)第2条第5項、優先評価化学物質(214 ナトリウム=アルキル(C=8~18)=スルファート)

[化管法]

法第2条第2項、施行令(平成20年11月21日改正後)第1条別表第1、第一種指定化学物質(275 ドデシル硫酸ナトリウム)

法第2条第2項、施行令(令和3年10月20日改正後)第1条別表第1、第一種指定化学物質(318 ドデシル硫酸ナトリウム)

参考文献

- 1) 通商産業省基礎産業局化学品安全課、既存化学物質安全性点検データ、通産省公報(1976年5月28日)
- 2) OECD, Alkyl sulfates, Alkane sulfonates and α -Olefin sulfonates, Screening Information Dataset (SIDS) Initial Assessment Report (2009)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、ドデシル硫酸ナトリウム(2015年度)

[4] *N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類（CAS 登録番号：112-00-5 (塩化物)、1119-94-4 (臭化物) 等）

【2024 年度調査媒体：水質】

・調査要望理由

化審法

優先評価化学物質に指定され第二種特定化学物質への指定を検討する必要があるが、近年の調査実績がないことから、環境残留実態の調査を優先的に行い、環境中における実態を把握することが必要とされたため。

・調査内容及び結果

＜水質＞

水質について本調査としては 2024 年度が初めての調査であり、31 地点を調査し、検出下限値 1.1 ng/L に於いて欠測扱いとなった 1 地点を除く 30 地点中 12 地点で検出され、検出濃度は 6.4 ng/L までの範囲であった。

調査結果を調査地点別にみると、下水処理場からの排水の影響を強く受けていると考えられる地点の幾つかで濃度が高かった。

○*N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類の検出状況

媒体	実施年度	検出頻度		検出範囲	検出下限値
		検体	地点		
水質 (ng/L)	2024	12/30	12/30	nd～6.4	1.1

【参考：*N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩類】

・用途：界面活性剤、医薬部外品添加物（化粧品等）、乳化分散剤、帯電防止剤、表面処理剤及び染色助剤⁹⁾

・生産量・輸入量：化審法優先化学物質届出結果公表値¹⁰⁾

2019 年度：397 t
2020 年度：318 t
2021 年度：390 t
2022 年度：297 t
2023 年度：275 t

・PRTR 排出量：RTR 集計結果 (kg/年)¹¹⁾

年度	届出排出量集計値					届出外排出量 推計値	排出量合計
	大気	公共用水域	土壌	埋立	合計		
2023	0	1,101	0	0	1,101	48,352	49,453

・生分解性：塩化物

水中での生分解スクリーニング試験（OECD テストガイドライン 301B、CO₂-Evolution 法）において、容易に生分解した（28 日後に CO₂ 理論値に対する CO₂ 測定値が 61.3 % 及び 66.8 %）。¹²⁾

・濃縮性：不詳

・媒体別分配予測：水質 15.4 %、底質 3.10 %、大気 0.00585 %、土壌 81.5 %（塩化物として）¹³⁾ 注 2)

・急性毒性等：塩化物

LD₅₀ = 800 mg/kg、ラット（経口）¹⁴⁾

臭化物

LD₅₀ = 雄 50 mg/kg 超、300 mg/kg 未満、ラット（経口）¹⁵⁾

- ・反復投与毒性等 : 塩化物
GHS 分類 : 分類できない (反復ばく露に関するデータ不足のため。) 。¹⁾
臭化物
GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。) 。²⁾
- ・発 がん 性 : 塩化物
GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータがない。) 。¹⁾
臭化物
GHS 分類 : 分類できない (発がん性に関するデータ不足のため。) 。²⁾
- ・生態影響 : 塩化物
72h-NOEC = 0.01 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 、生長阻害^{3)v)}
72h-EC₅₀ = 0.036 mg/L : 緑藻類 (*Pseudokirchneriella subcapitata*) 、生長阻害^{3)v)}
48h-LC₅₀ = 0.46 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*)^{3)v)}
臭化物
72h-NOEC = 0.00158 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*) 、生長阻害^{2)v)}
72h-EC₅₀ = 0.0599 mg/L : 緑藻類 (*Desmodesmus subspicatus*) 、生長阻害^{2)v)}
48h-EC₅₀ = 0.135 mg/L : オオミジンコ (*Daphnia magna*) 、遊泳阻害^{2)v)}
- ・規制
[化審法] 法 (平成 21 年 5 月 20 日改正後) 第 2 条第 5 項、優先評価化学物質 (229 *N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩)
[化管法] 法第 2 条第 2 項、施行令 (令和 3 年 10 月 20 日改正後) 第 1 条別表第 1、第一種指定化学物質 (341 *N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウムの塩)

参考文献

- 1) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、*N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウム=クロリド (2021 年度)
- 2) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、*N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウム=プロミド (2021 年度)
- 3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、政府による GHS 分類結果、*N,N,N*-トリメチルドデカン-1-アミニウム=クロリド (2020 年度)

- 注 1) 分解性は、分解度試験によって得られた結果。分解度試験とは「新規化学物質等に係る試験の方法について（昭和 49 年 7 月 13 日環保業第 5 号、薬発第 615 号、49 基局第 392 号）」若しくは「新規化学物質等に係る試験の方法について（平成 15 年 11 月 21 日薬食発第 1121002 号、平成 15・11・13 製局第 2 号、環保企発第 031121002 号）」又はそれらの改正を原則として実施されたものをいい、「標準法」、「逆転法」、「Closed Bottle 法」及び「修正 SCAS 法」とはそれぞれ OECD テストガイドラインの 301C、302C、301D 及び 302A に準拠して実施されたものをいう。
- 注 2) 媒体別分配予測は、U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 における Level III Fugacity Model では、水質、大気及び土壌への排出速度をそれぞれ 1,000kg/hr・km と仮定した場合における媒体別分配を予測している。
- 注 3) 「大防法」とは「大気汚染防止法」（昭和 43 年法律第 97 号）をいう。
- 注 4) 「水濁法」とは「水質汚濁防止法」（昭和 45 年法律第 138 号）をいう。

●参考文献（全物質共通）

- i) 独立行政法人製品評価技術基盤機構、化学物質総合情報提供システム（NITE-CHIRP）
(https://www.chem-info.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop、2024 年 10 月閲覧)
- ii) 経済産業省、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和 48 年法律第 117 号）に基づく監視化学物質、優先評価化学物質、一般化学物質届出結果の公表値
(http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/information/volume_index.html、2024 年 10 月閲覧)
- iii) 環境省、「化管法ホームページ（PRTR インフォメーション広場）」「全国の届出排出量・移動量」及び「届出外排出量」、「対象化学物質一覧」(<http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html>、2024 年 10 月閲覧)
- iv) U.S. EPA, Estimation Programs Interface (EPI) Suite v4.11 (<https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/epi-suite-tm-estimation-program-interface>) における Level III Fugacity Model
- v) European Chemicals Agency (ECHA), REACH registered substance factsheets (<https://echa.europa.eu/>、2024 年 10 月閲覧)
- vi) 環境省、生態影響試験結果一覧（令和 7 年 3 月版）(<http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html>、2025 年 10 月閲覧)
- vii) U.S. National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) Database (<http://ccinfoweb.ccohs.ca/rtecs/search.html>、2024 年 10 月閲覧)
- viii) U.S. National Library of Medicine, PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>、2024 年 10 月閲覧)

2024年度 モニタリング調査結果

1. 調査目的	141
2. 調査対象物質	141
3. 調査地点及び実施方法	156
(1) 試料採取機関	156
(2) 調査地点及び調査対象物質	157
(3) 試料の採取方法	157
(4) 分析法	157
(5) 調査対象生物種	157
表 1-1 2024年度モニタリング調査地点一覧（水質）	158
図 1-1 2024年度モニタリング調査地点（水質）	159
図 1-2 2024年度モニタリング調査地点（水質）詳細	160
表 1-2 2024年度モニタリング調査地点一覧（底質）	166
図 1-3 2024年度モニタリング調査地点（底質）	167
図 1-4 2024年度モニタリング調査地点（底質）詳細	168
表 1-3 2024年度モニタリング調査地点・生物種一覧（生物）	175
図 1-5 2024年度モニタリング調査地点（生物）	176
図 1-6 2024年度モニタリング調査地点（生物）詳細	177
表 1-4 2024年度モニタリング調査地点一覧（大気）	180
図 1-7 2024年度モニタリング調査地点（大気）	181
図 1-8 2024年度モニタリング調査地点（大気）詳細	182
表 2 調査対象生物種の特性等	186
表 3-1 2024年度モニタリング調査（生物 貝類）検体の概要	187
表 3-2 2024年度モニタリング調査（生物 魚類）検体の概要	187
表 3-3 2024年度モニタリング調査（生物 鳥類）検体の概要	188
4. モニタリング調査としての継続性に関する考察	189
(1) 調査対象物質及び媒体の推移	189
(2) 調査地点の推移	193
(3) 定量（検出）下限値の推移	195
(4) まとめ	196
表 4 モニタリング調査の年度別実施状況	197
表 5-1 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（水質）	203
表 5-2 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（底質）	204
表 5-3 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（生物）	206
表 5-4 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（大気）	207
表 6-1 モニタリング調査における検出下限値の比較（水質）	208
表 6-2 モニタリング調査における検出下限値の比較（底質）	210
表 6-3 モニタリング調査における検出下限値の比較（生物）	212
表 6-4 モニタリング調査における検出下限値の比較（大気）	214
表 7-1 モニタリング調査における定量下限値の比較（水質）	216
表 7-2 モニタリング調査における定量下限値の比較（底質）	218
表 7-3 モニタリング調査における定量下限値の比較（生物）	220
表 7-4 モニタリング調査における定量下限値の比較（大気）	222
5. 経年分析の方法	224
図 2 経年分析の手順及び分析結果に対する評価方法	226

6. 調査結果の概要	227
表 8-1 2024 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（水質及び底質）	228
表 8-2 2024 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（生物及び大気）	230
表 9 2024 年度モニタリング調査 定量〔検出〕下限値一覧表	232
表 10-1 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（水質）	234
表 10-2 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（底質）	236
表 10-3 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（生物）	238
表 10-4 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（大気）	240
表 11 2002 年度から 2024 年度における経年分析の水域分類	242
[1] 総 PCB	244
[2] HCB（ヘキサクロロベンゼン）	251
[3] アルドリン（参考）	258
[4] ディルドリン（参考）	254
[5] エンドリン（参考）	267
[6] DDT 類（参考）	271
[7] クロルデン類（参考）	295
[8] ヘプタクロル類（参考）	316
[9] トキサフェン類（参考）	326
[10] マイレックス（参考）	333
[11] HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン）類（参考）	337
[12] クロルデコン（参考）	354
[13] ヘキサブromobフェニル類（参考）	356
[14] ポリブromोजフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）（参考）	358
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	380
[16] ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	386
[17] ペンタクロロベンゼン	392
[18] エンドスルファン類（参考）	398
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブromoshクロドデカン類（参考）	402
[20] 総ポリ塩化ナフタレン（参考）	411
[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	415
[22] ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類（参考）	418
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	420
[24] ジコホル（参考）	426
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	428
[26] メトキシクロル	431
[27] デクロランプラス類	432
[28] UV-328	434
参考資料 1 継続的調査としての継続性に関する考察	436
参考資料 2 経年分析の方法等に関する補足説明	480
参考資料 3 カワウの卵の測定結果	484
参考資料 4 大気中の POPs 残留状況の高頻度監視結果	486

1. 調査目的

モニタリング調査は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」（昭和48年法律第117号）（以下「化審法」という。）の特定化学物質等について、一般環境中の残留状況を監視することを目的とする。また、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」（以下「POPs条約」という。）に対応するため、条約対象物質等の一般環境中及び人体中における残留状況の経年変化を把握することを目的とする。

※ POPs (Persistent Organic Pollutants: 残留性有機汚染物質)

2. 調査対象物質

2024年度のモニタリング調査は、POPs 条約の発効当初から対象物質に指定されている10物質（群）^{注1)}のうち PCB 類及び HCB（ヘキサクロロベンゼン）の2物質（群）、2009年5月に開催された同条約の第4回条約締約国会議（以下「COP4」という。）等において POPs 条約対象物質として採択されたペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)^{注2)}及びペンタクロロベンゼンの2物質、2015年5月に開催された同条約の第7回条約締約国会議（以下「COP7」という。）において POPs 条約対象物質として採択されたヘキサクロロブタ-1,3-ジエン、2017年4月から5月に開催された同条約の第8回条約締約国会議（以下「COP8」という。）において POPs 条約対象物質として採択された短鎖塩素化パラフィン類^{注3)}、2019年4月から5月に開催された同条約の第9回条約締約国会議（以下「COP9」という。）において POPs 条約対象物質として採択されたペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)^{注4)}、2021年7月及び2022年6月に開催された同条約の第10回条約締約国会議（以下「COP10」という。）において POPs 条約対象物質として採択されたペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)^{注5)}並びに2023年5月に開催された同条約の第11回条約締約国会議（以下「COP11」という。）において POPs 条約対象物質として採択されたメトキシクロル、デクロランプラス類及び UV-328の3物質（群）を加えた計11物質（群）を調査対象物質とした。調査対象物質と調査媒体との組合せは次のとおりである。

- (注1) 2009年度までは、POPs 条約の発効当初から対象物質に指定されている物質のうちポリ塩化ジベンゾ-*p*-ジオキシン及びポリ塩化ジベンゾフランを除く10物質（群）及び HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン）類について各物質とも毎年度の調査を行っていた。2010年度以降の調査においては、新たに条約の対象物質に追加された物質（群）等を追加する一方で、調査頻度を見直して一部の物質については数年おきの調査とすることとした。2024年度の調査では、POPs 条約対象物質のうち、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT 類^{注6)}、クロルデン類^{注7)}、ヘプタクロル類^{注8)}、トキサフェン類^{注9)}、マイレックス、HCH（ヘキサクロロシクロヘキサン）類^{注10)}、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類^{注11)}、エンドスルファン類、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類^{注12)}、ポリ塩化ナフタレン類^{注13)}、ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類^{注14)}並びにジコホルの17物質（群）の調査は行わなかった。なお、2024年度に調査を行わなかった17物質（群）についても最新年度までの調査結果を参考として本書に掲載している。
- (注2) POPs 条約では、ペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホンフルオリドが COP4で POPs 条約対象物質とすることとされ、直鎖及び分岐鎖のオクチル基を有するペルフルオロオクタンスルホン酸がモニタリングの対象とされているが、本調査ではこのうち直鎖のオクチル基を有するペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)を分析対象としている。
- (注3) POPs 条約では、アルキル基の炭素数が10から13までの塩素化パラフィン類が COP8で POPs 条約対象物質とすることとされているが、本調査ではアルキル基の炭素数が10から13までの塩素化パラフ

イン類のうち、水質、底質及び生物については塩素数が5から9までのものを、大気については塩素数が4から8までのものをそれぞれ対象としている。

- (注4) POPs 条約では、ペルフルオロオクタン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタン酸関連物質が COP9 で POPs 条約対象物質とすることとされ、直鎖及び分岐鎖のヘプチル基を有するペルフルオロオクタン酸がモニタリングの対象とされているが、本調査ではこのうち直鎖のヘプチル基を有するペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。
- (注5) POPs 条約では、ペルフルオロヘキサンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロヘキサンスルホン酸関連物質を POPs 条約対象物質とすることとされ、直鎖及び分岐鎖のヘキシル基を有するペルフルオロヘキサンスルホン酸がモニタリングの対象とされているが、本調査ではこのうち直鎖のヘキシル基を有するペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)を分析対象としている。
- (注6) POPs 条約では *p,p'*-DDT 及び *o,p'*-DDT が対象物質とされているが、本調査では環境中での分解産物である *p,p'*-DDE、*o,p'*-DDE、*p,p'*-DDD 及び *o,p'*-DDD を含めて DDT 類としている。
- (注7) POPs 条約では *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンが対象物質とされているが、本調査ではオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルを含めてクロルデン類としている。
- (注8) POPs 条約ではヘプタクロルが対象物質とされているが、本調査ではその代謝物である *cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドを含めてヘプタクロル類としている。
- (注9) POPs 条約では塩素化ボルナン及び塩素化カンフェンの工業混合物（約16,000の同族体又は異性体）が対象物質とされているが、本調査ではそのうち2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン（Parlar-26）、2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン（Parlar-50）及び2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン（Parlar-62）の3物質を分析対象としている。
- (注10) POPs 条約では、 α -HCH、 β -HCH 及び γ -HCH（別名：リンデン）が COP4 で POPs 条約対象物質とすることとされたが、本調査では δ -HCH も含めて HCH 類としている。
- (注11) POPs 条約では、テトラブロモジフェニルエーテル類、ペンタブロモジフェニルエーテル類、ヘキサブロモジフェニルエーテル類及びヘプタブロモジフェニルエーテル類が COP4 で POPs 条約対象物質とすることとされ、デカブロモジフェニルエーテルが COP8 で POPs 条約対象物質とすることとされているが、本調査ではそれらを含む臭素数が4から10のものについてポリブロモジフェニルエーテル類としている。
- (注12) POPs 条約では、 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンが COP6 で POPs 条約対象物質とすることとされたが、本調査では δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンも含めて1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類としている。ただし、2016年度から2019年度のすべての媒体及び2022年度の大気では、 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンのみを分析対象としている。
- (注13) POPs 条約では、塩素数が2から8までの塩化ナフタレンを含むものが COP7 で POPs 条約対象物質とすることとされており、本調査では塩素数が1のものを含めてポリ塩化ナフタレン類としている。
- (注14) POPs 条約では、ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類が COP7 で POPs 条約対象物質とすることとされているが、本調査ではペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールを分析対象としている。


物質 調査 番号	調査対象物質	調査媒体			
		水 質	底 質	生 物	大 気
[1]	PCB 類 総 PCB は、以下の表中に示した PCB 類の同族体ごとの総量を意味している。以降の紙面において総量としての結果のみを示しているが、各同族体およびコプラナーPCB の測定値はホームページに一覧表として掲載してある。 [1-1] モノクロロビフェニル類 [1-2] ジクロロビフェニル類 [1-3] トリクロロビフェニル類 [1-4] テトラクロロビフェニル類 [1-4-1] 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77) [1-4-2] 3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81) [1-5] ペンタクロロビフェニル類 [1-5-1] 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105) [1-5-2] 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#114) [1-5-3] 2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#118) [1-5-4] 2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123) [1-5-5] 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#126) [1-6] ヘキサクロロビフェニル類 [1-6-1] 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156) [1-6-2] 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157) [1-6-3] 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167) [1-6-4] 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169) [1-7] ヘプタクロロビフェニル類 [1-7-1] 2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170) [1-7-2] 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180) [1-7-3] 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189) [1-8] オクタクロロビフェニル類 [1-9] ノナクロロビフェニル類 [1-10] デカクロロビフェニル	○	○	○	○
[2]	HCB (ヘキサクロロベンゼン)	○	○	○	○
[3]	アルドリン (参考)				
[4]	ディルドリン (参考)				
[5]	エンドリン (参考)				
[6]	DDT 類 (参考) [6-1] <i>p,p'</i>-DDT [6-2] <i>p,p'</i>-DDE [6-3] <i>p,p'</i>-DDD [6-4] <i>o,p'</i>-DDT [6-5] <i>o,p'</i>-DDE [6-6] <i>o,p'</i>-DDD				
[7]	クロルデン類 (参考) [7-1] <i>cis</i>-クロルデン (参考) [7-2] <i>trans</i>-クロルデン (参考) [7-3] オキシクロルデン (参考) [7-4] <i>cis</i>-ノナクロル (参考) [7-5] <i>trans</i>-ノナクロル (参考)				
[8]	ヘプタクロル類 (参考) [8-1] ヘプタクロル (参考) [8-2] <i>cis</i>-ヘプタクロルエポキシド (参考) [8-3] <i>trans</i>-ヘプタクロルエポキシド (参考)				
[9]	トキサフェン類 (参考) [9-1] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン (Parlar-26) (参考) [9-2] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-50) (参考) [9-3] 2,2,5,5,8,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-62) (参考)				
[10]	マイレックス (参考)				

物質 調査 番号	調査対象物質	調査媒体			
		水 質	底 質	生 物	大 気
[11]	HCH 類 [11-1] α -HCH [11-2] β -HCH [11-3] γ -HCH (別名：リンデン) [11-4] δ -HCH				
[12]	クロルデコン (参考)				
[13]	ヘキサブromobiphenyl 類 (参考)				
[14]	ポリbromofenylエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの) [14-1] テトラbromofenylエーテル類 [14-1-1] 2,2',4,4'-テトラbromofenylエーテル (#47) [14-2] ペンタbromofenylエーテル類 [14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタbromofenylエーテル (#99) [14-3] ヘキサbromofenylエーテル類 [14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサbromofenylエーテル (#153) [14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサbromofenylエーテル (#154) [14-4] ヘプタbromofenylエーテル類 [14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6-ヘプタbromofenylエーテル (#175) [14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6-ヘプタbromofenylエーテル (#183) [14-5] オクタbromofenylエーテル類 [14-6] ノナbromofenylエーテル類 [14-7] デカbromofenylエーテル				
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	○	○	○	○
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	○	○	○	○
[17]	ペンタクロロベンゼン			○	○
[18]	エンドスルファン類 (参考) [18-1] α -エンドスルファン (参考) [18-2] β -エンドスルファン (参考)				
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane 類 [19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane [19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane [19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane [19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane [19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサbromocyclohexane				
[20]	ポリ塩化ナフタレン類 (参考) 総ポリ塩化ナフタレンは、ポリ塩化ナフタレン類の同族体ごとの総量を意味している。以降の紙面において総量としての結果のみを示している。				
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン				○
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類 (参考) [22-1] ペンタクロロフェノール (参考) [22-2] ペンタクロロアニソール (参考)				
[23]	短鎖塩素化パラフィン類 [23-1] 塩素化デカン類 [23-2] 塩素化ウンデカン類 [23-3] 塩素化ドデカン類 [23-4] 塩素化トリデカン類			○	○
[24]	ジコanol (参考)				
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	○	○	○	○
[26]	メトキシシクロ	○	○	○	
[27]	デクロランプラス類 [27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス [27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	○	○	○	
[28]	UV-328	○	○	○	

モニタリング調査の調査対象物質の物理化学的性状は次のとおりである。

[1] PCB 類

Polychlorinated biphenyls



$i = m+n = 1 \sim 10$

分子式 : $C_{12}H_{(10-i)}Cl_i$ ($i = m+n = 1 \sim 10$)

CAS : 27323-18-8 (1 塩化物)、22512-42-9 (2 塩化物)、25323-68-6 (3 塩化物)、26914-33-0 (4 塩化物)、25429-29-2 (5 塩化物)、26601-64-9 (6 塩化物)、28655-71-2 (7 塩化物)、31472-83-0 (8 塩化物)、53742-07-7 (9 塩化物)、2051-24-3 (10 塩化物)

既存化 : 該当なし

MW : 188.65~498.66

mp : 種類によって異なる。

bp : 種類によって異なる。


sw : 種類によって異なる。

比重等 : 種類によって異なる。

logPow : 種類によって異なる。

[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)

Hexachlorobenzene



分子式 : C_6Cl_6

CAS : 118-74-1

既存化 : 3-0076

MW : 284.78

mp : 230 °C ¹⁾

bp : 325 °C ¹⁾


sw : 0.0000096 g/kg (25 °C) ²⁾

比重等 : 2.044 (23 °C) ¹⁾

logPow : 5.73 ³⁾

[3] アルドリン (参考)

Aldrin



分子式 : $C_{12}H_8Cl_6$

CAS : 309-00-2

既存化 : 4-0303

MW : 364.91

mp : 103.8 °C ¹⁾

bp : 145 °C (0.27 kPa) ⁴⁾


sw : 0.0002 g/kg (25 °C) ²⁾

比重等 : 1.6 g/cm³ ⁵⁾

logPow : 6.50 ³⁾

[4] ディルドリン (参考)

Dieldrin



分子式 : $C_{12}H_8Cl_6O$

CAS : 60-57-1

既存化 : 4-0299

MW : 380.91

mp : 178.8 °C ¹⁾








bp : 330 °C ⁵⁾









sw : 0.00020 g/kg (25 °C) ²⁾

比重等 : 1.75 (25 °C) ²⁾






logPow : 5.40 ³⁾

(略称) 「CAS」とは CAS 登録番号を、「既存化」とは既存化学物質名簿における番号を、「MW」とは分子量を、「mp」とは融点を、「bp」とは沸点を、「sw」とは水への溶解度を、「比重等」とは比重 (単位なし) 又は密度 (単位あり) を、「logPow」とは *n*-オクタノール/水分配係数をそれぞれ意味する。


[5] エンドリン (参考) Endrin  分子式 : $C_{12}H_8Cl_6O$ CAS : 72-20-8 既存化 : 4-0299 MW : 380.91 mp : 200 °C ⁶⁾ bp : 245 °C (分解) ⁶⁾ sw : 0.00025 g/kg ²⁾ 比重等 : 1.7 g/cm³ ⁶⁾ logPow : 5.20 ³⁾	
[6] DDT 類 (参考) DDTs	
[6-1] <i>p,p'</i>-DDT (参考)  分子式 : $C_{14}H_9Cl_5$ CAS : 50-29-3 既存化 : 4-0910 MW : 354.49 mp : 108.5 °C ²⁾ bp : 260 °C ²⁾ sw : ほとんど溶けない ¹⁾ 比重等 : 1.6 g/cm³ ⁷⁾ logPow : 6.91 ³⁾	[6-2] <i>p,p'</i>-DDE (参考)  分子式 : $C_{14}H_8Cl_4$ CAS : 72-55-9 既存化 : 該当なし MW : 318.03 mp : 89 °C ²⁾ bp : 336 °C ⁵⁾ sw : 0.12 mg/L (25 °C) ⁵⁾ 比重等 : 不詳 logPow : 6.51 ³⁾
[6-3] <i>p,p'</i>-DDD (参考)  分子式 : $C_{14}H_{10}Cl_4$ CAS : 72-54-8 既存化 : 該当なし MW : 320.04 mp : 109 °C ¹⁾ bp : 193 °C (1 mm Hg) ²⁾ sw : 0.09 mg/L (25 °C) ⁵⁾ 比重等 : 不詳 logPow : 6.02 ³⁾	[6-4] <i>o,p'</i>-DDT (参考)  分子式 : $C_{14}H_9Cl_5$ CAS : 789-02-6 既存化 : 該当なし MW : 354.49 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 不詳
[6-5] <i>o,p'</i>-DDE (参考)  分子式 : $C_{14}H_8Cl_4$ CAS : 3424-82-6 既存化 : 該当なし MW : 318.03 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 不詳	[6-6] <i>o,p'</i>-DDD (参考)  分子式 : $C_{14}H_{10}Cl_4$ CAS : 53-19-0 既存化 : 該当なし MW : 320.04 mp : 76.2 °C ¹⁾ bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 不詳

[7] クロルデン類 (参考) Chlordanes		
[7-1] <i>cis</i>-クロルデン (参考) <i>cis</i>-Chlordane 	[7-2] <i>trans</i>-クロルデン (参考) <i>trans</i>-Chlordane 	以下は <i>cis</i> 体と <i>trans</i> 体に 共通した物性情報 分子式 : $C_{10}H_6Cl_8$ CAS : 5103-71-9 (<i>cis</i> 体) 、 5103-74-2 (<i>trans</i> 体) 既存化 : 4-637 MW : 409.78 mp : $101.1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾ bp : $175\text{ }^{\circ}\text{C}$ (1 mmHg) ¹⁾ sw : 0.0006 g/kg (25 $^{\circ}\text{C}$) ¹⁾ 比重等 : 1.59~1.63 (25 $^{\circ}\text{C}$) ²⁾ logPow : 6.16 ³⁾
[7-3] オキシクロルデン (参考) Oxychlordane  分子式 : $C_{10}H_4Cl_8O$ CAS : 26880-48-8 既存化 : 該当なし MW : 423.76 mp : $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾ bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 4.76 ³⁾	[7-4] <i>cis</i>-ノナクロル (参考) <i>cis</i>-Nonachlor  分子式 : $C_{10}H_5Cl_9$ CAS : 5103-73-1 既存化 : 該当なし MW : 444.22 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 5.21 ³⁾	
[7-5] <i>trans</i>-ノナクロル (参考) <i>trans</i>-Nonachlor  分子式 : $C_{10}H_5Cl_9$ CAS : 39765-80-5 既存化 : 該当なし MW : 444.22 mp : 不詳 bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 5.08 ³⁾		
[8] ヘプタクロル類 (参考) Heptachlors		
[8-1] ヘプタクロル (参考) Heptachlor  分子式 : $C_{10}H_5Cl_7$ CAS : 76-44-8 既存化 : 4-637、9-1646 MW : 373.32 mp : $95\sim 96\text{ }^{\circ}\text{C}$ ²⁾ bp : 不詳 sw : 0.00018 g/kg (25 $^{\circ}\text{C}$) ¹⁾ 比重等 : 1.57 (9 $^{\circ}\text{C}$) ¹⁾ logPow : 6.10 ³⁾		
[8-2] <i>cis</i>-ヘプタクロルエポキシド (参考) <i>cis</i>-Heptachlor epoxide 	[8-3] <i>trans</i>-ヘプタクロルエポキシド (参考) <i>trans</i>-Heptachlor epoxide  以下は <i>cis</i> 体と <i>trans</i> 体に 共通した物性情報 分子式 : $C_{10}H_5Cl_7O$ CAS : 1024-57-3 既存化 : 該当なし MW : 389.32 mp : $162.8\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾ bp : 不詳 sw : 不詳 比重等 : 不詳 logPow : 5.40 ³⁾	

[9] トキサフェン類 (参考) Toxaphenes			
[9-1] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン (Parlar-26) (参考)	[9-2] 2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-50) (参考)	[9-3] 2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン (Parlar-62) (参考)	分子式 : $C_{10}H_{10}Cl_8$ (8 塩素化物)、 $C_{10}H_9Cl_9$ (9 塩素化物) CAS : 8001-35-2 既存化 : 該当なし MW : 413.81 (8 塩素化物)、 448.26 (9 塩素化物) mp : 65~90℃ ²⁾ bp : 不詳 sw : 3 mg/L ²⁾ 比重等 : 1.630 (25℃) ²⁾ logPow : 6.44 ²⁾
[10] マイレックス (参考) Mirex			
		分子式 : $C_{10}Cl_{12}$ CAS : 2385-85-5 既存化 : 該当なし MW : 545.54 mp : 485℃ (分解) ²⁾ bp : 不詳 sw : 0.000085 g/kg (25℃) ¹⁾ 比重等 : 不詳 logPow : 5.28 ³⁾	
[11] HCH (ヘキサクロロシクロヘキサン) 類 (参考) Hexachlorohexanes			
[11-1] α-HCH (参考)		[11-2] β-HCH (参考)	
分子式 : $C_6H_6Cl_6$ CAS : 319-84-6 既存化 : 3-2250、9-1652 MW : 290.83 mp : 157.4℃ ¹⁾ bp : 288℃ ⁹⁾ sw : 0.00018 g/kg (25℃) ²⁾ 比重等 : 1.87 (20℃) ¹⁰⁾ logPow : 3.80 ³⁾		分子式 : $C_6H_6Cl_6$ CAS : 319-85-7 既存化 : 3-2250、9-1652 MW : 290.83 mp : 309℃ ¹¹⁾ bp : 60℃ (0.50 mmHg) ¹⁾ sw : 0.0002 g/kg (25℃) ²⁾ 比重等 : 1.87 (20℃) ¹⁰⁾ logPow : 3.78 ¹⁾	
[11-3] γ-HCH (別名：リンデン) (参考)		[11-4] δ-HCH (参考)	
分子式 : $C_6H_6Cl_6$ CAS : 58-89-9 既存化 : 3-2250、9-1652 MW : 290.83 mp : 115℃ ¹⁾ bp : 311℃ ¹⁾ sw : 0.0078 g/kg (25℃) ¹⁾ 比重等 : 1.85 (20℃) ¹⁰⁾ logPow : 3.72 ³⁾		分子式 : $C_6H_6Cl_6$ CAS : 319-86-8 既存化 : 3-2250、9-1652 MW : 290.83 mp : 141.5℃ ¹⁾ bp : 60℃ (0.36 mmHg) ¹⁾ sw : 不詳 比重等 : 1.87 (20℃) ¹⁰⁾ logPow : 4.14 ³⁾	

[12] クロルデコン (参考) Chlordecone 	分子式 : $C_{10}Cl_{10}O$ CAS : 143-50-0 既存化 : 該当なし MW : 490.64 mp : 350 °C (分解)²⁾ bp : 不詳 sw : 7.6 mg/L (24 °C)⁵⁾ 比重等 : 1.61 (25 °C)¹⁾ logPow : 3.45¹²⁾
[13] ヘキサブロモビフェニル類 (参考) Hexabromobiphenyls  $m+n=6$	分子式 : $C_{12}H_4Br_6$ CAS : 36355-01-8 既存化 : 該当なし MW : 627.58 mp : 種類によって異なる。 bp : 種類によって異なる。 sw : 種類によって異なる。 比重等 : 種類によって異なる。 logPow : 種類によって異なる。
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの) (参考) Polybromodiphenyl ethers ($Br_4 \sim Br_{10}$)  $i = m+n = 4 \sim 10$	分子式 : $C_{12}H_{(10-i)}Br_iO$ ($i = m+n = 4 \sim 10$) CAS : 40088-47-9 (4 臭素化物)、32534-81-9 (5 臭素化物)、36483-60-0 (6 臭素化物)、68928-80-3 (7 臭素化物)、32536-52-0 (8 臭素化物)、63936-56-1 (9 臭素化物)、1163-19-5 (10 臭素化物) 既存化 : 3-61 (4 臭素化物)、3-2845 (6 臭素化物) MW : 485.79~959.17 mp : 種類によって異なる。 bp : 種類によって異なる。 sw : 種類によって異なる。 比重等 : 種類によって異なる。 logPow : 種類によって異なる。
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS) 	分子式 : $C_8HF_{17}O_3S$ CAS : 1763-23-1 既存化 : 2-1595 MW : 500.13 mp : 400 °C未満 (カリウム塩)¹³⁾ bp : 不詳 sw : 519 mg/L (20 °C、カリウム塩)¹³⁾ 比重等 : 不詳 logPow : 不詳
[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) Perfluorooctanoic acid (PFOA) 	分子式 : $C_8HF_{15}O_2$ CAS : 335-67-1 既存化 : 2-1182、2-2659 MW : 414.07 mp : 54.3 °C¹⁾ bp : 192 °C¹⁾ sw : 9.5 g/L (20 °C)¹⁴⁾ 比重等 : 1.79 g/cm³¹⁵⁾ logPow : 6.3¹⁵⁾


[17] ペンタクロロベンゼン
Pentachlorobenzene



分子式 : C_6HCl_5
CAS : 608-93-5
既存化 : 3-76
MW : 250.34
mp : $84.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾
bp : $279\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁾
sw : 0.00050 g/kg ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$) ¹⁾
比重等 : 1.8342 g/cm^3 ($16\text{ }^{\circ}\text{C}$) ¹⁾
logPow : 5.17 ³⁾


[18] エンドスルファン類 (参考)
Endosulfans

[18-1] α -エンドスルファン (参考)
 α -Endosulfan



分子式 : $C_9H_6Cl_5O_3S$
CAS : 959-98-8
既存化 : 該当なし
MW : 406.93
mp : $109.2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁶⁾
bp : 不詳
sw : 0.33 mg/L ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$) ¹⁶⁾
比重等 : 不詳
logPow : 4.7 ¹⁶⁾

[18-2] β -エンドスルファン (参考)
 β -Endosulfan




分子式 : $C_9H_6Cl_5O_3S$
CAS : 33213-65-9
既存化 : 該当なし
MW : 406.93
mp : $213.3\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁶⁾
bp : 不詳
sw : 0.32 mg/L ($25\text{ }^{\circ}\text{C}$) ¹⁶⁾
比重等 : 不詳
logPow : 4.7 ¹⁶⁾

[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類 (参考)
1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecanes

[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン
(参考)


α -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane



分子式 : $C_{12}H_{18}Br_6$
CAS : 134237-50-6
既存化 : 3-2254
MW : 641.70
mp : $179\sim 181\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁷⁾
bp : 不詳
sw : $48.8\text{ }\mu\text{g/L}$ ¹⁷⁾
比重等 : 不詳
logPow : 5.07 ¹⁷⁾

[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン
(参考)


β -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane



分子式 : $C_{12}H_{18}Br_6$
CAS : 134237-51-7
既存化 : 3-2254
MW : 641.70
mp : $170\sim 172\text{ }^{\circ}\text{C}$ ¹⁷⁾
bp : 不詳
sw : $14.7\text{ }\mu\text{g/L}$ ¹⁷⁾
比重等 : 不詳
logPow : 5.12 ¹⁷⁾

[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン (参考)


γ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane



分子式 : $C_{12}H_{18}Br_6$
CAS : 134237-52-8
既存化 : 3-2254
MW : 641.70
mp : 207~209 °C ¹⁷⁾
bp : 不詳
sw : 2.1 µg/L ¹⁷⁾
比重等 : 不詳
logPow : 5.47 ¹⁷⁾

[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン (参考)


δ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane



分子式 : $C_{12}H_{18}Br_6$
CAS : 不詳
既存化 : 3-2254
MW : 641.70
mp : 不詳
bp : 不詳
sw : 不詳
比重等 : 不詳
logPow : 不詳

[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン (参考)


ϵ -1,2,5,6,9,10-Hexabromocyclododecane



分子式 : $C_{12}H_{18}Br_6$
CAS : 不詳
既存化 : 3-2254
MW : 641.70
mp : 不詳
bp : 不詳
sw : 不詳
比重等 : 不詳
logPow : 不詳

[20] ポリ塩化ナフタレン類 (参考)

Polychlorinated naphthalenes




$i = m+n = 1 \sim 8$

分子式 : $C_{10}H_{(8-i)}Cl_i$ ($i = m + n = 1 \sim 8$)
CAS : 25586-43-0 (1 塩化物)、28699-88-9 (2 塩化物)、1321-65-9 (3 塩化物)、1335-88-2 (4 塩化物)、1321-64-8 (5 塩化物)、1335-87-1 (6 塩化物)、32241-08-0 (7 塩化物)、2234-13-1 (8 塩化物)
既存化 : 該当なし
MW : 162.6~403.7
mp : 種類によって異なる。
bp : 種類によって異なる。
sw : 種類によって異なる。
比重等 : 種類によって異なる。
logPow : 種類によって異なる。

[21] ヘキサクロブタ-1,3-ジエン

Hexachlorobuta-1,3-diene




分子式 : C_4Cl_6
CAS : 87-68-3
既存化 : 2-121
MW : 260.76
mp : -21 °C ²⁾
bp : 215 °C ²⁾
sw : 0.0005 % (20 °C) ²⁾
比重等 : 1.682 (20 / 4 °C) ²⁾
logPow : 4.90 ¹⁸⁾

[22] ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類 (参考)

Pentachlorophenol and its salts and esters

[22-1] ペンタクロロフェノール (参考)

Pentachlorophenol



分子式 : C_6HCl_5O

CAS : 87-86-5

既存化 : 3-2850

MW : 266.34

mp : 174 °C (一水和物)、191 °C (無水水和物)¹⁹⁾

bp : 309~310 °C (分解)²⁾


sw : 14 mg/L (26.7 °C)²⁰⁾

比重等 : 1.978 (22 °C)²⁾

logPow : 5.12²¹⁾

[22-1] ペンタクロロアニソール (参考)

Pentachloroanisole



分子式 : $C_7H_3Cl_5O$

CAS : 1825-21-4

既存化 : 該当なし

MW : 280.36

mp : 233.9 °C¹⁾

bp : 不詳

sw : 1 mg/L 未満²²⁾

比重等 : 不詳


logPow : 5.45²²⁾

[23] 短鎖塩素化パラフィン類

Short-chain chlorinated paraffins

[23-1] 塩素化デカン類

Chlorinated decanes



X は H 又は Cl であることを意味する。

分子式 : $C_{10}H_{(22-i)}Cl_i$ ($i = 1 \sim 22$)

CAS : 不詳

既存化 : 2-68

MW : 176.73~900.07

mp : 種類によって異なる。

bp : 種類によって異なる。


sw : 種類によって異なる。

比重等 : 種類によって異なる。

logPow : 種類によって異なる。

[23-2] 塩素化ウンデカン類

Chlorinated undecanes



X は H 又は Cl であることを意味する。

分子式 : $C_{11}H_{(24-i)}Cl_i$ ($i = 1 \sim 24$)

CAS : 不詳

既存化 : 2-68

MW : 190.75~982.99

mp : 種類によって異なる。

bp : 種類によって異なる。


sw : 種類によって異なる。

比重等 : 種類によって異なる。

logPow : 種類によって異なる。

[23-3] 塩素化ドデカン類

Chlorinated dodecanes



XはH又はClであることを意味する。

分子式: $C_{12}H_{(26-i)}Cl_i$ ($i = 1 \sim 26$)

CAS: 不詳

既存化: 2-68

MW: 204.78~1065.91

mp: 種類によって異なる。

bp: 種類によって異なる。


sw: 種類によって異なる。

比重等: 種類によって異なる。

logPow: 種類によって異なる。

[23-4] 塩素化トリデカン類

Chlorinated tridecanes



XはH又はClであることを意味する。

分子式: $C_{13}H_{(28-i)}Cl_i$ ($i = 1 \sim 28$)

CAS: 不詳

既存化: 2-68

MW: 218.81~1,148.82

mp: 種類によって異なる。

bp: 種類によって異なる。


sw: 種類によって異なる。

比重等: 種類によって異なる。

logPow: 種類によって異なる。

[24] ジコホル (参考)

Dicofol



分子式: $C_{14}H_9Cl_3O$

CAS: 115-32-2

既存化: 4-226

MW: 370.49

mp: $77.5 \sim 79.5$ °C²³⁾

bp: $180 \sim 225$ °C²³⁾


sw: $0.8 \sim 1.32$ mg/L (25 °C)²³⁾

比重等: 1.45 g/cm³²³⁾

logPow: $3.8 \sim 6.06$ ²³⁾

[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)

Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS)



分子式: $C_6HF_{13}O_3S$

CAS: 355-46-4

既存化: 該当なし

MW: 400.11

mp: 41 °C²⁴⁾

bp: $238 \sim 239$ °C²⁴⁾

sw: 1.4 g/L (20~25 °C、カリウム塩)²⁴⁾


2.3 g/L (非解離)²⁴⁾

比重等: 1.841 g/cm³²⁵⁾

logPow: 5.17 ²⁴⁾

[26] メトキシクロル

Methoxychlor



分子式: $C_{16}H_{15}Cl_3O_2$

CAS: 72-43-5

既存化: 該当なし

MW: 345.65



mp: 87 °C²⁶⁾

bp: 346 °C²⁶⁾

sw: 0.040 mg/L (24 °C) 又は 0.12 mg/L (25 °C)²⁶⁾

比重等: 1.4 g/cm³ (25 °C)²⁵⁾

logPow: 5.08 ²⁶⁾

[27] デクロランプラス類 Dechlorane pluses		
[27-1] <i>anti</i> -デクロランプラス <i>anti</i> -Dechlorane plus	[27-2] <i>syn</i> -デクロランプラス <i>syn</i> -Dechlorane plus	以下は <i>anti</i> 体と <i>syn</i> 体に 共通した物性情報 分子式 : $C_{18}H_{12}Cl_{12}$ CAS : 13560-89-9 135821-74-8 (<i>anti</i> 体) 、 135821-03-3 (<i>syn</i> 体) 既存化 : 4-296 MW : 653.73 mp : 340~382 °C ²⁷⁾ bp : 不詳 sw : 1.67 ng/L 未満 (20~ 25 °C) 又は 0.044~249 µg/L ²⁷⁾ 比重等 : 1.8 g/cm ³ (25 °C) ²⁵⁾ logPow : 9.3 ²⁷⁾
		
[28] UV-328		
		
分子式 : $C_{22}H_{29}N_3O$ CAS : 25973-55-1 既存化 : 5-3604 MW : 351.49 mp : 80~88 °C ²⁸⁾ bp : 180 °C超で沸騰前に分解、230 °C超 又は 461 °C ²⁸⁾ sw : 0.001 mg/L 未満 (20°C、pH 6.3~ 6.4) 、0.02 mg/L、 2.7×10^{-4} mg/L (25 °C) 又は $1.7 \pm 0.7 \times 10^{-4}$ mg/L (25 °C) ²⁸⁾ 比重等 : 1.17 (20 °C) ²⁹⁾ logPow : 6.5 超 (23 °C、pH 6.4) ²⁸⁾		

参考文献

- 1) John R. Rumble, CRC Handbook of Chemistry and Physics, 98th Edition, CRC Press LLC (2017)
- 2) O'Neil, The Merck Index - An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals 15th Edition, Merck Co. Inc. (2013)
- 3) Hansch et al., Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic and Steric Constants, American Chemical Society (1995)
- 4) IPCS, International Chemical Safety Cards, Aldrin, ICSC0774 (1998)
- 5) Howard et al., Handbook of Physical Properties of Organic Chemicals, CRC Press Inc. (1996)
- 6) IPCS, International Chemical Safety Cards, Endrin, ICSC1023 (2000)
- 7) IPCS, International Chemical Safety Cards, DDT, ICSC0034 (2004)
- 8) Biggar et al., Apparent solubility of organochlorine insecticides in water at various temperatures, Hilgardia, 42, 383-391 (1974)
- 9) IPCS, International Chemical Safety Cards, alpha-Hexachlorocyclohexane, ICSC0795 (1998)
- 10) ATSDR, Toxicological Profile for alpha-, beta-, gamma- and delta-Hexachlorocyclohexane (2005)
- 11) IPCS, International Chemical Safety Cards, beta-Hexachlorocyclohexane, ICSC0796 (1998)
- 12) IPCS, International Chemical Safety Cards, Chlordecone ICSC1432 (2003)
- 13) United Nations Environment Programme (UNEP), Risk profile on perfluorooctane sulfonate, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its second meeting (2006)
- 14) OECD, Perfluorooctanoic Acid & Ammonium Perfluorooctanoate, SIDS Initial Assessment Profile for 26th SIAM (2008)
- 15) IPCS, International Chemical Safety Cards, Perfluorooctanoic acid, ICSC1613 (2005)
- 16) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Risk profile on endosulfan, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its fifth meeting (2009)
- 17) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Risk profile on hexabromocyclododecane, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its sixth meeting (2010)
- 18) IPCS, International Chemical Safety Cards, Hexachlorobutadiene ICSC0896 (1997)
- 19) International Agency for Research on Cancer(IARC), IARC Monographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals to Man(1972)
- 20) Yalkowsky et al., Aquasol Database of Aqueous Solubility Version 5, College of Pharmacy, University of Arizona(1992)
- 21) Hansch et al., Exploring QSAR - Hydrophobic, Electronic and Steric Constants, American Chemical Society (1995)
- 22) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Risk profile on pentachlorophenol and its salts and esters, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its ninth meeting (2013)
- 23) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Risk profile on dicofol, Report of the Persistent Organic Pollutants Review Committee on the work of its twelfth meeting (2016)

- 24) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Persistent Organic Pollutants Review Committee, Perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), its salts and PFHxS related compounds, Risk management evaluation (2019)
- 25) U.S. National Library of Medicine, PubChem (<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>)
- 26) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Persistent Organic Pollutants Review Committee, Risk profile for Methoxychlor (2021)
- 27) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Persistent Organic Pollutants Review Committee, Risk profile for Dechlorane Plus (2022)
- 28) UNEP, Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, Persistent Organic Pollutants Review Committee, Risk profile for UV-328 (2022)
- 29) European Chemicals Agency (ECHA), REACH registered substance factsheets (<https://echa.europa.eu/>)

3. 調査地点及び実施方法

(1) 試料採取機関

モニタリング調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取を委託し、民間分析機関において分析を実施した。

試料採取機関名 ^{注1)}	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
北海道環境生活部環境保全局循環型社会推進課及び地方独立行政法人北海道立総合研究機構産業技術環境研究本部エネルギー・環境・地質研究所	○	○		○
札幌市衛生研究所				○
岩手県環境保健研究センター	○	○	○	○
宮城県保健環境センター	○	○	○	○
仙台市衛生研究所		○		
秋田県健康環境センター	○	○		
山形県環境科学研究所	○	○		○
福島県環境創造センター	○	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	○	○
栃木県保健環境センター	○	○		
群馬県衛生環境研究所	○			
埼玉県環境科学国際センター	○			
千葉県環境研究センター		○		
東京都環境局環境改善部及び公益財団法人東京都環境公社東京都環境科学研究所	○	○	○	○
神奈川県環境科学センター				○
横浜市環境創造局環境科学研究所	○	○	○	○
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○	
新潟県保健環境科学研究所	○	○		○
富山県生活環境文化環境部環境保全課及び富山県環境科学センター	○	○		○
石川県保健環境センター	○	○	○	○
福井県衛生環境研究センター	○	○		
山梨県衛生環境研究所		○		○
山梨県水産技術センター			○ ^{注2)}	
長野県環境保全研究所	○	○		○
岐阜県保健環境研究所				○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○		
愛知県環境調査センター	○	○		
名古屋市環境局地域環境対策部環境科学調査センター			○	○
三重県保健環境研究所	○	○		○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○	○	

試料採取機関名 ^{注1)}	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
京都府保健環境研究所	○	○		○
京都市衛生環境研究所	○	○		
大阪府環境農林水産部環境管理室事業所指導課	○	○	○	○
大阪市立環境科学研究所	○	○		
兵庫県環境部水大気課及び公益財団法人ひょうご環境創造協会兵庫県環境研究センター	○	○	○	○
兵庫県環境部水大気課及び伊丹市都市交通部みどり自然課			○ ^{注2)}	
神戸市環境局環境保全課及び神戸市健康科学研究所	○	○		○
奈良県景観・環境総合センター		○		○
和歌山県環境衛生研究センター	○	○		
鳥取県生活環境部環境立県推進課及び衛生環境研究所			○	
島根県保健環境科学研究所及び島根県隠岐保健所				○
岡山県環境保健センター	○	○		
広島県立総合技術研究所保健環境センター	○	○		
広島市衛生研究所			○	○
山口県環境保健センター	○	○		○
徳島県立保健製薬環境センター	○	○		○
香川県環境保健研究センター	○	○	○	○
愛媛県立衛生環境研究所		○		○
高知県衛生環境研究所	○	○	○	
北九州市保健環境研究所	○	○		
福岡市保健環境研究所		○		
佐賀県環境センター	○	○		○
長崎県県民生活環境部地域環境課	○	○		
熊本県保健環境科学研究所	○			○
大分県生活環境部環境保全課及び大分県衛生環境研究センター		○	○	
宮崎県衛生環境研究所	○	○		○
鹿児島県環境保健センター	○	○	○	○
沖縄県衛生環境研究所	○	○	○	○

(注1) 試料採取機関名は、2024年度末のものである。

(注2) 山梨県水産技術センター並びに兵庫県環境部水大気課及び伊丹市都市交通部みどり自然課において採取された生物はカワウの卵で、諸外国の調査において調査を実施している例があることから、本調査においても実施しており、結果については参考値として扱った。

(2) 調査地点及び調査対象物質

モニタリング調査における調査媒体別の調査対象物質（群）数及び調査地点数等は以下の表のとおりである。

それぞれ媒体ごとでの各調査地点における対象物質、調査地点の全国分布図及び詳細地点図は、水質について表1-1、図1-1及び図1-2に、底質について表1-2、図1-3及び図1-4に、生物について表1-3、図1-5及び図1-6、大気について表1-4、図1-7及び図1-8に示した。それぞれの調査地点で得られた試料については、各媒体において調査の対象とした全ての物質の測定を行っている。

なお、調査対象物質、媒体及び調査地点については、「4. モニタリング調査としての継続性に関する考察」の「(1) 調査対象物質及び媒体の推移」、「(2) 調査地点の推移」も併せて参照のこと。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点（・生物種）数	調査地点ごとの検体数
水質	42	8	47	1
底質	46	8	60	1 注1)
生物（貝類）	3	10	3	1 注2)
生物（魚類）	16	10	16	1 注2)
生物（鳥類）	4 注3)	10	4 注3)	1 注2)
大気	33	8	35	1又は3 注4)
全媒体	56	11	120 注3)	

(注1) 底質については各調査地点とも3試料/地点の採取を行い、調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。

(注2) 生物については原則として各調査地点とも3試料/地点の採取を行い、調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。

(注3) 生物（鳥類）のうち2地点で得られた試料はカワウの卵であり、卵黄と卵白とに分けて測定を行い、結果は参考値として扱い、参考資料に示した。

(注4) [21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン以外の物質については、ハイボリュームエアサンプラーにより24時間の採取を3日行うことで得られる3試料の抽出液を等量ずつ混合した1検体又はミドルボリュームエアサンプラーにより7日間の採取を行うことで得られる1試料の抽出液から1検体を測定した。[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについては、ローボリュームエアサンプラーにより24時間の採取を3日行うことで得られる3試料それぞれを検体として測定した。

(3) 試料の採取方法

水質試料及び底質試料の採取は、概ね秋期（9月～11月）の天候が安定した時期に行った。生物試料の採取は、調査地点における調査対象生物種の生息状況を踏まえて適当な時期に行った。大気試料の採取は、概ね温暖期（9月～11月）に行った。各調査地点における試料採取日時、その他試料採取情報は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。試料の採取方法及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（令和2年度版）」（2021年3月、環境省環境保健部環境安全課）に従うこととした。

(4) 分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）の「モニタリング調査対象物質の分析法概要」を参照のこと。

(5) 調査対象生物種

生物媒体において調査対象とする種は、指標としての有意性、実用性のほか、国際的な比較の可能性も考慮し、ムラサキイガイ及びスズキを中心に貝類2種、魚類7種及び鳥類1種の計10種とした。

2024年度において調査対象となった生物種の特性等を表2に示す。また、表3-1から表3-3には、分析に供した検体の概要をまとめた。

表1-1 2024年度モニタリング調査地点一覧（水質）

地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	2024年11月11日
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	2024年12月4日
宮城県	仙台湾（松島湾）	2025年1月15日
秋田県	八郎湖	2024年10月9日
山形県	最上川河口（酒田市）	2024年10月22日
福島県	小名浜港	2024年12月16日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	2024年11月19日
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）	2024年12月11日
群馬県	利根川利根大堰上流（千代田町）	2024年12月13日
埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	2024年12月5日
東京都	荒川河口（江東区）	2025年1月23日
	隅田川河口（港区）	2025年1月23日
横浜市	横浜港	2024年12月3日
川崎市	川崎港京浜運河扇町地先	2024年12月3日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	2024年11月27日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	2024年11月8日
石川県	犀川河口（金沢市）	2024年9月25日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	2024年10月24日
長野県	諏訪湖湖心	2024年12月3日
静岡県	天竜川掛塚橋（磐田市）	2024年11月21日
愛知県	名古屋港	2024年11月11日
三重県	四日市港	2024年11月12日
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	2024年11月19日
京都府	宮津港	2024年11月12日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	2024年12月9日
大阪府	大和川河口（堺市）	2024年11月20日
大阪市	大阪港	2024年12月3日
兵庫県	姫路沖	2024年12月18日
神戸市	神戸港中央	2024年12月3日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	2024年12月4日
岡山県	水島沖	2024年12月3日
広島県	呉港	2024年11月7日
	広島湾	2024年11月7日
山口県	徳山湾	2024年11月13日
	宇部沖	2024年11月13日
	萩沖	2024年11月8日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	2024年10月16日
香川県	高松港	2024年11月26日
高知県	四万十川河口（四万十市）	2024年10月16日
北九州市	洞海湾	2024年12月17日
佐賀県	伊万里湾	2024年11月8日
長崎県	大村湾	2024年12月13日
熊本県	緑川平木橋（宇土市）	2024年12月10日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	2024年10月29日
鹿児島県	天降川新川橋（霧島市）	2024年11月18日
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	2024年11月11日
沖縄県	那覇港	2024年12月17日



図1-1 2024年度モニタリング調査地点（水質）




図 1-2 (1/6) 2024年度モニタリング調査地点(水質) 詳細




図 1-2 (2/6) 2024 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (3/6) 2024年度モニタリング調査地点(水質)詳細




図 1-2 (4/6) 2024年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (5/6) 2024 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (6/6) 2024 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細

表1-2 2024年度モニタリング調査地点一覧（底質）

地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	2024年11月11日
	苫小牧港	2024年9月18日
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	2024年12月4日
宮城県	仙台湾（松島湾）	2025年1月15日
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	2024年11月25日
秋田県	八郎湖	2024年10月9日
山形県	最上川河口（酒田市）	2024年10月22日
福島県	小名浜港	2024年12月16日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	2024年11月19日
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）	2024年12月11日
千葉県	市原・姉崎海岸	2024年12月3日
東京都	荒川河口（江東区）	2025年1月23日
	隅田川河口（港区）	2025年1月23日
横浜市	横浜港	2024年12月3日
川崎市	多摩川河口（川崎市）	2024年12月3日
	川崎港京浜運河扇町地先	2024年12月3日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	2024年11月27日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	2024年11月8日
石川県	犀川河口（金沢市）	2024年9月25日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	2024年10月24日
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）	2024年11月25日
長野県	諏訪湖湖心	2024年12月3日
静岡県	清水港	2024年12月5日
	天竜川掛塚橋（磐田市）	2024年11月21日
愛知県	衣浦港	2024年11月11日
	名古屋港	2024年11月11日
三重県	四日市港	2024年11月12日
	鳥羽港	2024年11月14日
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	2024年11月19日
	琵琶湖唐崎沖中央	2024年11月19日
京都府	宮津港	2024年11月12日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	2024年12月9日
大阪府	大和川河口（堺市）	2024年11月20日
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	2024年12月3日
	淀川河口（大阪市）	2024年12月3日
	大阪港	2024年12月3日
	大阪港外	2024年12月3日
兵庫県	姫路沖	2024年12月18日
神戸市	神戸港中央	2024年12月3日
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	2024年12月2日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	2024年12月4日
岡山県	水島沖	2024年12月3日
広島県	呉港	2024年11月7日
	広島湾	2024年11月7日
山口県	徳山湾	2024年11月13日
	宇部沖	2024年11月13日
	萩沖	2024年11月8日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	2024年10月16日
香川県	高松港	2024年11月26日
愛媛県	新居浜港	2024年11月7日
高知県	四万十川河口（四万十市）	2024年10月16日
北九州市	洞海湾	2024年12月17日
福岡市	博多湾	2024年12月11日
佐賀県	伊万里湾	2024年11月8日
長崎県	大村湾	2024年12月13日
大分県	大分川河口（大分市）	2024年11月25日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	2024年10月29日
鹿児島県	天降川（霧島市）	2024年11月18日
	五反田川（いちき串木野市）	2024年11月11日
沖縄県	那覇港	2024年12月17日



図1-3 2024年度モニタリング調査地点（底質）




図 1-4 (1/7) 2024 年度モニタリング調査地点(底質) 詳細




図 1-4 (2/7) 2024 年度モニタリング調査地点(底質) 詳細




図 1-4 (3/7) 2024 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (4/7) 2024 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (5/7) 2024 年度モニタリング調査地点(底質)詳細




図 1-4 (6/7) 2024 年度モニタリング調査地点(底質) 詳細




図 1-4 (7/7) 2024 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細

表1-3 2024年度モニタリング調査地点・生物種一覧（生物）

地方公共団体	調査地点	生物種	採取日
岩手県	山田湾	ムラサキイガイ	2024年10月21日
		アイナメ	2024年11月7日
宮城県	仙台湾（松島湾）	アイナメ	2025年1月7日
茨城県	常磐沖	マサバ	2025年1月15日
東京都	東京湾	スズキ	2024年11月26日
横浜市	横浜港	ミドリイガイ	2024年9月17日
川崎市	川崎港扇島沖	スズキ	2024年9月24日
石川県	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	2024年8月19日
名古屋市	名古屋港	ボラ	2024年9月10日
滋賀県	琵琶湖北湖竹生島	カワウ	2024年9月4日
	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	2024年4月2日
大阪府	大阪湾	スズキ	2024年10月9日
兵庫県	姫路沖	スズキ	2024年12月9日
鳥取県	天神川（倉吉市）	カワウ	2024年7月21日及び11月17日
	中海	スズキ	2024年11月17日
広島市	広島湾	スズキ	2024年11月13日
香川県	高松港	ボラ	2024年10月6日
高知県	四万十川河口（四万十市）	スズキ	2024年11月16日、17日、18日、20日、21日及び22日
大分県	大分川河口（大分市）	サワラ	2024年9月8日
鹿児島県	薩摩半島西岸	スズキ	2024年11月20日
沖縄県	中城湾	ミナミクロダイ	2025年1月31日



図1-5 2024年度モニタリング調査地点 (生物)




図 1-6 (1/3) 2024年度モニタリング調査地点(生物)詳細




図 1-6 (2/3) 2024年度モニタリング調査地点(生物)詳細




図 1-6 (3/3) 2024年度モニタリング調査地点（生物）詳細

表 1-4 2024 年度モニタリング調査地点一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	採取年月日
北海道	北海道渡島総合振興局（函館市）	2024 年 12 月 17 日～24 日※※又は 2024 年 12 月 17 日～20 日※
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）	2024 年 10 月 22 日～25 日
岩手県	巢子一般環境大気測定局（滝沢市）	2024 年 9 月 17 日～20 日
宮城県	宮城県保健環境センター（仙台市）	2024 年 12 月 17 日～24 日※※又は 2024 年 12 月 17 日～20 日※
山形県	山形県環境科学研究センター（村山市）	2024 年 9 月 30 日～10 月 7 日※※又は 2024 年 10 月 1 日～4 日※
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	2024 年 10 月 22 日～29 日※※又は 2024 年 10 月 22 日～25 日※
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	2024 年 12 月 10 日～17 日※※又は 2024 年 12 月 10 日～13 日※
	小笠原父島（小笠原村）	2024 年 11 月 8 日～15 日※※又は 2024 年 11 月 8 日～11 日※
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	2024 年 9 月 9 日～12 日
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）	2025 年 1 月 14 日～21 日※※又は 2025 年 1 月 14 日～17 日※
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）	2024 年 12 月 16 日～19 日
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）	2024 年 9 月 24 日～27 日
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	2024 年 9 月 9 日～12 日
山梨県	山梨県衛生環境研究所（甲府市）	2024 年 11 月 18 日～21 日
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	2024 年 10 月 15 日～22 日※※又は 2024 年 10 月 15 日～18 日※
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）	2024 年 11 月 25 日～28 日
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	2024 年 10 月 15 日～22 日※※又は 2024 年 10 月 15 日～18 日※
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	2024 年 10 月 28 日～31 日
京都府	京都府立城陽高等学校（城陽市）	2024 年 11 月 5 日～8 日
大阪府	大阪合同庁舎 2 号館別館（大阪市）	2024 年 10 月 8 日～11 日
兵庫県	兵庫県環境研究センター（神戸市）	2024 年 12 月 9 日～12 日
神戸市	神戸市健康科学研究所（神戸市）	2024 年 11 月 26 日～29 日
奈良県	天理一般環境大気測定局（天理市）	2024 年 12 月 9 日～12 日
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）	2024 年 11 月 12 日～15 日※※又は 2024 年 11 月 13 日～16 日※
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）	2024 年 10 月 29 日～11 月 1 日
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	2024 年 11 月 26 日～12 月 3 日※※又は 2024 年 11 月 26 日～29 日※
	萩健康福祉センター（萩市）	2024 年 11 月 26 日～12 月 3 日※※又は 2024 年 11 月 26 日～29 日※
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	2024 年 10 月 28 日～31 日
香川県	香川県環境保健研究センター（高松市）	2024 年 10 月 15 日～22 日※※又は 2024 年 10 月 15 日～18 日※
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）	2024 年 9 月 30 日～10 月 3 日
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	2024 年 10 月 8 日～15 日※※又は 2024 年 10 月 8 日～11 日※
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）	2024 年 12 月 9 日～12 日
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	2024 年 10 月 15 日～22 日※※又は 2024 年 10 月 15 日～18 日※
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）	2024 年 10 月 28 日～31 日
沖縄県	辺戸岬（国頭村）	2024 年 9 月 23 日～26 日

（注）※は [21] ヘキサクロボタ-1,3-ジエンを採取したことを、※※は [21] ヘキサクロボタ-1,3-ジエン以外の物質を、記載がないものについては全ての物質を採取したことをそれぞれ意味する。



図1-7 2024年度モニタリング調査地点 (大気)




図 1-8 (1/4) 2024年度モニタリング調査地点(大気) 詳細




図 1-8 (2/4) 2024年度モニタリング調査地点(大気) 詳細




図 1-8 (3/4) 2024年度モニタリング調査地点(大気) 詳細




図 1-8 (4/4) 2024年度モニタリング調査地点(大気) 詳細

表2 調査対象生物種の特性等

生物種		生物種の特性等	調査地点	調査目的	備考
貝類	ミドリイガイ (<i>Perna viridis</i>)	①本州南部以南の日本各地に分布する。 ②内湾岩礁、橋脚等に付着する。	横浜港	特定地域の残留実態の把握	
	ムラサキイガイ (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	①熱帯を除き、世界的に分布する。 ②内湾岩礁、橋脚等に付着する。	山田湾 能登半島沿岸	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる2地点で調査を実施
魚類	アイナメ (<i>Hexagrammos otakii</i>)	①北海道から南日本、朝鮮半島、中国に分布する。 ②5～50mの浅海域に生息する。	山田湾 仙台湾（松島湾）	特定地域の残留実態の把握	
	ウグイ (<i>Tribolodon hakonensis</i>)	①日本各地の淡水域に広く分布する。 ②主として昆虫類を捕食する。	琵琶湖安曇川（高島市）	特定地域の残留実態の把握	
	サワラ (<i>Scomberomorus niphonius</i>)	①東アジアの亜熱帯・温帯に分布する。 ②春から秋にかけては沿岸表層を、冬は深層をそれぞれ主な生息場所とする。	大分川河口（大分市）	特定地域の残留実態の把握	
	スズキ (<i>Lateolabrax japonicus</i>)	①日本各地、朝鮮半島、中国の沿岸部に分布する。 ②成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。 ③化学物質濃縮性は高位といわれている。	東京湾 川崎港扇島沖 大阪湾 姫路沖 中海 広島湾 四万十川河口（四万十市） 薩摩半島西岸	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる8地点で調査を実施
	ボラ (<i>Mugil cephalus</i>)	①ほぼ全世界の熱帯・温帯に広く分布する。 ②成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。	名古屋港 高松港	特定地域の残留実態の把握	
	マサバ (<i>Scomber japonicus</i>)	①全世界の亜熱帯・温帯に広く分布する。 ②春に北上・秋に南下という季節的な回遊を行う。	常磐沖	特定地域の残留実態の把握	
鳥類	ミナミクロダイ (<i>Acanthopagrus sivicolus</i>)	①南西諸島に分布する。 ②サンゴ礁海域及び河川水の流入する湾内に生息する。	中城湾	特定地域の残留実態の把握	
	カワウ（亜成鳥）※ (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	①日本各地に広く分布する。 ②魚類を主食とする。 ③化学物質濃縮性は高位といわれている。	琵琶湖北湖竹生島 天神川（倉吉市）	高次捕食動物の残留実態の把握	

※諸外国の調査において、カワウの卵を対象とした調査実施している例があることから、本調査においても他の2地点で卵を採取し、結果については参考値として扱い、参考資料に示した。

表3-1 2024年度モニタリング調査（生物 貝類）検体の概要

調査地点（生物種）	採取年月	検体番号	性別	個体数	体長（cm）（平均値）	体重（g）（平均値）	水分（%）	脂質分（%）
山田湾 （ムラサキガイ）	2024 年 10 月	1	不明	135	9.7～ 11.7 (10.4)	68.0～ 142.5 (91.1)	75.0	2.3
		2	不明	170	8.4～ 8.9 (8.6)	29.4～ 62.7 (48.0)	75.8	2.3
		3	不明	270	7.2～ 7.9 (7.7)	21.8～ 43.7 (32.4)	76.3	2.4
横浜港 （ミドリイガイ）	2024 年 9 月	1	混合	166	3.0～ 3.9 (3.3)	1.6～ 3.6 (2.5)	86.0	0.9
		2	混合	197	2.6～ 3.4 (3.0)	1.4～ 3.4 (2.1)	86.0	1.1
		3	混合	287	2.2～ 3.0 (2.6)	1.0～ 2.1 (1.5)	85.0	1.1
能登半島沿岸 （ムラサキガイ）	2024 年 8 月	1	不明	23	12.8～ 15.8 (14.0)	208～ 381 (285)	73.4	2.2
		2	不明	29	10.5～ 12.5 (11.5)	149～ 251 (198)	71.9	2.3
		3	不明	24	8.3～ 12.3 (10.5)	61.0～ 191 (127)	71.9	2.2

表 3-2（1/2） 2024 年度モニタリング調査（生物 魚類）検体の概要

調査地点（生物種）	採取年月	検体番号	性別	個体数	体長（cm）（平均値）	体重（g）（平均値）	水分（%）	脂質分（%）
山田湾 （アイナメ）	2024 年 11 月	1	不明	10	29.5～ 34.7 (31.0)	554～ 717 (604)	76.2	3.1
		2	不明	11	25.7～ 29.2 (27.4)	341～ 496 (429)	77.2	2.4
		3	不明	15	21.5～ 25.6 (23.8)	209～ 349 (290)	76.8	2.1
仙台湾（松島湾） （アイナメ）	2025 年 1 月	1	不明	3	28.0～ 30.5 (28.8)	410～ 420 (410)	78.7	0.9
		2	不明	4	23.5～ 27.5 (25.1)	230～ 370 (300)		
常磐沖 （マサバ）	2025 年 1 月	1	不明	15	18.0～ 26.0 (23.9)	101～ 328 (251)	40.5	0.5
		2	不明	25	26.0～ 28.0 (26.4)	332～ 399 (362)	43.3	1.5
		3	不明	20	27.0～ 32.0 (28.6)	405～ 687 (474)	38.7	5.9
東京湾 （スズキ）	2024 年 11 月	1	混合	3	52.5～ 56.2 (54.6)	2,080～ 2,540 (2,353)	77.0	1.3
		2	混合	3	48.2～ 53.5 (51.2)	1,650～ 2,000 (1,843)	79.0	0.7
		3	混合	3	44.0～ 48.2 (46.0)	1,210～ 1,490 (1,320)	78.8	0.7
川崎港扇島沖 （スズキ）	2024 年 9 月	1	雄	12	28.2～ 32.0 (29.7)	328～ 491 (410)	82.4	2.3
		2	雌	12	27.0～ 32.0 (29.3)	337～ 543 (430)	70.6	1.5
		3	雌	12	26.5～ 28.8 (27.9)	276～ 444 (384)	76.9	2.0
名古屋港（ボラ）	2024 年 9 月	1	不明	9	30.9～ 33.3 (32.4)	630～ 856 (728)	75.2	2.3
		2	不明	9	29.4～ 33.6 (31.6)	481～ 771 (656)		
		3	不明	9	29.6～ 33.8 (31.5)	567～ 866 (676)		
琵琶湖安曇川（高島市） （ウグイ）	2024 年 4 月	1	雄	25	24.2～ 28.3 (25.7)	160～ 275 (216)	73.8	3.2
		2	雌	25	24.4～ 30.0 (26.3)	181～ 417 (245)	74.2	2.6
		3	雄	25	23.4～ 28.0 (25.0)	172～ 321 (212)	74.4	2.8
大阪湾 （スズキ）	2024 年 10 月	1	混合	6	32.0～ 35.0 (33.8)	510～ 680 (635)	76.9	2.3
		2	混合	5	35.5～ 37.0 (36.3)	680～ 770 (718)		
		3	混合	4	36.5～ 39.0 (38.0)	810～ 940 (880)		
姫路沖 （スズキ）	2024 年 12 月	1	雌	1	56.0	3,160	78	2.7
		2	雄	1	54.5	2,340		
		3	雄	1	51.0	2,210		
中海 （スズキ）	2024 年 11 月	1	混合	10	37.0～ 43.4 (40.2)	632～ 990 (774)	79.9	1.4
		2	混合	10	35.7～ 42.0 (37.4)	536～ 764 (632)	79.4	0.9
		3	混合	10	31.0～ 35.0 (33.1)	387～ 540 (485)	79.9	0.9
広島湾 （スズキ）	2024 年 11 月	1	雄	3	37.5～ 44.5 (40.5)	921～ 1,485 (1,192)	76.1	1.4
		2	雄	3	45.5～ 46.5 (46.0)	1,395～ 1,526 (1,445)	74.2	
		3	雌	3	41.0～ 47.0 (44.3)	1,184～ 1,628 (1,429)	75.1	
高松港 （ボラ）	2024 年 10 月	1	不明	1	73	2,600	67.4	9.8
		2	不明	1	70	2,400	69.8	10.7
		3	不明	1	69	2,400	68.9	9.9
四万十川河口（四万十市） （スズキ）	2024 年 11 月	1	不明	8	24.5～ 35.5 (28.4)	238～ 847 (422)	73.8	1.4
		2	不明	8	24.0～ 31.5 (28.0)	255～ 696 (430)	73.9	1.1
		3	不明	10	22.5～ 29.0 (26.2)	172～ 446 (343)	76.1	1.3
大分川河口（大分市） （サワラ）	2024 年 9 月	1	雌	2	59.3～ 66.3 (62.8)	1,859～ 2049 (1,954)	69.3	4.0
		2	不明	2	57.5～ 65.4 (61.5)	1749～ 2279 (1,996)	64.9	6.0
		3	雄	2	57.4～ 67.5 (62.5)	1,819～ 2279 (2,049)	68.9	6.8

表 3-2 (2/2) 2024 年度モニタリング調査（生物 魚類）検体の概要

調査地点（生物種）	採取 年月	検体 番号	性別	個体数	体長（cm）（平均値）	体重（g）（平均値）	水分 （%）	脂質分 （%）
薩摩半島西岸 （スズキ）	2024 年 11 月	1	混合	10	26.0～ 29.0 (27.6)	308～ 392 (352)	76.3	0.7
		2	混合	10	26.0～ 29.0 (27.3)	318～ 392 (339)	76.0	1.3
		3	混合	10	27.0～ 29.0 (28.0)	357～ 401 (387)	76.1	0.9
中城湾 （ミナミクロダイ）	2025 年 1 月	1	雌	3	29.0～ 34.0 (32.3)	850～ 1,365 (1,190)	93.2	2.8
		2	雄	3	29.0～ 33.5 (30.7)	700～ 1,225 (917)	93.4	2.6
		3	雌	3	27.0～ 29.0 (28.5)	775～ 855 (828)	92.4	2.9

（注）仙台湾（松島湾）では、調整した 2 検体を等量ずつ混合して 1 検体/地点として測定した。

表 3-3 2024 年度モニタリング調査（生物 鳥類）検体の概要

調査地点（生物種）	採取 年月	検体 番号	性別	個体数	体長（cm）	体重（g）	水分 （%）	脂質分 （%）
琵琶湖北湖竹生島 （カワウ）	2024 年 9 月	1	雄	1	102	1,879	70.1	3.4
		2	雄	1	107	2,266		
		3	雄	1	101	2,036		
天神川（倉吉市） （カワウ）	2024 年 7 月及び 11 月	1	雄	1	111	1,982	68.8	4.4
		2	雌	1	111	1,685		

（注 1）カワウは駆除した個体を検体とした。

（注 2）天神川（倉吉市）では、採取した個体それぞれから調整した 2 試料を等量ずつ混合して 1 検体/地点として測定した。

4. モニタリング調査としての継続性に関する考察

2002年度より実施している「モニタリング調査」は、2001年度以前に実施していた「生物モニタリング」、「水質・底質モニタリング」、「指定化学物質等検討調査」、「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」及び「指定化学物質等検討調査」等の調査を包括した新たな体系として調査を実施している。

ここでは2002年度以降に実施しているモニタリング調査について記述する。

(1) 調査対象物質及び媒体の推移

参考として示した物質（群）を含めて本書に掲載しているモニタリング調査対象物質の年度別実施状況は表4のとおりである。

2002年度に、PCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類及びヘプタクロルについて全媒体で、 α -HCH及び β -HCHについて水質、底質及び生物でそれぞれ調査対象物質として調査を開始した。2003年度からは、*cis*-ヘプタクロルエポキシド、*trans*-ヘプタクロルエポキシド、トキサフェン類、マイレックス、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHについて全媒体で、 α -HCH及び β -HCHについて大気ですべて調査対象物質に追加し、2009年度までこれらの物質について全媒体での調査を継続した。

2004年度には、表3には示していないその他の調査対象物質としてHBB（全媒体）及びジオクチルスズ化合物（水質、底質及び生物）について調査を実施した。2005年度には、表4には示していないその他の調査対象物質としてBHT（底質、生物及び大気）並びにジベンゾチオフェン及び有機スズ化合物（水質、底質及び生物）について調査を実施した。2006年度は、ポリ塩化ナフタレン類（生物）並びに表4には示していないその他の調査対象物質として2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール（生物及び大気）、2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン（別名：アトラジン）、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）、フタル酸ジ-*n*-ブチル、ジオクチルスズ化合物及びりん酸トリ-*n*-ブチル（生物）について調査を実施した。2007年度には、ペンタクロロベンゼン（全媒体）及びヘキサクロロブタ-1,3-ジエン（水質、底質及び生物）並びに表4には示していないその他の調査対象物質としてアクリルアミド、テトラブロモビスフェノールA及びヘキサブロモベンゼン（水質、底質及び生物）並びにトリクロロベンゼン類及びテトラクロロベンゼン類（大気）について調査を実施した。2008年度には、クロルデコン（水質、底質及び生物）、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）（生物）及びポリ塩化ナフタレン類（全媒体）並びに表4には示していないその他の物質としてジオクチルスズ化合物、ジベンゾチオフェン、2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）、フタル酸ジ-*n*-ブチル及びりん酸トリ-*n*-ブチル（水質、底質及び生物）、2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン（別名：アトラジン）（水質及び底質）、*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類（水質）、2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール（別名：BHT）及び2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール（全媒体）について調査を実施した。2009年度には、ヘキサブロモビフェニル類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）（水質、底質及び生物）、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）（水質、底質及び大気）並びにペンタクロロベンゼン（大気）並びに表4には示していないその他の物質としてテトラクロロベンゼン類（大気）について調査を実施した。

このような中、2009年5月にCOP4が開催され、HCH類、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンが新規にPOPs条約対象物質として採択された。これを受けて調査頻度の見直しを行い、それらPOPs条約対象物質については毎年度の調査とすることとした一方で、2002年度又は2003年度から毎年度の調査が行われていた従前のPOPs条約対象物質であるPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、ヘプタクロル類、トキサフェン類及びマイレックスのうち、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、トキサフェン類及びマイレックスについては、数年おきの調査とすることとした。

2010年度は、POPs条約の発効当初から指定される物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、DDT類、クロルデン類及びヘプタクロル類の5物質（群）並びに新規にPOPs条約対象物質として採択されたHCH類、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンの6物質（群）について全媒体の調査を実施したほか、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（全媒体）並びに表4には示していないその他の物質としてトリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物（水質、底質及び生物）及び*N,N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン類（大気）について調査を実施した。

2011年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、ディルドリン、エンドリン、クロルデン類、ヘプタクロル類、マイレックスの7物質（群）、HCH類、クロルデコン、ヘキサブロモビフェニル類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼン並びに2011年4月に開催されたCOP5で新規にPOPs条約対象物質として採択されたエンドスルファン類について全媒体の調査を実施したほか、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（全媒体）及び1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（水質、底質及び生物）並びに表4には示していないその他の物質として*N,N*-ジメチルホルムアミド（水質、底質及び大気）について調査を実施した。

2012年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、クロルデン類、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペンタクロロベンゼン及びエンドスルファン類について全媒体で、ヘプタクロル類について生物及び大気で、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類について底質、生物及び大気で調査を実施したほか、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（全媒体）及び表3には示していないその他の物質として2-(2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール（水質、底質及び生物）について調査を実施した。

2013年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、クロルデン類、HCH類及びペンタクロロベンゼンについて全媒体で、DDT類及びヘプタクロル類について生物及び大気で、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）について大気で調査を実施したほか、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（大気）及びヘキサクロロブタ-1,3-ジエン（水質、底質及び生物）について調査を実施した。

2014年度は、従前のPOPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンについて全媒体で、アルドリン及びエンドスルファン類について生物及び大気で、ディルドリン、エンドリンについて水質、生物及び大気で、DDT類及びヘプタクロル類について水質及び底

質で、COP6で新規にPOPs条約対象物質として採択された1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類について水質、生物及び大気で調査を実施したほか、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）（全媒体）及びポリ塩化ナフタレン類（大気）について調査を実施した。

2015年度は、従前のPOPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペンタクロロベンゼンについて全媒体で、DDT類について大気で、ヘプタクロル類及びエンドスルファン類について生物及び大気で、トキサフェン類について生物で、ヘキサブロモジフェニル類及び1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類について底質、生物及び大気で、COP7で新規にPOPs条約対象物質として採択されたポリ塩化ナフタレン類について生物で、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについて大気で、ペンタクロロフェノールについて水質で調査を実施したほか、POPs条約対象物質とする必要性について検討されているペルフルオロオクタン酸（PFOA）について全媒体で調査を実施した。

2016年度は、従前のPOPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）及びペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）について全媒体で、クロルデン類、ヘプタクロル類及びペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類について生物及び大気で、ペンタクロロベンゼン、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（ α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）及びポリ塩化ナフタレン類について底質、生物及び大気で、エンドスルファン類及びヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについて大気で、COP8で新規にPOPs条約対象物質として採択された短鎖塩素化パラフィン類について生物及び大気で調査を実施したほか、POPs条約対象物質とする必要性について検討されているペルフルオロオクタン酸（PFOA）について全媒体で、ジコホルについて大気で調査を実施した。

2017年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペンタクロロベンゼン、ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類及び短鎖塩素化パラフィン類について全媒体で、クロルデン類及びヘプタクロル類について水質及び底質で、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及び1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（ α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）について生物及び大気で、ポリ塩化ナフタレン類について底質、生物及び大気で、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについて大気で調査を実施したほか、POPs条約対象物質とする必要性について検討されているペルフルオロオクタン酸（PFOA）について生物及び大気で調査を実施した。

2018年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロロベンゼン）、トキサフェン類、マイレックス、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペンタクロロベンゼン、ポリ塩化ナフタレン類、ペンタクロロフェノールとその塩及びエステル類並びに短鎖塩素化パラフィン類について全媒体で、アルドリン、ディルドリン及びエンドリンについて底質で、DDT類について生物及び大気で、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びエンドスルファンについて水質及び底質で、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（ α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）及びジコホ

ルについて生物で、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンについて大気で調査を実施したほか、POPs条約対象物質とする必要性について検討されているペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について水質及び底質で調査を実施した。

2019年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ポリ塩化ナフタレン類、ペンタクロベンゼン、ペンタクロフェノールとその塩及びエステル類、短鎖塩素化パラフィン類並びにジコホルについて全媒体で、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（ α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）について生物及び大気で、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンについて大気で調査を実施したほか、POPRC15においてPOPs条約対象物質への追加を条約締約国会議に勧告することが決定されたペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について水質及び底質で調査を実施した。

2020年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、クロルデン類、ヘプタクロル類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ペンタクロベンゼン、ヘキサクロブタ-1,3-ジエン、短鎖塩素化パラフィン類及びジコホル並びにPOPs条約対象物質への追加が勧告されているペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について全媒体で調査を実施した。

2021年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、DDT類、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ペンタクロベンゼン、エンドスルファン類、ポリ塩化ナフタレン類、ヘキサクロブタ-1,3-ジエン、短鎖塩素化パラフィン類及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について全媒体で調査を実施した。

2022年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、HCH類、ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ペンタクロベンゼン、1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類（ α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）、ヘキサクロブタ-1,3-ジエン、短鎖塩素化パラフィン類及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について全媒体で、 δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン）について水質、底質及び生物で調査を実施した。

2023年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について全媒体で、ペンタクロベンゼン及び短鎖塩素化パラフィン類を生物及び大気で、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンについて大気で、メトキシクロル、デクロランプラス類及びUV-328について水質及び底質で調査を実施した。

2024年度は、POPs条約対象物質のうちPCB類、HCB（ヘキサクロベンゼン）、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）について全媒体で、ペンタクロベンゼン及び短鎖塩素化パラフィン類を生物及び大気で、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンについて大気で、メトキシクロル、デクロランプラス類及びUV-328について水質、底質及び生物で調査を実施した。

なお、HCH類の 대기については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

(2) 調査地点の推移

モニタリング調査の年度別調査地点の状況は表5-1から表5-4のとおりである。

1) 水質

2002年度及び2003年度は38地点、2004年度は40地点、2005年度は47地点、2006年度から2008年度は48地点、2009年度から2011年度は49地点、2012年度から2016年度は48地点、2017年度及び2018年度は47地点、2019年度は48地点、2020年度は46地点、2021年度は47地点、2022年度は48地点、2023年度は47地点についての調査であった。

2024年度は、田川谷地賀橋（下野市）が田川給分地区頭首工（宇都宮市）に再変更され、47地点において調査を実施した。

2) 底質

2002年度は63地点、2003年度は62地点、2004年度及び17年度は63地点、2006年度から2011年度は64地点、2012年度から2014年度は63地点、2015年度から2017年度は62地点、2018年度及び2019年度は61地点、2020年度は58地点、2021年度は60地点、2022年度は61地点、2023年度は60地点についての調査であった。

2024年度は、田川谷地賀橋（下野市）が田川給分地区頭首工（宇都宮市）に変更され、60地点において調査を実施した。

3) 生物

2002年度は23地点（うち1地点は2生物種を調査）、2003年度は三浦半島のムラサキイガイ及び萩市見島のムラサキインコガイの2地点が外れ21地点、2004年度には高松港のムラサキイガイが新規追加され、洞海湾のムラサキイガイがムラサキインコガイに変更され22地点、2005年度は釧路沖のシロサケ及び姫路沖のスズキが新規追加され、高松港のムラサキイガイがイガイに、洞海湾のムラサキインコガイがムラサキイガイに変更され23地点（うち2地点は2生物種を調査）、2006年度及び2007年度も2005年度と同一の23地点、2008年度は大分川河口（大分市）のスズキが新規追加され24地点（うち2地点は2生物種を調査）、2009年度は、名古屋港のボラが新規追加され、洞海湾のムラサキイガイがムラサキインコガイに変更され25地点（うち2地点は2生物種を調査）、2010年度は、能登半島沿岸のムラサキイガイが外れ、横浜港のムラサキイガイがミドリイガイに、洞海湾のムラサキインコガイがムラサキイガイに変更され24地点（うち2地点は2生物種を調査）についての調査であった。2011年度は、能登半島沿岸のムラサキイガイが再追加され、蕨島のウミネコ、山田湾のムラサキイガイ及びアイナメ並びに鳴門のイガイが外れ、サンマが常磐沖から三陸沖に変更され、仙台湾（松島湾）のスズキがアイナメに、横浜港のミドリイガイがムラサキイガイに、高松港のムラサキイガイがボラに変更され22地点（うち1地点は2生物種を調査）、2012年度は、蕨島のウミネコ並びに山田湾のムラサキイガイ及びアイナメが再追加され、サンマが三陸沖から常磐沖に再変更され24地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2013年度は、蕨島のウミネコ並びに盛岡市郊外のムクドリの調査が廃止され、琵琶湖北湖竹生島及び天神川（倉吉市）のカワウが追加

され、24地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2014年度は、サンマが常磐沖から三陸沖に再変更され、島根半島沿岸七類湾並びに洞海湾のムラサキイガいの調査が廃止され、22地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2015年度は、サンマが三陸沖から小名浜沖に再変更され、琵琶湖北湖竹生島沖のカワウの調査が外れ、21地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2016年度は、サンマが小名浜沖から常磐沖に再変更され、琵琶湖北湖竹生島沖のカワウが再追加され、22地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2017年度は、2016年度と同一の22地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2018年度は、日本海沖のアイナメが廃止され、21地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2019年度は、常磐沖のサンマがマサバに変更され、釧路沖のシロサケ、高松港のボラ及び琵琶湖北湖竹生島のカワウが廃止され、19地点（うち1地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2020年度は、釧路沖のシロサケ、琵琶湖北湖竹生島のカワウ及び高松港のボラが再追加され、横浜港のムラサキイガいがミドリイガイに変更され、天神川（倉吉市）のカワウが廃止され、20地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2021年度は、天神川（倉吉市）のカワウが再追加され、大分川河口（大分市）のスズキがサワラに変更され、21地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2022年度は、横浜港のミドリイガいがムラサキイガイに再変更され、21地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。2023年度は、横浜港のムラサキイガイが廃止され、20地点（うち2地点は2生物種を調査）において調査を実施した。

2024年度は、釧路沖のシロサケ及びウサギアイナメが廃止され、横浜港のミドリイガイが再追加され、20地点（うち1地点は2生物種を調査）において調査を実施した。

なお、参考として、カワウの卵についても、笛吹川下曾根橋（甲府市）では2013年度から2019年度及び2024年度に、昆陽池（伊丹市）では2017年度から2024年度まで調査を実施している。

4) 大気

2002年度は34地点において秋季に調査が実施された。2003年度から2013年度までは温暖期と寒冷期の二期の調査となり、調査地点として2003年度は小笠原父島が追加され、釧路市立春採中学校（釧路市）が北海道渡島支庁庁舎（函館市）に変更され35地点において、2004年度は兵庫県環境研究センター（神戸市）及び鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）が追加され、北海道渡島支庁庁舎（函館市）が上川保健福祉事務所（名寄市）に変更され37地点において、2005年度は上川保健福祉事務所（名寄市）が釧路市立春採中学校（釧路市）に変更され37地点において、2006年度には釧路市立春採中学校（釧路市）が北海道渡島支庁庁舎（函館市）に変更され37地点において、2007年度は北海道渡島支庁庁舎（函館市）が上川保健福祉事務所（名寄市）、茨城県環境監視センター（水戸市）が茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）に変更され、天理一般環境大気測定局（天理市）が廃止され36地点において、2008年度は上川保健福祉事務所（名寄市）が北海道釧路支庁（釧路市）に変更され、天理一般環境大気測定局（天理市）が再度追加され37地点において、2009年度は北海道釧路支庁（釧路市）が北海道渡島支庁庁舎（函館市）に変更され37地点において、2010年度は北海道渡島支庁庁舎（函館市）が北海道上川合同庁舎（旭川市）に、富士吉田合同庁舎（富士吉田市）が山梨県衛生環境研究所（甲府市）に変更され37地点において、2011年度は北海道上川総合振興局（旭川市）が北海道釧路総合振興局（釧路市）に、萩市役所見島支所（萩市）が萩市見島ふれあい交流センター（萩市）に、徳島県保健環境センター（徳島市）が徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）に変更され、37地点において、2012年度は北海道釧路総合振興局（釧路市）が北海道渡島総

合振興局（函館市）に、宮城県保健環境センター（仙台市）が宮城県消防学校（仙台市）に、葺合一般環境大気測定局（神戸市）が神戸市役所（神戸市）に変更され、京都府立城陽高等学校（城陽市）が外れ36地点において、2013年度は北海道渡島総合振興局（函館市）が北海道上川総合振興局（旭川市）に変更され36地点においてそれぞれ調査が実施された。2014年度からは温暖期のみの調査となり。調査地点として2014年度は北海道上川総合振興局（旭川市）が北海道釧路総合振興局（釧路市）に、宮城県消防学校（仙台市）が宮城県仙台土木事務所（仙台市）に変更され36地点において、2015年度は北海道釧路総合振興局（釧路市）が北海道渡島総合振興局（函館市）に、宮城県仙台土木事務所（仙台市）が宮城県消防学校（仙台市）に、香川県高松合同庁舎（高松市）が香川県立総合水泳プール（高松市）に変更され、横浜市環境科学研究所（横浜市）が移転に伴い横浜市磯子区から横浜市神奈川区に位置が変更され、群馬県衛生環境研究所（前橋市）が廃止され35地点において、2016年度は北海道渡島総合振興局（函館市）が北海道上川総合振興局（旭川市）に、網張スキー場（雫石市）が菓子一般環境大気測定局（滝沢市）に、宮城県消防学校（仙台市）が宮城県保健環境センター（仙台市）に、地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所（大阪市）が大阪合同庁舎2号館別館（大阪市）に、萩市見島ふれあい交流センター（萩市）が萩健康福祉センター（萩市）に変更され、山形県環境科学研究所センター（村山市）が追加され、京都府立城陽高等学校（城陽市）が再追加され37地点において、2017年度は北海道上川総合振興局（旭川市）が北海道釧路総合振興局（釧路市）に、萩健康福祉センター（萩市）が山口県立萩美術館・浦上記念館（萩市）に変更され37地点において、2018年度は北海道釧路総合振興局（釧路市）が北海道渡島総合振興局（函館市）に、山口県立萩美術館・浦上記念館（萩市）が萩健康福祉センター（萩市）に再変更され37地点において、2019年度は北海道渡島総合振興局（函館市）が北海道上川総合振興局（旭川市）に再変更され、神戸市役所（神戸市）が神戸市健康科学研究所（当時の名称は環境保健研究所で2021年に左記の名称に変更、神戸市）に変更され、京都府立城陽高等学校（城陽市）が廃止され36地点において、2020年度は香川県環境保健研究センター（高松市）が追加され、北海道上川総合振興局（旭川市）が北海道釧路総合振興局（釧路市）に再変更され37地点において、2021年度は市原松崎一般環境大気測定局（市原市）及び香川県立総合水泳プール（高松市）が廃止され、北海道釧路総合振興局（釧路市）が北海道渡島総合振興局（函館市）に再変更され35地点において、2022年度は北海道渡島総合振興局（函館市）が北海道上川総合振興局（旭川市）に再変更され、京都府立城陽高等学校（城陽市）が再追加され36地点において、2023年度は北海道上川総合振興局（旭川市）が北海道釧路総合振興局（釧路市）に再変更され、大牟田市役所（大牟田市）が廃止され35地点においてそれぞれ調査が実施された。

2024年度は、北海道釧路総合振興局（釧路市）が北海道渡島総合振興局（函館市）に再変更され、35地点において概ね温暖期に調査が実施された。

（３）定量（検出）下限値の推移

モニタリング調査における検出下限値を表6-1から表6-4に、定量下限値を表7-1から表7-4に示す。2002年度の水質及び底質は装置検出下限値（IDL）を、2003年度以降の水質及び底質並びに2002年度以降の生物及び大気は分析方法の検出下限値（MDL）をそれぞれ検出下限値として扱っている。

表6-1から表6-4にあるとおり、検出下限値については年度によって変動はあるものの、分析機関が媒体ごとに一機関になっていることに加え、高感度のGC/HRMS等を用いた分析を実施しており、継続的に高感度

かつほぼ同等の検出下限値及び定量下限値で測定がされている。

モニタリング調査では測定値の推移を定量的に評価できることが重要であるため、2002年度調査結果からは原則として次のとおり定量下限値を示すことで数値の信頼性を確保することとした。

- ・検出下限値の約3倍を定量下限値とする。
- ・検出頻度（検出数/検体数等）は検出下限値により判定する。
- ・幾何平均値の算出においては、検出下限値以上の測定値はそのまま用い、検出下限値未満の測定値は検出下限値の1/2を用いる。
- ・幾何平均値、中央値等の表記に当たっては、その数値が検出下限値以上定量下限値未満の場合においてはトレース値とし、検出下限値未満であった場合においては不検出とする。

（４）まとめ

（１）～（３）の検討結果より、調査結果の評価を行うに当たっては以下の点を考慮する必要がある。

PCB類及びHCBについては全媒体で2002年度から2024年度調査まで継続的に実施している。その他の物質についても数年おきに実施し、現在まで継続的な調査を行っている。

また、調査地点のうち水質、底質及び大気並びに生物の貝類及び魚類に係る地点については、一部の地点では地点が入れ替わってはいるものの、概ね継続的に調査を実施している。他方、鳥類に係る調査地点については、2012年度まで鳥類でウミネコ及びムクドリを調査対象生物としていたものをカワウに入れ替えている。これに伴い、従来調査を実施していた地点を変更して調査を実施しており2012年度までとの継続性がない。

このため、鳥類について化学物質の残留状況を経年的に評価する場合には、2013年度以降とそれ以前とに継続性がないことに留意する必要がある。

大気では、2002年度は秋季に、2003年度から2013年度までは温暖期と寒冷期に、2014年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に2021年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されており、残留状況を経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。また、PCB類及びHCBの大気では、2007年度の温暖期及び寒冷期並びに2008年度の温暖期に用いた大気試料採取装置の一部からPCB類及びHCHが検出され、PCB類及びHCHの測定に影響を及ぼすことが判明したため、それぞれ3分の1程度の地点で欠測としており、大気についてこれらの化学物質の残留状況を経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。

定量（検出）下限値については、水質、底質、生物及び大気ともに2002年度から2024年度調査までの値はほぼ同等であり、高感度で測定が行われている。

以上より、モニタリング調査の対象物質については一部において留意が必要な点があるものの、概ね経年的な評価が可能であると判断される。

表4 モニタリング調査の年度別実施状況

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	大気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
[2]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	大気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
[3]	水質	■	■	■	■	■	■	■																
	底質	■	■	■	■	■	■	■										■						
	貝類	■	■	■	■	■	■	■						■										
	魚類	■	■	■	■	■	■	■						■										
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■						■										
	大気	■	■	■	■	■	■	■						■										
[4]	水質	■	■	■	■	■	■	■						■										
	底質	■	■	■	■	■	■	■			■							■						
	貝類	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	魚類	■	■	■	■	■	■	■						■										
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	大気	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
[5]	水質	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	底質	■	■	■	■	■	■	■										■						
	貝類	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	魚類	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
	大気	■	■	■	■	■	■	■			■			■										
[6-1] [6-2] [6-3] [6-4] [6-5] [6-6]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■					■							■			
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■					■							■			
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■					■							■			
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■					■							■			
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■					■							■			
	大気	■	■	■	■	■	■	■	■					■		■					■			

(注) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する（以下同じ。）。

[1] PCB 類、[2] HCB、[3] アルドリン、[4] デルドリン、[5] エンドリン、[6-1] *p,p'*-DDT、[6-2] *p,p'*-DDE、[6-3] *p,p'*-DDD、[6-4] *o,p'*-DDT、[6-5] *o,p'*-DDE、[6-6] *o,p'*-DDD

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[7-1] [7-2] [7-3] [7-4] [7-5]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			■				
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			■				
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■				■				
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■				■				
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■				■				
	大気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■				■				

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[8-1]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■				
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■				
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	大気	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
[8-2] [8-3]	水質		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■				
	底質		■	■	■	■	■	■	■	■	■			■			■			■				
	貝類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	魚類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	鳥類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				
	大気		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■				■				

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[9-1] [9-2] [9-3]	水質		■	■	■	■	■	■	■									■						
	底質		■	■	■	■	■	■	■									■						
	貝類		■	■	■	■	■	■	■						■			■						
	魚類		■	■	■	■	■	■	■						■			■						
	鳥類		■	■	■	■	■	■	■						■			■						
	大気		■	■	■	■	■	■	■									■						

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[10]	水質		■	■	■	■	■	■	■		■							■						
	底質		■	■	■	■	■	■	■		■							■						
	貝類		■	■	■	■	■	■	■		■							■						
	魚類		■	■	■	■	■	■	■		■							■						
	鳥類		■	■	■	■	■	■	■		■							■						
	大気		■	■	■	■	■	■	■		■							■						

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[11-1] [11-2]	水質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	底質	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	貝類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	魚類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	鳥類	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	大気		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
[11-3] [11-4]	水質		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	底質		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	貝類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	魚類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	鳥類		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		
	大気		□	□	□	□	□	□	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■		

(注) □ : HCH 類の大気については、2003 年度から 2008 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

[7-1] *cis*-クロルデン、[7-2] *trans*-クロルデン、[7-3] オキシクロルデン、[7-4] *cis*-ノナクロル、[7-5] *trans*-ノナクロル、[8-1] ヘプタクロル、[8-2] *cis*-ヘプタクロルエポキシド、[8-3] *trans*-ヘプタクロルエポキシド、[9-1] Parlar-26、[9-2] Parlar-50、[9-3] Parlar-62、[10] マイレックス、[11-1] α -HCH、[11-2] β -HCH、[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)、[11-4] δ -HCH

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[12]	水質							■		■	■													
	底質							■		■	■													
	貝類							■		■	■													
	魚類							■		■	■													
	鳥類							■		■	■													
	大気		△							■	■													

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[13]	水質		△						■	■	■													
	底質		△						■	■	■													
	貝類								■	■	■				■									
	魚類								■	■	■				■									
	鳥類								■	■	■				■									
	大気			△						■	■				■									

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[14-1]	水質				△				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	底質								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	魚類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-2]	大気			△					■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	水質				△				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	底質			△					■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	魚類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-3]	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気			△					■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	水質				△				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	底質		△						■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-4]	魚類		△					■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気			△					■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	水質		△						■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	底質								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-5]	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	魚類		△					■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	水質				△				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-6]	底質								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	魚類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[14-7]	水質	△			△				■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	底質	△	△						■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	貝類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	魚類	△	△					■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	鳥類							■		■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気								■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■		

(注) △：継続的調査以外の調査において実施したことを意味する（以下同じ。）。

[12] クロルデコン、[13] ヘキサブロモビフェニル類、[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類、[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類、[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類、[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類、[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類、[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類、[14-7] デカブロモジフェニルエーテル類

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[15]	水質	△			△				■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
	底質		△		△				■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
	貝類				△				■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	魚類		△		△				■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	鳥類								■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	大気			△						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
[16]	水質	△			△				■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
	底質		△		△				■	■	■	■		■	■	■		■	■	■	■	■	■	■
	貝類				△				■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	魚類		△		△				■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	鳥類								■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	大気			△						■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
[17]	水質						■			■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■		
	底質						■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	貝類						■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
	魚類						■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
	鳥類						■			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■
	大気						■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
[18-1]	水質										■	■						■			■			
	底質										■	■						■			■			
[18-1]	貝類										■	■		■	■						■			
[18-2]	魚類										■	■		■	■						■			
[18-2]	鳥類										■	■		■	■						■			
	大気										■	■		■	■	■					■			

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
[19-1]	水質		△								■			■								■		
	底質		△								■	■			■	■						■		
	貝類										■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[19-2]	魚類			△							■	■		■	■	■	■	■	■			■		
[19-3]	鳥類										■	■		■	■	■	■	■	■			■		
	大気											■		■	■	■	■		■			■		
[19-4]	水質		△								■			■								■		
	底質		△								■	■			■							■		
	貝類										■	■		■	■							■		
[19-5]	魚類			△							■	■		■	■							■		
	鳥類										■	■		■	■							■		
	大気											■		■	■									

(注) 2003年度及び2004年度は総1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 、[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) 、[17] ペンタクロロベンゼン、[18-1] α -エンドスルファン、[18-2] β -エンドスルファン、[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[20]	水質							■										■	■		■		
	底質							■								■	■	■	■		■		
	貝類					■		■							■	■	■	■	■		■		
	魚類	△				■		■							■	■	■	■	■		■		
	鳥類					■		■							■	■	■	■	■		■		
	大気	△						■						■		■	■	■	■		■		

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[21]	水質						■ △						■							■	■	■	
	底質						■ △						■							■	■	■	
	貝類						■						■							■	■	■	
	魚類												■							■	■	■	
	鳥類												■							■	■	■	
	大気														■	■	■	■	■	■	■	■	■

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
[22-1]	水質				△											■		■	■	■				
	底質																■	■	■					
	貝類															■	■	■	■					
	魚類															■	■	■	■					
	鳥類															■	■	■	■					
[22-2]	大気															■	■	■	■					
	水質																■	■	■					
	底質																■	■	■					
	貝類															■	■	■	■					
	魚類															■	■	■	■					
	鳥類															■	■	■	■					
	大気															■	■	■	■					

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[23-1]	水質			△	△												■	■	■	■	■	■	
	底質			△	△												■	■	■	■	■	■	
[23-2]	貝類				△											■	■	■	■	■	■	■	■
[23-3]	魚類			△	△											■	■	■	■	■	■	■	■
[23-4]	鳥類															■	■	■	■	■	■	■	■
	大気															■	■	■	■	■	■	■	■

(注) 2005年度の水質及び底質では[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が5のもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-1] 塩素化トリデカン類は塩素数が6のものを、貝類及び魚類では[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が4から6までのもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-4] 塩素化トリデカン類は塩素数が5から7までのものをそれぞれ対象とした。
2016年度以降の水質、底質並びに貝類、魚類及び鳥類では、塩素数が5から9までのものを対象とした
大気では、2016年度の[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が4から6までのもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-4] 塩素化トリデカン類は塩素数が4から7までのものを対象とし、2017年度以降はいずれの物質についても塩素数が4から7までのものを対象とした。

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																					
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
[24]	水質						■												■	■			
	底質			△			■												■	■			
	貝類					■	■											■	■	■			
	魚類					■	■											■	■	■			
	鳥類					■	■											■	■	■			
	大気															■			■	■			

[20] ポリ塩化ナフタレン類、[21] ヘキサクロボタ-1,3-ジエン、[22-1] ペンタクロロフェノール、[22-2] ペンタクロロアニソール、[23-1] 塩素化デカン類、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類、[23-4] 塩素化トリデカン類、[24] ジコホル

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[25]	水質																	■	■	■	■	■	■	■
	底質																	■	■	■	■	■	■	■
	貝類																			■	■	■	■	■
	魚類																			■	■	■	■	■
	鳥類																			■	■	■	■	■
	大気																			■	■	■	■	■

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[26]	水質				△																		■	■
	底質				△																		■	■
	貝類																							■
	魚類				△																			
	鳥類																							
	大気																							

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[27-1] [27-2]	水質																						■	■
	底質																						■	■
	貝類																							■
	魚類																							
	鳥類																							
	大気																							

物質 調査 番号	調査 媒体	年度																						
		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[28]	水質																						■	■
	底質																						■	■
	貝類																							■
	魚類																							
	鳥類																							
	大気																							

[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）、[26] メトキシクロル、[27-1] *anti*-デクロランプラス、[27-2] *syn*-デクロランプラス、
[28] UV-328

表5-1 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	年度																								分 析
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）	■	■	■	■	■																				
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	■	■	■	■	■																			◇	
青森県	十三湖	■	■	■	■	■																				
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	■	■	■	■	■																			◇	
宮城県	仙台湾（松島湾）	■	■	■	■	■																			◇	
秋田県	八郎湖	■	■	■	■	■																			◇	
山形県	最上川河口（酒田市）	■	■	■	■	■																			◇	
福島県	小名浜港	■	■	■	■	■																			◇	
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）		■	■	■	■																			◇	
	利根川河口利根川大橋（波崎町）	■																								
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）				■	■																				
	田川谷地賀橋（下野市）																						■			
群馬県	利根川利根大堰上流（千代田町）																			■	■					
埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
千葉県	花見川河口（千葉市）	■	■	■	■	■																				
東京都	荒川河口（江東区）				■	■																				
	隅田川河口（港区）	■	■	■	■	■																			◇	
横浜市	横浜港	■	■	■	■	■																			◇	
川崎市	川崎港京浜運河扇町地先	■	■	■	■	■																			◇	
新潟県	信濃川下流（新潟市）				■	■																				
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	■	■	■	■	■																			◇	
石川県	犀川河口（金沢市）	■	■	■	■	■																			◇	
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）				■	■																				
長野県	諏訪湖湖心	■	■	■	■	■																			◇	
静岡県	天竜川掛塚橋（磐田市）	■	■	■	■	■																			◇	
愛知県	名古屋港	■	■	■	■	■																			◇	
三重県	四日市港	■	■	■	■	■																			◇	
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	■	■	■	■	■																			◇	
京都府	宮津港	■	■	■	■	■																				
京都市	桂川宮前橋（京都市）	■	■	■	■	■																			◇	
大阪府	大和川河口（堺市）	■	■	■	■	■																			◇	
大阪市	大阪港	■	■	■	■	■																			◇	
兵庫県	姫路沖	■	■	■	■	■																			◇	
神戸市	神戸港中央	■	■	■	■	■																			◇	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）				■	■																				
岡山県	水島沖	■	■	■	■	■																			◇	
広島県	呉港	■	■	■	■	■																			◇	
	広島湾				■	■																				
山口県	徳山湾	■	■	■	■	■																			◇	
	宇部沖				■	■																				
	萩沖	■	■	■	■	■																			◇	
徳島県	吉野川河口（徳島市）	■	■	■	■	■																			◇	
香川県	高松港	■	■	■	■	■																			◇	
高知県	四万十川河口（四万十市）	■	■	■	■	■																			◇	
北九州市	洞海湾				■	■																				
佐賀県	伊万里湾	■	■	■	■	■																			◇	
長崎県	大村湾					■																				
熊本県	緑川平木橋（宇土市）	■	■	■	■	■																			◇	
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	■	■	■	■	■																			◇	
鹿児島県	天降川新川橋（霧島市）				■	■																				
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	■	■	■	■	■																			◇	
沖縄県	那覇港	■	■	■	■	■																				

（注1）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

（注2）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあつては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

（注3）「分析」の列に◇を付した調査地点は、統計学的手法を用いた経年分析を実施した地点であることを意味する。また、分析対象とする地点とは、それぞれの調査対象物質の調査を開始してから2024年度までの期間内において2か年以上測定されていない地点を除いたものを分析対象地点とした。

表5-2 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	年度																								分 析
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		
北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	天塩川恩根内大橋上流カヌー乗り場 （美深町）																■									
	十勝川すずらん大橋（帯広市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	苫小牧港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
青森県	十三湖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
宮城県	仙台湾（松島湾）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
秋田県	八郎湖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
山形県	最上川河口（酒田市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
福島県	小名浜港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	利根川河口利根川大橋（波崎町）	■																								
栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	田川谷地賀橋（下野市）																						■		◇	
千葉県	市原・姉崎海岸	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
千葉市	花見川河口（千葉市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
東京都	荒川河口（江東区）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	隅田川河口（港区）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
横浜市	横浜港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
川崎市	多摩川河口（川崎市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	川崎港京浜運河扇町地先	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
新潟県	信濃川下流（新潟市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
石川県	犀川河口（金沢市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
長野県	諏訪湖湖心	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
静岡県	清水港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	天竜川掛塚橋（磐田市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
愛知県	衣浦港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	名古屋港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
三重県	四日市港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	鳥羽港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
滋賀県	琵琶湖早崎港沖	■																								
	琵琶湖南比良沖中央		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	琵琶湖唐崎沖中央	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
京都府	宮津港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
京都市	桂川宮前橋（京都市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
大阪府	大和川河口（堺市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	淀川河口（大阪市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	大阪港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	大阪港外	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
兵庫県	姫路沖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
神戸市	神戸港中央	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
岡山県	水島沖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
広島県	呉港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	広島湾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
山口県	徳山湾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	宇部沖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	萩沖	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
徳島県	吉野川河口（徳島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
香川県	高松港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
愛媛県	新居浜港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
高知県	四万十川河口（四万十市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
北九州市	洞海湾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
福岡市	博多湾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
佐賀県	伊万里湾	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	

地方 公共団体	調査地点	年度																							分 析
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
長崎県	大村湾					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大分県	大分川河口（大分市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇
鹿児島県	天降川（霧島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇
	五反田川（いちき串木野市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇
沖縄県	那覇港	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇

（注1）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

（注2）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあつては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

（注3）「分析」の列に◇を付した調査地点は、統計学的手法を用いた経年分析を実施した地点であることを意味する。また、分析対象とする地点とは、それぞれの調査対象物質の調査を開始してから2024年度までの期間内において2か年以上測定されていない地点を除いたものを分析対象地点とした。

表5-3 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（生物）

地方 公共団体	調査地点	生物種	年度																								分 析
			'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		
(貝 類)																											
岩手県	山田湾	ムラサキイガイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
神奈川県	三浦半島	ムラサキイガイ	■																								
横浜市	横浜港	ムラサキイガイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
		ミドリイガイ									■											■	■		■		
石川県	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
島根県	島根半島沿岸七類湾	ムラサキイガイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
山口県	見島	ムラサキインコガイ	■																								
徳島県	鳴門	イガイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
香川県	高松港	ムラサキイガイ			■																						
		イガイ					■	■	■	■	■																
北九州市	洞海湾	ムラサキイガイ	■	■			■	■	■	■		■	■	■	■												
		ムラサキインコガイ			■					■																	
(魚 類)																											
北海道	釧路沖	ウサギアイナメ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
		シロサケ					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	日本海沖（岩内沖）	アイナメ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
岩手県	山田湾	アイナメ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
宮城県	仙台湾（松島湾）	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
		アイナメ										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
茨城県	常磐沖	サンマ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
		マサバ																				■	■	■	■		
	三陸沖	サンマ																									
	小名浜沖	サンマ																									
東京都	東京湾	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
川崎市	川崎港扇島沖	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
名古屋市	名古屋港	ボラ																									
滋賀県	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
大阪府	大阪湾	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
兵庫県	姫路沖	スズキ				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
鳥取県	中海	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
広島市	広島湾	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
香川県	高松港	ボラ																									
高知県	四万十川河口（四万十市）	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
大分県	大分川河口	スズキ																									
		サワラ																					■	■	■		
鹿児島県	薩摩半島西岸	スズキ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
沖縄県	中城湾	ミナミクロダイ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
(鳥 類)																											
青森県	蕨島（八戸市）	ウミネコ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
岩手県	盛岡市郊外	ムクドリ	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
滋賀県	琵琶湖北湖竹生島	カワウ																									
鳥取県	天神川（倉吉市／北栄町）	カワウ																									
		カワウ																									

（注1）■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

（注2）「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

（注3）「分析」の列に◇を付した調査地点は、統計学的手法を用いた経年分析を実施した地点であることを意味する。また、分析対象とする地点とは、それぞれの調査対象物質の調査を開始してから2024年度までの期間内において2か年以上測定されていない地点を除いたものを分析対象地点とした。

表5-4 モニタリング調査の年度別調査地点の一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	年度																								分 析
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		
北海道	上川保健福祉事務所（名寄市）				■			■																		
	釧路市立春採中学校（釧路市）	■			■																					
	北海道釧路総合振興局（釧路市）							■			■			■			■				■			■		
	北海道渡島総合振興局（函館市）		■				■					■			■				■			■			■	
	北海道上川総合振興局（旭川市）									■						■				■			■			
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
岩手県	網張スキー場（雫石町）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	梶子一般環境大気測定局（滝沢市）															■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	宮城県保健環境センター（仙台市）		■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■	■	■	■	■	■	■		
宮城県	国設仙台測定局（仙台市）	■																								
	宮城県消防学校（仙台市）											■	■		■											
	宮城県仙台土木事務所（仙台市）													■												
	山形県環境科学研究所センター（村山市）																■	■	■	■	■	■	■	■		
茨城県	茨城県環境監視センター（水戸市）	■	■	■	■	■																				
	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
群馬県	群馬県衛生環境研究所（前橋市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
千葉県	市原松崎一般環境大気測定局（市原市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	東京都立衛生研究所（調査当時）（新宿区）	■																								
	小笠原父島（小笠原村）		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
横浜市	旧横浜市環境科学研究所（横浜市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	横浜市環境科学研究所（横浜市）															■	■	■	■	■	■	■	■	■		
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
山梨県	富士吉田合同庁舎（富士吉田市）	■	■	■	■	■	■	■																		
	山梨県衛生環境研究所（甲府市）									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
京都府	京都府立城陽高等学校（城陽市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
大阪府	地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合 研究所（大阪市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	大阪合同庁舎 2号館別館（大阪市）															■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	兵庫県環境研究センター（神戸市）				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
神戸市	葺合一般環境大気測定局（神戸市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	神戸市役所（神戸市）													■	■	■	■	■								
	神戸市健康科学研究所（神戸市）																			■	■	■	■	■		
奈良県	天理一般環境大気測定局（天理市）	■	■	■	■	■				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
	萩市役所見島支所（萩市）	■	■	■	■	■	■	■	■																	
	萩市見島ふれあい交流センター（萩市）												■	■	■	■										
	萩健康福祉センター（萩市）																■		■	■	■	■	■	■		
	山口県立萩美術館・浦上記念館（萩市）																	■								
徳島県	徳島県保健環境センター（徳島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■											
	香川県立総合水泳プール（高松市）																									
	香川県環境保健研究センター（高松市）																									
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
福岡県	大牟田市役所（大牟田市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
沖縄県	辺戸岬（国頭村）	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	◇	

(注1) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

(注2) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

(注3) 「分析」の列に◇を付した調査地点は、統計学的手法を用いた経年分析を実施した地点であることを意味する。また、分析対象とする地点とは、それぞれの調査対象物質の調査を開始してから2024年度までの期間内において2か年以上測定されていない地点を除いたものを分析対象地点とした。

表6-1 モニタリング調査における検出下限値の比較（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総PCB※	2.5	2.5	5.0	3.2	3	2.9	3.0	4	24	1.7	15	8	2.9	7.3	2.8	5.5	5	4.7	6	6	5	4	6	
[2]	HCB	0.2	2	8	5	5	3	1	0.2	4	2	0.7	2	0.4	0.6	0.3	0.8	0.6	3	0.8	0.4	0.3	0.3	1	
[3]	アルドリノ	0.2	0.2	0.4	0.3	0.6	0.3	0.6	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	0.6	0.3	0.5	0.34	1	0.7	0.6	0.2	---	0.6	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	2.0	0.3	0.5	0.4	0.4	0.6	1	0.3	---	0.6	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.2	0.9	2	1	0.6	0.6	0.5	0.06	0.8	---	---	---	0.1	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.2	2	3	2	2	2	0.4	0.4	0.8	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	0.1	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.08	0.5	0.8	0.64	0.5	0.6	0.2	0.2	0.08	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.4	0.7	2	1	0.8	0.8	0.5	0.06	0.5	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.3	0.3	0.5	0.4	0.9	0.8	0.3	0.09	0.09	---	---	---	0.1	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.20	0.3	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.09	0.2	---	---	---	0.08	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---		
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.3	0.9	2	1	2	2	0.6	0.4	4	0.6	0.6	0.9	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.5	2	2	1	2	0.8	1	0.3	4	0.4	0.8	1	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	0.4	0.5	0.5	0.4	0.9	2	0.7	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	---	---	---	2	---	---	1	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.6	0.1	0.2	0.2	0.3	0.8	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	0.3	---	---	---	0.6	---	---	0.5	---	---	---	---	
[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.4	0.5	2	0.84	1.0	2	0.6	0.4	3	0.5	0.6	0.6	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	---		
[8]	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	0.5	0.5	2	1	2	0.8	0.8	0.3	0.7	0.5	---	---	0.2	---	---	1	---	---	1	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.2	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	---	---	0.2	---	---	0.6	---	---	0.9	---	---	---	---	
[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.4	0.3	0.2	0.6	0.7	0.7	0.3	0.5	0.3	---	---	0.3	---	---	0.9	---	---	0.7	---	---	---	---		
[9]	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	20	3	4	5	5	3	2	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	30	7	5	5	3	3	3	---	---	---	---	---	---	---	---	2	---	---	---	---	---	---	
	[9-3] Parlar-62	---	90	30	30	20	30	20	20	---	---	---	---	---	---	---	---	20	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	0.09	0.2	0.1	0.5	0.4	0.2	0.2	---	0.2	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH類																								
	[11-1] α -HCH	0.3	0.9	2	1	1	0.6	2	0.4	1	3	0.5	2	1.5	0.4	0.4	0.4	---	2	---	---	0.5	---	---	
	[11-2] β -HCH	0.3	0.7	2	0.9	0.6	0.9	0.4	0.2	0.7	0.8	0.5	2	0.4	0.4	0.4	0.7	---	1	---	---	0.2	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)	---	2	7	5	6	0.7	1	0.2	2	1	0.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.5	---	2	---	---	0.3	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	0.5	0.7	0.5	0.8	0.4	0.9	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.2	0.1	0.3	0.4	---	0.4	---	---	0.7	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	0.05	---	0.04	0.05	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	2.2	1	0.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	3	3	2	1	---	3	1.2	2	3	5	4	---	---	2	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	4	1	1	1	---	2	2.1	0.9	1	3	2	---	---	0.9	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.6	2	1	1	---	1	0.6	0.8	3	1	1	---	---	1	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	2	1	2	1	---	3	0.8	3	5	3	2	---	---	3	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.6	1	1	2	---	0.6	0.6	0.3	1	1	1	---	---	0.8	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	30	7	4	13	---	2	2	1	3	2	3	---	---	4	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	200	100	20	220	---	9	7	6	8	4	6	---	---	3	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	14	20	20	12	---	20	11	20	---	30	30	30	30	30	30	30
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	23	20	20	55	---	20	22	20	---	30	40	30	40	30	30	30
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	1,300	---	---	1	0.9	1	1	0.3	0.5	---	0.6	0.5	2	1	0.4	0.2	---	---
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50	10	---	---	---	---	---	40	---	---	40	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9	9	---	---	---	---	---	10	---	---	10	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	600	---	---	600	---	---	---	---	---	---	---	200	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	500	---	---	200	---	---	---	---	---	---	---	200	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	500	---	---	300	---	---	---	---	---	---	---	300	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	300	---	---	200	---	---	---	---	---	---	---	300	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	300	---	---	200	---	---	---	---	---	---	---	200	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	7.5	---	6	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	340	---	---	---	---	---	---	37	---	---	---	---	---	---	40	70	40	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	85	---	10	9	20	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	6	10	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,100	400	200	200	300	100	---	---
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	500	800	500	300	300	300	---	---
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,100	1,000	400	300	500	300	---	---
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,200	1,500	500	200	800	200	---	---
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	5	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50	30	20	30	30	30	40
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30	40
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.7	0.9	
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.9	1.0	
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20	20

(注1) 「---」は比較対象なしを意味する。

(注2) ※：検出下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表6-2 モニタリング調査における検出下限値の比較（底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	底質 (pg/g-dry)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総PCB※	3.5	3.2	2.6	2.1	1	1.5	1.2	2.1	220	4.5	18	13	21	22	18	5.0	55	3.3	3.1	2.9	3	3	7	
[2]	HCB	0.3	2	3	1	1.0	2	0.8	0.7	1	3	1	1.8	2	1	1	1	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.7	
[3]	アルドリン	2	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	1	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	1	2	0.9	1	1.0	0.9	0.5	0.3	---	2	---	---	---	---	---	---	0.6	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	2	2	0.9	0.9	1	2	0.7	0.6	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.9	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	2	0.4	0.5	0.34	0.5	0.5	0.5	0.4	0.9	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.9	0.3	0.8	0.94	0.3	0.4	0.7	0.3	2	---	---	---	0.6	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.8	0.3	0.7	0.64	0.2	0.4	0.4	0.2	0.5	---	---	---	1.4	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	1	0.2	0.8	0.9	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	2	0.5	0.5	0.3	0.2	0.4	0.1	0.2	0.4	---	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.3	2	2	0.64	0.8	2	0.9	0.3	2	0.4	1.0	0.8	---	---	---	1.6	---	---	0.5	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.6	2	0.9	0.8	0.4	0.8	0.8	0.7	4	0.5	1.3	0.7	---	---	---	1	---	---	0.1	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	0.5	0.4	0.8	0.7	1.0	0.9	1	1	0.4	0.9	0.7	0.5	---	---	---	1	---	---	0.7	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.7	0.9	0.6	0.64	0.4	0.6	0.2	0.4	0.3	0.4	1	0.3	---	---	---	0.7	---	---	0.3	---	---	---	---	
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.5	0.6	0.6	0.54	0.4	0.6	0.8	0.3	2	0.3	0.8	0.4	---	---	---	2	---	---	0.2	---	---	---	---	
[8]	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	0.6	1.0	0.9	0.8	0.6	0.7	1	0.4	0.4	0.7	---	---	0.5	---	---	0.3	---	---	0.2	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	1	2	2	1.0	1	1	0.3	0.3	0.2	---	---	0.2	---	---	0.5	---	---	0.7	---	---	---	---	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	3	2	2	2	4	0.7	0.6	1	0.9	---	---	0.3	---	---	0.8	---	---	0.4	---	---	---	---	
[9]	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	30	20	30	4	3	5	4	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	50	20	40	7	10	6	5	---	---	---	---	---	---	---	---	3	---	---	---	---	---	---	
	[9-3] Parlar-62	---	2,000	400	700	60	70	40	30	---	---	---	---	---	---	---	---	20	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH類																								
	[11-1] α -HCH	0.4	0.5	0.6	0.6	2	0.6	0.6	0.4	0.8	0.6	0.5	0.5	0.8	0.3	0.3	0.2	---	0.4	---	---	0.3	---	---	
	[11-2] β -HCH	0.3	0.7	0.8	0.9	0.4	0.3	0.3	0.5	0.8	1	0.6	0.1	0.3	0.3	0.3	0.6	---	0.5	---	---	0.6	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	---	0.4	0.5	0.7	0.7	0.4	0.4	0.2	0.7	1	0.4	0.2	0.9	0.2	0.3	0.4	---	0.4	---	---	0.5	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	0.7	0.5	0.3	0.6	2	1	0.5	0.5	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	---	0.2	---	---	0.3	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	0.16	---	0.2	0.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	0.40	0.6	1.4	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	底質 (pg/g-dry)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'23
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	23	2	10	1	---	9	7	11	4	6	2	---	---	0.9	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	8	2	2	0.9	---	2	6	4	4	2	1	---	---	1	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	2	2	3	1	---	2	1	3	2	1	2	---	---	1	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	4	2	3	2	---	6	1	2	6	5	3	---	---	3	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.5	4	4	6	---	4	16	2	2	0.5	1	---	---	3	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	4	9	9	11	---	20	8	9	5	2	2	---	---	5	---	---
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	20	80	20	89	---	80	20	41	10	14	2	---	---	8	---	---	
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	---	---	---	---	---	---	---	3.7	2	2	4	---	2	1	2	---	3	4	2	3	4	4	7
[16]	ペルフルオロオクタ酸（PFOA）	---	---	---	---	---	---	---	3.3	5	2	2	---	5	1	4	---	4	2	3	4	3	3	7
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	33	---	---	0.3	2	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	---	---
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	5	---	---	---	---	---	2	---	---	0.6	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	5	---	---	---	---	---	2	---	---	0.9	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	280	70	---	---	60	60	---	---	---	---	---	70	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	170	60	---	---	60	50	---	---	---	---	---	40	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	260	60	---	---	42	60	---	---	---	---	---	30	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	250	100	---	---	70	---	---	---	---	---	---	50	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	210	60	---	---	51	---	---	---	---	---	---	50	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	30	---	---	---	---	---	---	---	---	20	9.1	3.2	2.7	---	3.6	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	8.5	---	---	---	---	---	---	3.8	---	---	---	---	---	---	10	10	10	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	6	2	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	9	0.8	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,000	2,000	1,000	400	300	70	---	---
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,000	5,000	1,000	500	400	100	---	---
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4,000	2,000	1,000	800	400	200	---	---
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5,000	3,000	1,000	500	400	200	---	---
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	63	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	5	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	5	3	3	3	3	3
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	3
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6	1.8
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	0.4
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	8	8

(注1) 「---」 は比較対象なしを意味する。

(注2) ※：検出下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表6-3 モニタリング調査における検出下限値の比較（生物）

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	8.4	17	29	23	14	18	17	11	20	74	11	14	31	17	20	23	21	11	11	10	5	5	8	
[2]	HCB	0.06	7.5	4.6	3.8	1	3	3	2	2	1	2.8	10	3	6.5	2.7	1.3	1.1	1	1	1	0.8	0.8	0.4	
[3]	アルドリン	1.4	0.84	1.3	1.2	2	2	2	0.8	---	---	---	---	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	4	1.6	10	3.4	3	3	3	2	---	1	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	6	1.6	4.2	5.5	4	3	3	3	---	2	---	---	1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	1.4	3.5	1.1	1.7	2	2	2	1	1	---	---	1.1	---	---	---	---	1	---	---	2	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.8	1.9	2.7	2.8	0.7	1	1	1	1	---	---	1.4	---	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	1.8	3.3	0.70	0.97	0.9	1	1	0.9	0.5	---	---	0.7	---	---	---	---	0.6	---	---	0.9	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	4	0.97	0.61	0.86	1	1	1	0.8	1	---	---	1	---	---	---	---	0.9	---	---	1	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	1.2	1.2	0.69	1.1	1	0.9	1	1	0.6	---	---	1	---	---	---	---	1	---	---	1	---	---	---	
[7]	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	4	2.0	1.9	1.1	1	1	2	1	0.2	---	---	0.7	---	---	---	---	0.9	---	---	2	---	---	---	
	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.8	1.3	5.8	3.9	1	2	2	2	2	1	2	4	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.8	2.4	16	3.5	2	2	3	1	1	1	2	5.2	---	---	2	---	---	---	2	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	1.2	2.8	3.1	3.1	3	2	2	1	3	1	1	1	---	---	1	---	---	---	1	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.4	1.6	1.1	1.5	1	1	1	1	1	0.7	1	0.7	---	---	0.6	---	---	---	1	---	---	---	---	
[8]	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.8	1.2	4.2	2.1	1	3	2	1	2	1	1	3.4	---	---	1	---	---	---	2	---	---	---	---	
	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	1.4	2.2	1.4	2.0	2	2	2	2	1	1	1	1	---	1.0	0.9	---	---	---	1	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	2.3	3.3	1.2	1	1	2	1	0.9	0.8	0.6	0.8	---	0.8	0.7	---	---	---	1	---	---	---	---	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	4.4	4.0	7.5	5	5	4	3	1	3	3	3	---	3	3	---	---	---	4	---	---	---	---	
	[9]	トキサフェン類																							
[9-1] Parlar-26		---	15	14	16	7	4	3	3	---	---	---	---	---	9	---	---	8	---	---	---	---	---	---	
[9-2] Parlar-50		---	11	15	18	5	3	4	3	---	---	---	---	---	10	---	---	6	---	---	---	---	---	---	
[9-3] Parlar-62		---	40	33	34	30	30	30	20	---	---	---	---	---	60	---	---	40	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	0.81	0.82	0.99	1	1	1	0.8	---	0.8	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	1.4	0.61	4.3	3.6	1	2	2	2	1	1	1.2	1	1	1.0	1	1	---	2	---	---	0.4	---	---	
	[11-2] β -HCH	4	3.3	2.0	0.75	1	3	2	2	1	1	0.8	0.8	0.9	1.0	1	1	---	1	---	---	0.4	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)	---	1.1	10	2.8	2	3	3	3	1	1	0.9	0.9	0.8	1.6	1	1	---	1	---	---	0.4	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	1.3	1.5	1.7	1	2	2	2	1	1	1	1	1	0.8	1	0.9	---	2	---	---	0.4	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	2.2	---	2.3	0.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	0.43	10	1	---	---	---	5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	2.2	---	16	6	7	---	6	6	5	6	5	7	---	---	5	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	5.9	---	6	6	6	---	5	5	4	5	4	4	---	---	2	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	5.0	---	3	4	4	---	4	5	8	7	8	8	---	---	2	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	6.7	---	10	4	5	---	5	5	5	8	6	9	---	---	4	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	3.6	---	4	3	3	---	4	5	6	8	6	7	---	---	1	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	13	---	10	9	9	---	10	9	14	20	20	20	---	---	4	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	74	---	97	80	50	---	60	70	100	80	80	70	---	---	5	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	7.4	9.6	4	3	---	2	2	3	4	---	2	2	2	3	3	3
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	9.9	9.9	14	13	---	3	3.4	2	4	---	2	2	2	3	3	3
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	61	---	---	0.7	1	2.7	26	3.1	4.0	5.1	1	5	1	1	1	0.2	0.2	0.4
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20	24	---	20	38	---	---	---	---	---	20	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	5	---	6	11	---	---	---	---	---	6	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	70	20	---	10	10	9	9	9	9	---	---	20	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	40	10	---	10	10	8	9	8	9	---	---	20	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	80	10	---	10	10	9	9	8	9	---	---	20	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60	20	---	10	10	---	---	---	---	---	---	20	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60	20	---	10	10	---	---	---	---	---	---	20	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	11	10	---	---	---	---	---	---	---	18	19	12	12	15	---	13	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	3.7	---	---	---	---	---	---	5	5	4	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21	12	10	4	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1	1	2	1	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	500	200	400	300	300	200	200	150	200
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,000	300	700	200	300	300	300	500	300
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	700	300	600	500	200	200	300	300	300
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	400	200	500	200	200	200	400	500	300
[24]	ジコホル	---	---	---	---	36	---	48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	10	10	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2	2	3	3	3
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.8
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6

(注1) 「---」は比較対象なしを意味する。

(注2) ※：検出下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表6-4 モニタリング調査における検出下限値の比較（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m³)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	33	2.2	0.98	0.14	0.3	0.13	0.3	0.26	2.5	5.9	8.5	6.5	1.4	2.0	2.7	2.3	0.8	0.8	0.6	0.8	0.3	0.8	0.8	
[2]	HCB	0.3	0.78	0.37	0.034	0.07	0.03	0.08	0.2	0.7	0.75	1.4	1.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.06	0.1	0.04	0.04	0.1	0.04	
[3]	アルドリノ	0.020	0.0077	0.05	0.03	0.05	0.02	0.02	0.02	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	0.20	0.70	0.11	0.24	0.1	0.07	0.09	0.02	---	0.14	---	---	0.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	0.030	0.014	0.048	0.2	0.10	0.04	0.04	0.04	---	0.04	---	---	0.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.08	0.046	0.074	0.054	0.06	0.03	0.03	0.03	0.03	---	---	0.04	---	0.05	---	---	0.01	---	---	0.06	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.03	0.13	0.039	0.034	0.03	0.02	0.02	0.03	0.21	---	---	0.03	---	0.04	---	---	0.01	---	---	0.05	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.006	0.018	0.018	0.05	0.04	0.004	0.009	0.01	0.01	---	---	0.007	---	0.11	---	---	0.03	---	---	0.05	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.05	0.040	0.031	0.034	0.03	0.01	0.01	0.008	0.05	---	---	0.018	---	0.04	---	---	0.01	---	---	0.03	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.01	0.0068	0.012	0.024	0.03	0.007	0.009	0.006	0.01	---	---	0.009	---	0.06	---	---	0.02	---	---	0.04	---	---	---	
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.007	0.014	0.048	0.03	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	---	---	0.02	---	0.07	---	---	0.03	---	---	0.04	---	---	---		
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.20	0.17	0.19	0.054	0.04	0.04	0.05	0.06	0.3	0.42	0.51	0.2	---	---	0.3	---	---	---	0.03	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.20	0.29	0.23	0.14	0.06	0.05	0.06	0.05	0.4	0.53	0.7	0.3	---	---	0.3	---	---	---	0.06	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	0.008	0.015	0.042	0.054	0.08	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.03	0.01	---	---	0.06	---	---	---	0.04	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.010	0.0088	0.024	0.03	0.05	0.01	0.01	0.02	0.04	0.051	0.05	0.02	---	---	0.05	---	---	---	0.04	---	---	---	---	
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.10	0.12	0.16	0.044	0.03	0.03	0.03	0.03	0.3	0.35	0.41	0.2	---	---	0.2	---	---	---	0.04	---	---	---	---	
[8]	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	0.04	0.085	0.078	0.054	0.04	0.03	0.02	0.01	0.04	0.099	0.14	0.05	---	0.06	0.08	---	---	---	0.04	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.0048	0.017	0.044	0.04	0.01	0.008	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	---	0.2	0.05	---	---	---	0.04	---	---	---	---	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.033	0.2	0.05	0.1	0.06	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	---	0.01	0.1	---	---	---	0.05	---	---	---	---	
[9]	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	0.066	0.066	0.1	0.6	0.2	0.08	0.09	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	0.27	0.4	0.2	0.5	0.1	0.09	0.1	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	
	[9-3] Parlar-62	---	0.52	0.81	0.4	3	0.6	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	0.0028	0.017	0.03	0.04	0.01	0.01	0.006	---	0.01	---	---	---	---	---	---	0.01	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.05	0.47	0.83	0.7	1.7	0.06	0.06	0.07	0.03	---	0.05	---	---	0.04	---	---	
	[11-2] β -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.03	0.09	0.13	0.12	0.07	0.08	0.08	0.1	0.04	---	0.02	---	---	0.03	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	---	---	---	---	---	---	---	0.02	0.12	0.52	0.32	0.7	0.06	0.06	0.07	0.04	---	0.05	---	---	0.03	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.02	0.02	0.021	0.03	0.03	0.06	0.05	0.08	0.03	---	0.02	---	---	0.03	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.02	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1	---	---	---	0.02	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.04	0.05	0.07	0.1	---	0.09	0.1	0.2	0.05	0.02	0.01	---	---	0.2	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.06	0.05	0.06	0.06	---	0.09	0.2	0.2	0.04	0.08	0.05	---	---	0.05	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.09	0.06	0.05	0.1	---	0.1	0.4	0.2	0.1	0.06	0.05	---	---	0.2	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.1	0.1	0.2	---	0.2	0.4	0.4	0.2	0.08	0.1	---	---	0.2	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.06	0.08	0.1	---	0.1	0.4	0.2	0.07	0.04	0.1	---	---	0.1	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.6	1.2	0.4	0.4	---	1	1.1	0.5	0.2	0.2	0.1	---	---	0.3	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	5	9.1	4.0	5	---	3	0.7	1	0.8	0.8	0.1	---	---	0.3	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.2	0.2	0.1	0.06	0.06	0.2	0.1	---	0.3	0.1	0.07	0.07	0.2	0.2
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	1.8	0.2	0.6	0.1	1.4	0.4	1.1	---	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	4.8	---	2.5	0.5	0.70	0.6	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.08	0.04	0.07	0.05	0.03	0.08	0.02
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4.0	5.3	---	0.3	0.3	0.3	---	---	---	---	0.2	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.39	0.4	---	0.4	0.2	0.3	---	---	---	---	0.3	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	0.4	0.3	0.1	0.1	---	0.1	---	---	0.06	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	---	0.3	0.3	0.1	0.1	---	0.08	---	---	0.07	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	---	0.4	0.3	0.1	0.1	---	0.2	---	---	0.05	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	0.3	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	---	1.3	---	---	---	---	---	1.0	---	0.28	0.24	0.2	0.2	---	0.3	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11	20	20	10	20	10	20	20	20	20
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	0.2	0.2	0.2	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	0.5	0.4	0.1	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	110	50	60	100	50	100	40	40	50
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	240	60	40	100	50	80	100	190	130
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	170	30	40	90	50	80	120	210	120
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	120	40	70	80	40	100	110	130	50
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.2	---	---	0.2	0.2	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.1	0.07	0.04	0.2	0.2
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(注1) 「---」は比較対象なしを意味する。

(注2) ※：検出下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表 7-1 モニタリング調査における定量下限値の比較（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	7.4	9.4	14	10	9	7.6	7.8	10	73	4.5	44	25	8.2	21	8.4	16	14	12	19	16	13	9	17	
[2]	HCB	0.6	5	30	15	16	8	3	0.5	13	5	2.2	7	0.9	1.8	0.9	2.1	1.5	8	2.0	1.0	0.8	0.8	3	
[3]	アルドリノ	0.6	0.6	2	0.9	1.7	1.0	1.4	0.7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	1.8	0.7	2	1.0	3	2.1	1.5	0.6	---	1.6	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	6.0	0.7	2	1.1	1.3	1.9	3	0.7	---	1.6	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.6	3	6	4	1.9	1.7	1.2	0.15	2.4	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.8	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.6	4	8	6	7	4	1.1	1.1	2.3	---	---	---	0.5	---	---	---	---	---	---	0.3	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.24	2	3	1.9	1.6	1.7	0.6	0.4	0.20	---	---	---	1.0	---	---	---	---	---	---	0.8	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1.2	3	5	3	2.3	2.5	1.4	0.16	1.5	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.9	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.9	0.8	2	1.2	2.6	2.3	0.7	0.22	0.24	---	---	---	0.3	---	---	---	---	---	---	0.6	---	---	---	
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.60	0.8	2	1.2	0.8	0.8	0.8	0.22	0.6	---	---	---	0.20	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---		
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.9	3	6	4	5	4	1.6	1.1	11	1.4	1.6	2.7	---	---	---	2	---	---	5	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1.5	5	5	4	7	2.4	3	0.8	13	1.0	2.5	3	---	---	---	3	---	---	4	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	1.2	2	2	1.1	2.8	6	1.9	1.1	0.7	1.3	0.9	0.9	---	---	---	4	---	---	3	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.8	0.3	0.6	0.5	0.8	2.4	0.9	0.3	1.3	0.6	0.8	0.8	---	---	---	1.5	---	---	1.3	---	---	---	---	
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	1.2	2	4	2.5	3.0	5	1.6	1.0	8	1.3	1.5	1.5	---	---	---	3	---	---	5	---	---	---	---	
[8]	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	1.5	2	5	3	5	2.4	2.1	0.8	2.2	1.3	---	---	0.5	---	---	3	---	---	3	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.7	2	0.7	2.0	1.3	0.6	0.5	0.4	0.7	---	---	0.5	---	---	1.6	---	---	2.3	---	---	---	---	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	2	0.9	0.7	1.8	2.0	1.9	0.7	1.3	0.8	---	---	0.8	---	---	2.3	---	---	1.9	---	---	---	---	
[9]	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	40	9	10	16	20	8	5	---	---	---	---	---	---	---	---	4	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	70	20	20	16	9	7	7	---	---	---	---	---	---	---	---	6	---	---	---	---	---	---	
	[9-3] Parlar-62	---	300	90	70	60	70	40	40	---	---	---	---	---	---	---	---	40	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	0.3	0.4	0.4	1.6	1.1	0.6	0.4	---	0.5	---	---	---	---	---	---	0.7	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	0.9	3	6	4	3	1.9	4	1.2	4	7	1.4	7	4.5	1.2	1.1	0.9	---	4	---	---	1.2	---	---	
	[11-2] β -HCH	0.9	3	4	2.6	1.7	2.7	1.0	0.6	2.0	2.0	1.4	7	1.0	1.2	1.2	1.8	---	3	---	---	0.6	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)	---	7	20	14	18	2.1	3	0.6	6	3	1.3	2.7	1.2	0.9	0.8	1.4	---	4	---	---	0.8	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	2	2	1.5	2.0	1.2	2.3	0.9	0.8	0.4	1.1	1.1	0.4	0.3	0.8	1.0	---	1.0	---	---	1.8	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	0.14	---	0.09	0.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	5.7	3	2.2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	8	9	4	4	---	8	3.6	5	9	13	11	---	---	6	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	11	3	3	2	---	4	6.3	2.4	3	9	6	---	---	2.4	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.4	4	3	3	---	4	1.5	2.1	7	3	2	---	---	3	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	4	3	6	4	---	8	2.0	7	14	8	4	---	---	8	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.4	3	2	4	---	1.6	1.5	0.8	2	3	3	---	---	2.0	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	91	21	10	40	---	6	6	4	7	6	8	---	---	10	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	600	300	60	660	---	22	18	14	24	11	14	---	---	8	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	37	50	50	31	---	50	29	50	---	70	80	80	80	80	80	70
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	59	60	50	170	---	50	56	50	---	70	90	90	90	90	90	70
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	3,300	---	---	4	2.4	3	4	0.8	1.5	---	1.4	1.3	6	3	1.1	0.5	---	---
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	120	27	---	---	---	---	---	120	---	---	90	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	22	24	---	---	---	---	---	30	---	---	30	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,500	---	---	1,500	---	---	---	---	---	---	---	600	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,300	---	---	500	---	---	---	---	---	---	---	500	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,200	---	---	700	---	---	---	---	---	---	---	600	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	790	---	---	600	---	---	---	---	---	---	---	700	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	740	---	---	400	---	---	---	---	---	---	---	400	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	---	85	---	---	---	---	---	---	---	---	---	35	24	---	15	---	---	---
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	---	870	---	---	---	---	---	94	---	---	---	---	---	---	100	180	100	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	260	---	30	24	60	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	14	16	30	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,300	1,000	600	400	700	300	---	---
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,500	2,000	1,400	900	900	900	---	---
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,300	3,000	1,000	700	1,200	900	---	---
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,600	4,500	1,300	500	2,000	600	---	---
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	---	25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	13	13	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	120	60	60	70	70	70	90
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	80	110
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.7	.2
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.2	.0
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	60	60	

(注1) 2002年度の定量下限値はIDLの3倍、2003年度から2005年度の定量下限値はMDLの3倍、2006年度以降の定量下限値はMDL測定時に得られた標準偏差の10倍である。

(注2) 「---」は比較対象なしを意味する。

(注3) ※：定量下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表 7-2 モニタリング調査における定量下限値の比較 (底質)

物質 調査 番号	調査対象物質	底質 (pg/g-dry)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	10	10	7.9	6.3	4	4.7	3.3	5.1	660	12	51	44	61	62	53	14	170	8.5	8.2	7.8	7	8	19	
[2]	HCB	0.9	4	7	3	2.9	5	2.0	1.8	3	7	3	5.3	6	3	3	3	1.3	0.9	1.3	1.3	0.8	0.9	1.8	
[3]	アルドリノ	6	2	2	1.4	1.9	1.8	3	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	1.6	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	3	4	3	3	2.9	2.7	1.2	0.8	---	5	---	---	---	---	---	---	1.6	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	6	5	3	2.6	4	5	1.9	1.6	---	1.1	---	---	---	---	---	---	2.4	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT 類	6	2	2	1.0	1.4	1.3	1.2	1.0	2.8	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	2.7	0.9	3	2.7	1.0	1.1	1.7	0.8	5	---	---	---	1.8	---	---	---	---	---	---	0.7	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	2.4	0.9	2	1.7	0.7	1.0	1.0	0.4	1.4	---	---	---	4.2	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	6	0.8	2	0.8	1.2	1.8	1.5	1.2	1.1	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	3	0.6	3	2.6	1.1	1.2	1.4	0.6	1.2	---	---	---	0.8	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	6	2	2	1.0	0.5	1.0	0.3	0.5	0.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	
[7]	クロルデン類	0.9	4	4	1.9	2.4	5	2.4	0.7	6	1.1	2.9	2.0	---	---	---	4.8	---	---	1.2	---	---	---	---	
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	1.8	4	3	2.3	1.1	2.2	2.0	1.7	11	1.3	4.0	1.8	---	---	---	4	---	---	0.2	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1.5	1	3	2.0	2.9	2.5	3	2	1.0	2.2	1.7	1.3	---	---	---	3	---	---	1.8	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	2.1	3	2	1.9	1.2	1.6	0.6	1.0	0.9	1.1	3	0.7	---	---	---	1.7	---	---	0.8	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.5	2	2	1.5	1.2	1.7	2.2	0.9	6	0.8	2.4	1.2	---	---	---	6	---	---	0.5	---	---	---	---	
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[8]	ヘプタクロル類	1.8	3	3	2.5	1.9	3.0	4	1.1	1.1	1.8	---	---	1.5	---	---	0.9	---	---	0.4	---	---	---	---	
	[8-1] ヘプタクロル	---	3	6	7	3.0	3	2	0.7	0.8	0.6	---	---	0.5	---	---	1.2	---	---	1.7	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	9	4	5	7	10	1.7	1.4	3	2.3	---	---	0.7	---	---	2.0	---	---	1.0	---	---	---	---	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[9]	トキサフエン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
	[9-1] Parlar-26	---	90	60	60	12	7	12	10	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	200	60	90	24	30	17	12	---	---	---	---	---	---	---	---	8	---	---	---	---	---	---	
	[9-3] Parlar-62	---	4,000	2,000	2,000	210	300	90	80	---	---	---	---	---	---	---	---	50	---	---	---	---	---	---	
[10]	マイレックス	---	2	2	0.9	0.6	0.9	0.7	1.0	---	0.9	---	---	---	---	---	---	0.8	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH 類	1.2	2	2	1.7	5	1.8	1.6	1.1	2.0	1.5	1.6	1.5	2.4	0.7	0.9	0.5	---	1.1	---	---	0.9	---	---	
	[11-1] α -HCH	0.9	2	3	2.6	1.3	0.9	0.8	1.3	2.4	3	1.5	0.4	0.9	0.8	0.9	1.5	---	1.2	---	---	1.6	---	---	
	[11-2] β -HCH	---	2	2	2.0	2.1	1.2	0.9	0.6	2.0	3	1.3	0.6	2.7	0.5	0.8	1.0	---	1.0	---	---	1.3	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	---	2	2	1.0	1.7	5	2	1.2	1.2	1.4	0.8	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	---	0.5	---	---	0.7	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	---	---	---	---	---	0.42	---	0.4	0.40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	1.1	1.5	3.6	---	---	---	0.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	底質 (pg/g-dry)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	69	6	30	2	---	27	21	33	9	18	5	---	---	2.4	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	24	5	5	2.4	---	6	18	12	9	4	3	---	---	4	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	5	4	9	3	---	5	3	8	6	3	4	---	---	3	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	9	4	7	4	---	16	3	6	15	14	6	---	---	8	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.2	10	10	19	---	12	48	6	5	1.2	3	---	---	7	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	9	24	23	34	---	60	24	27	15	5	5	---	---	14	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	60	220	40	270	---	240	40	120	30	42	4	---	---	21	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	9.6	5	5	9	---	5	3	5	---	7	9	5	6	9	9	9
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	8.3	12	5	4	---	11	3	9	---	9	5	8	9	7	7	7
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	86	---	---	0.9	5	2.5	2.1	2.4	1.5	1.8	1.5	0.9	0.9	0.4	0.9	0.6	---	---
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30	13	---	---	---	---	---	5	---	---	1.4	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	9	13	---	---	---	---	---	5	---	---	2.2	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	420	180	---	---	150	130	---	---	---	---	---	160	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	150	150	---	---	150	130	---	---	---	---	---	100	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	400	160	---	---	110	150	---	---	---	---	---	70	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	350	300	---	---	180	---	---	---	---	---	---	110	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	280	150	---	---	130	---	---	---	---	---	---	130	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	84	---	---	---	---	---	---	---	---	59	27	8.5	7.3	---	9.7	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	22	---	---	---	---	---	---	9.9	---	---	---	---	---	---	30	30	30	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	18	6	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	27	2.1	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,000	6,000	2,000	900	800	70	---	---
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10,000	15,000	2,000	1,200	1,200	100	---	---
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11,000	6,000	2,000	2,000	1,000	100	---	---
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,000	9,000	2,000	1,200	1,000	200	---	---
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	160	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	4	13	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11	13	6	6	6	6	6
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10	7
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	16	5.4
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	1.1
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	21	20

(注1) 2002年度の定量下限値はIDLの3倍、2003年度から2005年度の定量下限値はMDLの3倍、2006年度以降の定量下限値はMDL測定時に得られた標準偏差の10倍である。

(注2 「---」は比較対象なしを意味する。

(注3) ※：定量下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表 7-3 モニタリング調査における定量下限値の比較 (生物)

物質調査番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	25	50	85	69	42	46	47	32	52	220	34	44	95	52	60	68	63	33	31	33	13	12	21	
[2]	HCB	0.18	23	14	11	3	7	7	4	5	4	8.4	31	10	20	8.1	3.9	3.3	3	3	3	2.1	2.1	1.2	
[3]	アルドリン	4.2	2.5	4.0	3.5	4	5	5	2.1	---	---	---	---	1.8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[4]	ディルドリン	12	4.8	31	9.4	7	9	9	7	---	3	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[5]	エンドリン	18	4.8	12	17	11	9	8	7	---	4	---	---	3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	4.2	11	3.2	5.1	6	5	5	3	3	---	---	3.3	---	---	---	---	3	---	---	6	---	---	---	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	2.4	5.7	8.2	8.5	1.9	3	3	4	3	---	---	4.3	---	---	---	---	3	---	---	3	---	---	---	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	5.4	9.9	2.2	2.9	2.4	3	3	2.4	1.3	---	---	1.9	---	---	---	---	1.4	---	---	2.2	---	---	---	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	12	2.9	1.8	2.6	3	3	3	2.2	3	---	---	3	---	---	---	---	2.7	---	---	3	---	---	---	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	3.6	3.6	2.1	3.4	3	2.3	3	3	1.5	---	---	4	---	---	---	---	3	---	---	3	---	---	---	
[7]	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	12	6.0	5.7	3.3	4	3	4	3	0.6	---	---	1.8	---	---	---	---	2.4	---	---	5	---	---	---	
	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	2.4	3.9	18	12	4	5	5	4	4	3	5	13	---	---	3	---	---	---	3	---	---	---	---	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	2.4	7.2	48	10	4	6	7	4	3	4	7	16	---	---	6	---	---	---	6	---	---	---	---	
	[7-3] オキシクロルデン	3.6	8.4	9.2	9.3	7	6	7	4	8	3	3	3	---	---	3	---	---	---	3	---	---	---	---	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	1.2	4.8	3.4	4.5	3	3	4	3	3	1.8	2	2.2	---	---	1.4	---	---	---	3	---	---	---	---	
[8]	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	2.4	3.6	13	6.2	3	7	6	3	4	3	4	10	---	---	3	---	---	---	4	---	---	---	---	
	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	4.2	6.6	4.1	6.1	6	6	6	5	3	3	4	3	---	3.0	2.4	---	---	---	3	---	---	---	---	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	6.9	9.9	3.5	4	4	5	3	2.4	2.0	1.5	2.1	---	2.1	1.9	---	---	---	3	---	---	---	---	
[9]	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	13	12	23	13	13	10	8	3	7	8	7	---	7	9	---	---	---	9	---	---	---	---	
	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	45	42	47	18	10	9	7	---	---	---	---	---	23	---	---	21	---	---	---	---	---	---	
	[9-2] Parlar-50	---	33	46	54	14	9	10	8	---	---	---	---	---	30	---	---	16	---	---	---	---	---	---	
[10]	[9-3] Parlar-62	---	120	98	100	70	70	80	70	---	---	---	---	---	150	---	---	100	---	---	---	---	---	---	
	マイレックス	---	2.4	2.5	3.0	3	3	4	2.1	---	1.9	---	---	---	---	---	---	1.4	---	---	---	---	---	---	
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	4.2	1.8	13	11	3	7	6	5	3	3	3.7	3	3	3.0	3	3	---	4	---	---	1.1	---	---	
	[11-2] β -HCH	12	9.9	6.1	2.2	3	7	6	6	3	3	2.0	2.2	2.4	3.0	3	3	---	3	---	---	1.0	---	---	
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)	---	3.3	31	8.4	4	9	9	7	3	3	2.3	2.4	2.2	4.8	3	3	---	4	---	---	1.1	---	---	
	[11-4] δ -HCH	---	3.9	4.6	5.1	3	4	6	5	3	3	3	3	3	2.1	3	2.3	---	4	---	---	1.0	---	---	
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	5.6	---	5.9	0.5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
[13]	ヘキサブromobiphenyl類	---	---	---	---	---	---	---	1.3	24	3	---	---	---	14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	5.9	---	43	16	19	---	15	15	13	16	14	18	---	---	13	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	16	---	14	15	18	---	12	13	9	12	11	10	---	---	4	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	14	---	8	10	10	---	10	12	21	17	21	21	---	---	5	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	18	---	30	11	12	---	12	12	13	22	15	24	---	---	10	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	9.6	---	11	7	8	---	11	14	16	20	16	17	---	---	2	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	35	---	30	22	24	---	30	23	36	50	40	50	---	---	10	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	220	---	270	230	120	---	170	170	300	210	240	190	---	---	13	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	19	25	10	7	---	5	4	9	12	---	6	5	5	6	6	6
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	25	26	41	38	---	10	10	4	12	---	3	6	6	8	8	8
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	180	---	---	1.9	4	8.1	78	9.3	12	15	4	15	3	3	4	0.6	0.6	1.0
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	50	71	---	60	120	---	---	---	---	---	60	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	11	14	---	19	32	---	---	---	---	---	18	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	170	50	---	30	30	22	24	23	24	---	---	40	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	98	40	---	30	30	21	23	22	24	---	---	40	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	210	30	---	30	30	24	24	21	22	---	---	40	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	140	50	---	30	30	---	---	---	---	---	---	50	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	140	40	---	30	30	---	---	---	---	---	---	40	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	27	26	---	---	---	---	---	---	54	57	33	36	40	---	37	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	---	36	---	---	---	---	---	9.4	---	---	---	---	---	---	13	14	10	---	---
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	63	36	30	10	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3	4	6	3	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,300	500	1,200	900	900	600	600	450	00
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	3,000	800	1,800	500	800	800	900	1,500	00
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2,100	900	1,500	1,200	600	400	900	700	800
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1,100	500	1,400	400	500	500	900	1,200	800
[24]	ジコホル	---	---	---	---	92	---	120	---	---	---	---	---	---	---	---	---	30	30	30	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	5	5	7	7	7
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	10
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	2.0
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	20

(注1) 2002年度の定量下限値はIDLの3倍、2003年度から2005年度の定量下限値はMDLの3倍、2006年度以降の定量下限値はMDL測定時に得られた標準偏差の10倍である。

(注2) 「-」は比較対象なしを意味する。

(注3) ※：定量下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

表 7-4 モニタリング調査における定量下限値の比較（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m³)																							
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[1]	総 PCB※	99	6.6	2.9	0.38	0.8	0.37	0.8	0.75	7.3	18	26	20	4.1	5.9	7.8	7.0	2.4	2.1	1.8	2.4	0.9	2.4	2.0	
[2]	HCB	0.9	2.3	1.1	0.14	0.21	0.09	0.22	0.6	1.8	2.3	4.3	3.8	1.4	0.5	0.8	0.5	0.4	0.14	0.3	0.11	0.09	0.4	0.10	
[3]	アルドリン	0.060	0.023	0.15	0.08	0.14	0.05	0.04	0.04	---	---	---	---	12	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
[4]	ディルドリン	0.60	2.1	0.33	0.54	0.3	0.18	0.24	0.06	---	0.42	---	---	0.34	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
[5]	エンドリン	0.090	0.042	0.14	0.5	0.30	0.09	0.10	0.09	---	0.09	---	---	0.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.24	0.14	0.22	0.16	0.17	0.03	0.07	0.07	0.10	---	---	0.11	---	0.15	---	---	0.03	---	---	0.15	---	---		
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.09	0.40	0.12	0.14	0.10	0.04	0.04	0.08	0.62	---	---	0.10	---	0.12	---	---	0.03	---	---	0.13	---	---		
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.018	0.054	0.053	0.16	0.13	0.011	0.025	0.03	0.02	---	---	0.018	---	0.33	---	---	0.07	---	---	0.13	---	---		
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.15	0.12	0.093	0.10	0.09	0.03	0.03	0.019	0.14	---	---	0.054	---	0.12	---	---	0.03	---	---	0.08	---	---		
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.03	0.020	0.037	0.074	0.09	0.017	0.025	0.016	0.04	---	---	0.023	---	0.18	---	---	0.05	---	---	0.10	---	---		
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.021	0.042	0.14	0.10	0.10	0.05	0.04	0.03	0.03	---	---	0.05	---	0.20	---	---	0.07	---	---	0.10	---	---			
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.60	0.51	0.57	0.16	0.13	0.1	0.14	0.16	0.9	1.3	1.5	0.7	---	---	0.9	---	---	---	0.09	---	---	---		
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.60	0.86	0.69	0.3	0.17	0.12	0.17	0.12	1.2	1.6	2.1	0.8	---	---	1.0	---	---	---	0.16	---	---	---		
	[7-3] オキシクロルデン	0.024	0.045	0.13	0.16	0.23	0.05	0.04	0.04	0.03	0.07	0.08	0.03	---	---	0.16	---	---	---	0.10	---	---	---		
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.030	0.026	0.072	0.08	0.15	0.03	0.03	0.04	0.11	0.15	0.12	0.07	---	---	0.14	---	---	---	0.09	---	---	---		
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.30	0.35	0.48	0.13	0.10	0.09	0.09	0.07	0.8	1.1	1.2	0.5	---	---	0.7	---	---	---	0.10	---	---	---		
[8]	ヘプタクロル類																								
	[8-1] ヘプタクロル	0.12	0.25	0.23	0.16	0.11	0.07	0.06	0.04	0.11	0.30	0.41	0.16	---	0.19	0.22	---	---	---	0.10	---	---	---		
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.015	0.052	0.12	0.11	0.03	0.022	0.03	0.02	0.04	0.05	0.03	---	0.5	0.12	---	---	---	0.11	---	---	---		
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	---	0.099	0.6	0.16	0.3	0.14	0.16	0.14	0.16	0.13	0.12	0.12	---	0.03	0.3	---	---	---	0.13	---	---	---		
[9]	トキサフェン類																								
	[9-1] Parlar-26	---	0.20	0.20	0.3	1.8	0.6	0.22	0.23	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---		
	[9-2] Parlar-50	---	0.81	1.2	0.6	1.6	0.3	0.25	0.3	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	---	---	---		
	[9-3] Parlar-62	---	1.6	2.4	1.2	8	1.5	1.6	1.6	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	---	---	---	---	---		
[10]	マイレックス	---	0.0084	0.05	0.10	0.13	0.03	0.03	0.015	---	0.04	---	---	---	---	---	---	0.03	---	---	---	---	---		
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.12	1.4	2.5	2.1	5.2	0.19	0.17	0.17	0.08	---	0.12	---	---	0.10	---		
	[11-2] β -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.09	0.27	0.39	0.36	0.21	0.24	0.25	0.3	0.11	---	0.06	---	---	0.07	---		
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)	---	---	---	---	---	---	---	0.06	0.35	1.6	0.95	2.2	0.17	0.19	0.18	0.10	---	0.12	---	---	0.09	---		
	[11-4] δ -HCH	---	---	---	---	---	---	---	0.04	0.05	0.063	0.07	0.08	0.19	0.15	0.20	0.08	---	0.04	---	---	0.08	---		
[12]	クロルデコン	---	---	---	---	---	---	---	---	0.04	0.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---		
[13]	ヘキサプロモビフェニル類	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.3	---	---	---	0.06	---	---	---	---	---	---	---	---		

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m³)																						
		'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)																							
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.11	0.12	0.18	0.3	---	0.28	0.4	0.4	0.15	0.05	0.04	---	---	0.6	---	---
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.16	0.12	0.16	0.14	---	0.28	0.6	0.4	0.10	0.20	0.12	---	---	0.12	---	---
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.22	0.16	0.14	0.3	---	0.4	1.1	0.6	0.3	0.17	0.13	---	---	0.5	---	---
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.3	0.3	0.5	---	0.7	1.3	1.1	0.4	0.20	0.3	---	---	0.4	---	---
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.15	0.20	0.3	---	0.4	1.1	0.6	0.21	0.11	0.3	---	---	0.3	---	---
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	---	---	---	---	---	---	---	1.8	3.7	0.9	1.2	---	4	3.2	1.4	0.6	0.4	0.3	---	---	0.7	---	---
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	---	---	---	---	---	---	---	16	27	12	16	---	9	2.2	3	2.4	2.0	0.3	---	---	0.9	---	---
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	0.5	0.5	0.3	0.17	0.19	0.6	0.3	---	0.8	0.3	0.18	0.19	0.5	0.5
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	5.4	0.7	1.8	0.4	4.2	1.3	3.3	---	0.8	0.8	0.7	0.5	0.5	0.5
[17]	ペンタクロロベンゼン	---	---	---	---	---	12	---	6.4	1.2	2.1	1.8	1.7	0.9	0.6	0.5	0.3	0.22	0.09	0.17	0.13	0.08	0.21	0.06
[18]	エンドスルファン類																							
	[18-1] α -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12	16	---	0.8	1.0	0.8	---	---	---	---	0.4	---	---	---
	[18-2] β -エンドスルファン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.2	1.2	---	1.2	0.5	0.8	---	---	---	---	0.7	---	---	---
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																							
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	---	1.2	0.9	0.3	0.3	---	0.3	---	---	0.16	---	---
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3	---	1.0	0.8	0.3	0.3	---	0.21	---	---	0.18	---	---
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3	---	1.3	0.8	0.3	0.3	---	0.4	---	---	0.14	---	---
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.4	---	1.8	1.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.6	---	0.9	0.9	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※	---	---	---	---	---	---	4.0	---	---	---	---	---	2.8	---	0.79	0.67	0.5	0.6	---	0.7	---	---	---
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	29	60	60	30	50	30	40	50	50	60
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																							
	[22-1] ペンタクロロフェノール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	0.6	0.5	0.6	---	---	---	---	---
	[22-2] ペンタクロロアニソール	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	1.0	1.2	1.1	0.3	---	---	---	---	---
[23]	短鎖塩素化パラフィン類																							
	[23-1] 塩素化デカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	290	140	150	400	120	300	110	140	120
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	610	190	110	300	120	210	300	550	380
	[23-3] 塩素化ドデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	430	100	110	260	140	220	360	630	360
	[23-4] 塩素化トリデカン類	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	320	120	180	250	100	300	330	400	110
[24]	ジコホル	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.5	---	---	0.4	0.5	---	---	---	---
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	0.3	0.18	0.11	0.5	0.5
[26]	メトキシシクロ	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[27]	デクロランプラス類																							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[28]	UV-328	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

(注 1) 2002 年度の定量下限値は IDL の 3 倍、2003 年度から 2005 年度の定量下限値は MDL の 3 倍、2006 年度以降の定量下限値は MDL 測定時に得られた標準偏差の 10 倍である。

(注 2 「-」は比較対象なしを意味する。

(注 3) ※：定量下限値は、同族体ごとの検出下限値の合計とした。

5. 経年分析の方法

2002年度から（調査開始の年度が異なるため物質・媒体により2003年度以降から）の調査結果が経年的な傾向が統計学的な有意差をもっているか、図2に示す手順の分析及びその分析結果に対する評価を、以下に示す方法により行った。

経年分析の対象とする地点とは、それぞれの調査物質において調査を開始してから2024年度までの期間内において2年以上調査を実施していない地点を除いたものを分析対象地点とした。

また、水質においては、2002年度は、1調査地点当たり3点で試料を採取し、それぞれを測定している。一方で、2003年度以降は、1調査地点当たり1点で採取した試料を測定している。このため、2002年度は、各調査地点とも、3検体の結果のうちで2003年度以降も継続して試料の採取が行われている点における1検体の測定結果のみ経年分析に用いることとした。

底質においては、2009年度以前は、1地点当たり3点で試料を採取し、それぞれを測定している。一方で、2010年度以降は、1地点当たり3点で採取した試料を、調査地点毎に等量ずつ混合して1検体/地点として測定している。このため、2009年度以前は、調査地点毎に3つの測定結果を算術平均することで得られる値を経年分析に用いることとした。

生物においては、2009年度以前は、原則として1地点当たり5試料を調整し、それぞれを測定している。一方で、2010年度は原則として1地点当たり5試料から中間的な大きさの試料として3試料を選択して調整し、これを混合して1検体/地点として測定している。2011年度以降は原則として1地点当たり3試料をそれぞれ調整し、調査地点毎に等量ずつ混合して1検体/地点として測定している。このため、2009年度以前は、測定地点毎に5つの測定結果を算術平均することで得られる値を経年分析に用いることとした。

また、生物のうち鳥類に関しては、2013年度の調査から調査対象生物をカワウに変更したが、それに伴い調査地点を変更したことから2012年度までの結果と継続性がないため、経年分析の対象外とした。

- ① 2002年度以降の調査において継続的に調査を行っている地点（複数年度で欠測が生じていない地点）の調査結果（具体的な調査地点名は前掲の表5-1から表5-4を参照のこと。）において、いずれかの年度の調査結果に検出下限値未満（nd）が検体の1/3以上存在する場合は、濃度の最多頻度が検出下限値未満（nd）となる場合があることから、検出下限値未満（nd）が検体の1/3を超える年度がない調査結果について、経年分析を行うこととした。
- ② 経年分析は、年度と対数濃度との回帰直線（対数線形回帰モデル※）を作成し、その回帰直線の傾きから増減傾向を判断することとした。回帰直線を作成する際には、測定結果の残差分布に従って各測定値の尤度の総積を最大とする方法（実データに基づいた残差分布による最尤推定法※）を利用して直線を選択した。なお、残差分布に複数のピークが存在する場合、又は各地点の減少傾向と2002年度（又は2003年度）の濃度に関連性があると示唆された場合には、地点を高濃度群及び低濃度群の2群に分け経年分析を行い、全体の傾向と矛盾が生じないか別途検討した。また、地点毎の検体数が異なる場合には、地点毎のデータの重みが等価となるよう重み付けを行った。


さらに、回帰直線「経年変化のあるモデル」のAIC（赤池情報量規準）※を求め、傾きを0とした回帰直線「経年変化のないモデル」のAICと比較し、モデルの適合度を評価した。「経年変化のあるモデル」が適合と判断したものについて、①で得られた回帰直線の傾きが負である（又は正である）場合に、「減少傾向（又は増加傾向）が統計的に有意と判定された。」と評価し、後述の6. 調査結果の概要で

示す表10においては「↓」（又は「↘」）と表記した。また、3か年以上継続して減少傾向が続く場合には、定量的な情報として調査結果に基づく環境中における半減期を表10に併記することとした。

- ③ 検出下限値未満（nd）が検体の1/3以上存在する調査結果においては、①で述べたとおり実データに基づいた残差分布による最尤推定法による回帰直線での経年変化の分析を行うことは適切ではないとされたため、ブートストラップ法を用いた平均値の差の検定※を適用した。本検定では、調査を実施した2024年度まで調査結果のうち、各物質においてモニタリング調査開始から8か年を前期、直近の2017年度から2024年度までを後期とし、前期及び後期の各年度で検出下限値未満（nd）が1/2以上存在していない調査結果において、前期の濃度と後期の濃度に有意に差が生じているか判定をすることとした。なお、調査年度が少ないペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペンタクロロベンゼンについては、解析する媒体によっては前期及び後期の対象年数が6か年未満になる場合がある。
- ④ ブートストラップ法を用いた平均値の差の検定を行い、P値が5%未満のものについて差があると判断し、かつ、その差が後期の濃度群より前期の濃度群が低値である（又は高値である）場合には、「調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べて低値である（又は高値である）ことが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆された。」と評価し、表10においては「└┐」（又は「└┐」）と表記した。
- ⑤ 検出下限値未満（nd）が検体の1/2以上存在し、実データに基づいた残差分布による最尤推定法による回帰直線での経年変化の分析及びブートストラップ法を用いた平均値の差の検定による分析が適切ではない場合には、解析の対象とした期間における最も高い検出下限値に着目し、その検出下限値を下回る地点を「低濃度地点」と定義し、低濃度地点数が有意に増加（又は減少）した場合には、「調査期間における低濃度地点数の増加傾向（または減少傾向）が統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆された。」と評価し、表10においては「↕」（又は「↗」）と表記した。なお、各年度における検出下限値の違いによる影響を回避するため、解析する際には解析対象年度内で最も高い検出下限値を用いて二項分布を想定したロジットモデルで最尤推定法を実施し、低濃度地点の割合を算出することとした。

なお、②の判断において減少傾向（又は増加傾向）が統計的に有意と判定されない場合には、表10において「—」と表記した。また、④の判断において差があると判断されない場合は、ブートストラップ法において調査期間の前期と後期との差が統計的に有意と判定されない場合として「—*」と表記した。また、⑤で検出した検体数の割合が有意に減少していない場合においては、検出率の減少（又は増加）が統計的に有意と判定されない場合として、表10において「—**」と表記した。

※ 経年変化解析の詳細な解析手法はそれぞれ章末に参考資料2として記載した。



（注1） 図中の①～⑤の番号は、前述した経年分析の方法の項目番号と対応する。

（注2） 濃度データが検出下限値未満（nd）の場合には、図中の⑤の分析を除き、検出下限値の1/2として解析を実施している。

（注3） ②において、AICにおいて傾きを持つモデルへの適合度が高い場合、回帰直線の傾きが負であれば「経年的な減少傾向が統計的に有意と判定された。」と評価し、回帰直線の傾きが正であれば「経年的な増加傾向が統計的に有意と判定された。」と評価する。

（注4） ブートストラップ法の対象となる年度は、各物質においてモニタリング調査開始から8か年及び直近の2017年度から2024年度までの8か年としている。なお、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）、ペンタクロロベンゼン、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）については、解析する媒体によっては前期及び後期の対象年数が8か年未満になる場合がある。

図2 経年分析の手順及び分析結果に対する評価方法

6. 調査結果の概要

モニタリング調査の検出状況一覧を表8-1及び表8-2に、検出下限値一覧を表9に、幾何平均値の経年変化については図3として物質ごとに示した。

また、2024年度の調査も2002年度（物質・媒体により調査開始年度が2003年度以降）から継続的に調査を実施している地点と概ね同一地点で実施しており、2024年度に調査を実施し、かつ、これまでに7か年度分以上の調査結果の蓄積がある物質（群）については、調査対象期間を通じた経年的な傾向について統計的な分析を行った。経年分析の結果を表10-1～表10-4に示した。なお、3か年以上継続して減少傾向が続く場合には、定量的な情報として調査結果に基づく環境中における半減期を表中に記載している。

表 8-1 2024 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（水質及び底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)		底質 (pg/g-dry)	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[1]	総 PCB	nd~10,000 (46/47)	90	21~520,000 (60/60)	4,900
[2]	HCB	3~52 (47/47)	7	1.9~8,000 (60/60)	52
[3]	アルドリノ				
[4]	ディルドリン				
[5]	エンドリン				
[6]	DDT 類				
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT				
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE				
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD				
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT				
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE				
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD				
[7]	クロルデン類				
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン				
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン				
	[7-3] オキシクロルデン				
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル				
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル				
[8]	ヘプタクロル類				
	[8-1] ヘプタクロル				
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド				
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド				
[9]	トキサフェン類				
	[9-1] Parlar-26				
	[9-2] Parlar-50				
	[9-3] Parlar-62				
[10]	マイレックス				
[11]	HCH 類				
	[11-1] α -HCH				
	[11-2] β -HCH				
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)				
	[11-4] δ -HCH				
[12]	クロルデコン				
[13]	ヘキサブロモビフェニル類				
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)				
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類				
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類				
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類				
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル				
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	nd~3,100 (45/47)	230	$\mu(5)$ ~300 (60/60)	38
[16]	ペルフルオロオクタノ酸 (PFOA)	210~34,000 (47/47)	980	nd~220 (59/60)	21
[17]	ペンタクロロベンゼン				
[18]	エンドスルファン類				
	[18-1] α -エンドスルファン				
	[18-2] β -エンドスルファン				

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)		底質 (pg/g-dry)	
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン類				
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン				
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン				
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン				
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン				
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロシクロドデカン				
[20]	総ポリ塩化ナフタレン				
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジエン				
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類				
	[22-1] ペンタクロロフェノール				
	[22-2] ペンタクロロアニソール				
[23]	短鎖塩素化パラフィン類				
	[23-1] 塩素化デカン類				
	[23-2] 塩素化ウンデカン類				
	[23-3] 塩素化ドデカン類				
	[23-4] 塩素化トリデカン類				
[24]	ジコホル				
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	nd~2,300 (38/47)	140	nd~18 (15/60)	nd
[26]	メトキシクロル	nd (0/47)	nd	nd (0/60)	nd
[27]	デクロランプラス類				
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	nd~4,400 (44/47)	7.2	nd~5,800 (56/60)	170
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	nd~11,000 (31/47)	3.4	tr(0.6)~2,100 (60/60)	64
[28]	UV-328	nd~120 (28/47)	tr(30)	tr(14)~50,000 (60/60)	1,200

(注1) 「平均値」は幾何平均値を意味する。nd (検出下限値未満)は検出下限値の1/2として算出した。

(注2) ■は調査対象外であることを意味する。

(注3) tr(X)は、Xの値が定量下限値未満、検出下限値以上であることを意味する。

表 8-2 2024 年度モニタリング調査 検出状況一覧表（生物及び大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)						大気 (pg/m³)	
		貝類		魚類		鳥類		範囲 (検出頻度)	平均値
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値		
[1]	総 PCB	170～6,100 (3/3)	910	1,000～ 130,000 (16/16)	8,100	46,000～ 910,000 (2/2)	200,000	7.7～170 (35/35)	44
[2]	HCB	nd～20 (2/3)	3.4	6.7～580 (16/16)	64	3,000～4,400 (2/2)	3,600	67～120 (35/35)	96
[3]	アルドリノ								
[4]	ディルドリン								
[5]	エンドリン								
[6]	DDT 類								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT								
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE								
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD								
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT								
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE								
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD								
[7]	クロルデン類								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン								
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン								
	[7-3] オキソクロルデン								
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル								
[8]	ヘプタクロル類								
	[8-1] ヘプタクロル								
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド								
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド								
	[8-4] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド								
[9]	トキサフェン類								
	[9-1] Parlar-26								
	[9-2] Parlar-50								
	[9-3] Parlar-62								
[10]	マイレックス								
[11]	HCH 類								
	[11-1] α -HCH								
	[11-2] β -HCH								
	[11-3] γ -HCH (別名: リンデン)								
	[11-4] δ -HCH								
[12]	クロルデコン								
[13]	ヘキサブロモビフェニル類								
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)								
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類								
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類								
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類								
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類								
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類								
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類								
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル類								
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	nd～120 (2/3)	11	15～11,000 (16/16)	300	1,200～ 36,000 (2/2)	6,600	1.1～7.1 (35/35)	3.5
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	9～23 (3/3)	14	tr(3)～28 (16/16)	8	100～930 (2/2)	300	3.5～31 (35/35)	8.0
[17]	ペンタクロロベンゼン	3.2～6.5 (3/3)	4.6	1.0～58 (16/16)	13	280～520 (2/2)	380	37～87 (35/35)	55
[18]	エンドスルファン類								
	[18-1] α -エンドスルファン								
	[18-2] β -エンドスルファン								

物質 調査 番号	調査対象物質	生物 (pg/g-wet)						大気 (pg/m³)	
		貝類		魚類		鳥類		範囲 (検出頻度)	平均値
		範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値	範囲 (検出頻度)	平均値		
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類								
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン								
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン								
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン								
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン								
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン								
[20]	総ポリ塩化ナフタレン								
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジエ ン							1,200~3,500 (35/35)	2,300
[22]	ペンタクロロフェノール並 びにその塩及びエステル類								
	[22-1] ペンタクロロフェノ ール								
	[22-2] ペンタクロロアニソ ール								
[23]	短鎖塩素化パラフィン類								
	[23-1] 塩素化デカン類	nd~tr(280) (1/3)	nd	nd~tr(290) (2/16)	nd	nd~tr(200) (1/2)	nd	tr(50)~770 (35/35)	270
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	tr(330)~ tr(490) (3/3)	tr(420)	nd~tr(550) (3/16)	nd	tr(320)~ tr(590) (2/2)	tr(430)	nd~4,300 (26/35)	tr(300)
	[23-3] 塩素化ドデカン類	nd~tr(540) (2/3)	tr(320)	nd~tr(510) (5/16)	nd	tr(360)~ tr(660) (2/2)	tr(490)	nd~910 (24/35)	tr(170)
	[23-4] 塩素化トリデカン類	nd~tr(640) (2/3)	tr(390)	nd~tr(570) (7/16)	nd	tr(540)~ 1,100 (2/2)	tr(770)	tr(100)~640 (35/35)	160
[24]	ジコanol								
[25]	ペルフルオロヘキサンスル ホン酸 (PFHxS)	nd (0/3)	nd	nd~1,900 (9/16)	tr(5)	94~180 (2/2)	130	0.7~6.1 (35/35)	2.4
[26]	メトキシクロル	nd (0/3)	nd	nd (0/16)	nd	nd (0/2)	nd		
[27]	デクロランプラス類								
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	nd~5.4 (1/3)	tr(1.0)	nd~51 (11/16)	2.2	16~160 (2/2)	51		
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	nd~tr(1.1) (1/3)	nd	nd~29 (11/16)	1.5	7.3~100 (2/2)	27		
[28]	UV-328	31~240 (3/3)	79	tr(17)~900 (16/16)	100	36~230 (2/2)	91		

(注1) 「平均値」は幾何平均値を意味する。nd (検出下限値未満) は検出下限値の1/2として算出した。

(注2) ■は調査対象外であることを意味する。

(注3) tr(X)は、Xの値が定量下限値未満、検出下限値以上であることを意味する。

(注4) ヘキサクロブタ-1,3-ジエン以外の大気試料の採取は、調査地点によってハイボリュームエアサンプラー又はミドルボリュームエアサンプラーのいずれかで行っている。同一地点・同一時刻にこの2種類のサンプラーで採取した試料の濃度を比較したところ、ミドルボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度が、ハイボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度に対してペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) は2.5倍前後、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) は1.5倍前後、ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) は3.5倍前後であった。この原因として、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) 及びペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) 等とともに採取されたそれらの前駆物質の一部が試料採取中にペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA) 及びペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) へと変化し、試料採取時間が長いミドルボリュームエアサンプラーでより多くの前駆物質が変化したことが想定されるが、科学的な根拠をもって究明するには至っていない。

(注5) ヘキサクロブタ-1,3-ジエンの大気についてはローボリュームエアサンプラーで3検体/地点の測定を行っており、範囲は全ての検体における最小値から最大値の範囲で示し、検出頻度は全測定地点に対して検出のあった地点数を示した。

(注6) 短鎖塩素化パラフィン類は、生物においては塩素数が5から9までのものを、大気においては塩素数が4から8までのものをそれぞれ測定の対象とした。

また、短鎖塩素化パラフィン類の結果は、測定法に様々な課題がある中での試行において得られた暫定的な値である。

表9 2024年度モニタリング調査 定量〔検出〕下限値一覧表

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)	底質 (pg/g-dry)	生物 (pg/g-wet)	大気 (pg/m³)
[1]	総 PCB※	17 [6]	19 [7]	21 [8]	2.0 [0.8]
[2]	HCB	3 [1]	1.8 [0.7]	1.2 [0.4]	0.10 [0.04]
[3]	アルドリン				
[4]	ディルドリン				
[5]	エンドリン				
[6]	DDT 類				
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT				
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE				
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD				
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT				
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE				
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD				
[7]	クロルデン類				
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン				
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン				
	[7-3] オキシクロルデン				
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル				
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル				
[8]	ヘプタクロル類				
	[8-1] ヘプタクロル				
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド				
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド				
[9]	トキサフェン類				
	[9-1] Parlar-26				
	[9-2] Parlar-50				
	[9-3] Parlar-62				
[10]	マイレックス				
[11]	HCH 類				
	[11-1] α -HCH				
	[11-2] β -HCH				
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)				
	[11-4] δ -HCH				
[12]	クロルデコン				
[13]	ヘキサブロモビフェニル類				
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)				
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類				
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類				
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類				
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類				
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル				
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	70 [30]	9 [4]	6 [3]	0.5 [0.2]
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	70 [30]	7 [3]	8 [3]	0.5 [0.2]
[17]	ペンタクロロベンゼン			1.0 [0.4]	0.06 [0.02]
[18]	エンドスルファン類				
	[18-1] α -エンドスルファン				
	[18-2] β -エンドスルファン				

物質 調査 番号	調査対象物質	水質 (pg/L)	底質 (pg/g-dry)	生物 (pg/g-wet)	大気 (pg/m³)
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン類				
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン				
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン				
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン				
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン				
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン				
[20]	総ポリ塩化ナフタレン※				
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジエン				60 [20]
[22]	ペンタクロフェノール並びにその塩及びエステル類 ペンタクロフェノール				
	[22-1] ペンタクロフェノール				
	[22-2] ペンタクロロアニソール				
[23]	短鎖塩素化パラフィン類				
	[23-1] 塩素化デカン類			400 [200]	120 [50]
	[23-2] 塩素化ウンデカン類			700 [300]	380 [130]
	[23-3] 塩素化ドデカン類			800 [300]	360 [120]
	[23-4] 塩素化トリデカン類			800 [300]	110 [50]
[24]	ジコホル				
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	90 [40]	6 [3]	7 [3]	0.5 [0.2]
[26]	メトキシクロル	110 [40]	7 [3]	10 [4]	
[27]	デクロランプラス類				
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	2.2 [0.9]	5.4 [1.8]	2.0 [0.8]	
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	3.0 [1.0]	1.1 [0.4]	1.2 [0.5]	
[28]	UV-328	60 [20]	20 [8]	20 [6]	

(注1) 上段は定量下限値、下段は検出下限値。

(注2) ※は同族体又は該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注3) 生物の定量下限値及び検出下限値は、貝類、魚類及び鳥類で共通であった。

(注4) ■は調査対象外であることを意味する。

表 10-1 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（水質）

物質 調査 番号	調査対象物質	水質				
			河川域	湖沼域	河口域	海域
[1]	総 PCB	↓ 半減期 9 年 [7~12 年]	↓ 半減期 8 年 [7~10 年]	↓ 半減期 9 年 [7~13 年]	↓ 半減期 15 年 [13~18 年]	↓
[2]	HCB	↓ 半減期 10 年 [9~12 年]	↓ 半減期 11 年 [9~14 年]	↓ 半減期 12 年 [8~22 年]	↓ 半減期 9 年 [7~11 年]	—
[3]	アルドリン					
[4]	ディルドリン					
[5]	エンドリン					
[6]	DDT 類					
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT					
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE					
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD					
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT					
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE					
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD					
[7]	クロルデン類					
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン					
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン					
	[7-3] オキシクロルデン					
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル					
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル					
[8]	ヘプタクロル類					
	[8-1] ヘプタクロル					
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド					
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド					
[9]	トキサフェン類					
	[9-1] Parlar-26					
	[9-2] Parlar-50					
	[9-3] Parlar-62					
[10]	マイレックス					
[11]	HCH 類					
	[11-1] α -HCH					
	[11-2] β -HCH					
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）					
	[11-4] δ -HCH					
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）					
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類					
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類					
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類					
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル類					
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	↓ 半減期 10 年 [8~17 年]	—	↓ 半減期 15 年 [11~25 年]	—	↓
[16]	ペルフルオロオクタ酸 (PFOA)	↓ 半減期 13 年 [11~18 年]	↓ 半減期 11 年 [8~18 年]	↓ 半減期 12 年 [9~22 年]	—	—
[17]	ペンタクロロベンゼン					

- (注 1) AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。
- (注 2) 「↓」は経年的な減少傾向が、「↑」は経年的な増加傾向がそれぞれ統計的に有意と判定されたことを、「 $\square$ 」は調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを、「 $\square$ 」は検出数が少ないものの、検出率が減少していることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを示す。
- (注 3) 「—」は経年的な減少傾向又は増加傾向が統計的に有意と判定されなかったことを、「—*」はブートストラップ法において調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べ低値であること（又は高値であること）が統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを、「—**」は不検出率の増加傾向の解析において検出数が少ないものの、検出率が減少（又は増加）していることが統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを意味する。
- (注 4) $\square$ は 2024 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。
- (注 5) 半減期は、実データに基づいた残差分布による最尤推定法で、減少傾向であるとの判定結果が 3 か年以上継続している場合に記載している。この半減期は、本年度の解析で得られた年度と対数濃度との回帰直線の傾きから算出した値で、[] 内はその 95%信頼区間を意味する。記載した半減期及びその信頼区間は、あくまで仮定に基づく見かけの値であり、解析で対象とする期間やデータの選び方に依存することに留意されたい。
- (注 6) 河川域、湖沼域、河口域及び海域の分類は表 11 に示すとおりである。
- (注 7) ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) は 2009 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果を、ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) は 2018 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果をそれぞれ記載している。

表 10-2 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（底質）

物質 調査 番号	調査対象物質	底質				
			河川域	湖沼域	河口域	海域
[1]	総 PCB	↓ 半減期 19 年 [15～27 年]	↓ 半減期 14 年 [11～19 年]	↓	↓	↓ 半減期 17 年 [13～23 年]
[2]	HCB	↓ 半減期 12 年 [10～17 年]	↓ 半減期 10 年 [8～14 年]	—	—	↓
[3]	アルドリン					
[4]	ディルドリン					
[5]	エンドリン					
[6]	DDT 類					
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT					
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE					
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD					
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT					
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE					
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD					
[7]	クロルデン類					
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン					
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン					
	[7-3] オキシクロルデン					
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル					
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル					
[8]	ヘプタクロル類					
	[8-1] ヘプタクロル					
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド					
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド					
[9]	トキサフェン類					
	[9-1] Parlar-26					
	[9-2] Parlar-50					
	[9-3] Parlar-62					
[10]	マイレックス					
[11]	HCH 類					
	[11-1] α -HCH					
	[11-2] β -HCH					
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）					
	[11-4] δ -HCH					
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）					
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類					
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類					
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類					
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類					
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル					
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	↓ 半減期 12 年 [9～18 年]	—	—	↓ 半減期 10 年 [7～20 年]	↓ 半減期 12 年 [9～17 年]
[16]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	↓ 半減期 12 年 [9～18 年]	↓	—	↓ 半減期 7 年 [6～11 年]	—
[17]	ペンタクロロベンゼン					

- (注 1) AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。
- (注 2) 「↓」は経年的な減少傾向が、「↑」は経年的な増加傾向がそれぞれ統計的に有意と判定されたことを、「」は調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを、「」は検出数が少ないものの、検出率が減少していることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを示す。
- (注 3) 「-」は経年的な減少傾向又は増加傾向が統計的に有意と判定されなかったことを、「-*」はブートストラップ法において調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べ低値であること（又は高値であること）が統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを、「-**」は不検出率の増加傾向の解析において検出数が少ないものの、検出率が減少（又は増加）していることが統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを意味する。
- (注 4) は 2024 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。
- (注 5) 半減期は、実データに基づいた残差分布による最尤推定法で、減少傾向であるとの判定結果が 3 か年以上継続している場合に記載している。この半減期は、本年度の解析で得られた年度と対数濃度との回帰直線の傾きから算出した値で、[] 内はその 95%信頼区間を意味する。記載した半減期及びその信頼区間は、あくまで仮定に基づく見かけの値であり、解析で対象とする期間やデータの選び方に依存することに留意されたい。
- (注 6) 河川域、湖沼域、河口域及び海域の分類は表 11 に示すとおりである。
- (注 7) ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオクタン酸 (PFOA) は 2009 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果を、ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) は 2018 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果をそれぞれ記載している。

表 10-3 2002 年度から 2024 年度における経年分析結果（生物）

物質 調査 番号	調査対象物質	貝類	魚類
[1]	総 PCB	↘ 半減期 10 年 [7~16 年]	↘ 半減期 15 年 [12~23 年]
[2]	HCB	—	—
[3]	アルドリン		
[4]	ディルドリン		
[5]	エンドリン		
[6]	DDT 類		
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT		
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE		
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD		
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT		
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE		
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD		
[7]	クロルデン類		
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン		
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン		
	[7-3] オキシクロルデン		
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル		
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル		
[8]	ヘプタクロル類		
	[8-1] ヘプタクロル		
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド		
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド		
[9]	トキサフェン類		
	[9-1] Parlar-26		
	[9-2] Parlar-50		
	[9-3] Parlar-62		
[10]	マイレックス		
[11]	HCH 類		
	[11-1] α -HCH		
	[11-2] β -HCH		
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）		
	[11-4] δ -HCH		
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類		
	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類		
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類		
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類		
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類		
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類		
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類		
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル		
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	— **	—
[16]	ペルフルオロオクタ酸（PFOA）	— **	↘
[17]	ペンタクロロベンゼン	↘	— *
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類		
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン		
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン		
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン		

- (注 1) AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。
- (注 2) 「↓」は経年的な減少傾向が、「↑」は経年的な増加傾向がそれぞれ統計的に有意と判定されたことを、「」は調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを、「」は検出数が少ないものの、検出率が減少していることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを示す。
- (注 3) 「-」は経年的な減少傾向又は増加傾向が統計的に有意と判定されなかったことを、「-*」はブートストラップ法において調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べ低値であること（又は高値であること）が統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを、「-**」は不検出率の増加傾向の解析において検出数が少ないものの、検出率が減少（又は増加）していることが統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを意味する。
- (注 4) は 2024 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。
- (注 5) 半減期は、実データに基づいた残差分布による最尤推定法で、減少傾向であるとの判定結果が 3 か年以上継続している場合に記載している。この半減期は、本年度の解析で得られた年度と対数濃度との回帰直線の傾きから算出した値で、[] 内はその 95%信頼区間を意味する。記載した半減期及びその信頼区間は、あくまで仮定に基づく見かけの値であり、解析で対象とする期間やデータの選び方に依存することに留意されたい。
- (注 6) ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) 及びペルフルオロオktan酸 (PFOA) は 2009 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果を、ペンタクロロベンゼンは 2010 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果をそれぞれ記載している。

表 10-4 2003 年度から 2024 年度における経年分析結果（大気）

物質 調査 番号	調査対象物質	大気
[1]	総 PCB	↓ 半減期 12 年 [10～15 年]
[2]	HCB	—
[3]	アルドリン	
[4]	ディルドリン	
[5]	エンドリン	
[6]	DDT 類	
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	
[7]	クロルデン類	
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	
	[7-3] オキシクロルデン	
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	
[8]	ヘプタクロル類	
	[8-1] ヘプタクロル	
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエポキシド	
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエポキシド	
[9]	トキサフェン類	
	[9-1] Parlar-26	
	[9-2] Parlar-50	
	[9-3] Parlar-62	
[10]	マイレックス	
[11]	HCH 類	
	[11-1] α -HCH	
	[11-2] β -HCH	
	[11-3] γ -HCH（別名：リンデン）	
	[11-4] δ -HCH	
[14]	[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	
	[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	
	[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	
	[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	
	[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	
	[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	
	[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	↓ 半減期 27 年 [22～38 年]
[16]	ペルフルオロオktan酸（PFOA）	↓ 半減期 10 年 [8～14 年]
[17]	ペンタクロロベンゼン	—
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類	
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	—

- (注 1) AIC での増減傾向の判定では、一次モデルの事後確率において 95%を閾値としている。
- (注 2) 「↓」は経年的な減少傾向が、「↑」は経年的な増加傾向がそれぞれ統計的に有意と判定されたことを、「」は調査期間の後期で得られた結果が前期と比べ低値であることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを、「」は検出数が少ないものの、検出率が減少していることが統計的に有意と判定され、濃度の減少傾向が示唆されたことを示す。
- (注 3) 「—」は経年的な減少傾向又は増加傾向が統計的に有意と判定されなかったことを、「—*」はブートストラップ法において調査期間の後期で得られた結果が、前期と比べ低値であること（又は高値であること）が統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを、「—**」は不検出率の増加傾向の解析において検出数が少ないものの、検出率が減少（又は増加）していることが統計的に有意と判定されず、濃度の減少傾向（又は増加傾向）が示唆されなかったことを意味する。
- (注 4) は 2024 年度の調査を実施しておらず、経年分析を行っていない。
- (注 5) 半減期は、実データに基づいた残差分布による最尤推定法で、減少傾向であるとの判定結果が 3 か年以上継続している場合に記載している。この半減期は、本年度の解析で得られた年度と対数濃度との回帰直線の傾きから算出した値で、[] 内はその 95%信頼区間を意味する。記載した半減期及びその信頼区間は、あくまで仮定に基づく見かけの値であり、解析で対象とする期間やデータの選び方に依存することに留意されたい。
- (注 6) ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) 及びは 2010 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果を、ペンタクロロベンゼンは 2007 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果を、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンは 2015 年度以降の調査結果に基づく経年分析の結果をそれぞれ記載している。

表 11 2002 年度から 2024 年度における経年分析の水域分類

分類	地方公共団体	調査地点	調査の実施	
			水質	底質
河川域	北海道	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	○	○
	岩手県	豊沢川豊沢橋（花巻市）	○	○
	仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）		○
	山形県	最上川河口（酒田市）	○	○
	茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	○	○
	栃木県	田川給分地区頭首工（宇都宮市）	○	○
	群馬県	利根川利根大堰上流（千代田町）	○	
	埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	○	
	新潟県	信濃川下流（新潟市）	○	○
	富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	○	○
	福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	○	○
	山梨県	荒川千秋橋（甲府市）		○
	静岡県	天竜川掛塚橋（磐田市）	○	○
	京都市	桂川宮前橋（京都市）	○	○
	大阪市	大川毛馬橋（大阪市）		○
		大阪港	○	○
	奈良県	大和川大正橋（王寺町）		○
	和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	○	○
	高知県	四万十川河口（四万十市）	○	○
	熊本県	緑川平木橋（宇土市）	○	
	宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	○	○
	鹿児島県	天降川（霧島市）	○	○
		五反田川（いちき串木野市）	○	○
湖沼域	秋田県	八郎湖		○
	長野県	諏訪湖湖心	○	○
	滋賀県	琵琶湖南比良沖中央		○
		琵琶湖唐崎沖中央	○	○
河口域	東京都	荒川河口（江東区）	○	○
		隅田川河口（港区）	○	○
	川崎市	多摩川河口（川崎市）		○
	石川県	犀川河口（金沢市）	○	○
	愛知県	衣浦港		○
	三重県	鳥羽港		○
	大阪府	大和川河口（堺市）	○	○
	大阪市	淀川河口（大阪市）		○
	徳島県	吉野川河口（徳島市）	○	○
	香川県	高松港	○	○
	北九州市	洞海湾	○	○
	大分県	大分川河口（大分市）		○
	沖縄県	那覇港	○	○
海域	北海道	苫小牧港		○
	宮城県	仙台湾（松島湾）	○	○
	福島県	小名浜港	○	○
	千葉県	市原・姉崎海岸		○
	横浜市	横浜港	○	○
	川崎市	川崎港京浜運河扇町地先	○	○
	静岡県	清水港		○
	愛知県	名古屋港	○	○
	三重県	四日市港	○	○
	京都府	宮津港	○	○
	大阪市	大阪港外		○
	兵庫県	姫路沖	○	○
	神戸市	神戸港中央	○	○
	岡山県	水島沖	○	○
	広島県	呉港	○	○
		広島湾	○	○
	山口県	徳山湾	○	○
		宇部沖	○	○
		萩沖	○	○
	愛媛県	新居浜港		○
	福岡市	博多湾		○
	佐賀県	伊万里湾	○	○
	長崎県	大村湾	○	○

(注) 調査地点の名称として河口としている地点の一部は、調査地点の状況から河川域及び海域に分類した。

2024 年度調査においては、2002 年度から継続的な分析が行われている PCB 類及び HCB について、いずれの媒体においても検出された。

また、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）についていずれもの媒体においても、ペンタクロロベンゼン及び短鎖塩素化パラフィン類について生物（貝類、魚類、鳥類）及び大気において、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンについて大気において、メトキシクロル、デクロランプラス類及び UV-328 について水質、底質及び生物において分析が行われた。

ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）が生物のうち貝類で、メトキシクロルが水質、底質及び生物でそれぞれ不検出であったが、その他の調査対象物質（群）・媒体ではいずれも検出された。

物質（群）別の調査結果は、次のとおりである。

[1] 総 PCB

・調査の経緯及び実施状況

PCB（ポリ塩化ビフェニル）類は、絶縁油等に利用されていた。難分解性で、生物に蓄積しやすくかつ慢性毒性を有するため、1974年6月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs条約においては、2004年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

2001年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾で1978年度から2001年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査しており、「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」ⁱⁱⁱ⁾で1996年度及び1997年度に底質及び生物（魚類）、2000年度及び2001年度に水質、底質、生物（魚類）及び大気の調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

<水質>

水質については、47地点を調査し、検出下限値6pg/Lにおいて47地点中46地点で検出され、検出濃度は10,000pg/Lまでの範囲であった。

2002年度から2024年度における経年分析の結果、河川域、湖沼域、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002年度から2024年度における水質についての総 PCB の検出状況

総 PCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	470	330	11,000	60	7.4 [2.5]	114/114	38/38
	2003	530	450	3,100	230	9.4 [2.5]	36/36	36/36
	2004	630	540	4,400	140	14 [5.0]	38/38	38/38
	2005	520	370	7,800	140	10 [3.2]	47/47	47/47
	2006	240	200	4,300	15	9 [3]	48/48	48/48
	2007	180	140	2,700	12	7.6 [2.9]	48/48	48/48
	2008	260	250	4,300	27	7.8 [3.0]	48/48	48/48
	2009	210	170	3,900	14	10 [4]	48/48	48/48
	2010	120	99	2,200	nd	73 [24]	41/49	41/49
	2011	150	130	2,100	16	4.5 [1.7]	49/49	49/49
	2012	400	280	6,500	72	44 [15]	48/48	48/48
	2013	140	110	2,600	tr(13)	25 [8]	48/48	48/48
	2014	150	120	4,800	16	8.2 [2.9]	48/48	48/48
	2015	200	160	4,200	34	21 [7.3]	48/48	48/48
	2016	140	120	3,100	tr(7.2)	8.4 [2.8]	48/48	48/48
	2017	84	79	2,400	nd	16 [5.5]	46/47	46/47
	2018	150	140	2,600	tr(11)	14 [5]	47/47	47/47
	2019	120	90	3,400	tr(6.6)	12 [4.7]	48/48	48/48
	2020	99	90	8,000	nd	19 [6]	43/46	43/46
	2021	100	81	5,900	nd	16 [6]	45/47	45/47
	2022	110	88	3,900	nd	13 [5]	46/48	46/48
	2023	120	85	4,500	10	9 [4]	47/47	47/47
	2024	90	72	10,000	nd	17 [6]	46/47	46/47

(注1) 2002年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 7 pg/g-dry において 60 地点全てで検出され、検出濃度は 21～520,000 pg/g-dry の範囲であった。

2002 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河川域、湖沼域、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002 年度から 2024 年度における底質についての総 PCB の検出状況

総 PCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注 1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注 2)}	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	11,000	11,000	630,000	39	10 [3.5]	189/189	63/63
	2003	9,400	9,500	5,600,000	39	10 [3.2]	186/186	62/62
	2004	8,400	7,600	1,300,000	38	7.9 [2.6]	189/189	63/63
	2005	8,600	7,100	690,000	42	6.3 [2.1]	189/189	63/63
	2006	8,800	6,600	690,000	36	4 [1]	192/192	64/64
	2007	7,400	6,800	820,000	19	4.7 [1.5]	192/192	64/64
	2008	8,700	8,900	630,000	22	3.3 [1.2]	192/192	64/64
	2009	7,600	7,100	1,700,000	17	5.1 [2.1]	192/192	64/64
	2010	6,500	7,800	710,000	nd	660 [220]	56/64	56/64
	2011	6,300	7,400	950,000	24	12 [4.5]	64/64	64/64
	2012	5,700	6,700	640,000	tr(32)	51 [18]	63/63	63/63
	2013	6,200	8,000	650,000	tr(43)	44 [13]	62/62	62/62
	2014	4,900	5,500	440,000	tr(35)	61 [21]	63/63	63/63
	2015	6,400	7,500	1,100,000	nd	62 [22]	61/62	61/62
	2016	5,300	5,300	770,000	tr(21)	53 [18]	62/62	62/62
	2017	4,600	6,200	610,000	nd	14 [5.0]	61/62	61/62
	2018	5,900	6,500	720,000	nd	170 [55]	58/61	58/61
	2019	5,700	7,900	640,000	37	8.5 [3.3]	61/61	61/61
	2020	4,600	6,200	400,000	30	8.2 [3.1]	58/58	58/58
	2021	4,900	4,800	450,000	33	7.8 [2.9]	60/60	60/60
	2022	4,600	4,800	340,000	20	7 [3]	61/61	61/61
	2023	4,200	4,900	300,000	14	8 [3]	60/60	60/60
	2024	4,900	5,600	520,000	21	19 [7]	60/60	60/60

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 8 pg/g-wet において 3 地点全てで検出され、検出濃度は 170～6,100 pg/g-wet の範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 8 pg/g-wet において 16 地点全てで検出され、検出濃度は 1,000～130,000 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 8 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 46,000 pg/g-wet 及び 910,000 pg/g-wet であった。

2002 年度から 2024 年度における経年分析の結果、貝類及び魚類の減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002 年度から 2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての総 PCB の検出状況

総 PCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注 1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注 2)}	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	8,800	28,000	160,000	200	25 [8.4]	38/38	8/8
	2003	11,000	9,600	130,000	1,000	50 [17]	30/30	6/6
	2004	11,000	11,000	150,000	1,500	85 [29]	31/31	7/7
	2005	11,000	13,000	85,000	920	69 [23]	31/31	7/7
	2006	8,500	8,600	77,000	690	42 [14]	31/31	7/7
	2007	9,000	11,000	66,000	980	46 [18]	31/31	7/7
	2008	8,600	8,600	69,000	870	47 [17]	31/31	7/7
	2009	8,700	11,000	62,000	780	32 [11]	31/31	7/7
	2010	9,200	11,000	46,000	1,500	52 [20]	6/6	6/6
	2011	8,900	17,000	65,000	820	220 [74]	4/4	4/4
	2012	6,600	12,000	34,000	680	34 [11]	5/5	5/5
	2013	5,200	7,800	44,000	730	44 [14]	5/5	5/5
	2014	2,900	2,600	15,000	600	95 [31]	3/3	3/3
	2015	2,400	2,500	9,600	580	52 [17]	3/3	3/3
	2016	2,300	2,300	12,000	420	60 [20]	3/3	3/3
	2017	2,500	1,600	19,000	500	68 [23]	3/3	3/3
	2018	2,000	900	12,000	740	63 [21]	3/3	3/3
	2019	2,200	1,900	17,000	350	33 [11]	3/3	3/3
	2020	1,700	1,100	9,900	470	31 [11]	3/3	3/3
	2021	1,500	980	7,200	490	33 [10]	3/3	3/3
	2022	1,000	490	10,000	230	13 [5]	3/3	3/3
	2023	680	---	1,900	240	12 [5]	2/2	2/2
	2024	910	730	6,100	170	21 [8]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	17,000	8,100	550,000	1,500	25 [8.4]	70/70	14/14
	2003	11,000	9,600	150,000	870	50 [17]	70/70	14/14
	2004	15,000	10,000	540,000	990	85 [29]	70/70	14/14
	2005	14,000	8,600	540,000	800	69 [23]	80/80	16/16
	2006	13,000	9,000	310,000	990	42 [14]	80/80	16/16
	2007	11,000	6,200	530,000	790	46 [18]	80/80	16/16
	2008	12,000	9,100	330,000	1,200	47 [17]	85/85	17/17
	2009	12,000	12,000	290,000	840	32 [11]	90/90	18/18
	2010	13,000	10,000	260,000	880	52 [20]	18/18	18/18
	2011	14,000	12,000	250,000	900	220 [74]	18/18	18/18
	2012	13,000	14,000	130,000	920	34 [11]	19/19	19/19
	2013	14,000	13,000	270,000	1,000	44 [14]	19/19	19/19
	2014	13,000	10,000	230,000	940	95 [31]	19/19	19/19
	2015	11,000	7,700	180,000	1,300	52 [17]	19/19	19/19
	2016	11,000	8,400	150,000	1,200	60 [20]	19/19	19/19
	2017	10,000	8,300	160,000	860	68 [23]	19/19	19/19
	2018	12,000	12,000	280,000	1,200	63 [21]	18/18	18/18
	2019	12,000	12,000	160,000	1,000	33 [11]	16/16	16/16
	2020	9,300	12,000	85,000	690	31 [11]	18/18	18/18
	2021	13,000	16,000	130,000	800	33 [10]	18/18	18/18
	2022	9,200	7,100	150,000	600	13 [5]	18/18	18/18
	2023	7,700	7,200	83,000	720	12 [5]	18/18	18/18
	2024	8,100	8,400	130,000	1,000	21 [8]	16/16	16/16

総 PCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注3)} (pg/g-wet)	2002	12,000	14,000	22,000	4,800	25 [8.4]	10/10	2/2
	2003	19,000	22,000	42,000	6,800	50 [17]	10/10	2/2
	2004	9,000	9,400	13,000	5,900	85 [29]	10/10	2/2
	2005	10,000	9,700	19,000	5,600	69 [23]	10/10	2/2
	2006	12,000	9,800	48,000	5,600	42 [14]	10/10	2/2
	2007	7,600	7,800	15,000	3,900	46 [18]	10/10	2/2
	2008	9,700	7,400	56,000	3,000	47 [17]	10/10	2/2
	2009	5,900	5,700	9,500	3,900	32 [11]	10/10	2/2
	2010	7,700	---	9,100	6,600	52 [20]	2/2	2/2
	2011	---	---	5,400	5,400	220 [74]	1/1	1/1
	2012	5,900	---	6,200	5,600	34 [11]	2/2	2/2
	2013	360,000	---	510,000	250,000	44 [14]	2/2	2/2
	2014	46,000	---	140,000	15,000	95 [31]	2/2	2/2
	2015	---	---	5,000	5,000	52 [17]	1/1	1/1
	2016	31,000	---	100,000	9,800	60 [20]	2/2	2/2
	2017	39,000	---	380,000	4,000	68 [23]	2/2	2/2
	2018	110,000	---	130,000	85,000	63 [21]	2/2	2/2
	2019	---	---	190,000	190,000	33 [11]	1/1	1/1
	2020	---	---	74,000	74,000	31 [11]	1/1	1/1
	2021	150,000	---	210,000	110,000	33 [10]	2/2	2/2
	2022	190,000	---	200,000	190,000	13 [5]	2/2	2/2
	2023	150,000	---	380,000	63,000	12 [5]	2/2	2/2
	2024	200,000	---	910,000	46,000	21 [8]	2/2	2/2

(注1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注3) 鳥類の 2013 年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

< 大気 >

大気については、35 地点を調査し、検出下限値 0.8 pg/m³において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 7.7～170 pg/m³の範囲であった。


2003 年度から 2024 年度における経年分析の結果、減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002 年度から 2024 年度における大気についての総 PCB の検出状況

総 PCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注1)}	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002 ^{注2)}	100	100	880	16	99 [33]	102/102	34/34
	2003 温暖期	260	340	2,600	36	6.6 [2.2]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	110	120	630	17		34/34	34/34
	2004 温暖期	240	250	3,300	25	2.9 [0.98]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	130	130	1,500	20		37/37	37/37
	2005 温暖期	190	210	1,500	23	0.38 [0.14]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	66	64	380	20		37/37	37/37
	2006 温暖期	170	180	1,500	21	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	82	90	450	19		37/37	37/37
	2007 温暖期	250	290	980	37	0.37 [0.13]	24/24	24/24
	2007 寒冷期	72	76	230	25		22/22	22/22
	2008 温暖期	200	170	960	52	0.8 [0.3]	22/22	22/22
	2008 寒冷期	93	86	1,500	21		36/36	36/36
	2009 温暖期	200	190	1,400	43	0.75 [0.26]	34/34	34/34
	2009 寒冷期	85	78	380	20		34/34	34/34
	2010 温暖期	160	150	970	36	7.3 [2.5]	35/35	35/35
	2010 寒冷期	84	86	630	19		35/35	35/35
	2011 温暖期	150	160	660	32	18 [5.9]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	76	66	320	tr(17)		37/37	37/37
	2012 温暖期	130	130	840	27	26 [8.5]	35/35	35/35
	2012 寒冷期	54	62	280	tr(16)		35/35	35/35
	2013 温暖期	140	130	1,100	24	20 [6.5]	35/35	35/35
	2013 寒冷期	57	55	300	tr(19)		35/35	35/35
	2014	140	150	1,300	28	4.1 [1.4]	36/36	36/36
	2015	98	110	950	17	5.9 [2.0]	35/35	35/35
	2016	130	140	1,300	16	7.8 [2.7]	37/37	37/37
	2017	120	110	3,300	26	7.0 [2.3]	37/37	37/37
	2018	110	100	750	20	2.4 [0.8]	37/37	37/37
	2019	89	90	340	27	2.1 [0.8]	36/36	36/36
	2020	82	82	360	21	1.8 [0.6]	37/37	37/37
	2021	71	70	340	17	2.4 [0.8]	35/35	35/35
	2022	78	82	190	18	0.9 [0.3]	36/36	36/36
	2023	60	58	190	24	2.4 [0.8]	35/35	35/35
	2024	44	45	170	7.7	2.0 [0.8]	35/35	35/35


(注 1) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注 2) 2002 年度の調査においては、特に低塩素化同族体の測定方法に技術的問題があったため、参考値として扱う。




(注) 2002年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 3-1-1 総 PCB の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 3-1-2 総 PCB の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

図 3-1-3 総 PCB の生物の経年変化 (幾何平均値)



(注) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-1-4 総 PCB の大気の経年変化 (幾何平均値)

[2] HCB

・調査の経緯及び実施状況

HCB は、殺虫剤等の原料に利用されていた。1979 年 8 月に、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約においては、2004 年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

2001 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ で 1978 年度から 1996 年度までの毎年度と 1998 年度、2000 年度及び 2001 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」ⁱ⁾ で水質は 1986 年度から 1998 年度まで、底質は 1986 年度から 2001 年度の全期間にわたって調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を毎年度実施している。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 1 pg/L において 47 地点全てで検出され、検出濃度は 3 ～52 pg/L の範囲であった。

2002 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河川域、湖沼域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定され、海域の調査期間の後期 7 か年で得られた結果が前期 7 か年と比べ低値であることが統計的に有意と判定され、減少傾向が示唆された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002 年度から 2024 年度における水質についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	37	28	1,400	9.8	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	2003	29	24	340	11	5 [2]	36/36	36/36
	2004	30	tr(29)	180	tr(11)	30 [8]	38/38	38/38
	2005	21	17	210	tr(6)	15 [5]	47/47	47/47
	2006	16	tr(12)	190	nd	16 [5]	46/48	46/48
	2007	17	14	190	tr(4)	8 [3]	48/48	48/48
	2008	16	13	480	4	3 [1]	48/48	48/48
	2009	15	17	180	2.4	0.5 [0.2]	49/49	49/49
	2010	tr(10)	tr(8)	120	nd	13 [4]	39/49	39/49
	2011	13	12	140	tr(3)	5 [2]	49/49	49/49
	2012	29	23	330	8.1	2.2 [0.7]	48/48	48/48
	2013	14	11	260	tr(4)	7 [2]	48/48	48/48
	2014	12	9.7	200	2.7	0.9 [0.4]	48/48	48/48
	2015	15	13	140	4.2	1.8 [0.6]	48/48	48/48
	2016	13	11	130	4.2	0.9 [0.3]	48/48	48/48
	2017	12	10	180	2.9	2.1 [0.8]	47/47	47/47
	2018	16	11	380	4.0	1.5 [0.6]	47/47	47/47
	2019	10	10	630	nd	8 [3]	46/48	46/48
	2020	7.9	6.1	600	2.7	2.0 [0.8]	46/46	46/46
	2021	6.8	5.5	180	1.6	1.0 [0.4]	47/47	47/47
	2022	5.3	4.0	70	1.6	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2023	6.1	5.3	190	1.4	0.8 [0.3]	47/47	47/47
	2024	7	6	52	3	3 [1]	47/47	47/47

(注) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 0.7 pg/g-dry において 60 地点全てで検出され、検出濃度は 1.9～8,000 pg/g-dry の範囲であった。

2002 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河川域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2002 年度から 2024 年度における底質についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値 ^(注)	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	240	200	19,000	7.6	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	2003	160	120	42,000	5	4 [2]	186/186	62/62
	2004	140	100	25,000	tr(6)	7 [3]	189/189	63/63
	2005	170	130	22,000	13	3 [1]	189/189	63/63
	2006	180	120	19,000	10	2.9 [1.0]	192/192	64/64
	2007	140	110	65,000	nd	5 [2]	191/192	64/64
	2008	160	97	29,000	4.4	2.0 [0.8]	192/192	64/64
	2009	150	120	34,000	nd	1.8 [0.7]	190/192	64/64
	2010	130	96	21,000	4	3 [1]	64/64	64/64
	2011	150	110	35,000	11	7 [3]	64/64	64/64
	2012	100	110	12,000	3	3 [1]	63/63	63/63
	2013	120	91	6,600	7.2	5.3 [1.8]	63/63	63/63
	2014	95	85	5,600	tr(4)	6 [2]	63/63	63/63
	2015	100	90	17,000	4	3 [1]	62/62	62/62
	2016	84	74	6,400	4	3 [1]	62/62	62/62
	2017	82	65	11,000	3	3 [1]	62/62	62/62
	2018	100	79	8,900	3.1	1.3 [0.5]	61/61	61/61
	2019	88	85	10,000	4.5	0.9 [0.4]	61/61	61/61
	2020	85	78	9,800	3.9	1.3 [0.5]	58/58	58/58
	2021	56	56	12,000	2.5	1.3 [0.5]	60/60	60/60
	2022	42	36	4,800	1.6	0.8 [0.3]	61/61	61/61
	2023	50	42	5,200	2.4	0.9 [0.4]	60/60	60/60
	2024	52	60	8,000	1.9	1.8 [0.7]	60/60	60/60

(注) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において 3 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は 20 pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において 16 地点全てで検出され、検出濃度は 6.7～580 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 3,000 pg/g-wet 及び 4,400 pg/g-wet であった。

○2002 年度から 2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注 1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	21	22	330	2.4	0.18 [0.06]	38/38	8/8
	2003	44	27	660	tr(21)	23 [7.5]	30/30	6/6
	2004	32	31	80	14	14 [4.6]	31/31	7/7
	2005	51	28	450	19	11 [3.8]	31/31	7/7
	2006	46	28	340	11	3 [1]	31/31	7/7
	2007	37	22	400	11	7 [3]	31/31	7/7
	2008	38	24	240	13	7 [3]	31/31	7/7
	2009	34	32	200	12	4 [2]	31/31	7/7
	2010	34	48	210	tr(4)	5 [2]	6/6	6/6
	2011	45	34	920	4	4 [1]	4/4	4/4
	2012	39	38	340	10	8.4 [2.8]	5/5	5/5
	2013	32	39	250	nd	31 [10]	4/5	4/5
	2014	34	26	100	15	10 [3]	3/3	3/3
	2015	35	26	120	tr(14)	20 [6.5]	3/3	3/3
	2016	38	22	150	17	8.1 [2.7]	3/3	3/3
	2017	41	26	99	26	3.9 [1.3]	3/3	3/3
	2018	21	23	28	14	3.3 [1.1]	3/3	3/3
	2019	23	16	65	12	3 [1]	3/3	3/3
	2020	9	14	30	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3
	2021	11	26	26	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3
	2022	8.4	8.5	9.1	7.6	2.1 [0.8]	3/3	3/3
	2023	14	---	21	9.3	2.1 [0.8]	2/2	2/2
	2024	3.4	9.5	20	nd	1.2 [0.4]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	140	180	910	19	0.18 [0.06]	70/70	14/14
	2003	180	170	1,500	28	23 [7.5]	70/70	14/14
	2004	230	210	1,800	26	14 [4.6]	70/70	14/14
	2005	180	160	1,700	29	11 [3.8]	80/80	16/16
	2006	180	220	1,400	25	3 [1]	80/80	16/16
	2007	160	140	1,500	17	7 [3]	80/80	16/16
	2008	170	210	1,500	25	7 [3]	85/85	17/17
	2009	210	180	30,000	29	4 [2]	90/90	18/18
	2010	240	280	1,700	36	5 [2]	18/18	18/18
	2011	260	320	1,500	34	4 [1]	18/18	18/18
	2012	200	300	1,100	33	8.4 [2.8]	19/19	19/19
	2013	240	220	1,500	36	31 [10]	19/19	19/19
	2014	280	340	1,900	37	10 [3]	19/19	19/19
	2015	170	150	1,700	43	20 [6.5]	19/19	19/19
	2016	150	150	1,300	24	8.1 [2.7]	19/19	19/19
	2017	190	180	1,100	33	3.9 [1.3]	19/19	19/19
	2018	140	150	900	25	3.3 [1.1]	18/18	18/18
	2019	100	99	1,100	12	3 [1]	16/16	16/16
	2020	110	58	1,100	15	3 [1]	18/18	18/18
	2021	160	160	950	24	3 [1]	18/18	18/18
	2022	110	88	710	16	2.1 [0.8]	18/18	18/18
	2023	76	64	560	21	2.1 [0.8]	18/18	18/18
	2024	64	54	580	6.7	1.2 [0.4]	16/16	16/16

HCB	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	1,000	1,200	1,600	560	0.18 [0.06]	10/10	2/2
	2003	1,800	2,000	4,700	790	23 [7.5]	10/10	2/2
	2004	980	1,300	2,200	410	14 [4.6]	10/10	2/2
	2005	1,000	1,100	2,500	400	11 [3.8]	10/10	2/2
	2006	970	1,100	2,100	490	3 [1]	10/10	2/2
	2007	960	1,100	2,000	420	7 [3]	10/10	2/2
	2008	880	1,100	2,500	240	7 [3]	10/10	2/2
	2009	850	910	1,500	400	4 [2]	10/10	2/2
	2010	970	---	1,900	500	5 [2]	2/2	2/2
	2011	---	---	460	460	4 [1]	1/1	1/1
	2012	840	---	1,500	470	8.4 [2.8]	2/2	2/2
	2013	3,900	---	5,200	2,900	31 [10]	2/2	2/2
	2014	420	---	5,600	32	10 [3]	2/2	2/2
	2015	---	---	760	760	20 [6.5]	1/1	1/1
	2016	1,700	---	5,300	550	8.1 [2.7]	2/2	2/2
	2017	1,100	---	4,900	230	3.9 [1.3]	2/2	2/2
	2018	2,800	---	3,100	2,600	3.3 [1.1]	2/2	2/2
	2019	---	---	3,200	3,200	3 [1]	1/1	1/1
	2020	---	---	2,900	2,900	3 [1]	1/1	1/1
	2021	3,400	---	4,200	2,800	3 [1]	2/2	2/2
	2022	2,000	---	2,300	1,800	2.1 [0.8]	2/2	2/2
	2023	3,000	---	4,200	2,100	2.1 [0.8]	2/2	2/2
	2024	3,600	---	4,400	3,000	1.2 [0.4]	2/2	2/2

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


(注 2) 鳥類の 2013 年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

< 大気 >

大気については、35 地点を調査し、検出下限値 0.04 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 67～120 pg/m³ の範囲であった。


○2002 年度から 2024 年度における大気についての HCB の検出状況

HCB	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	99	93	3,000	57	0.9 [0.3]	102/102	34/34
	2003 温暖期	150	130	430	81	2.3 [0.78]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	94	90	320	64		34/34	34/34
	2004 温暖期	130	130	430	47	1.1 [0.37]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	98	89	390	51		37/37	37/37
	2005 温暖期	88	90	250	27	0.14 [0.034]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	77	68	180	44		37/37	37/37
	2006 温暖期	83	89	210	23	0.21 [0.07]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	65	74	170	8.2		37/37	37/37
	2007 温暖期	110	100	230	72	0.09 [0.03]	24/24	24/24
	2007 寒冷期	77	72	120	55		22/22	22/22
	2008 温暖期	120	110	260	78	0.22 [0.08]	22/22	22/22
	2008 寒冷期	87	83	160	58		36/36	36/36
	2009 温暖期	110	110	210	78	0.6 [0.2]	34/34	34/34
	2009 寒冷期	87	87	150	59		34/34	34/34
	2010 温暖期	120	120	160	73	1.8 [0.7]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	100	96	380	56		37/37	37/37
	2011 温暖期	120	110	180	87	2.3 [0.75]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	96	96	160	75		37/37	37/37
	2012 温暖期	120	110	150	84	4.3 [1.4]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	97	95	150	68		36/36	36/36
	2013 温暖期	110	110	180	52	3.8 [1.3]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	97	97	180	73		36/36	36/36
	2014	150	160	240	84	1.4 [0.5]	36/36	36/36
	2015	120	130	170	74	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2016	130	130	220	79	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	2017	130	120	550	73	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2018	100	100	140	72	0.4 [0.2]	37/37	37/37
	2019	96	99	130	67	0.14 [0.06]	36/36	36/36
	2020	100	94	370	63	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2021	96	96	140	66	0.11 [0.04]	35/35	35/35
	2022	100	99	140	71	0.09 [0.04]	36/36	36/36
	2023	94	93	140	70	0.4 [0.1]	35/35	35/35
	2024	96	100	120	67	0.10 [0.04]	35/35	35/35




(注) 2002年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 3-2-1 HCB の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 3-2-2 HCB の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

図 3-2-3 HCB の生物の経年変化 (幾何平均値)



(注) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-2-4 HCB の大気の経年変化 (幾何平均値)

[3] アルドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

アルドリンは、日本では土壌害虫の駆除に使用されていたが、1971 年以降実質的に使用は中止された。農薬取締法に基づく登録は 1975 年に失効し、1981 年 10 月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約においては、2004 年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

2001 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ で 1978 年度から 1989 年度並びに 1991 年度及び 1993 年度にて生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査している。

2002 年度以降のモニタリング調査においては、2002 年度から 2009 年度の毎年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018 年度に底質の調査を実施している。

2019 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2018 年度までの調査結果を示す。

・2018 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2002 年度から 2009 年度における水質についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	0.8	0.9	18	nd	0.6 [0.2]	93/114	37/38
	2003	0.9	0.9	3.8	nd	0.6 [0.2]	34/36	34/36
	2004	tr(1.5)	tr(1.8)	13	nd	2 [0.4]	33/38	33/38
	2005	tr(0.6)	tr(0.7)	5.7	nd	0.9 [0.3]	32/47	32/47
	2006	nd	nd	4.4	nd	1.7 [0.6]	18/48	18/48
	2007	tr(0.6)	tr(0.6)	9.5	nd	1.0 [0.3]	34/48	34/48
	2008	tr(0.8)	tr(0.7)	21	nd	1.4 [0.6]	26/48	26/48
	2009	0.7	0.9	22	nd	0.7 [0.3]	32/49	32/49

(注) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<底質>

○2002 年度から 2018 年度における底質についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注 1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	14	12	570	nd	6 [2]	149/189	56/63
	2003	19	18	1,000	nd	2 [0.6]	178/186	60/62
	2004	10	10	390	nd	2 [0.6]	170/189	62/63
	2005	8.4	7.1	500	nd	1.4 [0.5]	173/189	62/63
	2006	10	9.3	330	nd	1.9 [0.6]	184/192	64/64
	2007	7.5	6.7	330	nd	1.8 [0.6]	172/192	60/64
	2008	6	6	370	nd	3 [1]	153/192	56/64
	2009	8.9	7.8	540	nd	0.5 [0.2]	180/192	64/64
	2018	3.7	3.8	270	nd	1.6 [0.6]	50/61	50/61

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2010 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2002 年度から 2014 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのアルドリンの検出状況

アルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	tr(1.6)	nd	34	nd	4.2 [1.4]	12/38	4/8
	2003	tr(1.7)	tr(0.85)	51	nd	2.5 [0.84]	15/30	3/6
	2004	tr(2.5)	tr(1.6)	46	nd	4.0 [1.3]	16/31	4/7
	2005	tr(1.8)	nd	84	nd	3.5 [1.2]	11/31	3/7
	2006	tr(2)	nd	19	nd	4 [2]	11/31	3/7
	2007	tr(2)	nd	26	nd	5 [2]	5/31	2/7
	2008	tr(2)	nd	20	nd	5 [2]	5/31	3/7
	2009	tr(1.6)	tr(0.8)	89	nd	2.1 [0.8]	16/31	6/7
	2014	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.7]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	nd	nd	tr(2.0)	nd	4.2 [1.4]	1/70	1/14
	2003	nd	nd	tr(1.9)	nd	2.5 [0.84]	16/70	7/14
	2004	nd	nd	tr(2.4)	nd	4.0 [1.3]	5/70	2/14
	2005	nd	nd	6.4	nd	3.5 [1.2]	11/80	5/16
	2006	nd	nd	tr(2)	nd	4 [2]	2/80	2/16
	2007	nd	nd	tr(2)	nd	5 [2]	2/80	2/16
	2008	nd	nd	tr(2)	nd	5 [2]	1/85	1/17
	2009	nd	nd	3.1	nd	2.1 [0.8]	22/90	7/18
	2014	nd	nd	2.4	nd	1.8 [0.7]	4/19	4/19
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	nd	nd	nd	nd	4.2 [1.4]	0/10	0/2
	2003	nd	nd	nd	nd	2.5 [0.84]	0/10	0/2
	2004	nd	nd	nd	nd	4.0 [1.3]	0/10	0/2
	2005	nd	nd	nd	nd	3.5 [1.2]	0/10	0/2
	2006	nd	nd	nd	nd	4 [2]	0/10	0/2
	2007	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	2008	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	2009	nd	nd	nd	nd	2.1 [0.8]	0/10	0/2
	2014	nd	---	nd	nd	1.8 [0.7]	0/2	0/2

(注1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の 2014 年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。


(注3) 2010 年度から 2013 年度は調査を実施していない。

< 大気 >

○2002 年度から 2014 年度における大気についてのアルドリンの検出状況


アルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	tr(0.030)	nd	3.2	nd	0.060 [0.020]	41/102	19/34
	2003 温暖期	1.5	1.9	28	nd	0.023 [0.0077]	34/35	34/35
	2003 寒冷期	0.55	0.44	6.9	0.030		34/34	34/34
	2004 温暖期	tr(0.12)	nd	14	nd	0.15 [0.05]	15/37	15/37
	2004 寒冷期	tr(0.08)	nd	13	nd		14/37	14/37
	2005 温暖期	0.33	0.56	10	nd	0.08 [0.03]	29/37	29/37
	2005 寒冷期	tr(0.04)	nd	1.8	nd		9/37	9/37
	2006 温暖期	0.30	0.35	8.5	nd	0.14 [0.05]	31/37	31/37
	2006 寒冷期	tr(0.05)	nd	1.1	nd		16/37	16/37
	2007 温暖期	0.58	0.48	19	nd	0.05 [0.02]	35/36	35/36
	2007 寒冷期	0.14	0.15	2.1	nd		34/36	34/36
	2008 温暖期	0.27	0.30	9.4	tr(0.02)	0.04 [0.02]	25/25	25/25
	2008 寒冷期	0.09	0.08	1.3	nd		22/25	22/25
	2009 温暖期	0.07	nd	10	nd	0.04 [0.02]	10/25	10/25
	2009 寒冷期	tr(0.03)	nd	1.8	nd		8/24	8/24
	2014	nd	nd	17	nd	12 [4]	6/34	6/34

(注) 2010 年度から 2013 年度は調査を実施していない。



- (注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2010 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 3) 2006 年度の全域及び全ての水域並びに 2009 年度の海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。


図 3-3-1 アルドリンの水質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2010 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-3-2 アルドリンの底質の経年変化 (幾何平均値)


[3] アルドリン



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 魚類については、全ての年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。
 (注 3) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2009 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 4) 2010 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 5) 2014 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-3-3 アルドリンの生物の経年変化（幾何平均値）

[3] アルドリン



- (注 1) 2010 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2014 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-3-4 アルドリンの大気の経年変化（幾何平均値）

[4] ディルドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ディルドリンの農薬としての使用は、1955年から1964年がピークであったといわれ、1971年に農薬取締法に基づく土壌残留性農薬に指定され、1975年には同法に基づく登録が失効した。しかし、ディルドリンはその後シロアリ防除剤として使われていた。1981年10月、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs条約においては、2004年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

2001年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾で1978年度から1996年度までの毎年度と1998年度、2000年度及び2001年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」ⁱ⁾で水質は1986年度から1998年度まで、底質は1986年度から2001年度の全期間にわたって調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査においては、2002年度から2009年度の毎年度及び2011年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014年度に水質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018年度に底質の調査を実施している。

2019年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2018年度までの調査結果を示す。

・2018年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2002年度から2014年度における水質についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	42	41	940	3.3	1.8 [0.6]	114/114	38/38
	2003	57	57	510	9.7	0.7 [0.3]	36/36	36/36
	2004	55	51	430	9	2 [0.5]	38/38	38/38
	2005	39	49	630	4.5	1.0 [0.34]	47/47	47/47
	2006	36	32	800	6	3 [1]	48/48	48/48
	2007	38	36	750	3.1	2.1 [0.7]	48/48	48/48
	2008	36	37	450	3.6	1.5 [0.6]	48/48	48/48
	2009	36	32	650	2.7	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	2011	33	38	300	2.1	1.6 [0.6]	49/49	49/49
	2014	28	27	200	2.7	0.5 [0.2]	48/48	48/48

(注1) 2002年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2010年度、2012年度及び2013年度は調査を実施していない。

<底質>

○2002 年度から 2018 年度における底質についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	70	51	2,300	4	3 [1]	189/189	63/63
	2003	66	56	9,100	nd	4 [2]	184/186	62/62
	2004	65	62	3,700	tr(1.9)	3 [0.9]	189/189	63/63
	2005	61	55	4,200	tr(2)	3 [1]	189/189	63/63
	2006	61	54	1,500	tr(1.7)	2.9 [1.0]	192/192	64/64
	2007	49	40	2,700	tr(1.2)	2.7 [0.9]	192/192	64/64
	2008	48	43	2,900	tr(0.7)	1.2 [0.5]	192/192	64/64
	2009	51	47	3,000	1.1	0.8 [0.3]	192/192	64/64
	2011	47	44	2,200	tr(2)	5 [2]	64/64	64/64
	2018	33	33	860	nd	1.6 [0.6]	60/61	60/61

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2010 年度及び 2012 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

<生物>

○2002 年度から 2014 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	440	390	190,000	tr(7)	12 [4]	38/38	8/8
	2003	440	160	78,000	46	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	2004	630	270	69,000	42	31 [10]	31/31	7/7
	2005	500	140	39,000	34	9.4 [3.4]	31/31	7/7
	2006	450	120	47,000	30	7 [3]	31/31	7/7
	2007	380	110	77,000	37	9 [3]	31/31	7/7
	2008	430	150	24,000	47	9 [3]	31/31	7/7
	2009	490	230	28,000	48	7 [2]	31/31	7/7
	2011	390	690	3,800	16	3 [1]	4/4	4/4
	2014	180	300	490	41	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	290	270	2,400	46	12 [4]	70/70	14/14
	2003	220	200	1,000	29	4.8 [1.6]	70/70	14/14
	2004	250	230	2,800	tr(23)	31 [10]	70/70	14/14
	2005	230	250	1,400	21	9.4 [3.4]	80/80	16/16
	2006	230	220	1,400	19	7 [3]	80/80	16/16
	2007	250	210	1,900	23	9 [3]	80/80	16/16
	2008	240	240	1,300	15	9 [3]	85/85	17/17
	2009	240	190	1,400	29	7 [2]	90/90	18/18
	2011	270	340	1,100	17	3 [1]	18/18	18/18
	2014	270	310	1,000	27	3 [1]	19/19	19/19
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	1,100	1,100	1,700	820	12 [4]	10/10	2/2
	2003	1,300	1,400	2,200	790	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	2004	600	610	960	370	31 [10]	10/10	2/2
	2005	830	740	1,800	500	9.4 [3.4]	10/10	2/2
	2006	700	690	1,300	440	7 [3]	10/10	2/2
	2007	710	710	910	560	9 [3]	10/10	2/2
	2008	680	620	1,300	260	9 [3]	10/10	2/2
	2009	470	420	890	330	7 [2]	10/10	2/2
	2011	---	---	770	770	3 [1]	1/1	1/1
	2014	320	---	530	190	3 [1]	2/2	2/2

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2014 年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2010 年度、2012 年度及び 2013 年度は調査を実施していない。


<大気>

○2002 年度から 2014 年度における大気についてのディルドリンの検出状況

ディルドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	5.6	5.4	110	0.73	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	2003 温暖期	19	22	260	2.1	2.1 [0.70]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	5.7	5.2	110	tr(0.82)		34/34	34/34
	2004 温暖期	17	22	280	1.1	0.33 [0.11]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	5.5	6.9	76	0.81		37/37	37/37
	2005 温暖期	14	12	200	1.5	0.54 [0.24]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	3.9	3.6	50	0.88		37/37	37/37
	2006 温暖期	15	14	290	1.5	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	4.5	4.2	250	0.7		37/37	37/37
	2007 温暖期	19	22	310	1.3	0.18 [0.07]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	4.5	3.7	75	0.96		36/36	36/36
	2008 温暖期	14	16	220	1.6	0.24 [0.09]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	4.9	3.8	72	0.68		37/37	37/37
	2009 温暖期	13	13	150	0.91	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	4.5	4.0	80	0.52		37/37	37/37
	2011 温暖期	12	15	230	0.80	0.42 [0.14]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	4.3	4.9	96	0.52		37/37	37/37
	2014	11	9.9	160	0.89	0.34 [0.11]	36/36	36/36

(注) 2010 年度、2012 年度及び 2013 年度は調査を実施していない。


[4] デイルドリン



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-4-1 デイルドリンの水質の経年変化 (幾何平均値)


[4] デイルドリン



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-4-2 デイルドリンの底質の経年変化 (幾何平均値)


[4] デイルドリン



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2011 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-4-3 デイルドリンの生物の経年変化（幾何平均値）

[4] デイルドリン



(注) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-4-4 デイルドリンの大気の経年変化（幾何平均値）

[5] エンドリン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

エンドリンは、殺虫剤、殺鼠剤として利用されたが、1975年に農薬取締法に基づく登録は失効し、1981年10月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs条約においては、2004年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

2001年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾で1978年度から1989年度並びに1991年度及び1993年度にて生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査している。

2002年度以降のモニタリング調査においては、2002年度から2009年度の毎年度及び2011年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014年度は水質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018年度に底質の調査を実施している。

2019年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2018年度までの調査結果を示す。

・2018年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2002年度から2014年度における水質についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	tr(4.8)	tr(5.5)	31	nd	6.0 [2.0]	101/114	36/38
	2003	5.7	6.0	78	0.7	0.7 [0.3]	36/36	36/36
	2004	7	7	100	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	2005	4.0	4.5	120	nd	1.1 [0.4]	45/47	45/47
	2006	3.1	3.5	26	nd	1.3 [0.4]	44/48	44/48
	2007	3.5	3.4	25	nd	1.9 [0.6]	46/48	46/48
	2008	3	4	20	nd	3 [1]	45/48	45/48
	2009	2.0	2.3	67	nd	0.7 [0.3]	39/49	39/49
	2011	3.8	4.6	71	nd	1.6 [0.6]	47/49	47/49
	2014	2.5	2.2	25	tr(0.4)	0.5 [0.2]	48/48	48/48

(注1) 2002年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2010年度、2012年度及び2013年度は調査を実施していない。

<底質>

○2002年度から2018年度における底質についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	10	10	19,000	nd	6 [2]	141/189	54/63
	2003	12	11	29,000	nd	5 [2]	150/186	53/62
	2004	15	13	6,900	nd	3 [0.9]	182/189	63/63
	2005	12	11	19,000	nd	2.6 [0.9]	170/189	61/63
	2006	12	10	61,000	nd	4 [1]	178/192	63/64
	2007	11	9	61,000	nd	5 [2]	151/192	55/64
	2008	11	11	38,000	nd	1.9 [0.7]	168/192	61/64
	2009	9.6	8.4	11,000	nd	1.6 [0.6]	168/192	63/64
	2011	8.8	14	1,100	nd	1.1 [0.4]	59/64	59/64
	2018	6.4	5.9	7,500	nd	2.4 [0.9]	48/61	48/61

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2010年度、2012年度から2017年度は調査を実施していない。

<生物>

○2002年度から2014年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	42	27	12,000	nd	18 [6]	35/38	7/8
	2003	38	21	5,000	6.3	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	2004	65	25	4,600	tr(5.7)	12 [4.2]	31/31	7/7
	2005	39	19	2,100	nd	17 [5.5]	27/31	7/7
	2006	40	15	3,100	tr(5)	11 [4]	31/31	7/7
	2007	28	12	3,000	tr(6)	9 [3]	31/31	7/7
	2008	30	10	1,500	tr(6)	8 [3]	31/31	7/7
	2009	38	19	1,400	tr(5)	7 [3]	31/31	7/7
	2011	33	62	110	tr(3)	4 [2]	4/4	4/4
	2014	23	17	84	8	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	20	24	180	nd	18 [6]	54/70	13/14
	2003	14	10	180	nd	4.8 [1.6]	67/70	14/14
	2004	18	24	220	nd	12 [4.2]	57/70	13/14
	2005	19	tr(16)	2,100	nd	17 [5.5]	58/80	12/16
	2006	13	tr(10)	150	nd	11 [4]	66/80	16/16
	2007	13	12	170	nd	9 [3]	69/80	15/16
	2008	11	10	200	nd	8 [3]	63/85	14/17
	2009	17	12	270	nd	7 [3]	86/90	18/18
	2011	18	19	160	nd	4 [2]	16/18	16/18
	2014	16	16	140	nd	3 [1]	18/19	18/19
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	28	52	99	nd	18 [6]	7/10	2/2
	2003	22	30	96	5.4	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	2004	tr(11)	25	62	nd	12 [4.2]	5/10	1/2
	2005	18	28	64	nd	17 [5.5]	7/10	2/2
	2006	16	23	57	tr(4)	11 [4]	10/10	2/2
	2007	17	28	55	nd	9 [3]	9/10	2/2
	2008	10	26	83	nd	8 [3]	5/10	1/2
	2009	11	17	43	tr(3)	7 [3]	10/10	2/2
	2011	---	---	tr(3)	tr(3)	4 [2]	1/1	1/1
	2014	4	---	5	4	3 [1]	2/2	2/2

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2014年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2010年度、2012年度及び2013年度は調査を実施していない。


<大気>

○2002年度から2014年度における大気についてのエンドリンの検出状況

エンドリン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	0.22	0.28	2.5	nd	0.090 [0.030]	90/102	32/34
	2003 温暖期	0.74	0.95	6.2	0.081	0.042 [0.014]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.23	0.20	2.1	0.042		34/34	34/34
	2004 温暖期	0.64	0.68	6.5	tr(0.054)	0.14 [0.048]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	0.23	0.26	1.9	nd		36/37	36/37
	2005 温暖期	tr(0.4)	tr(0.3)	2.9	nd	0.5 [0.2]	27/37	27/37
	2005 寒冷期	nd	nd	0.7	nd		8/37	8/37
	2006 温暖期	0.31	0.32	5.4	nd	0.30 [0.10]	32/37	32/37
	2006 寒冷期	nd	nd	5.0	nd		7/37	7/37
	2007 温暖期	0.69	0.73	6.3	tr(0.06)	0.09 [0.04]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.16	0.13	1.5	nd		33/36	33/36
	2008 温暖期	0.53	0.68	4.6	tr(0.06)	0.10 [0.04]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.18	0.18	1.8	nd		35/37	35/37
	2009 温暖期	0.49	0.51	3.4	nd	0.09 [0.04]	36/37	36/37
	2009 寒冷期	0.17	0.15	1.8	nd		36/37	36/37
	2011 温暖期	0.46	0.62	5.1	nd	0.09 [0.04]	34/35	34/35
	2011 寒冷期	0.16	0.16	1.8	nd		33/37	33/37
	2014	0.39	0.48	2.9	nd	0.20 [0.07]	32/36	32/36

(注) 2010年度、2012年度及び2013年度は調査を実施していない。

[5] エンドリン




(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-5-1 エンドリンの水質の経年変化（幾何平均値）

[5] エンドリン




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-5-2 エンドリンの底質の経年変化（幾何平均値）


[5] エンドリン



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-5-3 エンドリンの生物の経年変化（幾何平均値）

[5] エンドリン



(注 1) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2005 年度及び 2006 年度の寒冷期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-5-4 エンドリンの大気の大気経年変化（幾何平均値）

[6] DDT 類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

DDT は、ヘキサクロロシクロヘキサン（HCH）やドリン類とともに多用された殺虫剤である。1971 年に農薬取締法に基づく登録は失効し、1981 年 10 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に *p,p'*-DDT が指定されている。また、POPs 条約においては、2004 年に条約が発効された当初から DDT が条約対象物質に指定されている。

DDT には芳香環に置換している塩素の位置によっていくつかの異性体があるが、継続的調査においては、殺虫剤の主な有効成分である *p,p'*-DDT に加えて *o,p'*-DDT を、また、DDT の環境中での分解産物である *p,p'*-DDE、*o,p'*-DDE、*p,p'*-DDD 及び *o,p'*-DDD も含めて 1978 年度からモニタリング調査を実施している。

2001 年度以前の継続的調査において、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD は「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ で 1978 年度から 2001 年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施し、「水質・底質モニタリング」ⁱ⁾ で水質は 1986 年度から 1998 年度まで、底質は 1986 年度から 2001 年度の全期間にわたって調査を実施している。また、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD は「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ で 1978 年度から 1996 年度の毎年と 1998 年度、2000 年度及び 2001 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査においては、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD について、2002 年度から 2010 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2013 年度も生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014 年度に水質及び底質の調査を、2015 年度に大気の調査を、2018 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2021 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。実施している。

2022 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2021 年度までの調査結果を示す。

・2021 年度までの調査結果（参考）

【*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD】

<水質>

○2002 年度から 2021 年度における水質についての *p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE 及び *p,p'*-DDD の検出状況

<i>p,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	13	11	440	0.25	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	2003	14	12	740	tr(2.8)	3 [0.9]	36/36	36/36
	2004	15	14	310	nd	6 [2]	36/38	36/38
	2005	8	9	110	1.0	4 [1]	47/47	47/47
	2006	9.1	9.2	170	tr(1.6)	1.9 [0.6]	48/48	48/48
	2007	7.3	9.1	670	nd	1.7 [0.6]	46/48	46/48
	2008	11	11	1,200	nd	1.2 [0.5]	47/48	47/48
	2009	9.2	8.4	440	0.81	0.15 [0.06]	49/49	49/49
	2010	8.5	7.6	7,500	tr(1.0)	2.4 [0.8]	49/49	49/49
	2014	4.4	3.9	380	nd	0.4 [0.1]	47/48	47/48
	2021	2.6	2.7	190	nd	0.8 [0.3]	42/47	42/47

p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	25	26	760	1.3	0.6 [0.2]	114/114	38/38
	2003	26	22	380	5	4 [2]	36/36	36/36
	2004	36	34	680	tr(6)	8 [3]	38/38	38/38
	2005	26	24	410	4.0	6 [2]	47/47	47/47
	2006	24	24	170	tr(4)	7 [2]	48/48	48/48
	2007	22	23	440	tr(2)	4 [2]	48/48	48/48
	2008	27	28	350	2.5	1.1 [0.4]	48/48	48/48
	2009	23	23	240	3.4	1.1 [0.4]	49/49	49/49
	2010	14	12	1,600	2.4	2.3 [0.8]	49/49	49/49
	2014	16	17	610	1.9	0.5 [0.2]	48/48	48/48
	2021	9.2	8.0	170	0.9	0.3 [0.1]	47/47	47/47
p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	16	18	190	0.57	0.24 [0.08]	114/114	38/38
	2003	19	18	410	4	2 [0.5]	36/36	36/36
	2004	19	18	740	tr(2.4)	3 [0.8]	38/38	38/38
	2005	17	16	130	tr(1.8)	1.9 [0.64]	47/47	47/47
	2006	16	17	99	2.0	1.6 [0.5]	48/48	48/48
	2007	15	12	150	tr(1.5)	1.7 [0.6]	48/48	48/48
	2008	22	20	850	2.0	0.6 [0.2]	48/48	48/48
	2009	14	13	140	1.4	0.4 [0.2]	49/49	49/49
	2010	12	10	970	1.6	0.20 [0.08]	49/49	49/49
	2014	9.0	8.7	87	1.0	1.0 [0.4]	48/48	48/48
	2021	6.3	6.1	87	0.9	0.8 [0.3]	47/47	47/47

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2011 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2020 年度は調査を実施していない。

(注 3) p,p' -DDT の 2002 年度における最小値は、定量[検出]下限値が 0.06 [0.02]pg/L において測定されたものである。

(注 4) p,p' -DDT 及び p,p' -DDE の 2005 年度における最小値は、他の 46 検体とは異なり、大量採水装置を用いて採取され、定量[検出]下限値が 0.3 [0.1]pg/L (p,p' -DDT) 又は 0.5 [0.2]pg/L (p,p' -DDE) においてそれぞれ測定されたものである。

<底質>

○2002 年度から 2021 年度における底質についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	380	240	97,000	tr(5)	6 [2]	189/189	63/63
	2003	290	220	55,000	3	2 [0.4]	186/186	62/62
	2004	460	230	98,000	7	2 [0.5]	189/189	63/63
	2005	360	230	1,700,000	5.1	1.0 [0.34]	189/189	63/63
	2006	310	240	130,000	4.5	1.4 [0.5]	192/192	64/64
	2007	210	150	130,000	3	1.3 [0.5]	192/192	64/64
	2008	270	180	1,400,000	4.8	1.2 [0.5]	192/192	64/64
	2009	250	170	2,100,000	1.9	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	2010	230	200	220,000	9.3	2.8 [0.9]	64/64	64/64
	2014	140	140	12,000	tr(0.2)	0.4 [0.2]	63/63	63/63
	2021	110	100	17,000	3.8	0.4 [0.2]	60/60	60/60
p,p' -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	780	630	23,000	8.4	2.7 [0.9]	189/189	63/63
	2003	790	780	80,000	9.5	0.9 [0.3]	186/186	62/62
	2004	720	700	39,000	8	3 [0.8]	189/189	63/63
	2005	710	730	64,000	8.4	2.7 [0.94]	189/189	63/63
	2006	710	820	49,000	5.8	1.0 [0.3]	192/192	64/64
	2007	670	900	61,000	3.2	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	2008	920	940	96,000	9.0	1.7 [0.7]	192/192	64/64
	2009	700	660	50,000	6.7	0.8 [0.3]	192/192	64/64
	2010	680	790	40,000	11	5 [2]	64/64	64/64
	2014	530	610	64,000	11	1.8 [0.6]	63/63	63/63
	2021	350	360	25,000	8.7	0.7 [0.3]	60/60	60/60

p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	640	690	51,000	tr(2.2)	2.4 [0.8]	189/189	63/63
	2003	670	580	32,000	3.7	0.9 [0.3]	186/186	62/62
	2004	650	550	75,000	4	2 [0.7]	189/189	63/63
	2005	600	570	210,000	5.2	1.7 [0.64]	189/189	63/63
	2006	560	540	53,000	2.2	0.7 [0.2]	192/192	64/64
	2007	520	550	80,000	3.5	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	2008	740	660	300,000	2.8	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	2009	540	560	300,000	3.9	0.4 [0.2]	192/192	64/64
	2010	510	510	78,000	4.4	1.4 [0.5]	64/64	64/64
	2014	330	410	21,000	4.9	4.2 [1.4]	63/63	63/63
	2021	210	240	8,600	1.9	0.5 [0.2]	60/60	60/60

(注1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2011 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2020 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2002 年度から 2021 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	200	200	1,200	38	4.2 [1.4]	38/38	8/8
	2003	290	290	1,800	49	11 [3.5]	30/30	6/6
	2004	360	340	2,600	48	3.2 [1.1]	31/31	7/7
	2005	240	170	1,300	66	5.1 [1.7]	31/31	7/7
	2006	250	220	1,100	56	6 [2]	31/31	7/7
	2007	240	150	1,200	49	5 [2]	31/31	7/7
	2008	160	100	1,400	12	5 [2]	31/31	7/7
	2009	240	170	9,600	46	3 [1]	31/31	7/7
	2010	180	280	470	43	3 [1]	6/6	6/6
	2013	190	210	890	46	3.3 [1.1]	5/5	5/5
	2018	70	39	280	32	3 [1]	3/3	3/3
	2021	70	29	420	28	6 [2]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	430	450	24,000	6.8	4.2 [1.4]	70/70	14/14
	2003	220	400	1,900	tr(3.7)	11 [3.5]	70/70	14/14
	2004	410	330	53,000	5.5	3.2 [1.1]	70/70	14/14
	2005	280	330	8,400	tr(3.8)	5.1 [1.7]	80/80	16/16
	2006	300	340	3,000	tr(5)	6 [2]	80/80	16/16
	2007	260	320	1,800	9	5 [2]	80/80	16/16
	2008	280	310	2,900	7	5 [2]	85/85	17/17
	2009	250	300	2,000	4	3 [1]	90/90	18/18
	2010	240	280	2,100	7	3 [1]	18/18	18/18
	2013	280	250	3,300	5.2	3.3 [1.1]	19/19	19/19
	2018	150	150	4,800	tr (2)	3 [1]	18/18	18/18
	2021	120	170	1,500	nd	6 [2]	17/18	17/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	440	510	1,300	76	4.2 [1.4]	10/10	2/2
	2003	610	620	1,400	180	11 [3.5]	10/10	2/2
	2004	340	320	700	160	3.2 [1.1]	10/10	2/2
	2005	430	550	900	180	5.1 [1.7]	10/10	2/2
	2006	580	490	1,800	110	6 [2]	10/10	2/2
	2007	480	350	1,900	160	5 [2]	10/10	2/2
	2008	160	170	270	56	5 [2]	10/10	2/2
	2009	300	190	2,900	85	3 [1]	10/10	2/2
	2010	3	---	15	nd	3 [1]	1/2	1/2
	2013	14	---	46	4.3	3.3 [1.1]	2/2	2/2
	2018	43	---	63	29	3[1]	2/2	2/2
	2021	59	---	120	29	6 [2]	2/2	2/2

<i>p,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	1,000	1,700	6,000	140	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	2003	1,200	1,000	6,500	190	5.7 [1.9]	30/30	6/6
	2004	1,300	1,400	8,400	220	8.2 [2.7]	31/31	7/7
	2005	1,200	1,600	6,600	230	8.5 [2.8]	31/31	7/7
	2006	1,000	1,200	6,000	160	1.9 [0.7]	31/31	7/7
	2007	1,100	1,200	5,600	180	3 [1]	31/31	7/7
	2008	900	1,100	5,800	120	3 [1]	31/31	7/7
	2009	940	1,100	6,400	150	4 [1]	31/31	7/7
	2010	1,100	1,300	6,300	230	3 [1]	6/6	6/6
	2013	790	1,600	3,000	170	4.3 [1.4]	5/5	5/5
	2018	420	230	2,200	150	3 [1]	3/3	3/3
	2021	240	160	960	88	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	2,900	2,200	98,000	510	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	2003	2,000	2,200	12,000	180	5.7 [1.9]	70/70	14/14
	2004	3,000	2,100	52,000	390	8.2 [2.7]	70/70	14/14
	2005	2,400	2,400	73,000	230	8.5 [2.8]	80/80	16/16
	2006	2,200	2,600	28,000	280	1.9 [0.7]	80/80	16/16
	2007	2,200	2,000	22,000	160	3 [1]	80/80	16/16
	2008	2,500	2,000	53,000	320	3 [1]	85/85	17/17
	2009	2,300	2,100	20,000	260	4 [1]	90/90	18/18
	2010	2,300	2,100	13,000	260	3 [1]	18/18	18/18
	2013	2,900	2,800	16,000	430	4.3 [1.4]	19/19	19/19
	2018	1,900	1,700	16,000	290	3 [1]	18/18	18/18
	2021	2,000	2,600	8,500	230	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	36,000	60,000	170,000	8,100	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	2003	66,000	76,000	240,000	18,000	5.7 [1.9]	10/10	2/2
	2004	34,000	65,000	200,000	6,800	8.2 [2.7]	10/10	2/2
	2005	44,000	86,000	300,000	7,100	8.5 [2.8]	10/10	2/2
	2006	38,000	57,000	160,000	5,900	1.9 [0.7]	10/10	2/2
	2007	40,000	56,000	320,000	6,700	3 [1]	10/10	2/2
	2008	51,000	79,000	160,000	7,500	3 [1]	10/10	2/2
	2009	30,000	64,000	220,000	4,300	4 [1]	10/10	2/2
	2010	32,000	---	160,000	6,300	3 [1]	2/2	2/2
	2013	170,000	---	170,000	170,000	4.3 [1.4]	2/2	2/2
	2018	80,000	---	290,000	22,000	3 [1]	2/2	2/2
	2021	80,000	---	100,000	64,000	3 [1]	2/2	2/2
<i>p,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	340	710	3,200	11	5.4 [1.8]	38/38	8/8
	2003	390	640	2,600	tr(7.5)	9.9 [3.3]	30/30	6/6
	2004	440	240	8,900	7.8	2.2 [0.70]	31/31	7/7
	2005	370	800	1,700	13	2.9 [0.97]	31/31	7/7
	2006	300	480	1,400	7.3	2.4 [0.9]	31/31	7/7
	2007	310	360	1,500	7	3 [1]	31/31	7/7
	2008	280	280	1,300	6	3 [1]	31/31	7/7
	2009	220	170	2,400	5.8	2.4 [0.9]	31/31	7/7
	2010	180	330	960	11	1.3 [0.5]	6/6	6/6
	2013	270	520	1,300	19	1.9 [0.7]	5/5	5/5
	2018	110	93	830	17	1.4 [0.6]	3/3	3/3
	2021	69	75	840	5.2	2.2 [0.9]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	750	680	14,000	80	5.4 [1.8]	70/70	14/14
	2003	510	520	3,700	43	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	2004	770	510	9,700	56	2.2 [0.70]	70/70	14/14
	2005	510	650	6,700	29	2.9 [0.97]	80/80	16/16
	2006	520	580	4,300	60	2.4 [0.9]	80/80	16/16
	2007	470	490	4,100	36	3 [1]	80/80	16/16
	2008	460	440	4,100	33	3 [1]	85/85	17/17
	2009	440	460	2,500	57	2.4 [0.9]	90/90	18/18
	2010	560	610	2,900	57	1.3 [0.5]	18/18	18/18
	2013	500	500	4,700	68	1.9 [0.7]	19/19	19/19
	2018	280	250	3,100	40	1.4 [0.6]	18/18	18/18
	2021	320	390	2,700	26	2.2 [0.9]	18/18	18/18

p,p' -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	580	740	3,900	140	5.4 [1.8]	10/10	2/2
	2003	640	860	3,900	110	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	2004	330	520	1,400	52	2.2 [0.70]	10/10	2/2
	2005	310	540	1,400	45	2.9 [0.97]	10/10	2/2
	2006	410	740	1,800	55	2.4 [0.9]	10/10	2/2
	2007	440	780	2,300	70	3 [1]	10/10	2/2
	2008	240	490	1,100	35	3 [1]	10/10	2/2
	2009	280	430	3,400	31	2.4 [0.9]	10/10	2/2
	2010	440	---	1,600	120	1.3 [0.5]	2/2	2/2
	2013	140	---	270	70	1.9 [0.7]	2/2	2/2
	2018	230	---	260	210	1.4 [0.6]	2/2	2/2
	2021	130	---	140	120	2.2 [0.9]	2/2	2/2

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2013年度及び2018年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2011年度、2012年度、2014年度から2017年度、2019年度及び2020年度は調査を実施していない。

< 大気 >

○2002年度から2021年度における大気についての p,p' -DDT、 p,p' -DDE 及び p,p' -DDD の検出状況

p,p' -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	1.9	1.8	22	0.25	0.24 [0.08]	102/102	34/34
	2003 温暖期	5.8	6.6	24	0.75	0.14 [0.046]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	1.7	1.6	11	0.31		34/34	34/34
	2004 温暖期	4.7	5.1	37	0.41	0.22 [0.074]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	1.8	1.7	13	0.29		37/37	37/37
	2005 温暖期	4.1	4.2	31	0.44	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	1.1	0.99	4.8	0.25		37/37	37/37
	2006 温暖期	4.2	3.8	51	0.35	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	1.4	1.2	7.3	0.29		37/37	37/37
	2007 温暖期	4.9	5.2	30	0.6	0.07 [0.03]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	1.2	1.2	8.8	0.23		36/36	36/36
	2008 温暖期	3.6	3.0	27	0.76	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	1.2	1.0	15	0.22		37/37	37/37
	2009 温暖期	3.6	3.6	28	0.44	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	1.1	1.0	8.0	0.20		37/37	37/37
	2010 温暖期	3.5	3.1	56	0.28	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	1.3	0.89	16	0.30		37/37	37/37
	2013 温暖期	2.8	3.6	17	0.20	0.11 [0.04]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.65	0.53	4.5	0.18		36/36	36/36
	2015	1.5	1.8	13	0.18	0.15 [0.05]	35/35	35/35
	2018	1.6	2	14	0.15	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2021	0.80	0.67	6.3	0.16	0.15 [0.06]	35/35	35/35

<i>p,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	2.8	2.7	28	0.56	0.09 [0.03]	102/102	34/34
	2003 温暖期	7.2	7.0	51	1.2	0.40 [0.13]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	2.8	2.4	22	1.1		34/34	34/34
	2004 温暖期	6.1	6.3	95	0.62	0.12 [0.039]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	2.9	2.6	43	0.85		37/37	37/37
	2005 温暖期	5.0	5.7	42	1.2	0.14 [0.034]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	1.7	1.5	9.9	0.76		37/37	37/37
	2006 温暖期	5.0	4.7	49	1.7	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	1.9	1.7	9.5	0.52		37/37	37/37
	2007 温暖期	6.4	6.1	120	0.54	0.04 [0.02]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	2.1	1.9	39	0.73		36/36	36/36
	2008 温暖期	4.8	4.4	96	0.98	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	2.2	2.0	22	0.89		37/37	37/37
	2009 温暖期	4.9	4.8	130	0.87	0.08 [0.03]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	2.1	1.9	100	0.60		37/37	37/37
	2010 温暖期	4.9	4.1	200	tr(0.41)	0.62 [0.21]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	2.2	1.8	28	tr(0.47)		37/37	37/37
	2013 温暖期	4.1	4.3	37	0.2	0.10 [0.03]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	1.6	1.5	11	0.6		36/36	36/36
	2015	2.4	2.6	34	0.31	0.12 [0.04]	35/35	35/35
	2018	2.6	2.5	49	0.31	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2021	1.6	1.4	21	0.43	0.13 [0.05]	35/35	35/35
<i>p,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	0.12	0.13	0.76	nd	0.018 [0.006]	101/102	34/34
	2003 温暖期	0.30	0.35	1.4	0.063	0.054 [0.018]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.13	0.14	0.52	tr(0.037)		34/34	34/34
	2004 温暖期	0.24	0.27	1.4	tr(0.036)	0.053 [0.018]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	0.12	0.12	0.91	tr(0.025)		37/37	37/37
	2005 温暖期	0.24	0.26	1.3	tr(0.07)	0.16 [0.05]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	tr(0.06)	tr(0.07)	0.29	nd		28/37	28/37
	2006 温暖期	0.28	0.32	1.3	nd	0.13 [0.04]	36/37	36/37
	2006 寒冷期	0.14	tr(0.12)	0.99	nd		36/37	36/37
	2007 温暖期	0.26	0.27	1.4	0.046	0.011 [0.004]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.093	0.087	0.5	0.026		36/36	36/36
	2008 温暖期	0.17	0.17	1.1	0.037	0.025 [0.009]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.091	0.081	0.31	0.036		37/37	37/37
	2009 温暖期	0.17	0.18	0.82	0.03	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.08	0.08	0.35	tr(0.02)		37/37	37/37
	2010 温暖期	0.20	0.17	1.7	0.04	0.02 [0.01]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.10	0.09	0.41	0.02		37/37	37/37
	2013 温暖期	0.16	0.18	0.80	0.027	0.018 [0.007]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.056	0.054	0.14	tr(0.015)		36/36	36/36
	2015	nd	nd	tr(0.31)	nd	0.33 [0.11]	17/35	17/35
	2018	0.13	0.16	0.72	nd	0.07 [0.03]	36/37	36/37
	2021	tr(0.05)	tr(0.05)	0.18	nd	0.13 [0.05]	18/35	185/35

(注) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

【*o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD】

< 水質 >

○2002 年度から 2021 年度における水質についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	5.4	4.6	77	0.19	1.2 [0.4]	114/114	38/38
	2003	6	5	100	tr(1.5)	3 [0.7]	36/36	36/36
	2004	5	5	85	nd	5 [2]	29/38	29/38
	2005	3	3	39	nd	3 [1]	42/47	42/47
	2006	2.8	2.4	52	0.51	2.3 [0.8]	48/48	48/48
	2007	tr(2.1)	tr(2.2)	86	nd	2.5 [0.8]	38/48	38/48
	2008	3.1	3.0	230	nd	1.4 [0.5]	44/48	44/48
	2009	2.4	2.4	100	0.43	0.16 [0.06]	49/49	49/49
	2010	1.5	tr(1.2)	700	nd	1.5 [0.5]	43/49	43/49
	2014	1.0	1.0	63	nd	0.4 [0.2]	42/48	42/48
	2021	tr(0.6)	tr(0.5)	33	nd	0.9 [0.3]	30/47	30/47
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	2.4	2.1	680	nd	0.9 [0.3]	113/114	38/38
	2003	2.2	2.0	170	tr(0.42)	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2004	3	2	170	tr(0.6)	2 [0.5]	38/38	38/38
	2005	2.5	2.1	410	0.4	1.2 [0.4]	47/47	47/47
	2006	tr(1.6)	tr(1.4)	210	nd	2.6 [0.9]	28/48	28/48
	2007	tr(1.5)	tr(1.1)	210	nd	2.3 [0.8]	29/48	29/48
	2008	1.5	1.8	260	nd	0.7 [0.3]	39/48	39/48
	2009	1.3	1.1	140	nd	0.22 [0.09]	47/49	47/49
	2010	0.97	0.65	180	tr(0.13)	0.24 [0.09]	49/49	49/49
	2014	0.6	0.6	560	nd	0.3 [0.1]	36/48	36/48
	2021	tr(0.5)	tr(0.4)	92	nd	0.6 [0.2]	32/47	32/47
<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	5.6	6.0	110	nd	0.60 [0.20]	113/114	38/38
	2003	7.1	5.0	160	1.1	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2004	6	5	81	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	2005	5.2	5.4	51	tr(0.5)	1.2 [0.4]	47/47	47/47
	2006	2.5	3.3	39	nd	0.8 [0.3]	40/48	40/48
	2007	4.6	3.9	41	tr(0.3)	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2008	6.7	7.2	170	nd	0.8 [0.3]	47/48	47/48
	2009	4.4	3.8	41	0.44	0.22 [0.09]	49/49	49/49
	2010	4.6	3.8	170	tr(0.5)	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	2014	3.7	3.2	38	0.33	0.20 [0.08]	48/48	48/48
	2021	3.5	3.7	54	tr(0.3)	0.5 [0.2]	47/47	47/47

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2011 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2020 年度は調査を実施していない。

(注 3) *o,p'*-DDT の 2002 年度における最小値は、定量[検出]下限値が 0.12 [0.04]pg/L において測定されたものである。

(注 4) *o,p'*-DDT の 2006 年度における最小値及び *o,p'*-DDE の 2005 年度における最小値は、他の検体とは異なり、大量採水装置を用いて採取され、*o,p'*-DDT の 2006 年度の定量[検出]下限値が 0.09 [0.03]pg/L において、*o,p'*-DDE の 2005 年度の定量[検出]下限値が 0.10 [0.03]pg/L においてそれぞれ測定されたものである。

<底質>

○2002 年度から 2021 年度における底質についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	76	47	27,000	nd	6 [2]	183/189	62/63
	2003	50	43	3,200	nd	0.8 [0.3]	185/186	62/62
	2004	69	50	17,000	tr(1.1)	2 [0.6]	189/189	63/63
	2005	58	46	160,000	0.8	0.8 [0.3]	189/189	63/63
	2006	57	52	18,000	tr(0.8)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	2007	38	31	27,000	nd	1.8 [0.6]	186/192	63/64
	2008	51	40	140,000	tr(0.7)	1.5 [0.6]	192/192	64/64
	2009	44	30	100,000	nd	1.2 [0.5]	190/192	64/64
	2010	40	33	13,000	1.4	1.1 [0.4]	64/64	64/64
	2014	26	24	2,400	nd	0.4 [0.2]	62/63	62/63
	2021	19	20	3,200	nd	0.4 [0.2]	58/60	58/60
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	54	37	16,000	nd	3 [1]	188/189	63/63
	2003	48	39	24,000	tr(0.5)	0.6 [0.2]	186/186	62/62
	2004	40	34	28,000	nd	3 [0.8]	184/189	63/63
	2005	40	32	31,000	nd	2.6 [0.9]	181/189	62/63
	2006	42	40	27,000	tr(0.4)	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	2007	37	41	25,000	nd	1.2 [0.4]	186/192	63/64
	2008	50	48	37,000	nd	1.4 [0.6]	186/192	63/64
	2009	37	31	33,000	nd	0.6 [0.2]	191/192	64/64
	2010	37	32	25,000	tr(0.7)	1.2 [0.5]	64/64	64/64
	2014	30	32	41,000	tr(0.5)	0.8 [0.3]	63/63	63/63
	2021	19	14	16,000	nd	0.5 [0.2]	59/60	59/60
<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	160	150	14,000	nd	6 [2]	184/189	62/63
	2003	160	130	8,800	tr(1.0)	2 [0.5]	186/186	62/62
	2004	140	120	16,000	tr(0.7)	2 [0.5]	189/189	63/63
	2005	130	110	32,000	tr(0.8)	1.0 [0.3]	189/189	63/63
	2006	120	110	13,000	tr(0.3)	0.5 [0.2]	192/192	64/64
	2007	110	130	21,000	tr(0.5)	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	2008	170	150	50,000	0.5	0.3 [0.1]	192/192	64/64
	2009	120	120	24,000	0.5	0.5 [0.2]	192/192	64/64
	2010	130	130	6,900	tr(0.8)	0.9 [0.4]	64/64	64/64
	2014	74	85	3,200	tr(0.7)	1.2 [0.5]	63/63	63/63
	2021	64	66	2,500	0.4	0.4 [0.2]	60/60	60/60

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2011 年度から 2013 年度及び 2015 年度から 2020 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2002 年度から 2021 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	110	83	480	22	12 [4]	38/38	8/8
	2003	130	120	480	35	2.9 [0.97]	30/30	6/6
	2004	160	140	910	20	1.8 [0.61]	31/31	7/7
	2005	98	57	440	29	2.6 [0.86]	31/31	7/7
	2006	92	79	380	24	3 [1]	31/31	7/7
	2007	79	52	350	20	3 [1]	31/31	7/7
	2008	58	37	330	5	3 [1]	31/31	7/7
	2009	74	48	2,500	17	2.2 [0.8]	31/31	7/7
	2010	51	67	160	15	3 [1]	6/6	6/6
	2013	49	51	180	12	3 [1]	5/5	5/5
	2018	24	12	120	10	2.7 [0.9]	3/3	3/3
	2021	20	10	93	8	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	130	130	2,300	tr(6)	12 [4]	70/70	14/14
	2003	85	120	520	2.9	2.9 [0.97]	70/70	14/14
	2004	160	140	1,800	3.7	1.8 [0.61]	70/70	14/14
	2005	100	110	1,500	5.8	2.6 [0.86]	80/80	16/16
	2006	100	110	700	6	3 [1]	80/80	16/16
	2007	69	90	430	3	3 [1]	80/80	16/16
	2008	72	92	720	3	3 [1]	85/85	17/17
	2009	61	73	470	2.4	2.2 [0.8]	90/90	18/18
	2010	58	71	550	5	3 [1]	18/18	18/18
	2013	58	76	310	4	3 [1]	19/19	19/19
	2018	34	34	1,500	tr(1.1)	2.7 [0.9]	18/18	18/18
	2021	24	32	70	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	12	tr(10)	58	nd	12 [4]	8/10	2/2
	2003	24	16	66	8.3	2.9 [0.97]	10/10	2/2
	2004	8.5	13	43	tr(0.87)	1.8 [0.61]	10/10	2/2
	2005	11	14	24	3.4	2.6 [0.86]	10/10	2/2
	2006	14	10	120	3	3 [1]	10/10	2/2
	2007	9	9	26	tr(2)	3 [1]	10/10	2/2
	2008	4	6	16	nd	3 [1]	8/10	2/2
	2009	6.3	7.6	12	tr(1.4)	2.2 [0.8]	10/10	2/2
	2010	nd	---	nd	nd	3 [1]	0/2	0/2
	2013	nd	---	tr(1)	nd	3 [1]	1/2	1/2
	2018	tr(1.1)	---	tr(2.5)	nd	2.7 [0.9]	1/2	1/2
	2021	tr(2)	---	3	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	83	66	1,100	13	3.6 [1.2]	38/38	8/8
	2003	85	100	460	17	3.6 [1.2]	30/30	6/6
	2004	86	69	360	19	2.1 [0.69]	31/31	7/7
	2005	70	89	470	12	3.4 [1.1]	31/31	7/7
	2006	62	81	340	12	3 [1]	31/31	7/7
	2007	56	69	410	8.9	2.3 [0.9]	31/31	7/7
	2008	49	52	390	8	3 [1]	31/31	7/7
	2009	46	58	310	8	3 [1]	31/31	7/7
	2010	46	58	160	7.8	1.5 [0.6]	6/6	6/6
	2013	28	31	260	4	4 [1]	5/5	5/5
	2018	20	15	250	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3
	2021	12	8	110	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3

<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2002	91	50	13,000	3.6	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	2003	51	54	2,500	nd	3.6 [1.2]	67/70	14/14
	2004	76	48	5,800	tr(0.89)	2.1 [0.69]	70/70	14/14
	2005	54	45	12,000	tr(1.4)	3.4 [1.1]	80/80	16/16
	2006	56	43	4,800	tr(1)	3 [1]	80/80	16/16
	2007	45	29	4,400	nd	2.3 [0.9]	79/80	16/16
	2008	50	37	13,000	tr(1)	3 [1]	85/85	17/17
	2009	46	33	4,300	tr(1)	3 [1]	90/90	18/18
	2010	47	37	2,800	tr(1.2)	1.5 [0.6]	18/18	18/18
	2013	51	40	3,000	tr(1)	4 [1]	19/19	19/19
	2018	32	27	2,000	nd	3 [1]	17/18	17/18
	2021	32	32	1,600	nd	3 [1]	17/18	17/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	28	26	49	20	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	2003	tr(2.3)	tr(2.0)	4.2	nd	3.6 [1.2]	9/10	2/2
	2004	tr(1.0)	tr(1.1)	3.7	nd	2.1 [0.69]	5/10	1/2
	2005	tr(1.2)	tr(1.9)	tr(2.9)	nd	3.4 [1.1]	7/10	2/2
	2006	tr(1)	tr(2)	3	tr(1)	3 [1]	10/10	2/2
	2007	tr(1.0)	tr(1.4)	2.8	nd	2.3 [0.9]	6/10	2/2
	2008	tr(1)	nd	3	nd	3 [1]	5/10	1/2
	2009	nd	tr(1)	tr(2)	nd	3 [1]	6/10	2/2
	2010	tr(1.1)	---	3.7	nd	1.5 [0.6]	1/2	1/2
	2013	nd	---	tr(1)	nd	4 [1]	1/2	1/2
	2018	tr(1)	---	tr(1)	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
	2021	tr(1)	---	tr(1)	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	120	190	2,900	tr(9)	12 [4]	38/38	8/8
	2003	200	220	1,900	6.5	6.0 [2.0]	30/30	6/6
	2004	220	130	2,800	6.0	5.7 [1.9]	31/31	7/7
	2005	170	280	1,800	10	3.3 [1.1]	31/31	7/7
	2006	150	200	1,000	7	4 [1]	31/31	7/7
	2007	150	200	1,200	6	3 [1]	31/31	7/7
	2008	130	140	1,100	5	4 [2]	31/31	7/7
	2009	95	51	1,000	5	3 [1]	31/31	7/7
	2010	57	50	400	5.8	0.6 [0.2]	6/6	6/6
	2013	100	74	1,800	7.8	1.8 [0.7]	5/5	5/5
	2018	46	27	720	4.9	2.4 [0.9]	3/3	3/3
	2021	33	23	760	tr(2)	5 [2]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	95	90	1,100	nd	12 [4]	66/70	14/14
	2003	75	96	920	nd	6.0 [2.0]	66/70	14/14
	2004	120	96	1,700	nd	5.7 [1.9]	68/70	14/14
	2005	83	81	1,400	nd	3.3 [1.1]	79/80	16/16
	2006	80	86	1,100	tr(1)	4 [1]	80/80	16/16
	2007	66	62	1,300	nd	3 [1]	78/80	16/16
	2008	65	74	1,000	nd	4 [2]	80/85	16/17
	2009	63	64	760	nd	3 [1]	87/90	18/18
	2010	75	99	700	2.6	0.6 [0.2]	18/18	18/18
	2013	70	85	940	nd	1.8 [0.7]	18/19	18/19
	2018	40	39	1,100	nd	2.4 [0.9]	17/18	17/18
	2021	39	58	380	nd	5 [2]	17/18	17/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	15	15	23	tr(8)	12 [4]	10/10	2/2
	2003	15	14	36	tr(5.0)	6.0 [2.0]	10/10	2/2
	2004	6.1	5.7	25	nd	5.7 [1.9]	9/10	2/2
	2005	7.3	7.5	9.7	4.7	3.3 [1.1]	10/10	2/2
	2006	8	8	19	5	4 [1]	10/10	2/2
	2007	7	7	10	5	3 [1]	10/10	2/2
	2008	4	tr(3)	14	tr(2)	4 [2]	10/10	2/2
	2009	6	5	13	3	3 [1]	10/10	2/2
	2010	6.3	---	11	3.6	0.6 [0.2]	2/2	2/2
	2013	5.4	---	12	2.4	1.8 [0.7]	2/2	2/2
	2018	6.1	---	9.9	3.7	2.4 [0.9]	2/2	2/2
	2021	6	---	8	tr(4)	5 [2]	2/2	2/2

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2013 年度及び 2018 年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。


< 大気 >

○ 2002 年度から 2021 年度における大気についての *o,p'*-DDT、*o,p'*-DDE 及び *o,p'*-DDD の検出状況

<i>o,p'</i> -DDT	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	2.2	2.0	40	0.41	0.15 [0.05]	102/102	34/34
	2003 温暖期	6.9	7.7	38	0.61	0.12 [0.040]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	1.6	1.4	6.4	0.43		34/34	34/34
	2004 温暖期	5.1	5.4	22	0.54	0.093 [0.031]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	1.5	1.4	9.4	0.35		37/37	37/37
	2005 温暖期	3.0	3.1	14	0.67	0.10 [0.034]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	0.76	0.67	3.0	0.32		37/37	37/37
	2006 温暖期	2.5	2.4	20	0.55	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	0.90	0.79	3.9	0.37		37/37	37/37
	2007 温暖期	2.9	2.6	19	0.24	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.77	0.63	3.4	0.31		36/36	36/36
	2008 温暖期	2.3	2.1	18	0.33	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.80	0.62	6.5	0.32		37/37	37/37
	2009 温暖期	2.3	2.2	14	0.33	0.019 [0.008]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.80	0.71	3.7	0.20		37/37	37/37
	2010 温暖期	2.2	1.9	26	0.19	0.14 [0.05]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.81	0.69	5.5	0.22		37/37	37/37
	2013 温暖期	1.7	1.7	12	0.15	0.054 [0.018]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.47	0.44	2.4	0.20		36/36	36/36
	2015	0.99	1.2	6.8	0.14	0.12 [0.04]	35/35	35/35
	2018	1.0	1.1	6.3	0.08	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2021	0.50	0.47	3.0	0.11	0.08 [0.03]	35/35	35/35
<i>o,p'</i> -DDE	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	0.60	0.56	8.5	0.11	0.03 [0.01]	102/102	34/34
	2003 温暖期	1.4	1.5	7.5	0.17	0.020 [0.0068]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.50	0.47	1.7	0.18		34/34	34/34
	2004 温暖期	1.1	1.2	8.9	0.14	0.037 [0.012]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	0.53	0.49	3.9	0.14		37/37	37/37
	2005 温暖期	1.6	1.5	7.9	0.33	0.074 [0.024]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	0.62	0.59	2.0	0.24		37/37	37/37
	2006 温暖期	1.1	1.1	7.4	nd	0.09 [0.03]	36/37	36/37
	2006 寒冷期	0.65	0.56	2.6	0.19		37/37	37/37
	2007 温暖期	0.66	0.67	7	0.096	0.017 [0.007]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.3	0.29	3.7	0.12		36/36	36/36
	2008 温暖期	0.48	0.52	5.0	0.11	0.025 [0.009]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.30	0.24	1.1	0.15		37/37	37/37
	2009 温暖期	0.51	0.46	6.7	0.098	0.016 [0.006]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.27	0.24	23	0.072		37/37	37/37
	2010 温暖期	0.49	0.41	9.0	0.09	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.27	0.23	2.3	0.08		37/37	37/37
	2013 温暖期	0.38	0.35	3.3	0.051	0.023 [0.009]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.21	0.19	0.65	0.097		36/36	36/36
	2015	0.25	0.24	1.1	nd	0.18 [0.06]	34/35	34/35
	2018	0.24	0.26	1.2	tr(0.04)	0.05 [0.02]	37/37	37/37
	2021	0.17	0.16	0.55	nd	0.10 [0.04]	34/35	34/35


<i>o,p'</i> -DDD	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	0.14	0.18	0.85	nd	0.021 [0.007]	97/102	33/34
	2003 温暖期	0.37	0.42	1.3	0.059	0.042 [0.014]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.15	0.14	0.42	0.062		34/34	34/34
	2004 温暖期	0.31	0.33	2.6	tr(0.052)	0.14 [0.048]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	0.14	tr(0.13)	0.86	nd		35/37	35/37
	2005 温暖期	0.22	0.19	0.90	tr(0.07)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	tr(0.07)	tr(0.07)	0.21	nd		35/37	35/37
	2006 温暖期	0.28	0.28	1.4	tr(0.05)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	0.12	0.11	0.79	nd		34/37	34/37
	2007 温暖期	0.28	0.29	1.9	0.05	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.095	0.09	0.33	tr(0.03)		36/36	36/36
	2008 温暖期	0.19	0.16	1.6	0.05	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.10	0.09	0.26	0.04		37/37	37/37
	2009 温暖期	0.20	0.19	0.90	0.04	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.08	0.08	0.28	tr(0.02)		37/37	37/37
	2010 温暖期	0.21	0.19	1.8	0.04	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.10	0.09	0.48	tr(0.02)		37/37	37/37
	2013 温暖期	0.17	0.18	1.2	tr(0.03)	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.06	0.06	0.17	nd		35/36	35/36
	2015	tr(0.09)	tr(0.10)	0.37	nd	0.20 [0.07]	25/35	25/35
	2018	0.10	0.11	0.38	nd	0.07 [0.03]	36/37	36/37
	2021	tr(0.05)	tr(0.06)	0.16	nd	0.10 [0.04]	27/35	27/35

(注) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。




(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-1-1 p,p' -DDT の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-1-2 p,p' -DDT の底質の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
- (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-1-3 p,p' -DDT の生物の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-6-1-4 p,p' -DDT の大気の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-2-1 p,p' -DDE の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-2-2 p,p' -DDE の底質の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-2-3 p,p' -DDE の生物の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-6-2-4 p,p' -DDE の大気の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度及び 2015 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-3-1 p,p' -DDD の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-3-2 p,p' -DDD の底質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-6-3-3 p,p' -DDD の生物の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2015 年度の温暖期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
 (注 3) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-6-3-4 p,p' -DDD の大気の経年変化 (幾何平均値)


[6-4] *o,p'*-DDT



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-6-4-1 *o,p'*-DDT の水質の経年変化 (幾何平均値)

[6-4] *o,p'*-DDT




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-4-2 *o,p'*-DDT の底質の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
- (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-4-3 *o,p'*-DDT の生物の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-6-4-4 *o,p'*-DDT の大気の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-6-5-1 *o,p'*-DDE の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-5-2 *o,p'*-DDE の底質の経年変化 (幾何平均値)


[6-5] *o,p'*-DDE



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-5-3 *o,p'*-DDE の生物の経年変化 (幾何平均値)


[6-5] *o,p'*-DDE



- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。


図 3-6-5-4 *o,p'*-DDE の大気の経年変化 (幾何平均値)

[6-6] *o,p'*-DDD




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
(注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-6-1 *o,p'*-DDD の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
(注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-6-2 *o,p'*-DDD の底質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2010 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
- (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-6-6-3 *o,p'*-DDD の生物の経年変化（幾何平均値）



- (注 1) 2011 年度、2012 年度、2014 年度、2016 年度、2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2015 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-6-6-4 *o,p'*-DDD の大気の経年変化（幾何平均値）

[7] クロルデン類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

クロルデンは、殺虫剤として利用されたが、1968年に農薬取締法に基づく登録が失効した。しかし、クロルデン類はその後も木材加工時に用いられ、シロアリ防除のために家屋等にも使用されていた。1986年9月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定された。また、POPs条約においては、2004年に条約が発効された当初から *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンが条約対象物質に指定されている。

工業的に生産されたクロルデン類の組成は多岐にわたるが、継続的調査では、当初ヘプタクロル、 γ -クロルディーン、ヘプタクロルエポキシド、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン（クロルデン代謝物）、*cis*-ノナクロル（農薬として未登録）及び *trans*-ノナクロル（農薬として未登録）の8種類を調査対象物質とした。1983年度以降は、1982年度精密環境調査において特に検出頻度が高かった5物質（*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロル）を調査対象物質に選定し、調査を実施している。

2001年度までの継続的調査において、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾で1983年度から2001年度の全期間にわたって生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。また、「水質・底質モニタリング」ⁱ⁾で *cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルについて、水質は1986年度から1998年度まで、底質は1986年度から2001年度の全期間にわたって調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査においては、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルについて、2002年度から2013年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2016年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017年度に水質、底質の調査を、2020年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2021年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2020年度までの調査結果を示す。

・2020年度までの調査結果（参考）

【*cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデン】

<水質>

○2002年度から2020年度における水質についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	42	32	880	2.5	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	2003	69	51	920	12	3 [0.9]	36/36	36/36
	2004	92	87	1,900	10	6 [2]	38/38	38/38
	2005	53	54	510	6	4 [1]	47/47	47/47
	2006	31	26	440	5	5 [2]	48/48	48/48
	2007	23	22	680	nd	4 [2]	47/48	47/48
	2008	29	29	480	2.9	1.6 [0.6]	48/48	48/48
	2009	29	26	710	4.4	1.1 [0.4]	49/49	49/49
	2010	19	14	170	nd	11 [4]	47/49	47/49
	2011	20	16	500	3.8	1.4 [0.6]	49/49	49/49
	2012	43	37	350	10	1.6 [0.6]	48/48	48/48
	2013	18	16	260	2.9	2.7 [0.9]	48/48	48/48
	2017	19	19	210	2	2 [1]	47/47	47/47
	2020	12	10	120	tr(2)	5 [2]	46/46	46/46

<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	33	24	780	3.1	1.5 [0.5]	114/114	38/38
	2003	34	30	410	6	5 [2]	36/36	36/36
	2004	32	26	1,200	5	5 [2]	38/38	38/38
	2005	25	21	200	3	4 [1]	47/47	47/47
	2006	24	16	330	tr(4)	7 [2]	48/48	48/48
	2007	16	20	580	nd	2.4 [0.8]	47/48	47/48
	2008	23	22	420	3	3 [1]	48/48	48/48
	2009	23	18	690	3.0	0.8 [0.3]	49/49	49/49
	2010	15	tr(11)	310	nd	13 [4]	44/49	44/49
	2011	16	13	470	3.2	1.0 [0.4]	49/49	49/49
	2012	41	33	300	12	2.5 [0.8]	48/48	48/48
	2013	15	13	200	3	3 [1]	48/48	48/48
	2017	15	15	150	tr(2)	3 [1]	47/47	47/47
	2020	11	8	98	tr(3)	4 [2]	46/46	46/46

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。

(注 3) *trans*-クロルデンの 2005 年度における最小値は、他の 46 検体とは異なり、大量採水装置を用いて採取され、定量[検出]下限値が 0.3 [0.1]pg/L において測定されたものである。

<底質>

○2002 年度から 2020 年度における底質についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	140	98	18,000	1.8	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	2003	190	140	19,000	tr(3.6)	4 [2]	186/186	62/62
	2004	160	97	36,000	4	4 [2]	189/189	63/63
	2005	150	100	44,000	3.3	1.9 [0.64]	189/189	63/63
	2006	100	70	13,000	tr(0.9)	2.4 [0.8]	192/192	64/64
	2007	82	55	7,500	nd	5 [2]	191/192	64/64
	2008	100	63	11,000	tr(2.3)	2.4 [0.9]	192/192	64/64
	2009	84	61	8,600	2.0	0.7 [0.3]	192/192	64/64
	2010	82	62	7,200	tr(4)	6 [2]	64/64	64/64
	2011	70	58	4,500	1.7	1.1 [0.4]	64/64	64/64
	2012	69	61	11,000	tr(2.6)	2.9 [1.0]	63/63	63/63
	2013	65	55	5,400	tr(1.9)	2.0 [0.8]	63/63	63/63
	2017	47	36	2,800	nd	4.8 [1.6]	61/62	61/62
	2020	42	38	4,200	tr(1.1)	1.2 [0.5]	58/58	58/58
<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	150	110	16,000	2.1	1.8 [0.6]	189/189	63/63
	2003	130	100	13,000	tr(2.4)	4 [2]	186/186	62/62
	2004	110	80	26,000	3	3 [0.9]	189/189	63/63
	2005	110	81	32,000	3.4	2.3 [0.84]	189/189	63/63
	2006	110	76	12,000	2.2	1.1 [0.4]	192/192	64/64
	2007	82	58	7,500	nd	2.2 [0.8]	191/192	64/64
	2008	110	66	10,000	2.4	2.0 [0.8]	192/192	64/64
	2009	91	68	8,300	2.1	1.7 [0.7]	192/192	64/64
	2010	95	69	8,000	tr(4)	11 [4]	64/64	64/64
	2011	73	64	4,300	3.2	1.3 [0.5]	64/64	64/64
	2012	80	71	13,000	tr(2.9)	4.0 [1.3]	63/63	63/63
	2013	74	65	5,600	2.5	1.8 [0.7]	63/63	63/63
	2017	53	41	3,000	tr(1)	4 [1]	62/62	62/62
	2020	47	44	4,500	1.4	0.2 [0.1]	58/58	58/58

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2002 年度から 2020 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	730	1,200	26,000	24	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	2003	1,100	1,400	14,000	110	3.9 [1.3]	30/30	6/6
	2004	1,300	1,600	14,000	91	18 [5.8]	31/31	7/7
	2005	1,000	960	13,000	78	12 [3.9]	31/31	7/7
	2006	970	1,100	18,000	67	4 [1]	31/31	7/7
	2007	870	590	19,000	59	5 [2]	31/31	7/7
	2008	750	560	11,000	85	5 [2]	31/31	7/7
	2009	1,200	1,100	16,000	83	4 [2]	31/31	7/7
	2010	1,600	2,300	15,000	67	4 [2]	6/6	6/6
	2011	790	880	3,400	160	3 [1]	4/4	4/4
	2012	710	500	3,500	180	5 [2]	5/5	5/5
	2013	410	410	2,000	75	13 [4]	5/5	5/5
	2016	220	260	500	80	3 [1]	3/3	3/3
	2020	200	310	590	41	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	610	550	6,900	57	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	2003	510	400	4,400	43	3.9 [1.3]	70/70	14/14
	2004	620	490	9,800	68	18 [5.8]	70/70	14/14
	2005	520	600	8,000	42	12 [3.9]	80/80	16/16
	2006	520	420	4,900	56	4 [1]	80/80	16/16
	2007	430	360	5,200	30	5 [2]	80/80	16/16
	2008	430	340	3,500	36	5 [2]	85/85	17/17
	2009	430	450	3,200	41	4 [2]	90/90	18/18
	2010	450	630	3,400	51	4 [2]	18/18	18/18
	2011	580	660	3,800	79	3 [1]	18/18	18/18
	2012	580	550	3,100	98	5 [2]	19/19	19/19
	2013	540	450	5,700	65	13 [4]	19/19	19/19
	2016	340	440	2,200	67	3 [1]	19/19	19/19
	2020	290	310	2,200	39	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	67	180	450	10	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	2003	47	120	370	6.8	3.9 [1.3]	10/10	2/2
	2004	39	110	240	tr(5.8)	18 [5.8]	10/10	2/2
	2005	53	120	340	tr(5.8)	12 [3.9]	10/10	2/2
	2006	32	83	250	5	4 [1]	10/10	2/2
	2007	29	83	230	tr(4)	5 [2]	10/10	2/2
	2008	24	87	280	tr(3)	5 [2]	10/10	2/2
	2009	21	48	130	4	4 [2]	10/10	2/2
	2010	27	---	180	4	4 [2]	2/2	2/2
	2011	---	---	6	6	3 [1]	1/1	1/1
	2012	23	---	110	5	5 [2]	2/2	2/2
	2013	37	---	140	tr(10)	13 [4]	2/2	2/2
	2016	38	---	110	13	3 [1]	2/2	2/2
	2020	---	---	83	83	3 [1]	1/1	1/1
<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	390	840	2,300	33	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	2003	550	840	2,800	69	7.2 [2.4]	30/30	6/6
	2004	560	770	2,800	53	48 [16]	31/31	7/7
	2005	470	660	2,400	40	10 [3.5]	31/31	7/7
	2006	470	580	2,800	41	4 [2]	31/31	7/7
	2007	440	460	1,500	34	6 [2]	31/31	7/7
	2008	360	410	1,300	52	7 [3]	31/31	7/7
	2009	540	560	16,000	48	4 [1]	31/31	7/7
	2010	520	640	5,500	31	3 [1]	6/6	6/6
	2011	490	470	2,900	150	4 [1]	4/4	4/4
	2012	390	310	1,300	140	7 [2]	5/5	5/5
	2013	280	230	1,700	58	16 [5.2]	5/5	5/5
	2016	120	99	330	56	6 [2]	3/3	3/3
	2020	100	97	430	25	6 [2]	3/3	3/3

<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2002	190	160	2,700	20	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	2003	160	120	1,800	9.6	7.2 [2.4]	70/70	14/14
	2004	200	130	5,200	tr(17)	48 [16]	70/70	14/14
	2005	160	180	3,100	tr(9.8)	10 [3.5]	76/80	16/16
	2006	150	120	2,000	14	4 [2]	80/80	16/16
	2007	130	100	2,100	8	6 [2]	80/80	16/16
	2008	120	71	1,300	14	7 [3]	85/85	17/17
	2009	130	140	1,300	10	4 [1]	90/90	18/18
	2010	120	170	1,100	9	3 [1]	18/18	18/18
	2011	180	240	1,300	20	4 [1]	18/18	18/18
	2012	170	140	1,100	19	7 [2]	19/19	19/19
	2013	160	170	2,700	tr(14)	16 [5.2]	19/19	19/19
	2016	100	110	800	12	6 [2]	19/19	19/19
	2020	90	110	780	11	6 [2]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	14	14	26	8.9	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	2003	11	12	27	tr(5.9)	7.2 [2.4]	10/10	2/2
	2004	nd	nd	tr(26)	nd	48 [16]	5/10	1/2
	2005	11	12	30	tr(4.5)	10 [3.5]	10/10	2/2
	2006	7	8	17	tr(3)	4 [2]	10/10	2/2
	2007	7	8	19	tr(3)	6 [2]	10/10	2/2
	2008	tr(5)	9	27	nd	7 [3]	7/10	2/2
	2009	6	7	13	tr(3)	4 [1]	10/10	2/2
	2010	4	---	10	tr(2)	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	5	5	4 [1]	1/1	1/1
	2012	tr(6)	---	10	tr(4)	7 [2]	2/2	2/2
	2013	26	---	68	tr(10)	16 [5.2]	2/2	2/2
	2016	18	---	46	7	6 [2]	2/2	2/2
	2020	---	---	34	34	6 [2]	1/1	1/1

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2013年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2014年度、2015年度及び2017年度から2019年度は調査を実施していない。

< 大気 >

○2002 年度から 2020 年度における大気についての *cis*-クロルデン及び *trans*-クロルデンの検出状況

<i>cis</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	31	40	670	0.86	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	2003 温暖期	110	120	1,600	6.4	0.51 [0.17]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	30	38	220	2.5		34/34	34/34
	2004 温暖期	92	160	1,000	2.3	0.57 [0.19]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	29	49	290	1.2		37/37	37/37
	2005 温暖期	92	120	1,000	3.4	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	16	19	260	1.4		37/37	37/37
	2006 温暖期	82	110	760	2.9	0.13 [0.04]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	19	19	280	2.0		37/37	37/37
	2007 温暖期	90	120	1,100	3.3	0.10 [0.04]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	17	20	230	1.4		36/36	36/36
	2008 温暖期	75	120	790	1.9	0.14 [0.05]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	21	34	200	1.5		37/37	37/37
	2009 温暖期	67	110	790	2.7	0.16 [0.06]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	19	22	180	0.65		37/37	37/37
	2010 温暖期	68	100	700	2.2	0.9 [0.3]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	20	27	130	tr(0.8)		37/37	37/37
	2011 温暖期	66	95	700	1.5	1.3 [0.42]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	20	31	240	tr(0.88)		37/37	37/37
	2012 温暖期	61	98	650	2.9	1.5 [0.51]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	10	14	74	nd		35/36	35/36
	2013 温暖期	58	97	580	1.5	0.7 [0.2]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	11	15	86	tr(0.5)		36/36	36/36
	2016	53	86	810	0.9	0.9 [0.3]	37/37	37/37
	2020	32	37	200	1.5	0.09 [0.03]	37/37	37/37
<i>trans</i> -クロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	36	48	820	0.62	0.60 [0.20]	102/102	34/34
	2003 温暖期	130	150	2,000	6.5	0.86 [0.29]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	37	44	290	2.5		34/34	34/34
	2004 温暖期	110	190	1,300	2.2	0.69 [0.23]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	35	60	360	1.5		37/37	37/37
	2005 温暖期	100	130	1,300	3.2	0.34 [0.14]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	19	23	310	1.9		37/37	37/37
	2006 温暖期	96	140	1,200	3.4	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	22	21	350	2.0		37/37	37/37
	2007 温暖期	100	140	1,300	3.8	0.12 [0.05]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	20	24	300	1.5		36/36	36/36
	2008 温暖期	87	130	990	2.5	0.17 [0.06]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	25	41	250	1.8		37/37	37/37
	2009 温暖期	79	120	960	2.6	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	23	30	210	0.68		37/37	37/37
	2010 温暖期	79	120	820	2.0	1.2 [0.4]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	24	34	150	tr(1.0)		37/37	37/37
	2011 温暖期	76	110	810	tr(1.4)	1.6 [0.53]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	24	37	290	tr(0.70)		37/37	37/37
	2012 温暖期	70	120	780	2.8	2.1 [0.7]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	12	18	95	nd		35/36	35/36
	2013 温暖期	64	120	690	1.7	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	13	18	110	tr(0.4)		36/36	36/36
	2016	61	95	1,100	tr(0.7)	1.0 [0.3]	37/37	37/37
	2020	35	42	230	1.5	0.16 [0.06]	37/37	37/37

(注) 2014 年度、2015 年度及び 2017 年度から 2019 年度は調査を実施していない。

【オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロル】

<水質>

○2002 年度から 2020 年度における水質についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	2.7	3.5	41	nd	1.2 [0.4]	96/114	35/38
	2003	3	2	39	tr(0.6)	2 [0.5]	36/36	36/36
	2004	3.2	2.9	47	tr(0.7)	2 [0.5]	38/38	38/38
	2005	2.6	2.1	19	nd	1.1 [0.4]	46/47	46/47
	2006	tr(2.5)	tr(2.4)	18	nd	2.8 [0.9]	43/48	43/48
	2007	tr(2)	nd	41	nd	6 [2]	25/48	25/48
	2008	1.9	1.9	14	nd	1.9 [0.7]	40/48	40/48
	2009	2.0	1.9	19	nd	1.1 [0.4]	45/49	45/49
	2010	1.5	1.3	45	nd	0.7 [0.3]	47/49	47/49
	2011	1.9	1.8	34	nd	1.3 [0.5]	44/49	44/49
	2012	2.2	2.3	17	nd	0.9 [0.4]	44/48	44/48
	2013	1.8	1.8	12	nd	0.9 [0.4]	41/48	41/48
	2017	nd	nd	12	nd	4 [2]	19/47	19/47
	2020	tr(1)	nd	8	nd	3 [1]	21/46	21/46
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	7.9	6.7	250	0.23	1.8 [0.6]	114/114	38/38
	2003	8.0	7.0	130	1.3	0.3 [0.1]	36/36	36/36
	2004	7.5	6.3	340	0.8	0.6 [0.2]	38/38	38/38
	2005	6.0	5.9	43	0.9	0.5 [0.2]	47/47	47/47
	2006	6.6	5.6	83	1.0	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2007	5.9	6.1	210	nd	2.4 [0.8]	43/48	43/48
	2008	6.5	5.9	130	0.9	0.9 [0.3]	48/48	48/48
	2009	7.1	5.5	210	1.4	0.3 [0.1]	49/49	49/49
	2010	5.4	3.9	40	tr(0.9)	1.3 [0.4]	49/49	49/49
	2011	5.0	4.3	130	0.8	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	2012	6.4	5.9	58	1.1	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2013	5.1	4.6	74	tr(0.7)	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2017	4.6	4.6	36	tr(0.6)	1.5 [0.6]	47/47	47/47
	2020	3.8	2.8	39	tr(0.6)	1.3 [0.5]	46/46	46/46
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	30	24	780	1.8	1.2 [0.4]	114/114	38/38
	2003	26	20	450	4	2 [0.5]	36/36	36/36
	2004	25	19	1,100	tr(3)	4 [2]	38/38	38/38
	2005	20	17	150	2.6	2.5 [0.84]	47/47	47/47
	2006	21	16	310	3.2	3.0 [1.0]	48/48	48/48
	2007	17	17	540	tr(2)	5 [2]	48/48	48/48
	2008	18	17	340	1.9	1.6 [0.6]	48/48	48/48
	2009	20	17	530	2.7	1.0 [0.4]	49/49	49/49
	2010	12	11	93	nd	8 [3]	45/49	45/49
	2011	15	12	480	2.6	1.3 [0.5]	49/49	49/49
	2012	30	26	210	7.9	1.5 [0.6]	48/48	48/48
	2013	14	11	170	2.3	1.5 [0.6]	48/48	48/48
	2017	13	14	120	tr(2)	3 [1]	47/47	47/47
	2020	9	8	95	nd	5 [2]	45/46	45/46

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。

(注 3) *cis*-ノナクロルの 2002 年度における最小値は、定量[検出]下限値が 0.18 [0.06]pg/L において測定されたものである。

<底質>

○2002 年度から 2020 年度における底質についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	2.7	1.7	120	nd	1.5 [0.5]	153/189	59/63
	2003	2	2	85	nd	1 [0.4]	158/186	57/62
	2004	tr(2.1)	tr(1.3)	140	nd	3 [0.8]	129/189	54/63
	2005	2.3	tr(1.9)	160	nd	2.0 [0.7]	133/189	51/63
	2006	tr(2.5)	tr(1.7)	280	nd	2.9 [1.0]	141/192	54/64
	2007	tr(2.1)	tr(1.5)	76	nd	2.5 [0.9]	117/192	46/64
	2008	tr(2)	tr(1)	340	nd	3 [1]	110/192	48/64
	2009	2	tr(1)	150	nd	2 [1]	97/192	45/64
	2010	1.7	1.2	60	nd	1.0 [0.4]	56/64	56/64
	2011	tr(1.6)	tr(1.2)	83	nd	2.2 [0.9]	36/64	36/64
	2012	tr(1.4)	tr(1.0)	75	nd	1.7 [0.7]	38/63	38/63
	2013	1.5	1.3	54	nd	1.3 [0.5]	50/63	50/63
	2017	tr(1)	tr(1)	78	nd	3 [1]	41/62	41/62
	2020	tr(1.1)	tr(1.0)	39	nd	1.8 [0.7]	34/58	34/58
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	76	66	7,800	nd	2.1 [0.7]	188/189	63/63
	2003	66	50	6,500	nd	3 [0.9]	184/186	62/62
	2004	53	34	9,400	tr(0.8)	2 [0.6]	189/189	63/63
	2005	56	42	9,900	tr(1.1)	1.9 [0.64]	189/189	63/63
	2006	58	48	5,800	tr(0.6)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	2007	48	35	4,200	nd	1.6 [0.6]	191/192	64/64
	2008	57	42	5,100	1.1	0.6 [0.2]	192/192	64/64
	2009	53	38	4,700	1.4	1.0 [0.4]	192/192	64/64
	2010	53	45	3,600	2.3	0.9 [0.3]	64/64	64/64
	2011	41	38	2,900	nd	1.1 [0.4]	63/64	63/64
	2012	44	35	4,900	tr(1)	3 [1]	63/63	63/63
	2013	41	31	3,100	tr(0.6)	0.7 [0.3]	63/63	63/63
	2017	31	25	1,500	nd	1.7 [0.7]	61/62	61/62
	2020	31	24	2,100	tr(0.7)	0.8 [0.3]	58/58	58/58
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	130	83	13,000	3.1	1.5 [0.5]	189/189	63/63
	2003	110	78	11,000	2	2 [0.6]	186/186	62/62
	2004	94	63	23,000	3	2 [0.6]	189/189	63/63
	2005	99	72	24,000	2.4	1.5 [0.54]	189/189	63/63
	2006	100	65	10,000	3.4	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	2007	78	55	8,400	tr(1.6)	1.7 [0.6]	192/192	64/64
	2008	91	53	8,400	tr(1.6)	2.2 [0.8]	192/192	64/64
	2009	85	58	7,800	2.0	0.9 [0.3]	192/192	64/64
	2010	80	65	6,200	tr(3)	6 [2]	64/64	64/64
	2011	68	52	4,500	1.7	0.8 [0.3]	64/64	64/64
	2012	69	62	10,000	2.5	2.4 [0.8]	63/63	63/63
	2013	67	54	4,700	2.2	1.2 [0.4]	63/63	63/63
	2017	47	39	2,600	nd	6 [2]	61/62	61/62
	2020	48	40	3,800	1.9	0.5 [0.2]	58/58	58/58

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。

<生物>

○2002 年度から 2020 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び *trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	71	83	5,600	nd	3.6 [1.2]	37/38	8/8
	2003	93	62	1,900	11	8.4 [2.8]	30/30	6/6
	2004	110	100	1,700	14	9.2 [3.1]	31/31	7/7
	2005	99	79	1,400	12	9.3 [3.1]	31/31	7/7
	2006	91	90	2,400	7	7 [3]	31/31	7/7
	2007	70	43	2,200	8	6 [2]	31/31	7/7
	2008	64	55	1,100	7	7 [2]	31/31	7/7
	2009	100	89	820	10	4 [1]	31/31	7/7
	2010	240	390	3,300	11	8 [3]	6/6	6/6
	2011	68	100	260	8	3 [1]	4/4	4/4
	2012	66	80	450	12	3 [1]	5/5	5/5
	2013	42	44	210	8	3 [1]	5/5	5/5
	2016	27	40	43	11	3 [1]	3/3	3/3
	2020	24	45	59	5	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	170	140	3,900	16	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	2003	150	160	820	30	8.4 [2.8]	70/70	14/14
	2004	160	140	1,500	25	9.2 [3.1]	70/70	14/14
	2005	150	150	1,900	20	9.3 [3.1]	80/80	16/16
	2006	150	120	3,000	28	7 [3]	80/80	16/16
	2007	120	100	1,900	17	6 [2]	80/80	16/16
	2008	130	130	2,200	15	7 [2]	85/85	17/17
	2009	120	99	2,400	23	4 [1]	90/90	18/18
	2010	120	140	1,000	33	8 [3]	18/18	18/18
	2011	140	130	2,300	33	3 [1]	18/18	18/18
	2012	140	180	390	28	3 [1]	19/19	19/19
	2013	130	130	560	31	3 [1]	19/19	19/19
	2016	96	80	950	31	3 [1]	19/19	19/19
	2020	75	60	2,100	24	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	640	630	890	470	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	2003	760	700	1,300	610	8.4 [2.8]	10/10	2/2
	2004	460	450	730	320	9.2 [3.1]	10/10	2/2
	2005	610	660	860	390	9.3 [3.1]	10/10	2/2
	2006	510	560	720	270	7 [3]	10/10	2/2
	2007	440	400	740	290	6 [2]	10/10	2/2
	2008	560	530	960	290	7 [2]	10/10	2/2
	2009	300	290	540	190	4 [1]	10/10	2/2
	2010	400	---	510	320	8 [3]	2/2	2/2
	2011	---	---	590	590	3 [1]	1/1	1/1
	2012	250	---	360	170	3 [1]	2/2	2/2
	2013	2,500	---	3,400	1,900	3 [1]	2/2	2/2
	2016	580	---	1,400	240	3 [1]	2/2	2/2
	2020	---	---	820	820	3 [1]	1/1	1/1
<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	170	300	870	8.6	1.2 [0.4]	38/38	8/8
	2003	290	260	1,800	48	4.8 [1.6]	30/30	6/6
	2004	320	380	1,800	43	3.4 [1.1]	31/31	7/7
	2005	270	220	1,300	27	4.5 [1.5]	31/31	7/7
	2006	270	180	1,500	31	3 [1]	31/31	7/7
	2007	250	250	1,000	26	3 [1]	31/31	7/7
	2008	210	210	780	33	4 [1]	31/31	7/7
	2009	300	310	10,000	31	3 [1]	31/31	7/7
	2010	280	310	1,300	35	3 [1]	6/6	6/6
	2011	250	280	1,300	77	1.8 [0.7]	4/4	4/4
	2012	200	190	670	52	2 [1]	5/5	5/5
	2013	150	140	900	38	2.2 [0.7]	5/5	5/5
	2016	72	46	220	37	1.4 [0.6]	3/3	3/3
	2020	53	38	200	20	3 [1]	3/3	3/3

<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2002	460	420	5,100	46	1.2 [0.4]	70/70	14/14
	2003	360	360	2,600	19	4.8 [1.6]	70/70	14/14
	2004	430	310	10,000	48	3.4 [1.1]	70/70	14/14
	2005	380	360	6,200	27	4.5 [1.5]	80/80	16/16
	2006	370	330	3,300	33	3 [1]	80/80	16/16
	2007	320	280	3,700	16	3 [1]	80/80	16/16
	2008	350	300	3,200	46	4 [1]	85/85	17/17
	2009	340	340	2,600	27	3 [1]	90/90	18/18
	2010	320	370	2,200	23	3 [1]	18/18	18/18
	2011	440	450	2,900	45	1.8 [0.7]	18/18	18/18
	2012	420	450	2,200	33	2 [1]	19/19	19/19
	2013	430	420	3,000	34	2.2 [0.7]	19/19	19/19
	2016	300	170	1,900	53	1.4 [0.6]	19/19	19/19
	2020	230	250	1,600	26	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	200	240	450	68	1.2 [0.4]	10/10	2/2
	2003	200	260	660	68	4.8 [1.6]	10/10	2/2
	2004	140	150	240	73	3.4 [1.1]	10/10	2/2
	2005	160	180	370	86	4.5 [1.5]	10/10	2/2
	2006	120	130	270	60	3 [1]	10/10	2/2
	2007	130	140	300	42	3 [1]	10/10	2/2
	2008	140	150	410	37	4 [1]	10/10	2/2
	2009	81	85	160	44	3 [1]	10/10	2/2
	2010	100	---	190	57	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	76	76	1.8 [0.7]	1/1	1/1
	2012	75	---	100	56	2 [1]	2/2	2/2
	2013	270	---	970	74	2.2 [0.7]	2/2	2/2
	2016	240	---	770	74	1.4 [0.6]	2/2	2/2
	2020	---	---	480	480	3 [1]	1/1	1/1
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	450	1,100	1,800	21	2.4 [0.8]	38/38	8/8
	2003	800	700	3,800	140	3.6 [1.2]	30/30	6/6
	2004	780	870	3,400	110	13 [4.2]	31/31	7/7
	2005	700	650	3,400	72	6.2 [2.1]	31/31	7/7
	2006	660	610	3,200	85	3 [1]	31/31	7/7
	2007	640	610	2,400	71	7 [3]	31/31	7/7
	2008	510	510	2,000	94	6 [2]	31/31	7/7
	2009	780	680	33,000	79	3 [1]	31/31	7/7
	2010	790	870	6,000	84	4 [2]	6/6	6/6
	2011	640	680	3,000	200	3 [1]	4/4	4/4
	2012	530	400	1,800	190	4 [1]	5/5	5/5
	2013	380	370	2,000	98	10 [3.4]	5/5	5/5
	2016	200	150	520	97	3 [1]	3/3	3/3
	2020	140	130	480	47	4 [2]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	1,000	900	8,300	98	2.4 [0.8]	70/70	14/14
	2003	920	840	5,800	85	3.6 [1.2]	70/70	14/14
	2004	1,100	760	21,000	140	13 [4.2]	70/70	14/14
	2005	970	750	13,000	80	6.2 [2.1]	80/80	16/16
	2006	940	680	6,900	120	3 [1]	80/80	16/16
	2007	800	680	7,900	71	7 [3]	80/80	16/16
	2008	860	750	6,900	87	6 [2]	85/85	17/17
	2009	810	720	7,400	68	3 [1]	90/90	18/18
	2010	800	1,000	4,700	110	4 [2]	18/18	18/18
	2011	1,100	1,000	5,000	190	3 [1]	18/18	18/18
	2012	1,100	1,300	4,200	140	4 [1]	19/19	19/19
	2013	1,100	1,100	7,800	150	10 [3.4]	19/19	19/19
	2016	690	410	3,400	170	3 [1]	19/19	19/19
	2020	530	510	5,700	95	4 [2]	18/18	18/18

<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	890	980	1,900	350	2.4 [0.8]	10/10	2/2
	2003	1,100	1,400	3,700	350	3.6 [1.2]	10/10	2/2
	2004	690	780	1,200	390	13 [4.2]	10/10	2/2
	2005	870	880	2,000	440	6.2 [2.1]	10/10	2/2
	2006	650	620	1,500	310	3 [1]	10/10	2/2
	2007	590	680	1,400	200	7 [3]	10/10	2/2
	2008	740	850	2,600	180	6 [2]	10/10	2/2
	2009	400	430	730	220	3 [1]	10/10	2/2
	2010	510	---	880	290	4 [2]	2/2	2/2
	2011	---	---	400	400	3 [1]	1/1	1/1
	2012	360	---	480	270	4 [1]	2/2	2/2
	2013	55	---	170	18	10 [3.4]	2/2	2/2
	2016	60	---	130	28	3 [1]	2/2	2/2
	2020	---	---	81	81	4 [2]	1/1	1/1

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2013年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2014年度、2015年度及び2017年度から2019年度は調査を実施していない。

< 大気 >


○2002年度から2020年度における大気についてのオキシクロルデン、*cis*-ノナクロル及び*trans*-ノナクロルの検出状況

オキシクロルデン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	0.96	0.98	8.3	nd	0.024 [0.008]	101/102	34/34
	2003 温暖期	2.5	2.7	12	0.41	0.045 [0.015]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.87	0.88	3.2	0.41		34/34	34/34
	2004 温暖期	1.9	2.0	7.8	0.41	0.13 [0.042]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	0.80	0.76	3.9	0.27		37/37	37/37
	2005 温暖期	1.9	2.0	8.8	0.65	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	0.55	0.50	2.2	0.27		37/37	37/37
	2006 温暖期	1.8	1.9	5.7	0.47	0.23 [0.08]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	0.54	0.56	5.1	tr(0.13)		37/37	37/37
	2007 温暖期	1.9	1.8	8.6	0.56	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.61	0.63	2.4	0.26		36/36	36/36
	2008 温暖期	1.7	1.7	7.1	0.50	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.61	0.63	1.8	0.27		37/37	37/37
	2009 温暖期	1.7	1.8	6.5	0.38	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.65	0.61	2.7	0.24		37/37	37/37
	2010 温暖期	1.5	1.5	6.2	0.44	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.56	0.55	2.3	0.26		37/37	37/37
	2011 温暖期	1.5	1.5	5.2	0.28	0.07 [0.03]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	0.61	0.57	2.6	0.21		37/37	37/37
	2012 温暖期	1.4	1.6	6.7	0.34	0.08 [0.03]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	0.41	0.38	1.0	0.22		36/36	36/36
	2013 温暖期	1.4	1.5	4.7	0.36	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.43	0.41	1.0	0.20		36/36	36/36
	2016	1.4	1.4	8.9	0.19	0.16 [0.06]	37/37	37/37
	2020	0.79	0.8	2.6	0.15	0.10 [0.04]	37/37	37/37

<i>cis</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2002	3.1	4.0	62	0.071	0.030 [0.010]	102/102	34/34
	2003 温暖期	12	15	220	0.81	0.026 [0.0088]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	2.7	3.5	23	0.18		34/34	34/34
	2004 温暖期	10	15	130	0.36	0.072 [0.024]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	2.7	4.4	28	0.087		37/37	37/37
	2005 温暖期	10	14	160	0.30	0.08 [0.03]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	1.6	1.6	34	0.08		37/37	37/37
	2006 温暖期	11	12	170	0.28	0.15 [0.05]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	2.4	2.0	41	tr(0.14)		37/37	37/37
	2007 温暖期	10	14	150	0.31	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	1.6	1.7	22	0.09		36/36	36/36
	2008 温暖期	7.9	12	87	0.18	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	2.0	2.7	19	0.16		37/37	37/37
	2009 温暖期	7.5	10	110	0.33	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	1.9	2.1	18	0.07		37/37	37/37
	2010 温暖期	7.5	10	68	0.23	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	1.8	2.1	13	tr(0.06)		37/37	37/37
	2011 温暖期	7.4	8.8	89	0.24	0.15 [0.051]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	1.9	2.9	28	nd		36/37	36/37
	2012 温暖期	6.9	11	89	0.29	0.12 [0.05]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	0.98	1.1	10	tr(0.05)		36/36	36/36
	2013 温暖期	6.4	10	72	0.15	0.07 [0.02]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	1.0	1.4	12	tr(0.06)		36/36	36/36
	2016	6.1	9.9	120	tr(0.13)	0.14 [0.05]	37/37	37/37
	2020	3.1	3.4	24	0.13	0.09 [0.04]	37/37	37/37
<i>trans</i> -ノナクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2002	24	30	550	0.64	0.30 [0.10]	102/102	34/34
	2003 温暖期	87	100	1,200	5.1	0.35 [0.12]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	24	28	180	2.1		34/34	34/34
	2004 温暖期	72	120	870	1.9	0.48 [0.16]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	23	39	240	0.95		37/37	37/37
	2005 温暖期	75	95	870	3.1	0.13 [0.044]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	13	16	210	1.2		37/37	37/37
	2006 温暖期	68	91	800	3.0	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	16	15	240	1.4		37/37	37/37
	2007 温暖期	72	96	940	2.5	0.09 [0.03]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	13	15	190	1.1		36/36	36/36
	2008 温暖期	59	91	650	1.5	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	17	25	170	1.3		37/37	37/37
	2009 温暖期	54	81	630	2.2	0.07 [0.03]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	16	19	140	0.75		37/37	37/37
	2010 温暖期	52	78	520	1.7	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	15	17	89	tr(0.7)		37/37	37/37
	2011 温暖期	53	72	550	1.2	1.1 [0.35]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	16	24	210	tr(0.70)		37/37	37/37
	2012 温暖期	49	79	510	2.5	1.2 [0.41]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	8.1	10	61	tr(0.50)		36/36	36/36
	2013 温暖期	46	78	470	1.2	0.5 [0.2]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	8.5	12	75	0.5		36/36	36/36
	2016	42	69	650	0.8	0.7 [0.2]	37/37	37/37
	2020	23	26	140	1.0	0.10 [0.04]	37/37	37/37

(注) 2014 年度、2015 年度及び 2017 年度から 2019 年度は調査を実施していない。


[7-1] *cis*-クロルデン



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-1-1 *cis*-クロルデンの水質の経年変化 (幾何平均値)


[7-1] *cis*-クロルデン



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-1-2 *cis*-クロルデンの底質の経年変化 (幾何平均値)


[7-1] *cis*-クロルデン



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-1-3 *cis*-クロルデンの生物の経年変化（幾何平均値）


[7-1] *cis*-クロルデン



- (注) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-1-4 *cis*-クロルデンの大気経年変化（幾何平均値）


[7-2] *trans*-クロルデン



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-7-2-1 *trans*-クロルデンの水質の経年変化（幾何平均値）

[7-2] *trans*-クロルデン




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-2-2 *trans*-クロルデンの底質の経年変化（幾何平均値）



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-7-2-3 *trans*-クロルデンの生物の経年変化（幾何平均値）



(注) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-2-4 *trans*-クロルデンの大気 of 経年変化（幾何平均値）


[7-3] オキシクロルデン



- (注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 3) 2007 年度の湖沼域及び海域、2008 年度の湖沼域並びに 2017 年度の全域、湖沼域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-7-3-1 オキシクロルデンの水質の経年変化（幾何平均値）


[7-3] オキシクロルデン



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 3) 2004 年度、2006 年度、2008 年度及び 2018 年度の湖沼域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
 (注 4) 海域については、多くの年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。


図 3-7-3-2 オキシクロルデンの底質の経年変化（幾何平均値）

[7-3] オキシクロルデン



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-7-3-3 オキシクロルデンの生物の経年変化（幾何平均値）



(注) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-3-4 オキシクロルデンの大気の経年変化（幾何平均値）


[7-4] *cis*-ノナクロル



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-4-1 *cis*-ノナクロルの水質の経年変化（幾何平均値）


[7-4] *cis*-ノナクロル



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-4-2 *cis*-ノナクロルの底質の経年変化（幾何平均値）


[7-4] *cis*-ノナクロル



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-4-3 *cis*-ノナクロルの生物の経年変化（幾何平均値）


[7-4] *cis*-ノナクロル



(注) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-4-4 *cis*-ノナクロルの大気の経年変化（幾何平均値）


[7-5] *trans*-ノナクロル



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-7-5-1 *trans*-ノナクロルの水質の経年変化（幾何平均値）

[7-5] *trans*-ノナクロル




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-5-2 *trans*-ノナクロルの底質の経年変化（幾何平均値）



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-5-3 *trans*-ノナクロルの生物の経年変化（幾何平均値）



(注) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-7-5-4 *trans*-ノナクロルの大気の経年変化（幾何平均値）

[8] ヘプタクロル類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ヘプタクロルは、有機塩素系殺虫剤の一種である。稲、麦類、じゃがいも、さつまいも、たばこ、豆類、あぶらな科野菜、ネギ類、ウリ類、てんさい、ほうれん草等の殺虫剤として使用された。農薬取締法に基づく登録は 1975 年に失効した。工業用クロルデン（シロアリ防除剤）にも含まれており、1986 年 9 月、化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約においては、2004 年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

継続的調査としては 2002 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)} では、ヘプタクロル及びその代謝物のヘプタクロルエポキシドについて 1982 年度に水質、底質及び魚類を、1986 年度に大気を調査している。

2002 年度以降のモニタリング調査においては、ヘプタクロルについて 2002 年度から、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドについて 2003 年度からそれぞれ調査を開始し、2002 年度から 2011 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2017 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014 年度及び 2017 年度に水質及び底質の調査を、2020 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2021 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2020 年度までの調査結果を示す。

・2020 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2002 年度から 2020 年度における水質についてのヘプタクロル、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドの検出状況

ヘプタクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	tr(1.2)	tr(1.0)	25	nd	1.5 [0.5]	97/114	38/38
	2003	tr(1.8)	tr(1.6)	7	tr(1.0)	2 [0.5]	36/36	36/36
	2004	nd	nd	29	nd	5 [2]	9/38	9/38
	2005	nd	tr(1)	54	nd	3 [1]	25/47	25/47
	2006	nd	nd	6	nd	5 [2]	5/48	5/48
	2007	nd	nd	5.2	nd	2.4 [0.8]	12/48	12/48
	2008	nd	nd	4.6	nd	2.1 [0.8]	19/48	19/48
	2009	tr(0.5)	nd	17	nd	0.8 [0.3]	20/49	20/49
	2010	nd	nd	43	nd	2.2 [0.7]	4/49	4/49
	2011	nd	nd	22	nd	1.3 [0.5]	6/49	6/49
	2014	tr(0.2)	tr(0.2)	1.5	nd	0.5 [0.2]	28/48	28/48
	2017	nd	nd	6	nd	3 [1]	2/47	2/47
	2020	nd	nd	tr(2)	nd	3 [1]	5/46	5/46
<i>cis</i> -ヘプタクロルエ ポキシド	実施 年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2003	9.8	11	170	1.2	0.7 [0.2]	36/36	36/36
	2004	10	10	77	2	2 [0.4]	38/38	38/38
	2005	7.1	6.6	59	0.96	0.7 [0.2]	47/47	47/47
	2006	7.6	6.6	47	1.1	2.0 [0.7]	48/48	48/48
	2007	6.1	5.8	120	tr(0.9)	1.3 [0.4]	48/48	48/48
	2008	4.7	5.0	37	nd	0.6 [0.2]	46/48	46/48
	2009	5.5	4.2	72	0.8	0.5 [0.2]	49/49	49/49
	2010	5.9	3.9	710	0.7	0.4 [0.2]	49/49	49/49
	2011	5.8	5.8	160	0.7	0.7 [0.3]	49/49	49/49
	2014	4.9	3.4	56	0.7	0.5 [0.2]	48/48	48/48
	2017	4.7	3.5	83	nd	1.6 [0.6]	46/47	46/47
	2020	4.0	3.4	36	nd	2.3 [0.9]	44/46	44/46

<i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシド	実施 年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
水質 (pg/L)	2003	nd	nd	2	nd	2 [0.4]	4/36	4/36
	2004	nd	nd	nd	nd	0.9 [0.3]	0/38	0/38
	2005	nd	nd	nd	nd	0.7 [0.2]	0/47	0/47
	2006	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.6]	0/48	0/48
	2007	nd	nd	tr(0.9)	nd	2.0 [0.7]	2/48	2/48
	2008	nd	nd	nd	nd	1.9 [0.7]	0/48	0/48
	2009	nd	nd	nd	nd	0.7 [0.3]	0/49	0/49
	2010	nd	nd	8.0	nd	1.3 [0.5]	2/49	2/49
	2011	nd	nd	2.8	nd	0.8 [0.3]	3/49	3/49
	2014	nd	nd	nd	nd	0.8 [0.3]	0/48	0/48
	2017	nd	nd	nd	nd	2.3 [0.9]	0/47	0/47
	2020	nd	nd	nd	nd	1.9 [0.7]	0/46	0/46

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2012 年度、2013 年度、2015 年度、2016 年度、2018 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。また、2002 年度はヘプタクロルのみの調査で、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドの調査は実施していない。

(注 3) *cis*-ヘプタクロルエポキシドの 2005 年度及び 2006 年度における最小値は、他の検体とは異なり、大量採水装置を用いて採取され、定量[検出]下限値が 0.06[0.02]pg/L (2005 年度) 又は 0.08 [0.03]pg/L (2006 年度) においてそれぞれ測定されたものである。

<底質>

○2002 年度から 2020 年度における底質についてのヘプタクロル、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドの検出状況

ヘプタクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2002	4.1	3.2	120	nd	1.8 [0.6]	167/189	60/63
	2003	tr(2.7)	tr(2.2)	160	nd	3 [1.0]	138/186	53/62
	2004	tr(2.8)	tr(2.3)	170	nd	3 [0.9]	134/189	53/63
	2005	3.1	2.8	200	nd	2.5 [0.8]	120/189	48/63
	2006	5.2	3.9	230	nd	1.9 [0.6]	190/192	64/64
	2007	tr(1.8)	tr(1.5)	110	nd	3.0 [0.7]	143/192	57/64
	2008	tr(1)	nd	85	nd	4 [1]	59/192	27/64
	2009	1.6	1.3	65	nd	1.1 [0.4]	144/192	59/64
	2010	1.2	tr(0.8)	35	nd	1.1 [0.4]	51/64	51/64
	2011	tr(1.3)	tr(1.2)	48	nd	1.8 [0.7]	40/64	40/64
	2014	tr(1.0)	tr(0.9)	49	nd	1.5 [0.5]	38/63	38/63
	2017	1.2	1.1	40	nd	0.9 [0.3]	53/62	53/62
	2020	0.7	0.6	52	nd	0.4 [0.2]	43/58	43/58
<i>cis</i> -ヘプタクロルエ ポキシド	実施 年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2003	4	3	160	nd	3 [1]	153/186	55/62
	2004	tr(5)	tr(3)	230	nd	6 [2]	136/189	52/63
	2005	tr(4)	tr(3)	140	nd	7 [2]	119/189	49/63
	2006	4.0	3.2	210	nd	3.0 [1.0]	157/192	58/64
	2007	3	tr(2)	270	nd	3 [1]	141/192	53/64
	2008	3	2	180	nd	2 [1]	130/192	51/64
	2009	2.7	1.9	290	nd	0.7 [0.3]	176/192	63/64
	2010	3.1	2.4	300	nd	0.8 [0.3]	62/64	62/64
	2011	2.8	2.5	160	nd	0.6 [0.2]	63/64	63/64
	2014	2.1	1.7	310	nd	0.5 [0.2]	59/63	59/63
	2017	1.9	1.6	150	nd	1.2 [0.5]	51/62	51/62
	2020	tr(1.5)	tr(1.2)	110	nd	1.7 [0.7]	40/58	40/58

<i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシド	実施 年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/186	0/62
	2004	nd	nd	tr(2.5)	nd	4 [2]	1/189	1/63
	2005	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/189	0/63
	2006	nd	nd	19	nd	7 [2]	2/192	2/64
	2007	nd	nd	31	nd	10 [4]	2/192	2/64
	2008	nd	nd	nd	nd	1.7 [0.7]	0/192	0/64
	2009	nd	nd	nd	nd	1.4 [0.6]	0/192	0/64
	2010	nd	nd	4	nd	3 [1]	1/64	1/64
	2011	nd	nd	2.4	nd	2.3 [0.9]	2/64	2/64
	2014	nd	nd	3.6	nd	0.7 [0.3]	1/63	1/63
	2017	nd	nd	nd	nd	2.0 [0.8]	0/62	0/62
	2020	nd	nd	1.4	nd	1.0 [0.4]	1/58	1/58

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2012年度、2013年度、2015年度、2016年度、2018年度及び2019年度は調査を実施していない。また、2002年度はヘプタクロルのみの調査で、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び*trans*-ヘプタクロルエポキシドの調査は実施していない。

<生物>

○2002年度から2020年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのヘプタクロル、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び*trans*-ヘプタクロルエポキシドの検出状況

ヘプタクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	tr(3.5)	4.6	15	nd	4.2 [1.4]	28/38	6/8
	2003	tr(2.8)	tr(2.4)	14	nd	6.6 [2.2]	16/30	4/6
	2004	tr(3.4)	5.2	16	nd	4.1 [1.4]	23/31	6/7
	2005	tr(2.9)	tr(2.9)	24	nd	6.1 [2.0]	18/31	6/7
	2006	tr(4)	tr(4)	20	nd	6 [2]	23/31	6/7
	2007	tr(3)	tr(3)	12	nd	6 [2]	20/31	6/7
	2008	tr(2)	nd	9	nd	6 [2]	13/31	5/7
	2009	tr(4)	nd	120	nd	5 [2]	14/31	4/7
	2010	3	tr(2)	78	nd	3 [1]	5/6	5/6
	2011	4	4	51	nd	3 [1]	3/4	3/4
	2012	tr(3)	tr(3)	13	nd	4 [1]	4/5	4/5
	2013	3	tr(2)	19	nd	3 [1]	4/5	4/5
	2015	nd	nd	tr(1.7)	nd	3.0 [1.0]	1/3	1/3
	2016	nd	nd	tr(1.4)	nd	2.4 [0.9]	1/3	1/3
	2020	nd	nd	tr(2)	nd	3 [1]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	4.2	4.8	20	nd	4.2 [1.4]	57/70	12/14
	2003	nd	nd	11	nd	6.6 [2.2]	29/70	8/14
	2004	tr(2.3)	tr(2.1)	460	nd	4.1 [1.4]	50/70	11/14
	2005	nd	nd	7.6	nd	6.1 [2.0]	32/80	8/16
	2006	tr(2)	nd	8	nd	6 [2]	36/80	8/16
	2007	tr(2)	nd	7	nd	6 [2]	28/80	6/16
	2008	nd	nd	9	nd	6 [2]	25/85	7/17
	2009	tr(2)	nd	8	nd	5 [2]	30/90	11/18
	2010	tr(2)	tr(2)	5	nd	3 [1]	12/18	12/18
	2011	tr(1)	tr(1)	7	nd	3 [1]	13/18	13/18
	2012	nd	tr(1)	5	nd	4 [1]	10/19	10/19
	2013	nd	nd	12	nd	3 [1]	9/19	9/19
	2015	nd	nd	9.2	nd	3.0 [1.0]	9/19	9/19
	2016	nd	nd	5.5	nd	2.4 [0.9]	8/19	8/19
	2020	nd	nd	6	nd	3 [1]	6/18	6/18

ヘブタクロル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	tr(1.7)	tr(2.8)	5.2	nd	4.2 [1.4]	7/10	2/2
	2003	nd	nd	nd	nd	6.6 [2.2]	0/10	0/2
	2004	nd	nd	tr(1.5)	nd	4.1 [1.4]	1/10	1/2
	2005	nd	nd	nd	nd	6.1 [2.0]	0/10	0/2
	2006	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	2007	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	2008	nd	nd	nd	nd	6 [2]	0/10	0/2
	2009	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/10	0/2
	2010	nd	---	tr(1)	nd	3 [1]	1/2	1/2
	2011	---	---	nd	nd	3 [1]	0/1	0/1
	2012	nd	---	nd	nd	4 [1]	0/2	0/2
	2013	nd	---	nd	nd	3 [1]	0/2	0/2
	2015	---	---	nd	nd	3.0 [1.0]	0/1	0/1
	2016	nd	---	nd	nd	2.4 [0.9]	0/2	0/2
	2020	---	---	nd	nd	3 [1]	0/1	0/1
cis-ヘブタクロルエ ポキシド	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	44	29	880	9.7	6.9 [2.3]	30/30	6/6
	2004	64	34	840	tr(9.8)	9.9 [3.3]	31/31	7/7
	2005	49	20	590	7.4	3.5 [1.2]	31/31	7/7
	2006	56	23	1,100	8	4 [1]	31/31	7/7
	2007	37	20	1,100	8	4 [1]	31/31	7/7
	2008	37	19	510	8	5 [2]	31/31	7/7
	2009	59	33	380	10	3 [1]	31/31	7/7
	2010	170	260	1,800	9.0	2.4 [0.9]	6/6	6/6
	2011	55	110	320	3.9	2.0 [0.8]	4/4	4/4
	2012	48	120	180	6.2	1.5 [0.6]	5/5	5/5
	2013	28	29	110	4.4	2.1 [0.8]	5/5	5/5
	2015	21	14	91	7.2	2.1 [0.8]	3/3	3/3
	2016	23	18	75	9.4	1.9 [0.7]	3/3	3/3
	2020	28	48	96	5	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	43	43	320	7.0	6.9 [2.3]	70/70	14/14
	2004	51	49	620	tr(3.3)	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	2005	41	45	390	4.9	3.5 [1.2]	80/80	16/16
	2006	42	48	270	4	4 [1]	80/80	16/16
	2007	43	49	390	4	4 [1]	80/80	16/16
	2008	39	46	350	tr(3)	5 [2]	85/85	17/17
	2009	41	50	310	4	3 [1]	90/90	18/18
	2010	39	49	230	5.0	2.4 [0.9]	18/18	18/18
	2011	50	62	540	3.2	2.0 [0.8]	18/18	18/18
	2012	41	62	120	6.9	1.5 [0.6]	19/19	19/19
	2013	42	46	190	7.3	2.1 [0.8]	19/19	19/19
	2015	33	43	190	3.2	2.1 [0.8]	19/19	19/19
	2016	29	28	130	3.6	1.9 [0.7]	19/19	19/19
	2020	24	32	320	tr(2)	3 [1]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	540	510	770	370	6.9 [2.3]	10/10	2/2
	2004	270	270	350	190	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	2005	370	340	690	250	3.5 [1.2]	10/10	2/2
	2006	330	310	650	240	4 [1]	10/10	2/2
	2007	280	270	350	250	4 [1]	10/10	2/2
	2008	370	370	560	180	5 [2]	10/10	2/2
	2009	220	210	390	160	3 [1]	10/10	2/2
	2010	290	---	360	240	2.4 [0.9]	2/2	2/2
	2011	---	---	410	410	2.0 [0.8]	1/1	1/1
	2012	160	---	170	150	1.5 [0.6]	2/2	2/2
	2013	300	---	560	160	2.1 [0.8]	2/2	2/2
	2015	---	---	20	20	2.1 [0.8]	1/1	1/1
	2016	91	---	270	31	1.9 [0.7]	2/2	2/2
	2020	---	---	270	270	3 [1]	1/1	1/1

<i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシンド	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	nd	nd	48	nd	13 [4.4]	5/30	1/6
	2004	nd	nd	55	nd	12 [4.0]	9/31	2/7
	2005	nd	nd	37	nd	23 [7.5]	5/31	1/7
	2006	nd	nd	45	nd	13 [5]	5/31	1/7
	2007	nd	nd	61	nd	13 [5]	5/31	1/7
	2008	nd	nd	33	nd	10 [4]	5/31	1/7
	2009	tr(3)	nd	24	nd	8 [3]	13/31	3/7
	2010	3	tr(2)	24	nd	3 [1]	3/6	3/6
	2011	nd	nd	tr(6)	nd	7 [3]	1/4	1/4
	2012	nd	nd	tr(4)	nd	8 [3]	1/5	1/5
	2013	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/5	0/5
	2015	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/3	0/3
	2016	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/3	0/3
	2020	nd	nd	nd	nd	9 [4]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	nd	nd	nd	nd	13 [4.4]	0/70	0/14
	2004	nd	nd	tr(10)	nd	12 [4.0]	2/70	2/14
	2005	nd	nd	nd	nd	23 [7.5]	0/80	0/16
	2006	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/80	0/16
	2007	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/80	0/16
	2008	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/85	0/17
	2009	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/90	0/18
	2010	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/18	0/18
	2011	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/18	0/18
	2012	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/19	0/19
	2013	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/19	0/19
	2015	nd	nd	10	nd	7 [3]	5/19	5/19
	2016	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/19	0/19
	2020	nd	nd	nd	nd	9 [4]	0/18	0/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	nd	nd	nd	nd	13 [4.4]	0/10	0/2
	2004	nd	nd	nd	nd	12 [4.0]	0/10	0/2
	2005	nd	nd	nd	nd	23 [7.5]	0/10	0/2
	2006	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/10	0/2
	2007	nd	nd	nd	nd	13 [5]	0/10	0/2
	2008	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/10	0/2
	2009	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/10	0/2
	2010	nd	---	nd	nd	3 [1]	0/2	0/2
	2011	---	---	nd	nd	7 [3]	0/1	0/1
	2012	nd	---	nd	nd	8 [3]	0/2	0/2
	2013	nd	---	tr(5)	nd	7 [3]	1/2	1/2
	2015	---	---	nd	nd	7 [3]	0/1	0/1
	2016	nd	---	nd	nd	9 [3]	0/2	0/2
	2020	---	---	nd	nd	9 [4]	0/1	0/1

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2013 年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2014 年度及び 2017 年度から 2019 年度は調査を実施していない。また、2002 年度はヘプタクロルのみの調査で、*cis*-ヘプタクロルエポキシンド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシンドの調査は実施していない。

<大気>


○2002 年度から 2020 年度における大気についてのヘプタクロル、*cis*-ヘプタクロルエポキシド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシドの検出状況

ヘプタクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2002	11	14	220	0.20	0.12 [0.04]	102/102	34/34
	2003 温暖期	27	41	240	1.1	0.25 [0.085]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	10	16	65	0.39		34/34	34/34
	2004 温暖期	23	36	200	0.46	0.23 [0.078]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	11	18	100	0.53		37/37	37/37
	2005 温暖期	25	29	190	1.1	0.16 [0.054]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	6.5	7.9	61	0.52		37/37	37/37
	2006 温暖期	20	27	160	0.88	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	6.8	7.2	56	0.32		37/37	37/37
	2007 温暖期	22	27	320	1.1	0.07 [0.03]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	6.3	8.0	74	0.42		36/36	36/36
	2008 温暖期	20	31	190	0.92	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	7.5	12	60	0.51		37/37	37/37
	2009 温暖期	18	30	110	0.48	0.04 [0.01]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	6.3	7.8	48	0.15		37/37	37/37
	2010 温暖期	17	26	160	0.69	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	7.2	9.5	53	0.22		37/37	37/37
	2011 温暖期	16	25	110	0.73	0.30 [0.099]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	6.1	10	56	tr(0.13)		37/37	37/37
	2012 温暖期	13	21	58	0.46	0.41 [0.14]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	3.2	4.9	20	nd		35/36	35/36
	2013 温暖期	11	21	43	0.46	0.16 [0.05]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	3.1	4.6	22	tr(0.10)		36/36	36/36
	2015	8.7	11	49	0.43	0.19 [0.06]	35/35	35/35
	2016	12	14	120	tr(0.18)	0.22 [0.08]	37/37	37/37
	2020	7.6	9.2	35	0.69	0.10 [0.04]	37/37	37/37
<i>cis</i> -ヘプタクロルエ ポキシド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	3.5	3.5	28	0.45	0.015 [0.0048]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	1.3	1.3	6.6	0.49		34/34	34/34
	2004 温暖期	2.8	2.9	9.7	0.65	0.052 [0.017]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	1.1	1.1	7.0	0.44		37/37	37/37
	2005 温暖期	1.5	1.7	11	tr(0.10)	0.12 [0.044]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	0.91	0.81	2.9	0.43		37/37	37/37
	2006 温暖期	1.7	2.0	6.7	0.13	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2006 寒冷期	0.74	0.88	3.2	nd		36/37	36/37
	2007 温暖期	2.9	2.8	13	0.54	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.93	0.82	3.0	0.41		36/36	36/36
	2008 温暖期	2.4	2.2	9.9	0.53	0.022 [0.008]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.91	0.84	3.0	0.37		37/37	37/37
	2009 温暖期	2.5	2.6	16	0.37	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	1.0	0.91	3.8	0.42		37/37	37/37
	2010 温暖期	2.3	2.3	10	0.38	0.02 [0.01]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.93	0.85	4.3	0.33		37/37	37/37
	2011 温暖期	2.0	2.3	6.0	0.29	0.04 [0.01]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	0.90	0.90	2.8	0.35		37/37	37/37
	2012 温暖期	2.0	2.1	6.3	0.37	0.05 [0.02]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	0.62	0.57	1.9	0.30		36/36	36/36
	2013 温暖期	2.0	2.1	7.7	0.43	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.66	0.63	1.4	0.32		36/36	36/36
	2015	1.4	1.4	4.7	tr(0.4)	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2016	1.9	1.9	9.1	0.30	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	2020	1.1	1.2	2.9	0.23	0.11 [0.04]	37/37	37/37

<i>trans</i> -ヘプタクロル エポキシンド	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	tr(0.036)	tr(0.038)	0.30	nd	0.099 [0.033]	18/35	18/35
	2003 寒冷期	nd	nd	tr(0.094)	nd		3/34	3/34
	2004 温暖期	nd	nd	tr(0.38)	nd	0.6 [0.2]	4/37	4/37
	2004 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2005 温暖期	tr(0.10)	tr(0.12)	1.2	nd	0.16 [0.05]	27/37	27/37
	2005 寒冷期	nd	nd	0.32	nd		3/37	3/37
	2006 温暖期	nd	nd	0.7	nd	0.3 [0.1]	2/37	2/37
	2006 寒冷期	nd	nd	tr(0.1)	nd		1/37	1/37
	2007 温暖期	nd	nd	0.16	nd	0.14 [0.06]	8/36	8/36
	2007 寒冷期	nd	nd	tr(0.06)	nd		1/36	1/36
	2008 温暖期	nd	nd	0.17	nd	0.16 [0.06]	6/37	6/37
	2008 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2009 温暖期	nd	nd	0.18	nd	0.14 [0.05]	10/37	10/37
	2009 寒冷期	nd	nd	tr(0.06)	nd		1/37	1/37
	2010 温暖期	nd	nd	0.16	nd	0.16 [0.06]	6/37	6/37
	2010 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2011 温暖期	nd	nd	0.14	nd	0.13 [0.05]	5/35	5/35
	2011 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2012 温暖期	nd	nd	tr(0.08)	nd	0.12 [0.05]	8/36	8/36
	2012 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	2013 温暖期	nd	nd	tr(0.11)	nd	0.12 [0.05]	7/36	7/36
	2013 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	2015	nd	nd	nd	nd	0.03 [0.01]	0/35	0/35
	2016	nd	nd	tr(0.2)	nd	0.3 [0.1]	1/37	1/37
	2020	nd	nd	nd	nd	0.13 [0.05]	0/37	0/37


(注) 2014 年度及び 2017 年度から 2019 年度は調査を実施していない。また、2002 年度はヘプタクロルのみの調査で、*cis*-ヘプタクロルエポキシンド及び *trans*-ヘプタクロルエポキシンドの調査は実施していない。

[8-1] ヘプタクロル



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2012 年度、2013 年度、2015 年度、2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 3) 2008 年度の湖沼域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。


図 3-8-1-1 ヘプタクロルの底質の経年変化（幾何平均値）



- (注) 2014 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-8-1-2 ヘプタクロルの大気 of 経年変化（幾何平均値）

[8-2] *cis*-ヘプタクロルエポキシド



(注) 2002 年度、2012 年度、2013 年度、2015 年度、2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-8-2-1 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの水質の経年変化（幾何平均値）




(注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2002 年度、2012 年度、2013 年度、2015 年度、2016 年度、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-8-2-2 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの底質の経年変化（幾何平均値）

[8-2] *cis*-ヘプタクロルエポキシド



- (注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度、2014 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-8-2-3 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの生物の経年変化（幾何平均値）



- (注) 2002 年度、2014 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-8-2-4 *cis*-ヘプタクロルエポキシドの大気の経年変化（幾何平均値）

[9] トキサフェン類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

トキサフェン類は、有機塩素系殺虫剤の一種である。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。2002 年 9 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約においては、2004 年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

継続的調査としては 2003 年度が初めての調査であり、2002 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)} では、1983 年度に水質及び底質を調査している。

2002 年度以降のモニタリング調査においては、2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン（Parlar-26）、2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン（Parlar-50）及び 2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン（Parlar-62）の 3 物質を分析対象として、2003 年度から 2009 年度の毎年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2015 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2018 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2019 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2018 年度までの調査結果を示す。

・2018 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2003 年度から 2018 年度における水質についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
水質 (pg/L)	2003	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/36	0/36
	2004	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/38	0/38
	2005	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/47	0/47
	2006	nd	nd	nd	nd	16 [5]	0/48	0/48
	2007	nd	nd	nd	nd	20 [5]	0/48	0/48
	2008	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/48	0/48
	2009	nd	nd	nd	nd	5 [2]	0/49	0/49
	2018	nd	nd	5	nd	4 [2]	7/47	7/47
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
水質 (pg/L)	2003	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/36	0/36
	2004	nd	nd	nd	nd	20 [7]	0/38	0/38
	2005	nd	nd	nd	nd	20 [5]	0/47	0/47
	2006	nd	nd	nd	nd	16 [5]	0/48	0/48
	2007	nd	nd	nd	nd	9 [3]	0/48	0/48
	2008	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/48	0/48
	2009	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/49	0/49
	2018	nd	nd	tr(2)	nd	6 [2]	1/47	1/47
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
水質 (pg/L)	2003	nd	nd	nd	nd	300 [90]	0/36	0/36
	2004	nd	nd	nd	nd	90 [30]	0/38	0/38
	2005	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/47	0/47
	2006	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/48	0/48
	2007	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/48	0/48
	2008	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/48	0/48
	2009	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/49	0/49
	2018	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/47	0/47

（注）2010 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

< 底質 >

○2003 年度から 2018 年度における底質についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	nd	nd	nd	nd	90 [30]	0/186	0/62
	2004	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/189	0/63
	2005	nd	nd	nd	nd	60 [30]	0/189	0/63
	2006	nd	nd	nd	nd	12 [4]	0/192	0/64
	2007	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/192	0/64
	2008	nd	nd	nd	nd	12 [5]	0/192	0/64
	2009	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/192	0/64
	2018	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/61	0/61
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	nd	nd	nd	nd	200 [50]	0/186	0/62
	2004	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/189	0/63
	2005	nd	nd	nd	nd	90 [40]	0/189	0/63
	2006	nd	nd	nd	nd	24 [7]	0/192	0/64
	2007	nd	nd	nd	nd	30 [10]	0/192	0/64
	2008	nd	nd	nd	nd	17 [6]	0/192	0/64
	2009	nd	nd	nd	nd	12 [5]	0/192	0/64
	2018	nd	nd	tr(3)	nd	8 [3]	1/61	1/61
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	nd	nd	nd	nd	4,000 [2,000]	0/186	0/62
	2004	nd	nd	nd	nd	2,000 [400]	0/189	0/63
	2005	nd	nd	nd	nd	2,000 [700]	0/189	0/63
	2006	nd	nd	nd	nd	210 [60]	0/192	0/64
	2007	nd	nd	nd	nd	300 [70]	0/192	0/64
	2008	nd	nd	nd	nd	90 [40]	0/192	0/64
	2009	nd	nd	nd	nd	80 [30]	0/192	0/64
	2018	nd	nd	tr(20)	nd	50 [20]	1/61	1/61

(注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2010 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2003 年度から 2018 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	nd	nd	tr(39)	nd	45 [15]	11/30	3/6
	2004	nd	nd	tr(32)	nd	42 [14]	15/31	3/7
	2005	nd	nd	tr(28)	nd	47 [16]	7/31	4/7
	2006	tr(9)	tr(12)	25	nd	18 [7]	21/31	5/7
	2007	tr(7)	tr(8)	20	nd	10 [4]	26/31	6/7
	2008	tr(7)	tr(8)	22	nd	9 [3]	27/31	7/7
	2009	9	9	23	nd	7 [3]	27/31	7/7
	2015	tr(10)	tr(15)	tr(17)	nd	23 [9]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2018	tr(10)	tr(15)	tr(15)	nd	21 [8]	2/3	2/3
	2003	tr(28)	tr(24)	810	nd	45 [15]	44/70	11/14
	2004	43	tr(41)	1,000	nd	42 [14]	54/70	13/14
	2005	tr(42)	53	900	nd	47 [16]	50/75	13/16
	2006	41	44	880	nd	18 [7]	70/80	15/16
	2007	24	32	690	nd	10 [4]	64/80	14/16
	2008	35	33	730	nd	9 [3]	79/85	17/17
	2009	25	20	690	nd	7 [3]	82/90	18/18
	2015	26	28	400	nd	23 [9]	13/19	13/19
	2018	tr(17)	tr(17)	280	nd	21 [8]	12/18	12/18

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	120	650	2,500	nd	45 [15]	5/10	1/2
	2004	70	340	810	nd	42 [14]	5/10	1/2
	2005	86	380	1,200	nd	47 [16]	5/10	1/2
	2006	48	290	750	nd	18 [7]	5/10	1/2
	2007	34	280	650	nd	10 [4]	5/10	1/2
	2008	38	320	1,200	nd	9 [3]	6/10	2/2
	2009	26	200	500	nd	7 [3]	6/10	2/2
	2015	---	---	tr(10)	tr(10)	23 [9]	1/1	1/1
	2018	53	---	54	53	21 [8]	2/2	2/2
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	tr(12)	tr(12)	58	nd	33 [11]	17/30	4/6
	2004	tr(15)	nd	tr(45)	nd	46 [15]	15/31	3/7
	2005	nd	nd	tr(38)	nd	54 [18]	9/31	4/7
	2006	tr(10)	14	32	nd	14 [5]	24/31	6/7
	2007	9	10	37	nd	9 [3]	27/31	7/7
	2008	tr(7)	tr(6)	23	nd	10 [4]	23/31	6/7
	2009	9	9	31	nd	8 [3]	27/31	7/7
	2015	tr(11)	tr(15)	tr(16)	nd	30 [10]	2/3	2/3
	2018	tr(9)	16	17	nd	16 [6]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	35	34	1,100	nd	33 [11]	55/70	14/14
	2004	60	61	1,300	nd	46 [15]	59/70	14/14
	2005	tr(52)	66	1,400	nd	54 [18]	55/80	13/16
	2006	56	52	1,300	nd	14 [5]	79/80	16/16
	2007	35	41	1,100	nd	9 [3]	77/80	16/16
	2008	44	45	1,000	nd	10 [4]	77/85	17/17
	2009	30	23	910	nd	8 [3]	85/90	18/18
	2015	tr(25)	tr(13)	640	nd	30 [10]	13/19	13/19
	2018	22	20	300	nd	16 [6]	16/18	16/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	110	850	3,000	nd	33 [11]	5/10	1/2
	2004	83	440	1,000	nd	46 [15]	5/10	1/2
	2005	100	480	1,500	nd	54 [18]	5/10	1/2
	2006	46	380	1,000	nd	14 [5]	5/10	1/2
	2007	34	360	930	nd	9 [3]	5/10	1/2
	2008	49	410	1,600	nd	10 [4]	5/10	1/2
	2009	29	250	620	nd	8 [3]	5/10	1/2
	2015	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1
	2018	tr(12)	---	tr(13)	tr(11)	16 [6]	2/2	2/2
Parlar-62	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	nd	nd	nd	nd	120 [40]	0/30	0/6
	2004	nd	nd	nd	nd	98 [33]	0/31	0/7
	2005	nd	nd	nd	nd	100 [34]	0/31	0/7
	2006	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/31	0/7
	2007	nd	nd	nd	nd	70 [30]	0/31	0/7
	2008	nd	nd	nd	nd	80 [30]	0/31	0/7
	2009	nd	nd	nd	nd	70 [20]	0/31	0/7
	2015	nd	nd	nd	nd	150 [60]	0/3	0/3
	2018	nd	nd	nd	nd	100 [40]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	nd	nd	580	nd	120 [40]	9/70	3/14
	2004	nd	nd	870	nd	98 [33]	24/70	7/14
	2005	nd	nd	830	nd	100 [34]	23/80	8/16
	2006	tr(30)	nd	870	nd	70 [30]	28/80	10/16
	2007	tr(30)	nd	530	nd	70 [30]	22/80	7/16
	2008	tr(30)	nd	590	nd	80 [30]	31/85	8/17
	2009	tr(20)	nd	660	nd	70 [20]	24/90	8/18
	2015	nd	nd	320	nd	150 [60]	2/19	2/19
	2018	nd	nd	150	nd	100 [40]	3/18	3/18

Parlar-62	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	tr(96)	200	530	nd	120 [40]	5/10	1/2
	2004	tr(64)	110	280	nd	98 [33]	5/10	1/2
	2005	tr(78)	130	460	nd	100 [34]	5/10	1/2
	2006	70	120	430	nd	70 [30]	5/10	1/2
	2007	tr(60)	100	300	nd	70 [30]	5/10	1/2
	2008	tr(70)	130	360	nd	80 [30]	5/10	1/2
	2009	tr(40)	80	210	nd	70 [20]	5/10	1/2
	2015	---	---	nd	nd	150 [60]	0/1	0/1
	2018	nd	---	nd	nd	100 [40]	0/2	0/2

(注1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の 2015 年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2009 年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2010 年度から 2014 年度、2016 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

< 大気 >


○2003 年度から 2018 年度における大気についての Parlar-26、Parlar-50 及び Parlar-62 の検出状況

Parlar-26	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	0.31	0.31	0.77	tr(0.17)	0.20 [0.066]	35/35	35/35
	2003 寒冷期	tr(0.17)	tr(0.17)	0.27	tr(0.091)		34/34	34/34
	2004 温暖期	0.27	0.26	0.46	tr(0.17)	0.20 [0.066]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	tr(0.15)	tr(0.15)	0.50	tr(0.094)		37/37	37/37
	2005 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.3 [0.1]	0/37	0/37
	2005 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2006 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.6]	0/37	0/37
	2006 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2007 温暖期	nd	nd	tr(0.3)	nd	0.6 [0.2]	18/36	18/36
	2007 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	2008 温暖期	tr(0.21)	0.22	0.58	tr(0.12)	0.22 [0.08]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	tr(0.11)	tr(0.12)	tr(0.20)	nd		36/37	36/37
	2009 温暖期	tr(0.18)	tr(0.19)	0.26	tr(0.11)	0.23 [0.09]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	tr(0.12)	tr(0.13)	0.27	nd		33/37	33/37
	2018	nd	nd	tr(0.3)	nd	0.4 [0.2]	12/37	12/37
Parlar-50	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	nd	nd	tr(0.37)	nd	0.81 [0.27]	2/35	2/35
	2003 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/34	0/34
	2004 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.2 [0.4]	0/37	0/37
	2004 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2005 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.6 [0.2]	0/37	0/37
	2005 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2006 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.5]	0/37	0/37
	2006 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2007 温暖期	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	nd	0.3 [0.1]	29/36	29/36
	2007 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	2008 温暖期	nd	nd	tr(0.19)	nd	0.25 [0.09]	15/37	15/37
	2008 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2009 温暖期	nd	nd	tr(0.1)	nd	0.3 [0.1]	11/37	11/37
	2009 寒冷期	nd	nd	tr(0.1)	nd		1/37	1/37
	2018	nd	nd	tr(0.2)	nd	0.5 [0.2]	2/37	2/37

Parlar-62	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.52]	0/35	0/35
	2003 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/34	0/34
	2004 温暖期	nd	nd	nd	nd	2.4 [0.81]	0/37	0/37
	2004 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2005 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.2 [0.4]	0/37	0/37
	2005 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2006 温暖期	nd	nd	nd	nd	8 [3]	0/37	0/37
	2006 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2007 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.5 [0.6]	0/36	0/36
	2007 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/36	0/36
	2008 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.6]	0/37	0/37
	2008 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2009 温暖期	nd	nd	nd	nd	1.6 [0.6]	0/37	0/37
	2009 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2018	nd	nd	nd	nd	0.4 [0.2]	0/37	0/37

(注) 2010 年度から 2017 年度は調査を実施していない。


[9-1] Parlar-26



- (注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2009 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度、2010 年度から 2014 年度、2016 年度、2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 4) 2003 年度から 2005 年度の貝類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-9-1-1 トキサフェン Parlar-26 の生物の経年変化（幾何平均値）


[9-1] Parlar-26



- (注 1) 2002 年度、2010 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2005 年度から 2007 年度の温暖期及び寒冷期並びに 2018 年度の温暖期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-9-1-2 トキサフェン Parlar-26 の大気の大気経年変化（幾何平均値）

[9-2] Parlar-50



- (注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2009 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度、2010 年度から 2014 年度、2016 年度、2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 4) 2005 年度の貝類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-9-2-1 トキサフェン Parlar-50 の生物の経年変化 (幾何平均値)

[10] マイレックス（参考）

・調査の経緯及び実施状況

マイレックスは、米国で開発された有機塩素系殺虫剤で、海外では難燃剤としても使用されている。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。2002年9月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs条約においては、2004年に条約が発効された当初から条約対象物質に指定されている。

継続的調査としては2003年度が初めての調査であり、2002年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)}では、1983年度に水質及び底質を調査している。

2002年度以降のモニタリング調査においては、2003年度から2009年度、2011年度及び2018年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2019年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2018年度までの調査結果を示す。

・2018年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2003年度から2018年度における水質についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2003	tr(0.13)	tr(0.12)	0.8	nd	0.3 [0.09]	25/36	25/36
	2004	nd	nd	1.1	nd	0.4 [0.2]	18/38	18/38
	2005	nd	nd	1.0	nd	0.4 [0.1]	14/47	14/47
	2006	nd	nd	0.07	nd	1.6 [0.5]	1/48	1/48
	2007	nd	nd	tr(0.5)	nd	1.1 [0.4]	2/48	2/48
	2008	nd	nd	0.7	nd	0.6 [0.2]	4/48	4/48
	2009	nd	nd	0.5	nd	0.4 [0.2]	8/49	8/49
	2011	nd	nd	0.8	nd	0.5 [0.2]	3/49	3/49
	2018	nd	nd	1.0	nd	0.7 [0.3]	3/47	3/47

（注1）2010年度及び2012年度から2017年度は調査を実施していない。

（注2）2006年度に検出された1検体は、他の47検体とは異なり、大量採水装置を用いて採取され、定量[検出]下限値が0.06 [0.02]pg/Lにおいて測定されたものである。

<底質>

○2003年度から2018年度における底質についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	2	tr(1.6)	1,500	nd	2 [0.4]	137/186	51/62
	2004	2	tr(1.6)	220	nd	2 [0.5]	153/189	55/63
	2005	1.8	1.2	5,300	nd	0.9 [0.3]	134/189	48/63
	2006	1.7	1.2	640	nd	0.6 [0.2]	156/192	57/64
	2007	1.5	0.9	200	nd	0.9 [0.3]	147/192	55/64
	2008	1.4	1.1	820	nd	0.7 [0.3]	117/192	48/64
	2009	1.4	1.3	620	nd	1.0 [0.4]	126/192	49/64
	2011	1.2	0.9	1,900	nd	0.9 [0.4]	42/64	42/64
	2018	1.1	0.9	240	nd	0.8 [0.3]	44/61	44/61

（注1）2003年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注2）2010年度及び2012年度から2017年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2003 年度から 2018 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	4.9	4.2	19	tr(1.6)	2.4 [0.81]	30/30	6/6
	2004	4.4	4.3	12	tr(1.1)	2.5 [0.82]	31/31	7/7
	2005	5.4	5.2	20	tr(1.9)	3.0 [0.99]	31/31	7/7
	2006	5	4	19	tr(2)	3 [1]	31/31	7/7
	2007	5	4	18	tr(2)	3 [1]	31/31	7/7
	2008	4	tr(3)	18	tr(2)	4 [1]	31/31	7/7
	2009	5.9	5.2	21	tr(1.7)	2.1 [0.8]	31/31	7/7
	2011	10	7.1	44	5.2	1.9 [0.8]	4/4	4/4
魚類 (pg/g-wet)	2018	4.9	3.2	20	1.8	1.4 [0.5]	3/3	3/3
	2003	8.3	9.0	25	tr(1.7)	2.4 [0.81]	70/70	14/14
	2004	13	11	180	3.8	2.5 [0.82]	70/70	14/14
	2005	13	13	78	tr(1.0)	3.0 [0.99]	80/80	16/16
	2006	11	10	53	tr(2)	3 [1]	80/80	16/16
	2007	9	11	36	tr(1)	3 [1]	80/80	16/16
	2008	11	13	48	tr(1)	4 [1]	85/85	17/17
	2009	8.6	9.6	37	tr(0.9)	2.1 [0.8]	90/90	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2011	12	15	41	tr(1.3)	1.9 [0.8]	18/18	18/18
	2018	8.2	8.4	70	1.9	1.4 [0.5]	18/18	18/18
	2003	120	150	450	31	2.4 [0.81]	10/10	2/2
	2004	61	64	110	33	2.5 [0.82]	10/10	2/2
	2005	77	66	180	41	3.0 [0.99]	10/10	2/2
	2006	77	70	280	39	3 [1]	10/10	2/2
	2007	57	59	100	32	3 [1]	10/10	2/2
	2008	74	68	260	27	4 [1]	10/10	2/2
	2009	49	50	79	32	2.1 [0.8]	10/10	2/2
	2011	---	---	58	58	1.9 [0.8]	1/1	1/1
	2018	110	---	260	47	1.4 [0.5]	2/2	2/2

(注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2018 年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011 年度までの結果と継続性がない。


(注 2) 2010 年度及び 2012 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

< 大気 >

○2003 年度から 2018 年度における大気についてのマイレックスの検出状況

マイレックス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2003 温暖期	0.11	0.12	0.19	0.047	0.0084	35/35	35/35
	2003 寒冷期	0.044	0.043	0.099	0.024	[0.0028]	34/34	34/34
	2004 温暖期	0.099	0.11	0.16	tr(0.042)	0.05 [0.017]	37/37	37/37
	2004 寒冷期	tr(0.046)	tr(0.047)	0.23	tr(0.019)		37/37	37/37
	2005 温暖期	tr(0.09)	tr(0.09)	0.24	tr(0.05)	0.10 [0.03]	37/37	37/37
	2005 寒冷期	tr(0.04)	tr(0.04)	tr(0.08)	nd		29/37	29/37
	2006 温暖期	tr(0.07)	tr(0.10)	0.22	nd	0.13 [0.04]	29/37	29/37
	2006 寒冷期	tr(0.07)	tr(0.07)	2.1	nd		27/37	27/37
	2007 温暖期	0.11	0.11	0.28	0.04	0.03 [0.01]	36/36	36/36
	2007 寒冷期	0.04	0.04	0.09	tr(0.02)		36/36	36/36
	2008 温暖期	0.09	0.09	0.25	0.03	0.03 [0.01]	37/37	37/37
	2008 寒冷期	0.05	0.04	0.08	0.03		37/37	37/37
	2009 温暖期	0.12	0.13	0.48	0.049	0.015 [0.006]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.058	0.054	0.18	0.030		37/37	37/37
	2011 温暖期	0.14	0.13	0.25	0.08	0.04 [0.01]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	0.07	0.07	0.11	tr(0.03)		37/37	37/37
	2018	0.09	0.09	0.20	0.05	0.03 [0.01]	37/37	37/37


(注) 2010 年度及び 2012 年度から 2017 年度は調査を実施していない。



(注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2002 年度、2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-10-1 マイレックスの底質の経年変化（幾何平均値）



(注 1) 2003 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2002 年度、2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-10-3 マイレックスの生物の経年変化（幾何平均値）



(注) 2002 年度、2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-10-4 マイレックスの大気の経年変化 (幾何平均値)

[11] HCH 類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

HCH 類は、農薬、殺虫剤及びシロアリ駆除剤等として使用された。1971 年に農薬取締法に基づく登録が失効したが、その後もシロアリ駆除剤や木材処理剤として使われていた。2009 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議（COP4）において、HCH 類のうち α -HCH、 β -HCH 及び γ -HCH（別名：リンデン）について条約対象物質とすることが採択され、2010 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

HCH 類には多くの異性体が存在するが、継続的調査においては α -体、 β -体、 γ -体及び δ -体の 4 種の異性体を調査対象物質として水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）並びに大気についてモニタリング調査を実施している。

2001 年度までの継続的調査においては、 α -体及び β -体について「水質・底質モニタリング」ⁱ⁾ で水質は 1986 年度から 1998 年度まで、底質は 1986 年度から 2001 年度の全期間にわたって調査している。「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ では、1978 年度から 1996 年度までの毎年と 1998 年度、2000 年度及び 2001 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査している（ γ -体は 1997 年度以降、 δ -体は 1993 年度以降未実施）。

2002 年度以降のモニタリング調査では、 α -体及び β -体の水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）について 2002 年度から、 α -体及び β -体の大気並びに γ -体及び δ -体の水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気については 2003 年度からそれぞれ調査を開始し、それ以降、2017 年度までの毎年度並びに 2019 年度及び 2022 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していないため、参考として以下に、2022 年度までの調査結果を示す。

・2022 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2002 年度から 2022 年度における水質についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注 1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
水質 (pg/L)	2002	86	76	6,500	1.9	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	2003	120	120	970	13	3 [0.9]	36/36	36/36
	2004	150	140	5,700	13	6 [2]	38/38	38/38
	2005	90	81	660	16	4 [1]	47/47	47/47
	2006	110	90	2,100	25	3 [1]	48/48	48/48
	2007	76	73	720	13	1.9 [0.6]	48/48	48/48
	2008	78	75	1,100	9	4 [2]	48/48	48/48
	2009	74	73	560	14	1.2 [0.4]	49/49	49/49
	2010	94	75	1,400	14	4 [1]	49/49	49/49
	2011	67	60	1,000	11	7 [3]	49/49	49/49
	2012	65	56	2,200	9.5	1.4 [0.5]	48/48	48/48
	2013	57	55	1,900	9	7 [2]	48/48	48/48
	2014	47	41	700	7.3	4.5 [1.5]	48/48	48/48
	2015	48	40	610	8.7	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	2016	38	36	640	5.1	1.1 [0.4]	48/48	48/48
	2017	47	45	680	3.7	0.9 [0.4]	47/47	47/47
	2019	35	37	640	tr(2)	4 [2]	48/48	48/48
	2022	24	21	430	1.9	1.2 [0.5]	48/48	48/48

β -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2002	210	180	1,600	24	0.9 [0.3]	114/114	38/38
	2003	250	240	1,700	14	3 [0.7]	36/36	36/36
	2004	260	250	3,400	31	4 [2]	38/38	38/38
	2005	200	170	2,300	25	2.6 [0.9]	47/47	47/47
	2006	200	160	2,000	42	1.7 [0.6]	48/48	48/48
	2007	170	150	1,300	18	2.7 [0.9]	48/48	48/48
	2008	150	150	1,800	15	1.0 [0.4]	48/48	48/48
	2009	150	150	1,100	18	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	2010	180	160	2,500	33	2.0 [0.7]	49/49	49/49
	2011	130	120	840	28	2.0 [0.8]	49/49	49/49
	2012	150	130	820	17	1.4 [0.5]	48/48	48/48
	2013	130	130	1,100	20	7 [2]	48/48	48/48
	2014	100	110	1,100	11	1.0 [0.4]	48/48	48/48
	2015	130	120	1,100	21	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	2016	100	96	1,100	12	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	2017	100	110	830	12	1.8 [0.7]	47/47	47/47
	2019	100	92	570	17	3 [1]	48/48	48/48
	2022	76	69	540	9.5	0.6 [0.2]	48/48	48/48
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2003	92	90	370	32	7 [2]	36/36	36/36
	2004	91	76	8,200	21	20 [7]	38/38	38/38
	2005	48	40	250	tr(8)	14 [5]	47/47	47/47
	2006	44	43	460	tr(9)	18 [6]	48/48	48/48
	2007	34	32	290	5.2	2.1 [0.7]	48/48	48/48
	2008	34	32	340	4	3 [1]	48/48	48/48
	2009	32	26	280	5.1	0.6 [0.2]	49/49	49/49
	2010	26	22	190	tr(5)	6 [2]	49/49	49/49
	2011	23	20	170	3	3 [1]	49/49	49/49
	2012	22	21	440	3.0	1.3 [0.4]	48/48	48/48
	2013	21	17	560	3.2	2.7 [0.8]	48/48	48/48
	2014	18	18	350	3.5	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	2015	17	15	110	2.6	0.9 [0.3]	48/48	48/48
	2016	14	13	130	1.8	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2017	17	16	190	2.1	1.4 [0.5]	47/47	47/47
	2019	14	12	480	nd	4 [2]	47/48	47/48
	2022	9.3	8.0	120	tr(0.6)	0.8 [0.3]	48/48	48/48
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2003	14	14	200	tr(1.1)	2 [0.5]	36/36	36/36
	2004	24	29	670	tr(1.4)	2 [0.7]	38/38	38/38
	2005	1.8	nd	62	nd	1.5 [0.5]	23/47	23/47
	2006	24	18	1,000	2.2	2.0 [0.8]	48/48	48/48
	2007	11	9.7	720	tr(0.7)	1.2 [0.4]	48/48	48/48
	2008	11	10	1,900	tr(1.1)	2.3 [0.9]	48/48	48/48
	2009	10	11	450	tr(0.7)	0.9 [0.4]	49/49	49/49
	2010	16	17	780	0.9	0.8 [0.3]	49/49	49/49
	2011	8.6	8.9	300	0.7	0.4 [0.2]	49/49	49/49
	2012	7.9	6.7	220	tr(0.5)	1.1 [0.4]	48/48	48/48
	2013	8.2	8.9	320	tr(0.6)	1.1 [0.4]	48/48	48/48
	2014	7.1	6.5	590	0.7	0.4 [0.2]	48/48	48/48
	2015	7.2	7.4	310	0.8	0.3 [0.1]	48/48	48/48
	2016	5.5	6.0	920	tr(0.5)	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2017	8.2	8.2	690	tr(0.4)	1.0 [0.4]	47/47	47/47
	2019	5.1	5.3	85	nd	1.0 [0.4]	46/48	46/48
	2022	3.6	3.0	90	nd	1.8 [0.7]	41/48	41/48

(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2018 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。また、2002 年度は α -HCH 及び β -HCH のみの調査で、 γ -HCH (別名：リンデン) 及び δ -HCH の調査は実施していない。

<底質>

○2002年度から2022年度における底質についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH及び δ -HCHの検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	150	170	8,200	2.0	1.2 [0.4]	189/189	63/63
	2003	160	170	9,500	2	2 [0.5]	186/186	62/62
	2004	160	180	5,700	tr(1.5)	2 [0.6]	189/189	63/63
	2005	140	160	7,000	3.4	1.7 [0.6]	189/189	63/63
	2006	140	160	4,300	tr(2)	5 [2]	192/192	64/64
	2007	140	150	12,000	tr(1.3)	1.8 [0.6]	192/192	64/64
	2008	140	190	5,200	nd	1.6 [0.6]	191/192	64/64
	2009	120	120	6,300	nd	1.1 [0.4]	191/192	64/64
	2010	140	140	3,700	3.1	2.0 [0.8]	64/64	64/64
	2011	120	140	5,100	1.6	1.5 [0.6]	64/64	64/64
	2012	100	100	3,900	tr(1.1)	1.6 [0.5]	63/63	63/63
	2013	94	98	3,200	tr(0.6)	1.5 [0.5]	63/63	63/63
	2014	84	93	4,300	nd	2.4 [0.8]	62/63	62/63
	2015	97	120	9,600	1.1	0.7 [0.3]	62/62	62/62
	2016	64	77	5,000	1.1	0.9 [0.3]	62/62	62/62
	2017	77	86	1,900	1.0	0.5 [0.2]	62/62	62/62
	2019	67	83	2,600	1.3	1.1 [0.4]	61/61	61/61
	2022	67	80	2,800	1.2	0.9 [0.3]	61/61	61/61
β -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2002	230	230	11,000	3.9	0.9 [0.3]	189/189	63/63
	2003	250	220	39,000	5	2 [0.7]	186/186	62/62
	2004	240	230	53,000	4	3 [0.8]	189/189	63/63
	2005	200	220	13,000	3.9	2.6 [0.9]	189/189	63/63
	2006	190	210	21,000	2.3	1.3 [0.4]	192/192	64/64
	2007	200	190	59,000	1.6	0.9 [0.3]	192/192	64/64
	2008	190	200	8,900	2.8	0.8 [0.3]	192/192	64/64
	2009	180	170	10,000	2.4	1.3 [0.5]	192/192	64/64
	2010	230	210	8,200	11	2.4 [0.8]	64/64	64/64
	2011	180	210	14,000	3	3 [1]	64/64	64/64
	2012	160	170	8,300	3.7	1.5 [0.6]	63/63	63/63
	2013	160	170	6,900	4.5	0.4 [0.1]	63/63	63/63
	2014	140	140	7,200	2.9	0.9 [0.3]	63/63	63/63
	2015	160	170	5,900	2.5	0.8 [0.3]	62/62	62/62
	2016	130	160	6,000	3.7	0.9 [0.3]	62/62	62/62
	2017	140	110	3,400	5.7	1.5 [0.6]	62/62	62/62
	2019	130	110	4,100	4.0	1.2 [0.5]	61/61	61/61
	2022	120	100	2,900	2.2	1.6 [0.6]	61/61	61/61
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出]	検出頻度	
						下限値	検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	51	47	4,000	tr(1.4)	2 [0.4]	186/186	62/62
	2004	53	48	4,100	tr(0.8)	2 [0.5]	189/189	63/63
	2005	49	46	6,400	tr(1.8)	2.0 [0.7]	189/189	63/63
	2006	48	49	3,500	tr(1.4)	2.1 [0.7]	192/192	64/64
	2007	42	41	5,200	tr(0.6)	1.2 [0.4]	192/192	64/64
	2008	40	43	2,200	tr(0.7)	0.9 [0.4]	192/192	64/64
	2009	38	43	3,800	nd	0.6 [0.2]	191/192	64/64
	2010	35	30	2,300	tr(1.5)	2.0 [0.7]	64/64	64/64
	2011	35	42	3,500	nd	3 [1]	62/64	62/64
	2012	30	29	3,500	nd	1.3 [0.4]	61/63	61/63
	2013	33	35	2,100	0.9	0.6 [0.2]	63/63	63/63
	2014	27	30	2,600	nd	2.7 [0.9]	61/63	61/63
	2015	29	35	2,800	tr(0.3)	0.5 [0.2]	62/62	62/62
	2016	20	25	3,100	tr(0.7)	0.8 [0.3]	62/62	62/62
	2017	23	25	1,900	tr(0.4)	1.0 [0.4]	62/62	62/62
	2019	23	27	2,100	tr(0.6)	1.0 [0.4]	61/61	61/61
	2022	23	29	2,100	tr(0.7)	1.3 [0.5]	61/61	61/61

δ -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2003	42	46	5,400	nd	2 [0.7]	180/186	61/62
	2004	55	55	5,500	tr(0.5)	2 [0.5]	189/189	63/63
	2005	52	63	6,200	nd	1.0 [0.3]	188/189	63/63
	2006	45	47	6,000	nd	1.7 [0.6]	189/192	64/64
	2007	26	28	5,400	nd	5 [2]	165/192	60/64
	2008	41	53	3,300	nd	2 [1]	186/192	64/64
	2009	36	37	5,000	nd	1.2 [0.5]	190/192	64/64
	2010	39	40	3,800	1.3	1.2 [0.5]	64/64	64/64
	2011	37	47	5,000	nd	1.4 [0.5]	63/64	63/64
	2012	28	28	3,100	nd	0.8 [0.3]	62/63	62/63
	2013	31	29	2,500	0.4	0.3 [0.1]	63/63	63/63
	2014	27	26	3,900	0.4	0.4 [0.1]	63/63	63/63
	2015	27	28	2,900	tr(0.4)	0.5 [0.2]	62/62	62/62
	2016	20	24	6,100	nd	0.5 [0.2]	60/62	60/62
	2017	25	22	1,700	tr(0.2)	0.6 [0.2]	62/62	62/62
	2019	22	23	2,500	tr(0.2)	0.5 [0.2]	61/61	61/61
	2022	21	24	2,300	tr(0.6)	0.7 [0.3]	61/61	61/61

(注1) 2002年度から2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2018年度、2020年度及び2021年度は調査を実施していない。また、2002年度は α -HCH及び β -HCHのみの調査で、 γ -HCH(別名：リンデン)及び δ -HCHの調査は実施していない。

<生物>

○2002年度から2022年度における生物(貝類、魚類及び鳥類)についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH及び δ -HCHの検出状況

α -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	67	64	1,100	12	4.2 [1.4]	38/38	8/8
	2003	45	30	610	9.9	1.8 [0.61]	30/30	6/6
	2004	56	25	1,800	tr(12)	13 [4.3]	31/31	7/7
	2005	38	25	1,100	tr(7.1)	11 [3.6]	31/31	7/7
	2006	30	21	390	6	3 [1]	31/31	7/7
	2007	31	17	1,400	8	7 [2]	31/31	7/7
	2008	26	16	380	7	6 [2]	31/31	7/7
	2009	45	21	2,200	9	5 [2]	31/31	7/7
	2010	35	20	730	13	3 [1]	6/6	6/6
	2011	64	33	1,200	13	3 [1]	4/4	4/4
	2012	23	12	340	4.0	3.7 [1.2]	5/5	5/5
	2013	30	25	690	6	3 [1]	5/5	5/5
	2014	16	16	39	7	3 [1]	3/3	3/3
	2015	11	15	25	3.5	3.0 [1.0]	3/3	3/3
	2016	13	20	22	5	3 [1]	3/3	3/3
	2017	15	16	32	6	3 [1]	3/3	3/3
	2019	9	12	14	4	4 [2]	3/3	3/3
	2022	7.4	10	16	2.5	1.1 [0.4]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	57	56	590	tr(1.9)	4.2 [1.4]	70/70	14/14
	2003	43	58	590	2.6	1.8 [0.61]	70/70	14/14
	2004	57	55	2,900	nd	13 [4.3]	63/70	14/14
	2005	42	43	1,000	nd	11 [3.6]	75/80	16/16
	2006	44	53	360	tr(2)	3 [1]	80/80	16/16
	2007	39	40	730	tr(2)	7 [2]	80/80	16/16
	2008	36	47	410	nd	6 [2]	84/85	17/17
	2009	39	32	830	tr(2)	5 [2]	90/90	18/18
	2010	27	39	250	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
	2011	37	54	690	tr(2)	3 [1]	18/18	18/18
	2012	24	32	170	nd	3.7 [1.2]	18/19	18/19
	2013	32	47	320	tr(2)	3 [1]	19/19	19/19
	2014	26	40	210	nd	3 [1]	18/19	18/19
	2015	18	26	180	tr(1.3)	3.0 [1.0]	19/19	19/19
	2016	15	17	81	nd	3 [1]	18/19	18/19
	2017	20	29	130	nd	3 [1]	18/19	18/19
	2019	8	8	130	nd	4 [2]	12/16	12/16
	2022	8.7	6.8	82	nd	1.1 [0.4]	17/18	17/18

α -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	170	130	360	93	4.2 [1.4]	10/10	2/2
	2003	73	74	230	30	1.8 [0.61]	10/10	2/2
	2004	190	80	1,600	58	13 [4.3]	10/10	2/2
	2005	76	77	85	67	11 [3.6]	10/10	2/2
	2006	76	75	100	55	3 [1]	10/10	2/2
	2007	75	59	210	43	7 [2]	10/10	2/2
	2008	48	48	61	32	6 [2]	10/10	2/2
	2009	43	42	56	34	5 [2]	10/10	2/2
	2010	260	---	430	160	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	48	48	3 [1]	1/1	1/1
	2012	35	---	39	32	3.7 [1.2]	2/2	2/2
	2013	46	---	130	16	3 [1]	2/2	2/2
	2014	61	---	220	17	3 [1]	2/2	2/2
	2015	---	---	13	13	3.0 [1.0]	1/1	1/1
	2016	63	---	170	23	3 [1]	2/2	2/2
	2017	81	---	930	7	3 [1]	2/2	2/2
	2019	---	---	63	63	4 [2]	1/1	1/1
	2022	47	---	63	35	1.1 [0.4]	2/2	2/2
β -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2002	88	62	1,700	32	12 [4]	38/38	8/8
	2003	78	50	1,100	23	9.9 [3.3]	30/30	6/6
	2004	100	74	1,800	22	6.1 [2.0]	31/31	7/7
	2005	85	56	2,000	20	2.2 [0.75]	31/31	7/7
	2006	81	70	880	11	3 [1]	31/31	7/7
	2007	79	56	1,800	21	7 [3]	31/31	7/7
	2008	73	51	1,100	23	6 [2]	31/31	7/7
	2009	83	55	1,600	27	6 [2]	31/31	7/7
	2010	89	56	1,500	27	3 [1]	6/6	6/6
	2011	130	68	2,000	39	3 [1]	4/4	4/4
	2012	65	37	980	15	2.0 [0.8]	5/5	5/5
	2013	61	47	710	17	2.2 [0.8]	5/5	5/5
	2014	40	35	64	28	2.4 [0.9]	3/3	3/3
	2015	34	45	69	13	3.0 [1.0]	3/3	3/3
	2016	37	47	50	21	3 [1]	3/3	3/3
	2017	39	47	60	21	3 [1]	3/3	3/3
	2019	23	32	33	11	3 [1]	3/3	3/3
	2022	18	17	35	10	1.0 [0.4]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2002	110	120	1,800	tr(5)	12 [4]	70/70	14/14
	2003	81	96	1,100	tr(3.5)	9.9 [3.3]	70/70	14/14
	2004	110	140	1,100	tr(3.9)	6.1 [2.0]	70/70	14/14
	2005	95	110	1,300	6.7	2.2 [0.75]	80/80	16/16
	2006	89	110	1,100	4	3 [1]	80/80	16/16
	2007	110	120	810	7	7 [3]	80/80	16/16
	2008	94	150	750	tr(4)	6 [2]	85/85	17/17
	2009	98	130	970	tr(5)	6 [2]	90/90	18/18
	2010	81	110	760	5	3 [1]	18/18	18/18
	2011	100	140	710	4	3 [1]	18/18	18/18
	2012	72	100	510	6.5	2.0 [0.8]	19/19	19/19
	2013	80	110	420	7.2	2.2 [0.8]	19/19	19/19
	2014	75	140	460	4.4	2.4 [0.9]	19/19	19/19
	2015	56	94	390	6.0	3.0 [1.0]	19/19	19/19
	2016	41	65	200	5	3 [1]	19/19	19/19
	2017	54	86	290	4	3 [1]	19/19	19/19
	2019	27	35	400	3	3 [1]	16/16	16/16
	2022	32	38	230	2.2	1.0 [0.4]	18/18	18/18

β -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2002	3,000	3,000	7,300	1,600	12 [4]	10/10	2/2
	2003	3,400	3,900	5,900	1,800	9.9 [3.3]	10/10	2/2
	2004	2,300	2,100	4,800	1,100	6.1 [2.0]	10/10	2/2
	2005	2,500	2,800	6,000	930	2.2 [0.75]	10/10	2/2
	2006	2,100	2,400	4,200	1,100	3 [1]	10/10	2/2
	2007	2,000	1,900	3,200	1,400	7 [3]	10/10	2/2
	2008	2,400	2,000	5,600	1,300	6 [2]	10/10	2/2
	2009	1,600	1,400	4,200	870	6 [2]	10/10	2/2
	2010	1,600	---	2,800	910	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	4,500	4,500	3 [1]	1/1	1/1
	2012	1,400	---	2,600	730	2.0 [0.8]	2/2	2/2
	2013	1,400	---	3,000	610	2.2 [0.8]	2/2	2/2
	2014	290	---	3,600	24	2.4 [0.9]	2/2	2/2
	2015	---	---	57	57	3.0 [1.0]	1/1	1/1
	2016	1,400	---	2,600	790	3 [1]	2/2	2/2
	2017	1,000	---	3,500	300	3 [1]	2/2	2/2
	2019	---	---	950	950	3 [1]	1/1	1/1
	2022	1,100	---	1,300	970	1.0 [0.4]	2/2	2/2
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	19	18	130	5.2	3.3 [1.1]	30/30	6/6
	2004	tr(24)	tr(16)	230	nd	31 [10]	28/31	7/7
	2005	23	13	370	tr(5.7)	8.4 [2.8]	31/31	7/7
	2006	18	12	140	7	4 [2]	31/31	7/7
	2007	16	10	450	tr(4)	9 [3]	31/31	7/7
	2008	12	10	98	tr(3)	9 [3]	31/31	7/7
	2009	14	12	89	tr(3)	7 [3]	31/31	7/7
	2010	14	9	150	5	3 [1]	6/6	6/6
	2011	26	17	320	5	3 [1]	4/4	4/4
	2012	8.1	3.5	68	3.0	2.3 [0.9]	5/5	5/5
	2013	7.2	3.9	31	tr(2.1)	2.4 [0.9]	5/5	5/5
	2014	7.4	4.8	18	4.6	2.2 [0.8]	3/3	3/3
	2015	7.3	7.8	14	tr(3.6)	4.8 [1.6]	3/3	3/3
	2016	6	5	11	4	3 [1]	3/3	3/3
	2017	4	3	11	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3
	2019	tr(2)	tr(2)	7	nd	4 [1]	2/3	2/3
	2022	3.5	5.1	8.4	tr(1.0)	1.1 [0.4]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	16	22	130	tr(1.7)	3.3 [1.1]	70/70	14/14
	2004	tr(28)	tr(24)	660	nd	31 [10]	55/70	11/14
	2005	17	17	230	nd	8.4 [2.8]	78/80	16/16
	2006	19	22	97	tr(2)	4 [2]	80/80	16/16
	2007	15	15	190	nd	9 [3]	71/80	15/16
	2008	13	16	96	nd	9 [3]	70/85	15/17
	2009	14	12	180	nd	7 [3]	81/90	17/18
	2010	9	13	56	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
	2011	12	15	160	tr(1)	3 [1]	18/18	18/18
	2012	7.8	12	43	nd	2.3 [0.9]	18/19	18/19
	2013	8.6	12	81	nd	2.4 [0.9]	17/19	17/19
	2014	8.4	14	45	nd	2.2 [0.8]	16/19	16/19
	2015	6.1	7.9	42	nd	4.8 [1.6]	14/19	14/19
	2016	5	5	43	nd	3 [1]	18/19	18/19
	2017	6	9	30	nd	3 [1]	16/19	16/19
	2019	tr(3)	tr(3)	34	nd	4 [1]	13/16	13/16
	2022	3.0	2.8	24	nd	1.1 [0.4]	17/18	17/18

γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	14	19	40	3.7	3.3 [1.1]	10/10	2/2
	2004	64	tr(21)	1,200	tr(11)	31 [10]	10/10	2/2
	2005	18	20	32	9.6	8.4 [2.8]	10/10	2/2
	2006	16	17	29	8	4 [2]	10/10	2/2
	2007	21	14	140	tr(8)	9 [3]	10/10	2/2
	2008	12	14	19	tr(5)	9 [3]	10/10	2/2
	2009	11	11	21	tr(6)	7 [3]	10/10	2/2
	2010	10	---	23	4	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	26	26	3 [1]	1/1	1/1
	2012	11	---	19	6.3	2.3 [0.9]	2/2	2/2
	2013	6.0	---	24	tr(1.5)	2.4 [0.9]	2/2	2/2
	2014	10	---	24	4.4	2.2 [0.8]	2/2	2/2
	2015	---	---	nd	nd	4.8 [1.6]	0/1	0/1
	2016	5	---	14	tr(2)	3 [1]	2/2	2/2
	2017	4	---	20	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
	2019	---	---	7	7	4 [1]	1/1	1/1
	2022	3.4	---	6.6	1.8	1.1 [0.4]	2/2	2/2
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2003	7.4	tr(2.6)	1,300	nd	3.9 [1.3]	29/30	6/6
	2004	6.3	tr(2.1)	1,500	nd	4.6 [1.5]	25/31	6/7
	2005	5.4	tr(2.1)	1,600	nd	5.1 [1.7]	23/31	6/7
	2006	6	tr(2)	890	tr(1)	3 [1]	31/31	7/7
	2007	4	nd	750	nd	4 [2]	12/31	4/7
	2008	tr(3)	nd	610	nd	6 [2]	7/31	3/7
	2009	tr(4)	nd	700	nd	5 [2]	14/31	4/7
	2010	4	tr(2)	870	nd	3 [1]	5/6	5/6
	2011	9	tr(2)	1,400	tr(1)	3 [1]	4/4	4/4
	2012	3	tr(1)	580	nd	3 [1]	3/5	3/5
	2013	3	tr(1)	230	nd	3 [1]	3/5	3/5
	2014	tr(1)	tr(2)	3	nd	3 [1]	2/3	2/3
	2015	nd	nd	tr(1.5)	nd	2.1 [0.8]	1/3	1/3
	2016	tr(1)	tr(1)	tr(2)	tr(1)	3 [1]	3/3	3/3
	2017	tr(1.7)	tr(1.6)	3.0	tr(1.0)	2.3 [0.9]	3/3	3/3
	2019	nd	nd	nd	nd	4 [2]	0/3	0/3
	2022	tr(0.7)	tr(0.6)	3.0	nd	1.0 [0.4]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2003	tr(3.6)	4.0	16	nd	3.9 [1.3]	59/70	13/14
	2004	tr(4.2)	tr(3.5)	270	nd	4.6 [1.5]	54/70	11/14
	2005	tr(3.2)	tr(3.1)	32	nd	5.1 [1.7]	55/80	12/16
	2006	4	3	35	nd	3 [1]	72/80	16/16
	2007	tr(3)	tr(2)	31	nd	4 [2]	42/80	10/16
	2008	tr(4)	tr(3)	77	nd	6 [2]	54/85	12/17
	2009	tr(3)	tr(3)	18	nd	5 [2]	57/90	13/18
	2010	tr(2)	tr(2)	36	nd	3 [1]	13/18	13/18
	2011	3	4	19	nd	3 [1]	14/18	14/18
	2012	tr(2)	tr(2)	12	nd	3 [1]	14/19	14/19
	2013	3	tr(2)	40	nd	3 [1]	14/19	14/19
	2014	tr(2)	tr(2)	23	nd	3 [1]	14/19	14/19
	2015	tr(1.7)	tr(1.8)	17	nd	2.1 [0.8]	12/19	12/19
	2016	tr(2)	tr(2)	10	nd	3 [1]	17/19	17/19
	2017	2.4	2.4	23	nd	2.3 [0.9]	15/19	15/19
	2019	nd	nd	5	nd	4 [2]	6/16	6/16
	2022	1.0	1.2	5.5	nd	1.0 [0.4]	13/18	13/18

δ -HCH	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2003	19	18	31	12	3.9 [1.3]	10/10	2/2
	2004	30	14	260	6.4	4.6 [1.5]	10/10	2/2
	2005	16	15	30	10	5.1 [1.7]	10/10	2/2
	2006	13	12	21	9	3 [1]	10/10	2/2
	2007	12	10	22	4	4 [2]	10/10	2/2
	2008	9	8	31	tr(3)	6 [2]	10/10	2/2
	2009	5	6	9	tr(3)	5 [2]	10/10	2/2
	2010	12	---	13	11	3 [1]	2/2	2/2
	2011	---	---	5	5	3 [1]	1/1	1/1
	2012	4	---	7	tr(2)	3 [1]	2/2	2/2
	2013	3	---	4	tr(2)	3 [1]	2/2	2/2
	2014	tr(2)	---	3	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
	2015	---	---	nd	nd	2.1 [0.8]	0/1	0/1
	2016	tr(1)	---	tr(2)	tr(1)	3 [1]	2/2	2/2
	2017	nd	---	tr(1.0)	nd	2.3 [0.9]	1/2	1/2
	2019	---	---	4	4	4 [2]	1/1	1/1
	2022	1.6	---	2.1	1.2	1.0 [0.4]	2/2	2/2

(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2013 年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2018 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。また、2002 年度は α -HCH 及び β -HCH のみの調査で、 γ -HCH (別名：リンデン) 及び δ -HCH の調査は実施していない。

< 大気 >

○2009 年度から 2022 年度における大気についての α -HCH、 β -HCH、 γ -HCH 及び δ -HCH の検出状況


α -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	58	58	340	19	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	21	18	400	7.8		37/37	37/37
	2010 温暖期	46	51	280	14	1.4 [0.47]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	19	16	410	6.8		37/37	37/37
	2011 温暖期	43	44	410	9.5	2.5 [0.83]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	18	15	680	6.5		37/37	37/37
	2012 温暖期	37	37	250	15	2.1 [0.7]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	12	11	120	4.4		36/36	36/36
	2013 温暖期	36	39	220	13	5.2 [1.7]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	10	8.8	75	tr(3.9)		36/36	36/36
	2014	44	40	650	14	0.19 [0.06]	36/36	36/36
	2015	33	32	300	8.8	0.17 [0.06]	35/35	35/35
	2016	39	35	520	5.4	0.17 [0.07]	37/37	37/37
	2017	36	37	700	4.9	0.08 [0.03]	37/37	37/37
	2019	21	21	230	6.3	0.12 [0.05]	36/36	36/36
	2022	14	14	100	2.9	0.10 [0.04]	34/34	34/34

β -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	5.6	5.6	28	0.96	0.09 [0.03]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	1.8	1.8	24	0.31		37/37	37/37
	2010 温暖期	5.6	6.2	34	0.89	0.27 [0.09]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	1.7	1.7	29	tr(0.26)		37/37	37/37
	2011 温暖期	5.0	5.2	49	0.84	0.39 [0.13]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	1.7	1.7	91	tr(0.31)		37/37	37/37
	2012 温暖期	5.0	5.5	32	0.65	0.36 [0.12]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	0.93	1.1	8.5	tr(0.26)		36/36	36/36
	2013 温暖期	4.7	5.7	37	0.66	0.21 [0.07]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.97	0.95	6.7	tr(0.17)		36/36	36/36
	2014	5.4	6.8	74	0.57	0.24 [0.08]	36/36	36/36
	2015	3.0	3.0	34	0.36	0.25 [0.08]	35/35	35/35
	2016	4.8	5.6	64	0.3	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2017	4.1	5.1	59	0.67	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2019	2.3	2.4	29	0.38	0.06 [0.02]	36/36	36/36
	2022	1.8	1.9	14	0.23	0.07 [0.03]	34/34	34/34
γ -HCH (別名：リンデン)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	17	19	65	2.9	0.06 [0.02]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	5.6	4.6	55	1.5		37/37	37/37
	2010 温暖期	14	16	66	2.3	0.35 [0.12]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	4.8	4.4	60	1.1		37/37	37/37
	2011 温暖期	14	17	98	2.7	1.6 [0.52]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	5.1	4.8	67	tr(1.1)		37/37	37/37
	2012 温暖期	13	15	55	2.3	0.95 [0.32]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	3.1	3.2	19	tr(0.63)		36/36	36/36
	2013 温暖期	12	14	58	tr(2.0)	2.2 [0.7]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	2.8	3.0	12	nd		34/36	34/36
	2014	14	16	100	1.7	0.17 [0.06]	36/36	36/36
	2015	8.3	10	51	1.4	0.19 [0.06]	35/35	35/35
	2016	12	13	89	0.79	0.18 [0.07]	37/37	37/37
	2017	10	11	93	0.84	0.10 [0.04]	37/37	37/37
	2019	6.4	7.0	49	0.88	0.12 [0.05]	36/36	36/36
	2022	5.0	5.9	22	0.63	0.09 [0.03]	34/34	34/34
δ -HCH	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	1.3	1.3	21	0.09	0.04 [0.02]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.36	0.33	20	0.04		37/37	37/37
	2010 温暖期	1.4	1.3	25	0.11	0.05 [0.02]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.38	0.35	22	0.05		37/37	37/37
	2011 温暖期	1.1	1.1	33	0.11	0.063 [0.021]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	0.35	0.34	26	tr(0.050)		37/37	37/37
	2012 温暖期	1.0	1.3	20	tr(0.06)	0.07 [0.03]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	0.18	0.19	7.3	nd		35/36	35/36
	2013 温暖期	1.0	1.1	20	tr(0.05)	0.08 [0.03]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	0.17	0.17	5.3	nd		34/36	34/36
	2014	1.2	1.3	50	tr(0.07)	0.19 [0.06]	36/36	36/36
	2015	0.55	0.71	22	nd	0.15 [0.05]	32/35	32/35
	2016	1.0	1.2	46	nd	0.20 [0.08]	35/37	35/37
	2017	0.80	0.92	46	nd	0.08 [0.03]	36/37	36/37
	2019	0.46	0.51	19	tr(0.02)	0.04 [0.02]	36/36	36/36
	2022	0.57	0.62	12	nd	0.08 [0.03]	32/34	32/34

(注 1) 2003 年度から 2008 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

(注 2) 2018 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。


[11-1] α -HCH



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-1-1 α -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


(注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-11-1-2 α -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-1-3 α -HCH の生物の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2003 年度から 2008 年度の全てのデータについては欠測扱いとした。
 (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-11-1-4 α -HCH の大気の経年変化 (幾何平均値)


[11-2] β -HCH



(注 1) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-2-1 β -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


(注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-11-2-2 β -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-2-3 β -HCH の生物の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2003 年度から 2008 年度の全てのデータについては欠測扱いとした。
 (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。


図 3-11-2-4 β -HCH の大気の経年変化 (幾何平均値)

[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)



(注) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-11-3-1 γ -HCH (別名：リンデン) の水質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-3-2 γ -HCH (別名：リンデン) の底質の経年変化 (幾何平均値)

[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-11-3-3 γ -HCH (別名：リンデン) の生物の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2003 年度から 2008 年度の全てのデータについては欠測扱いとした。
 (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-11-3-4 γ -HCH (別名：リンデン) の大気の経年変化 (幾何平均値)



(注) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-11-4-1 δ -HCH の水質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


(注 2) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-11-4-2 δ -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 4) 2015 年度の貝類並びに 2019 年度の貝類及び魚類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-11-4-3 δ -HCH の生物の経年変化（幾何平均値）



- (注 1) 2002 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2003 年度から 2008 年度の全てのデータについては欠測扱いとした。
 (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-11-4-4 δ -HCH の大気の経年変化（幾何平均値）

[12] クロルデコン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

クロルデコンは、有機塩素系殺虫剤の一種である。日本では農薬登録されたことはなく、国内での製造・輸入実績はない。2009年5月に開催されたPOPs条約の第4回条約締約国会議（COP4）において条約対象物質とすることが採択され、2010年4月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては2008年度が初めての調査であり、2002年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2003年度に大気の調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、2008年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2010年度及び2011年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2012年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2011年度までの調査結果を示す。

・2011年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2008年度から2011年度における水質についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2008	nd	nd	0.76	nd	0.14 [0.05]	13/46	13/46
	2010	tr(0.04)	nd	1.6	nd	0.09 [0.04]	13/49	13/49
	2011	nd	nd	0.70	nd	0.20 [0.05]	15/49	15/49

（注）2009年度は調査を実施していない。

<底質>

○2008年度から2011年度における底質についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2008	nd	nd	5.8	nd	0.42 [0.16]	23/129	10/49
	2010	nd	nd	2.8	nd	0.4 [0.2]	9/64	9/64
	2011	nd	nd	1.5	nd	0.40 [0.20]	9/64	9/64

（注1）2008年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注2）2009年度は調査を実施していない。

<生物>

○2008年度から2011年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/31	0/7
	2010	nd	nd	nd	nd	5.9 [2.3]	0/6	0/6
	2011	nd	nd	nd	nd	0.5 [0.2]	0/4	0/4
魚類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/85	0/17
	2010	nd	nd	nd	nd	5.9 [2.3]	0/18	0/18
	2011	nd	nd	nd	nd	0.5 [0.2]	0/18	0/18
鳥類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	nd	nd	5.6 [2.2]	0/10	0/2
	2010	nd	---	nd	nd	5.9 [2.3]	0/2	0/2
	2011	---	---	nd	nd	0.5 [0.2]	0/1	0/1

（注1）2008年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注2）2009年度は調査を実施していない。

<大気>

○2010 年度及び 2011 年度における大気についてのクロルデコンの検出状況

クロルデコン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2010 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.04 [0.02]	0/37	0/37
	2010 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2011 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.04 [0.02]	0/35	0/35
	2011 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37

[13] ヘキサブロモビフェニル類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ヘキサブロモビフェニル類は、プラスチック製品等の難燃剤として利用されていた。2009年5月に開催された POPs 条約の第4回条約締約国会議（COP4）において条約対象物質とすることが採択され、2010年4月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては2009年度が初めての調査であり、2001年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)}では、1989年度に水質、底質、生物（魚類）及び大気の調査を、2002年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2003年度に水質及び底質の調査を、2004年度は大気の調査をそれぞれ実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、2009年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2010年度及び2011年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2015年度は底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2016年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2015年度までの調査結果を示す。

・2015年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2009年度から2011年度における水質についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注)}	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	nd	nd	nd	nd	5.7 [2.2]	0/49	0/49
	2010	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/49	0/49
	2011	nd	nd	nd	nd	2.2 [0.9]	0/49	0/49

（注）2009年度及び2011年度の定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

<底質>

○2009年度から2015年度における底質についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	nd	nd	12	nd	1.1 [0.40]	45/190	21/64
	2010	nd	nd	18	nd	1.5 [0.6]	10/64	10/64
	2011	nd	nd	6.3	nd	3.6 [1.4]	8/64	8/64
	2015	nd	nd	15	nd	0.8 [0.3]	9/62	9/62

（注1）2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注2）2009年度及び2011年度の定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

（注3）2012年度から2014年度は調査を実施していない。

<生物>

○2009 年度から 2015 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2009	nd	nd	tr(0.53)	nd	1.3 [0.43]	1/31	1/7
	2010	nd	nd	nd	nd	24 [10]	0/6	0/6
	2011	nd	nd	nd	nd	3 [1]	0/4	0/4
	2015	nd	nd	nd	nd	14 [5]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2009	tr(0.49)	tr(0.43)	6.0	nd	1.3 [0.43]	46/90	12/18
	2010	nd	nd	nd	nd	24 [10]	0/18	0/18
	2011	nd	nd	3	nd	3 [1]	5/18	5/18
	2015	nd	nd	nd	nd	14 [5]	0/19	0/19
鳥類 ^{注3)} (pg/g-wet)	2009	1.6	1.6	2.1	tr(1.2)	1.3 [0.43]	10/10	2/2
	2010	nd	---	nd	nd	24 [10]	0/2	0/2
	2011	---	---	3	3	3 [1]	1/1	1/1
	2015	---	---	nd	nd	14 [5]	0/1	0/1

(注1) 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2009 年度及び 2010 年度の定量[検出]下限値は、該当物質ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注3) 鳥類の 2015 年度における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011 年度までの結果と継続性がない。

(注4) 2012 年度から 2014 年度は調査を実施していない。

<大気>

○2010 年度から 2015 年度における大気についてのヘキサブロモビフェニル類の検出状況

ヘキサブロモ ビフェニル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2010 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.3 [0.1]	0/37	0/37
	2010 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2011 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.3 [0.1]	0/35	0/35
	2011 寒冷期	nd	nd	nd	nd		0/37	0/37
	2015	nd	nd	1.1	nd	0.06 [0.02]	2/35	2/35

(注) 2012 年度から 2014 年度は調査を実施していない。

[14] ポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）

・調査の経緯及び実施状況

ポリブロモジフェニルエーテル類は、プラスチック製品等の難燃剤として利用されていた。2009 年 5 月に開催された POPs 条約の第 4 回条約締約国会議（COP4）において、ポリブロモジフェニルエーテル類のうちテトラブロモジフェニルエーテル類、ペンタブロモジフェニルエーテル類、ヘキサブロモジフェニルエーテル類及びヘプタブロモジフェニルエーテル類について条約対象物質とすることが採択され、2010 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、2017 年 4 月から 5 月に開催された POPs 条約の第 8 回条約締約国会議（COP8）において、デカブロモジフェニルエーテルについて条約対象物質とすることが採択され、2018 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2008 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)} では、1977 年度に臭素数が 10 のものについて水質及び底質の調査を、1987 年度及び 1988 年度に臭素数が 6、8 及び 10 のものについて水質、底質及び生物（魚類）の調査を、1996 年度に臭素数が 10 のものについて水質及び底質の調査を、2001 年度に臭素数が 1 から 7 までのものについて大気の調査を、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2002 年度に臭素数が 10 のものについて水質、底質及び生物（魚類）の調査を、2003 年度に臭素数が 6、8 及び 10 のものについて底質及び生物（魚類）の調査を、2004 年度に臭素数が 5 のものについて底質の調査及び臭素数が 1 から 7 までのものについて大気の調査を、2005 年度に臭素数が 1、2、3、4、5、6、7、9 及び 10 のものについて水質の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、臭素数が 4 から 10 のものについて、2008 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2009 年度に水質、底質及び大気の調査を、2010 年度から 2012 年度、2014 年度から 2019 年度及び 2022 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していないため、参考として以下に、2022 年度までの調査結果を示す。

・2022 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2009 年度から 2022 年度における水質についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	17	16	160	nd	8 [3]	44/49	44/49
	2010	nd	nd	390	nd	9 [3]	17/49	17/49
	2011	11	10	180	nd	4 [2]	48/49	48/49
	2012	tr(3)	tr(3)	22	nd	4 [1]	47/48	47/48
	2014	tr(6)	tr(6)	51	tr(4)	8 [3]	48/48	48/48
	2015	4.3	4.1	40	tr(1.2)	3.6 [1.2]	48/48	48/48
	2016	5	5	47	tr(3)	5 [2]	48/48	48/48
	2017	tr(4)	tr(4)	12	nd	9 [3]	44/47	44/47
	2018	nd	nd	72	nd	13 [5]	22/47	22/47
	2019	tr(6)	tr(6)	320	nd	11 [4]	39/48	39/48
	2022	tr(4)	tr(3)	140	tr(2)	6 [2]	48/48	48/48

ペンタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	11	12	87	nd	11 [4]	43/49	43/49
	2010	tr(1)	tr(1)	130	nd	3 [1]	25/49	25/49
	2011	5	4	180	nd	3 [1]	48/49	48/49
	2012	tr(1)	tr(1)	20	nd	2 [1]	32/48	32/48
	2014	nd	nd	39	nd	4 [2]	19/48	19/48
	2015	tr(3.0)	tr(3.2)	31	nd	6.3 [2.1]	34/48	34/48
	2016	tr(1.5)	tr(1.3)	36	nd	2.4 [0.9]	39/48	39/48
	2017	nd	tr(1)	8	nd	3 [1]	24/47	24/47
	2018	nd	nd	110	nd	9 [3]	13/47	13/47
	2019	nd	nd	69	nd	6 [2]	19/48	19/48
	2022	tr(1.7)	tr(1.4)	31	nd	2.4 [0.9]	40/48	40/48
ヘキサブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	tr(0.9)	tr(0.7)	18	nd	1.4 [0.6]	26/49	26/49
	2010	nd	nd	51	nd	4 [2]	16/49	16/49
	2011	tr(1)	nd	39	nd	3 [1]	21/49	21/49
	2012	nd	nd	7	nd	3 [1]	6/48	6/48
	2014	nd	nd	8	nd	4 [1]	10/48	10/48
	2015	nd	nd	12	nd	1.5 [0.6]	5/48	5/48
	2016	nd	nd	9.1	nd	2.1 [0.8]	9/48	9/48
	2017	nd	nd	tr(6)	nd	7 [3]	1/47	1/47
	2018	nd	nd	54	nd	3 [1]	15/47	15/47
	2019	nd	nd	8	nd	2 [1]	5/48	5/48
	2022	nd	nd	10	nd	3 [1]	5/48	5/48
ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	nd	nd	40	nd	4 [2]	9/49	9/49
	2010	nd	nd	14	nd	3 [1]	17/49	17/49
	2011	nd	nd	14	nd	6 [2]	14/49	14/49
	2012	nd	nd	10	nd	4 [1]	9/48	9/48
	2014	nd	nd	8	nd	8 [3]	3/48	3/48
	2015	nd	nd	28	nd	2.0 [0.8]	9/48	9/48
	2016	nd	nd	11	nd	7 [3]	10/48	10/48
	2017	nd	nd	30	nd	14 [5]	1/47	1/47
	2018	nd	nd	65	nd	8 [3]	3/47	3/47
	2019	nd	nd	6	nd	4 [2]	2/48	2/48
	2022	nd	nd	tr(6)	nd	8 [3]	1/48	1/48
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	3.0	3.9	56	nd	1.4 [0.6]	37/49	37/49
	2010	tr(2)	tr(2)	69	nd	3 [1]	40/49	40/49
	2011	4	3	98	nd	2 [1]	44/49	44/49
	2012	tr(2)	nd	35	nd	4 [2]	16/48	16/48
	2014	2.5	3.7	38	nd	1.6 [0.6]	33/48	33/48
	2015	2.3	3.1	36	nd	1.5 [0.6]	31/48	31/48
	2016	5.8	7.5	230	nd	0.8 [0.3]	44/48	44/48
	2017	2	nd	33	nd	2 [1]	22/47	22/47
	2018	tr(2)	tr(1)	69	nd	3 [1]	35/47	35/47
	2019	nd	nd	14	nd	3 [1]	12/48	12/48
	2022	tr(0.9)	nd	26	nd	2.0 [0.8]	17/48	17/48
ノナブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	tr(46)	tr(38)	500	nd	91 [30]	32/49	32/49
	2010	tr(17)	tr(13)	620	nd	21 [7]	39/49	39/49
	2011	33	24	920	nd	10 [4]	47/49	47/49
	2012	tr(21)	tr(19)	320	nd	40 [13]	30/48	30/48
	2014	37	38	590	nd	6 [2]	47/48	47/48
	2015	36	33	330	nd	6 [2]	47/48	47/48
	2016	43	45	3,900	tr(2)	4 [1]	48/48	48/48
	2017	17	26	460	nd	7 [3]	37/47	37/47
	2018	12	12	170	nd	6 [2]	46/47	46/47
	2019	tr(7)	8	150	nd	8 [3]	27/48	27/48
	2022	tr(8)	tr(5)	670	nd	10 [4]	25/48	25/48

デカブロモジフェニ ルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	tr(310)	tr(220)	3,400	nd	600 [200]	26/49	26/49
	2010	tr(250)	tr(200)	13,000	nd	300 [100]	31/49	31/49
	2011	200	140	58,000	nd	60 [20]	45/49	45/49
	2012	tr(400)	tr(320)	12,000	nd	660 [220]	31/48	31/48
	2014	200	230	5,600	tr(14)	22 [9]	48/48	48/48
	2015	720	570	13,000	140	18 [7]	48/48	48/48
	2016	210	160	34,000	tr(12)	14 [6]	48/48	48/48
	2017	150	210	4,100	nd	24 [8]	46/47	46/47
	2018	120	110	2,700	12	11 [4]	47/47	47/47
	2019	110	99	2,200	tr(10)	14 [6]	48/48	48/48
	2022	89	72	5,600	tr(7)	8 [3]	48/48	48/48

(注) 2013 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。

<底質>

○2009 年度から 2022 年度における底質についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	tr(60)	tr(44)	1,400	nd	69 [23]	131/192	51/64
	2010	35	38	910	nd	6 [2]	57/64	57/64
	2011	32	30	2,600	nd	30 [10]	47/64	47/64
	2012	27	37	4,500	nd	2 [1]	60/63	60/63
	2014	tr(24)	tr(19)	550	nd	27 [9]	44/63	44/63
	2015	30	28	1,400	nd	21 [7]	44/62	44/62
	2016	tr(21)	tr(16)	390	nd	33 [11]	35/62	35/62
	2017	13	10	570	nd	9 [4]	44/62	44/62
	2018	21	tr(16)	3,100	nd	18 [6]	43/61	43/61
	2019	15	14	710	nd	5 [2]	58/61	58/61
	2022	6.9	6.4	1,800	nd	2.4 [0.9]	52/61	52/61
ペンタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	36	24	1,700	nd	24 [8]	146/192	57/64
	2010	26	23	740	nd	5 [2]	58/64	58/64
	2011	24	18	4,700	nd	5 [2]	62/64	62/64
	2012	21	21	2,900	nd	2.4 [0.9]	62/63	62/63
	2014	16	14	570	nd	6 [2]	53/63	53/63
	2015	23	20	1,300	nd	18 [6]	44/62	44/62
	2016	13	tr(10)	400	nd	12 [4]	46/62	46/62
	2017	10	tr(5.5)	560	nd	9 [4]	37/62	37/62
	2018	19	24	2,800	nd	4 [2]	53/61	53/61
	2019	9	9	740	nd	3 [1]	52/61	52/61
	2022	5	5	850	nd	4 [1]	45/61	45/61
ヘキサブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	21	21	2,600	nd	5 [2]	139/192	53/64
	2010	23	23	770	nd	4 [2]	57/64	57/64
	2011	31	42	2,000	nd	9 [3]	52/64	52/64
	2012	15	19	1,700	nd	3 [1]	48/63	48/63
	2014	21	27	730	nd	5 [2]	50/63	50/63
	2015	11	15	820	nd	3 [1]	42/62	42/62
	2016	17	19	600	nd	8 [3]	40/62	40/62
	2017	16	24	570	nd	6 [2]	44/62	44/62
	2018	29	37	1,300	nd	3 [1]	52/61	52/61
	2019	14	17	690	nd	4 [2]	41/61	41/61
	2022	10	14	420	nd	3 [1]	46/61	46/61

ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	30	25	16,000	nd	9 [4]	125/192	51/64
	2010	28	18	930	nd	4 [2]	58/64	58/64
	2011	29	32	2,400	nd	7 [3]	55/64	55/64
	2012	34	32	4,400	nd	4 [2]	48/63	48/63
	2014	19	tr(14)	680	nd	16 [6]	41/63	41/63
	2015	16	21	1,800	nd	3 [1]	44/62	44/62
	2016	16	17	1,100	nd	6 [2]	44/62	44/62
	2017	18	16	580	nd	15 [6]	36/62	36/62
	2018	44	48	1,900	nd	14 [5]	46/61	46/61
	2019	15	11	1,400	nd	6 [3]	39/61	39/61
	2022	10	12	940	nd	8 [3]	39/61	39/61
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	210	96	110,000	nd	1.2 [0.5]	182/192	63/64
	2010	71	76	1,800	nd	10 [4]	60/64	60/64
	2011	57	64	36,000	nd	10 [4]	55/64	55/64
	2012	78	74	15,000	nd	19 [6]	47/63	47/63
	2014	52	58	2,000	nd	12 [4]	55/63	55/63
	2015	58	tr(44)	1,400	nd	48 [16]	41/62	41/62
	2016	51	49	1,400	nd	6 [2]	55/62	55/62
	2017	38	58	1,900	nd	5 [2]	48/62	48/62
	2018	100	140	5,500	nd	1.2 [0.5]	57/61	57/61
	2019	33	47	2,000	nd	3 [1]	50/61	50/61
	2022	31	49	1,600	nd	7 [3]	45/61	45/61
ノナブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	1,100	710	230,000	nd	9 [4]	181/192	64/64
	2010	360	430	26,000	nd	24 [9]	60/64	60/64
	2011	710	630	70,000	nd	23 [9]	62/64	62/64
	2012	360	380	84,000	nd	34 [11]	52/63	52/63
	2014	470	470	42,000	nd	60 [20]	60/63	60/63
	2015	300	420	11,000	nd	24 [8]	55/62	55/62
	2016	430	390	26,000	nd	27 [9]	60/62	60/62
	2017	400	490	29,000	nd	15 [5]	61/62	61/62
	2018	690	770	56,000	nd	5 [2]	60/61	60/61
	2019	310	420	40,000	nd	5 [2]	59/61	59/61
	2022	340	510	43,000	nd	14 [5]	56/61	56/61
デカブロモジフェニルエーテル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	6,000	4,800	880,000	tr(30)	60 [20]	192/192	64/64
	2010	5,100	4,200	700,000	nd	220 [80]	60/64	60/64
	2011	4,200	4,700	700,000	nd	40 [20]	62/64	62/64
	2012	5,700	6,300	760,000	nd	270 [89]	60/63	60/63
	2014	5,600	5,000	980,000	nd	240 [80]	61/63	61/63
	2015	6,600	7,200	490,000	40	40 [20]	62/62	62/62
	2016	4,700	5,100	940,000	nd	120 [41]	61/62	61/62
	2017	4,600	5,700	580,000	tr(27)	30 [10]	62/62	62/62
	2018	5,100	6,300	520,000	tr(14)	42 [14]	61/61	61/61
	2019	4,400	6,300	560,000	14	4 [2]	61/61	61/61
	2022	3,300	4,100	410,000	tr(17)	21 [8]	61/61	61/61

(注 1) 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2013 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。

<生物>

○2008 年度から 2022 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が 4 から 10 までのもの）の検出状況

テトラブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	73	61	380	20	5.9 [2.2]	31/31	7/7
	2010	59	73	310	nd	43 [16]	5/6	5/6
	2011	96	120	490	26	16 [6]	4/4	4/4
	2012	59	44	190	24	19 [7]	5/5	5/5
	2014	56	38	140	33	15 [6]	3/3	3/3
	2015	48	38	89	32	15 [6]	3/3	3/3
	2016	42	32	98	23	13 [5]	3/3	3/3
	2017	47	23	200	23	16 [6]	3/3	3/3
	2018	36	26	68	26	14 [5]	3/3	3/3
	2019	26	tr(17)	68	tr(15)	18 [7]	3/3	3/3
	2022	16	tr(7)	94	tr(6)	13 [5]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	120	110	1,300	9.8	5.9 [2.2]	85/85	17/17
	2010	160	170	740	tr(16)	43 [16]	18/18	18/18
	2011	110	110	860	tr(9)	16 [6]	18/18	18/18
	2012	120	140	650	tr(10)	19 [7]	19/19	19/19
	2014	150	160	1,300	18	15 [6]	19/19	19/19
	2015	90	82	580	tr(14)	15 [6]	19/19	19/19
	2016	76	53	390	tr(10)	13 [5]	19/19	19/19
	2017	80	73	360	tr(7)	16 [6]	19/19	19/19
	2018	79	61	440	tr(13)	14 [5]	18/18	18/18
	2019	57	62	210	tr(10)	18 [7]	16/16	16/16
	2022	38	44	230	tr(6)	13 [5]	18/18	18/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	170	190	1,200	32	5.9 [2.2]	10/10	2/2
	2010	140	---	270	72	43 [16]	2/2	2/2
	2011	---	---	67	67	16 [6]	1/1	1/1
	2012	73	---	110	49	19 [7]	2/2	2/2
	2014	190	---	480	78	15 [6]	2/2	2/2
	2015	---	---	36	36	15 [6]	1/1	1/1
	2016	170	---	470	62	13 [5]	2/2	2/2
	2017	130	---	660	26	16 [6]	2/2	2/2
	2018	290	---	310	280	14 [5]	2/2	2/2
	2019	---	---	210	210	18 [7]	1/1	1/1
	2022	210	---	250	180	13 [5]	2/2	2/2
ペンタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	32	27	94	tr(11)	16 [5.9]	31/31	7/7
	2010	32	37	98	tr(9)	14 [6]	6/6	6/6
	2011	51	60	160	tr(12)	15 [6]	4/4	4/4
	2012	28	24	67	tr(8)	18 [6]	5/5	5/5
	2014	30	37	41	18	12 [5]	3/3	3/3
	2015	18	19	20	16	13 [5]	3/3	3/3
	2016	11	9	20	tr(8)	9 [4]	3/3	3/3
	2017	18	16	62	tr(6)	12 [5]	3/3	3/3
	2018	13	21	23	tr(5)	11 [4]	3/3	3/3
	2019	12	12	28	tr(5)	10 [4]	3/3	3/3
	2022	4	tr(2)	26	nd	4 [2]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	30	37	280	nd	16 [5.9]	72/85	16/17
	2010	51	54	200	nd	14 [6]	16/18	16/18
	2011	39	39	300	nd	15 [6]	17/18	17/18
	2012	37	54	180	nd	18 [6]	17/19	17/19
	2014	41	47	570	nd	12 [5]	18/19	18/19
	2015	22	17	140	nd	13 [5]	18/19	18/19
	2016	18	14	87	tr(4)	9 [4]	19/19	19/19
	2017	23	28	87	nd	12 [5]	18/19	18/19
	2018	21	21	100	nd	11 [4]	17/18	17/18
	2019	17	18	58	tr(4)	10 [4]	16/16	16/16
	2022	15	20	82	nd	4 [2]	17/18	17/18

ペンタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	150	130	440	52	16 [5.9]	10/10	2/2
	2010	150	---	200	120	14 [6]	2/2	2/2
	2011	---	---	110	110	15 [6]	1/1	1/1
	2012	85	---	110	66	18 [6]	2/2	2/2
	2014	100	---	320	31	12 [5]	2/2	2/2
	2015	---	---	22	22	13 [5]	1/1	1/1
	2016	88	---	300	26	9 [4]	2/2	2/2
	2017	77	---	500	12	12 [5]	2/2	2/2
	2018	180	---	240	140	11 [4]	2/2	2/2
	2019	---	---	150	150	10 [4]	1/1	1/1
	2022	230	---	260	200	4 [2]	2/2	2/2
ヘキサブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	19	16	82	tr(5.3)	14 [5.0]	31/31	7/7
	2010	8	16	26	nd	8 [3]	4/6	4/6
	2011	38	41	81	20	10 [4]	4/4	4/4
	2012	21	23	130	tr(6)	10 [4]	5/5	5/5
	2014	23	21	52	11	10 [4]	3/3	3/3
	2015	tr(9)	tr(6)	41	nd	12 [5]	2/3	2/3
	2016	tr(13)	tr(13)	40	nd	21 [8]	2/3	2/3
	2017	tr(14)	20	36	nd	17 [7]	2/3	2/3
	2018	tr(12)	tr(12)	34	nd	21 [8]	2/3	2/3
	2019	nd	nd	24	nd	21 [8]	1/3	1/3
	2022	tr(2)	nd	5	nd	5 [2]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	46	51	310	nd	14 [5.0]	83/85	17/17
	2010	39	47	400	nd	8 [3]	16/18	16/18
	2011	53	50	430	nd	10 [4]	17/18	17/18
	2012	55	71	320	nd	10 [4]	18/19	18/19
	2014	60	61	1,100	nd	10 [4]	18/19	18/19
	2015	44	45	250	nd	12 [5]	18/19	18/19
	2016	42	36	190	nd	21 [8]	18/19	18/19
	2017	49	49	210	nd	17 [7]	18/19	18/19
	2018	44	48	190	nd	21 [8]	17/18	17/18
	2019	42	40	290	tr(12)	21 [8]	16/16	16/16
	2022	20	24	96	nd	5 [2]	17/18	17/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	140	120	380	62	14 [5.0]	10/10	2/2
	2010	110	---	140	86	8 [3]	2/2	2/2
	2011	---	---	96	96	10 [4]	1/1	1/1
	2012	150	---	320	72	10 [4]	2/2	2/2
	2014	170	---	680	42	10 [4]	2/2	2/2
	2015	---	---	30	30	12 [5]	1/1	1/1
	2016	220	---	740	68	21 [8]	2/2	2/2
	2017	230	---	1,000	51	17 [7]	2/2	2/2
	2018	650	---	1,300	330	21 [8]	2/2	2/2
	2019	---	---	480	480	21 [8]	1/1	1/1
	2022	340	---	480	240	5 [2]	2/2	2/2
ヘプタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	tr(8.5)	tr(7.6)	35	nd	18 [6.7]	20/31	7/7
	2010	nd	nd	tr(10)	nd	30 [10]	1/6	1/6
	2011	14	26	44	nd	11 [4]	3/4	3/4
	2012	tr(8)	tr(6)	59	nd	12 [5]	3/5	3/5
	2014	nd	nd	13	nd	12 [5]	1/3	1/3
	2015	nd	nd	tr(11)	nd	12 [5]	1/3	1/3
	2016	nd	nd	tr(8)	nd	13 [5]	1/3	1/3
	2017	nd	nd	tr(9)	nd	22 [8]	1/3	1/3
	2018	nd	nd	tr(10)	nd	15 [6]	1/3	1/3
	2019	nd	nd	tr(18)	nd	24 [9]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/3	0/3

ヘプタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2008	tr(11)	tr(8.1)	77	nd	18 [6.7]	44/85	10/17
	2010	nd	nd	40	nd	30 [10]	4/18	4/18
	2011	13	21	130	nd	11 [4]	13/18	13/18
	2012	tr(11)	18	120	nd	12 [5]	11/19	11/19
	2014	tr(10)	13	280	nd	12 [5]	10/19	10/19
	2015	nd	nd	44	nd	12 [5]	4/19	4/19
	2016	tr(9)	tr(7)	85	nd	13 [5]	11/19	11/19
	2017	tr(11)	tr(12)	55	nd	22 [8]	10/19	10/19
	2018	tr(9)	tr(8)	58	nd	15 [6]	11/18	11/18
	2019	tr(10)	tr(10)	82	nd	24 [9]	9/16	9/16
	2022	nd	nd	tr(8)	nd	10 [4]	4/18	4/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	35	35	53	19	18 [6.7]	10/10	2/2
	2010	tr(19)	---	70	nd	30 [10]	1/2	1/2
	2011	---	---	44	44	11 [4]	1/1	1/1
	2012	63	---	280	14	12 [5]	2/2	2/2
	2014	19	---	150	nd	12 [5]	1/2	1/2
	2015	---	---	tr(11)	tr(11)	12 [5]	1/1	1/1
	2016	65	---	220	19	13 [5]	2/2	2/2
	2017	89	---	440	tr(18)	22 [8]	2/2	2/2
	2018	230	---	480	110	15 [6]	2/2	2/2
	2019	---	---	260	260	24 [9]	1/1	1/1
	2022	69	---	96	49	10 [4]	2/2	2/2
オクタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	10	nd	9.6 [3.6]	15/31	6/7
	2010	nd	nd	tr(10)	nd	11 [4]	2/6	2/6
	2011	7	9	29	nd	7 [3]	3/4	3/4
	2012	8	tr(7)	25	nd	8 [3]	4/5	4/5
	2014	tr(9.2)	11	14	tr(5)	11 [4]	3/3	3/3
	2015	nd	nd	nd	nd	14 [5]	0/3	0/3
	2016	nd	nd	nd	nd	16 [6]	0/3	0/3
	2017	nd	nd	tr(9)	nd	20 [8]	1/3	1/3
	2018	nd	nd	nd	nd	16 [6]	0/3	0/3
	2019	tr(8)	nd	39	nd	17 [7]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	tr(1)	nd	2 [1]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	tr(5.7)	nd	73	nd	9.6 [3.6]	35/85	7/17
	2010	tr(6)	nd	100	nd	11 [4]	8/18	8/18
	2011	tr(6)	tr(7)	150	nd	7 [3]	10/18	10/18
	2012	tr(7)	8	160	nd	8 [3]	12/19	12/19
	2014	14	13	540	nd	11 [4]	15/19	15/19
	2015	tr(7)	nd	60	nd	14 [5]	9/19	9/19
	2016	tr(8)	nd	86	nd	16 [6]	9/19	9/19
	2017	tr(9.7)	nd	88	nd	20 [8]	9/19	9/19
	2018	tr(7)	nd	74	nd	16 [6]	8/18	8/18
	2019	tr(8)	nd	120	nd	17 [7]	8/16	8/16
	2022	3	4	29	nd	2 [1]	13/18	13/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	42	41	64	30	9.6 [3.6]	10/10	2/2
	2010	41	---	65	26	11 [4]	2/2	2/2
	2011	---	---	66	66	7 [3]	1/1	1/1
	2012	130	---	420	40	8 [3]	2/2	2/2
	2014	17	---	140	nd	11 [4]	1/2	1/2
	2015	---	---	tr(5)	tr(5)	14 [5]	1/1	1/1
	2016	65	---	220	19	16 [6]	2/2	2/2
	2017	130	---	720	25	20 [8]	2/2	2/2
	2018	190	---	580	61	16 [6]	2/2	2/2
	2019	---	---	330	330	17 [7]	1/1	1/1
	2022	160	---	180	150	2 [1]	2/2	2/2

ノナブロモジフェニ ルエーテル類	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	tr(23)	nd	35 [13]	5/31	1/7
	2010	tr(16)	tr(15)	60	nd	30 [10]	5/6	5/6
	2011	tr(12)	tr(11)	40	nd	22 [9]	3/4	3/4
	2012	tr(15)	25	45	nd	24 [9]	3/5	3/5
	2014	40	tr(20)	110	tr(20)	30 [10]	3/3	3/3
	2015	nd	nd	tr(11)	nd	23 [9]	1/3	1/3
	2016	nd	nd	nd	nd	36 [14]	0/3	0/3
	2017	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/3	0/3
	2018	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/3	0/3
	2019	tr(20)	nd	81	nd	50 [20]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	tr(15)	nd	35 [13]	2/85	2/17
	2010	nd	nd	40	nd	30 [10]	3/18	3/18
	2011	nd	nd	tr(15)	nd	22 [9]	5/18	5/18
	2012	nd	nd	54	nd	24 [9]	9/19	9/19
	2014	tr(10)	tr(20)	40	nd	30 [10]	16/19	16/19
	2015	nd	nd	35	nd	23 [9]	6/19	6/19
	2016	nd	nd	tr(22)	nd	36 [14]	3/19	3/19
	2017	nd	nd	68	nd	50 [20]	1/19	1/19
	2018	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/18	0/18
	2019	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/16	0/16
	2022	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/18	0/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	tr(21)	tr(20)	tr(33)	nd	35 [13]	9/10	2/2
	2010	32	---	50	tr(20)	30 [10]	2/2	2/2
	2011	---	---	62	62	22 [9]	1/1	1/1
	2012	100	---	150	67	24 [9]	2/2	2/2
	2014	tr(10)	---	tr(20)	tr(10)	30 [10]	2/2	2/2
	2015	---	---	tr(12)	tr(12)	23 [9]	1/1	1/1
	2016	nd	---	tr(21)	nd	36 [14]	1/2	1/2
	2017	nd	---	nd	nd	50 [20]	0/2	0/2
	2018	49	---	53	46	40 [20]	2/2	2/2
	2019	---	---	nd	nd	50 [20]	0/1	0/1
	2022	tr(4)	---	10	nd	10 [4]	1/2	1/2
デカブロモジフェニ ルエーテル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	tr(170)	nd	220 [74]	8/31	3/7
	2010	nd	nd	tr(190)	nd	270 [97]	2/6	2/6
	2011	nd	nd	240	nd	230 [80]	1/4	1/4
	2012	120	170	480	nd	120 [50]	4/5	4/5
	2014	220	tr(150)	570	tr(120)	170 [60]	3/3	3/3
	2015	nd	nd	tr(70)	nd	170 [70]	1/3	1/3
	2016	nd	nd	tr(110)	nd	300 [100]	1/3	1/3
	2017	nd	nd	tr(180)	nd	210 [80]	1/3	1/3
	2018	nd	nd	nd	nd	240 [80]	0/3	0/3
	2019	nd	nd	tr(180)	nd	190 [70]	1/3	1/3
	2022	tr(5)	nd	15	nd	13 [5]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2008	nd	nd	230	nd	220 [74]	5/76	4/16
	2010	nd	nd	tr(150)	nd	270 [97]	2/18	2/18
	2011	nd	nd	tr(90)	nd	230 [80]	2/18	2/18
	2012	tr(59)	tr(60)	380	nd	120 [50]	11/19	11/19
	2014	tr(75)	tr(70)	300	nd	170 [60]	13/19	13/19
	2015	nd	nd	380	nd	170 [70]	5/19	5/19
	2016	nd	nd	tr(190)	nd	300 [100]	7/19	7/19
	2017	nd	nd	2,100	nd	210 [80]	1/19	1/19
	2018	nd	nd	tr(110)	nd	240 [80]	2/18	2/18
	2019	nd	nd	nd	nd	190 [70]	0/16	0/16
	2022	nd	nd	tr(7)	nd	13 [5]	1/18	1/18

デカブロモジフェニ ルエーテル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2008	nd	nd	tr(110)	nd	220 [74]	4/10	1/2
	2010	nd	---	nd	nd	270 [97]	0/2	0/2
	2011	---	---	tr(170)	tr(170)	230 [80]	1/1	1/1
	2012	250	---	260	240	120 [50]	2/2	2/2
	2014	tr(65)	---	tr(140)	nd	170 [60]	1/2	1/2
	2015	---	---	tr(90)	tr(90)	170 [70]	1/1	1/1
	2016	nd	---	nd	nd	300 [100]	0/2	0/2
	2017	nd	---	nd	nd	210 [80]	0/2	0/2
	2018	tr(210)	---	500	tr(90)	240 [80]	2/2	2/2
	2019	---	---	nd	nd	190 [70]	0/1	0/1
	2022	tr(5)	---	tr(9)	nd	13 [5]	1/2	1/2

(注1) 2008年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2014年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2009年度、2013年度、2020年度及び2021年度は調査を実施していない。

<大気>

○2009年度から2022年度における大気についてのポリブロモジフェニルエーテル類（臭素数が4から10までのもの）の検出状況


テトラブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	0.89	0.80	18	0.11	0.11 [0.04]	37/37	37/37
	2009 寒冷期	0.40	0.37	7.1	tr(0.04)		37/37	37/37
	2010 温暖期	0.79	0.57	50	0.15	0.12 [0.05]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	0.40	0.35	25	tr(0.09)		37/37	37/37
	2011 温暖期	0.80	0.72	9.3	tr(0.11)	0.18 [0.07]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	0.36	0.34	7.0	nd		35/37	35/37
	2012 温暖期	0.7	0.7	5.7	nd	0.3 [0.1]	35/36	35/36
	2012 寒冷期	tr(0.2)	tr(0.2)	1.7	nd		25/36	25/36
	2014	0.53	0.47	2.3	tr(0.09)	0.28 [0.09]	36/36	36/36
	2015	tr(0.3)	tr(0.3)	2.7	nd	0.4 [0.1]	30/35	30/35
	2016	0.5	0.4	28	nd	0.4 [0.2]	30/37	30/37
	2017	0.39	0.34	4.1	tr(0.06)	0.15 [0.05]	37/37	37/37
	2018	0.28	0.26	3.9	0.05	0.05 [0.02]	37/37	37/37
	2019	0.25	0.23	5.5	tr(0.03)	0.04 [0.01]	36/36	36/36
	2022	tr(0.2)	tr(0.2)	1.1	nd	0.6 [0.2]	20/36	20/36
ペンタブロモジフェ ニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	0.20	0.19	18	nd	0.16 [0.06]	33/37	33/37
	2009 寒冷期	0.19	0.16	10	nd		29/37	29/37
	2010 温暖期	0.20	0.17	45	nd	0.12 [0.05]	35/37	35/37
	2010 寒冷期	0.20	0.22	28	nd		34/37	34/37
	2011 温暖期	0.19	0.17	8.8	nd	0.16 [0.06]	31/35	31/35
	2011 寒冷期	0.16	tr(0.14)	2.6	nd		31/37	31/37
	2012 温暖期	tr(0.13)	tr(0.12)	2.4	nd	0.14 [0.06]	30/36	30/36
	2012 寒冷期	tr(0.09)	tr(0.09)	0.77	nd		26/36	26/36
	2014	tr(0.13)	tr(0.14)	0.80	nd	0.28 [0.09]	25/36	25/36
	2015	nd	nd	0.9	nd	0.6 [0.2]	6/35	6/35
	2016	nd	nd	28	nd	0.4 [0.2]	6/37	6/37
	2017	0.11	0.10	3.4	nd	0.10 [0.04]	33/37	33/37
	2018	tr(0.08)	nd	4.1	nd	0.20 [0.08]	18/37	18/37
	2019	tr(0.10)	tr(0.06)	6.1	nd	0.12 [0.05]	27/36	27/36
	2022	nd	nd	0.31	nd	0.12 [0.05]	13/36	13/36

ヘキサブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	tr(0.11)	tr(0.11)	2.0	nd	0.22 [0.09]	19/37	19/37
	2009 寒冷期	tr(0.20)	0.22	27	nd		24/37	24/37
	2010 温暖期	tr(0.14)	tr(0.13)	4.9	nd	0.16 [0.06]	29/37	29/37
	2010 寒冷期	0.24	0.27	5.4	nd		31/37	31/37
	2011 温暖期	tr(0.11)	tr(0.10)	1.2	nd	0.14 [0.05]	28/35	28/35
	2011 寒冷期	0.16	0.18	1.7	nd		30/37	30/37
	2012 温暖期	nd	nd	3.1	nd	0.3 [0.1]	9/36	9/36
	2012 寒冷期	tr(0.1)	tr(0.1)	0.5	nd		22/36	22/36
	2014	nd	nd	0.4	nd	0.4 [0.1]	5/36	5/36
	2015	nd	nd	2.0	nd	1.1 [0.4]	3/35	3/35
	2016	nd	nd	2.7	nd	0.6 [0.2]	3/37	3/37
	2017	nd	nd	2.1	nd	0.3 [0.1]	11/37	11/37
	2018	nd	nd	1.5	nd	0.17 [0.06]	9/37	9/37
	2019	tr(0.05)	nd	0.79	nd	0.13 [0.05]	15/36	15/36
	2022	nd	nd	0.6	nd	0.5 [0.2]	1/36	1/36
ヘプタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	tr(0.1)	nd	1.7	nd	0.3 [0.1]	17/37	17/37
	2009 寒冷期	tr(0.2)	0.3	20	nd		25/37	25/37
	2010 温暖期	tr(0.2)	tr(0.1)	1.4	nd	0.3 [0.1]	24/37	24/37
	2010 寒冷期	0.3	0.4	11	nd		28/37	28/37
	2011 温暖期	tr(0.1)	tr(0.1)	1.1	nd	0.3 [0.1]	20/35	20/35
	2011 寒冷期	tr(0.2)	tr(0.2)	2.3	nd		25/37	25/37
	2012 温暖期	nd	nd	1.8	nd	0.5 [0.2]	6/36	6/36
	2012 寒冷期	nd	nd	0.7	nd		8/36	8/36
	2014	nd	nd	tr(0.4)	nd	0.7 [0.2]	2/36	2/36
	2015	nd	nd	tr(0.6)	nd	1.3 [0.4]	2/35	2/35
	2016	nd	nd	1.3	nd	1.1 [0.4]	1/37	1/37
	2017	nd	nd	3.2	nd	0.4 [0.2]	10/37	10/37
	2018	tr(0.09)	nd	1.3	nd	0.20 [0.08]	16/37	16/37
	2019	tr(0.1)	tr(0.1)	2.7	nd	0.3 [0.1]	24/36	24/36
	2022	nd	nd	1.0	nd	0.4 [0.2]	1/36	1/36
オクタブロモジフェニルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	tr(0.2)	0.3	1.6	nd	0.3 [0.1]	23/37	23/37
	2009 寒冷期	0.3	0.4	7.1	nd		26/37	26/37
	2010 温暖期	0.25	0.30	2.3	nd	0.15 [0.06]	30/37	30/37
	2010 寒冷期	0.40	0.52	6.9	nd		32/37	32/37
	2011 温暖期	0.24	0.31	1.9	nd	0.20 [0.08]	27/35	27/35
	2011 寒冷期	0.35	0.44	7.0	nd		30/37	30/37
	2012 温暖期	tr(0.2)	tr(0.2)	1.2	nd	0.3 [0.1]	29/36	29/36
	2012 寒冷期	0.3	0.4	1.2	nd		30/36	30/36
	2014	tr(0.1)	tr(0.1)	0.7	nd	0.4 [0.1]	22/36	22/36
	2015	nd	nd	3.8	nd	1.1 [0.4]	9/35	9/35
	2016	nd	nd	1.6	nd	0.6 [0.2]	18/37	18/37
	2017	tr(0.19)	0.23	5.7	nd	0.21 [0.07]	28/37	28/37
	2018	0.15	0.14	1.3	nd	0.11 [0.04]	34/37	34/37
	2019	tr(0.2)	tr(0.2)	2.6	nd	0.3 [0.1]	32/36	32/36
	2022	nd	nd	0.4	nd	0.3 [0.1]	12/36	12/36

ノナブロモジフェニ ルエーテル類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	tr(0.7)	tr(0.7)	3.0	nd	1.8 [0.6]	22/37	22/37
	2009 寒冷期	tr(1.0)	tr(0.8)	3.9	nd		27/37	27/37
	2010 温暖期	nd	nd	24	nd	3.7 [1.2]	12/37	12/37
	2010 寒冷期	tr(1.2)	tr(1.3)	7.1	nd		22/37	22/37
	2011 温暖期	tr(0.8)	0.9	3.9	nd	0.9 [0.4]	29/35	29/35
	2011 寒冷期	1.1	1.1	14	nd		30/37	30/37
	2012 温暖期	tr(0.5)	tr(0.5)	5.1	nd	1.2 [0.4]	24/36	24/36
	2012 寒冷期	tr(0.9)	tr(1.1)	4.7	nd		30/36	30/36
	2014	nd	nd	tr(3)	nd	4 [1]	7/36	7/36
	2015	nd	nd	12	nd	3.2 [1.1]	14/35	14/35
	2016	tr(0.9)	tr(0.9)	11	nd	1.4 [0.5]	28/37	28/37
	2017	0.8	0.8	40	nd	0.6 [0.2]	31/37	31/37
	2018	0.5	0.7	3.0	nd	0.4 [0.2]	31/37	31/37
	2019	0.5	0.7	3.1	nd	0.3 [0.1]	34/36	34/36
	2022	nd	nd	1.0	nd	0.7 [0.3]	15/36	15/36
デカブロモジフェニ ルエーテル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2009 温暖期	tr(7)	tr(9)	31	nd	16 [5]	28/37	28/37
	2009 寒冷期	tr(10)	tr(11)	45	nd		29/37	29/37
	2010 温暖期	nd	nd	290	nd	27 [9.1]	10/37	10/37
	2010 寒冷期	tr(11)	tr(12)	88	nd		21/37	21/37
	2011 温暖期	tr(8.2)	tr(9.0)	30	nd	12 [4.0]	31/35	31/35
	2011 寒冷期	tr(8.4)	tr(9.0)	44	nd		29/37	29/37
	2012 温暖期	nd	nd	31	nd	16 [5]	17/36	17/36
	2012 寒冷期	tr(10)	tr(12)	73	nd		28/36	28/36
	2014	tr(4.7)	tr(5.0)	64	nd	9 [3]	24/36	24/36
	2015	4.2	4.3	61	nd	2.2 [0.7]	30/35	30/35
	2016	5	5	86	nd	3 [1]	35/37	35/37
	2017	4.2	4.4	140	nd	2.4 [0.8]	34/37	34/37
	2018	2.6	3.4	19	nd	2.0 [0.8]	31/37	31/37
	2019	1.8	2.6	14	nd	0.3 [0.1]	32/36	32/36
	2022	2.0	1.8	16	nd	0.9 [0.3]	33/36	33/36

(注) 2013 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。


[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2010 年度の全域、河川域、湖沼域及び海域、2017 年度の湖沼域並びに 2018 年度の全域、河川域、湖沼域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-1-1 テトラブロモジフェニルエーテル類の水質の経年変化 (幾何平均値)


[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2016 年度の河川域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。


図 3-14-1-2 テトラブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化 (幾何平均値)

[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類



- (注 1) 鳥類は2014年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから2012年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
- (注 2) 2002年度から2007年度、2009年度、2013年度、2020年度、2021年度、2023年度及び2024年度は調査を実施していない。


図 3-14-1-3 テトラブロモジフェニルエーテル類の生物の経年変化（幾何平均値）



- (注 1) 2002年度から2008年度、2013年度、2020年度、2021年度、2023年度及び2024年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2014年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に2022年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-14-1-4 テトラブロモジフェニルエーテル類の大気の経年変化（幾何平均値）

[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類




(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度及、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2014 年度、2017 年度及び 2018 年度の全域及び河川域並びに 2019 年度の全域、河川域及び河口域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

(注3) 湖沼域及び海域については、多くの年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。

図 3-14-2-1 ペンタブロモジフェニルエーテル類の水質の経年変化（幾何平均値）


[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類



(注1) 2002年度から2008年度、2013年度、2020年度、2021年度、2023年度及び2024年度は調査を実施していない。

(注2) 2017年度の河川域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の1/2の値を図示した。


図 3-14-2-2 ペンタブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化（幾何平均値）



(注 1) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

(注 2) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-14-2-3 ペンタブロモジフェニルエーテル類の生物の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2015 年度、2016 年度及び 2022 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

(注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-14-2-4 ペンタブロモジフェニルエーテル類の大気の経年変化 (幾何平均値)


[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-14-3-1 ヘキサブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化 (幾何平均値)

[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類




(注 1) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

(注 2) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 3) 2019 年度の貝類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-3-2 ヘキサブロモジフェニルエーテル類の生物の経年変化 (幾何平均値)

[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類




(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2017 年度の河川域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-4-1 ヘプタブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化 (幾何平均値)

[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 貝類については、多くの年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。


(注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

(注 3) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 4) 2010 年度、2015 年度及び 2022 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-4-2 ヘプタブロモジフェニルエーテル類の生物の経年変化 (幾何平均値)


[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2017 年度の海域並びに 2019 年度の全域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
 (注 3) 湖沼域については、多くの年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。

図 3-14-5-1 オクタブロモジフェニルエーテル類の水質の経年変化 (幾何平均値)


[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-14-5-2 オクタブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化 (幾何平均値)

[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類



- (注 1) 貝類については、多くの年度において幾何平均値が検出下限値未満であったため、経年変化は示していない。
 (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-14-5-3 オクタブロモジフェニルエーテル類の生物の経年変化（幾何平均値）



- (注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2015 年度、2016 年度及び 2022 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
 (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-14-5-4 オクタブロモジフェニルエーテル類の大気の経年変化（幾何平均値）


[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2019 年度及び 2022 年度の湖沼域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-6-1 ノナブロモジフェニルエーテル類の水質の経年変化（幾何平均値）


[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-14-6-2 ノナブロモジフェニルエーテル類の底質の経年変化（幾何平均値）


[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類



- (注 1) 2010 年度の温暖期並びに 2014 年度、 2015 年度及び 2022 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
- (注 2) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-14-6-3 ノナブロモジフェニルエーテル類の大気の経年変化（幾何平均値）


[14-7] デカブロモジフェニルエーテル



- (注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2009 年度の湖沼域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-14-7-1 デカブロモジフェニルエーテルの水質の経年変化（幾何平均値）


[14-7] デカブロモジフェニルエーテル



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-14-7-2 デカブロモジフェニルエーテルの底質の経年変化 (幾何平均値)

[14-7] デカブロモジフェニルエーテル類



(注 1) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2010 年度及び 2012 年度の温暖期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

(注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-14-7-3 デカブロモジフェニルエーテルの大気経年変化 (幾何平均値)

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）

・調査の経緯及び実施状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）は、撥水撥油剤及び界面活性剤等として利用されている。2009年5月に開催された POPs 条約の第4回条約締約国会議（COP4）においてペルフルオロオクタンスルホン酸及びその塩並びにペルフルオロオクタンスルホニルフルオリドを条約対象物質とすることが採択され、2011年4月に化審法に基づく第一種特定化学物質にペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)及びその塩並びにペルフルオロ(オクタン-1-スルホニル)フルオリドが指定されている。

継続的調査としては 2009 年度が初めての調査であり、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2002 年度に水質の調査を、2003 年度に底質及び生物（魚類）の調査を、2004 年度に大気の調査を、2005 年度に水質、底質及び生物（貝類及び魚類）の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、直鎖のオクチル基を有するペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)を分析対象として、2009 年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2010 年度から 2012 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2013 年度は大気の調査を、2014 年度から 2016 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気、2018 年度に水質及び底質の調査を、2019 年度から 2024 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

なお、モニタリング調査では、直鎖のオクチル基を有するペルフルオロ(オクタン-1-スルホン酸)を分析対象としている。ただし、オクチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 30 pg/L において 47 地点中 45 地点で検出され、検出濃度は 3,100 pg/L までの範囲であった。

2009 年度から 2024 年度における経年分析の結果、湖沼域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2009 年度から 2024 年度における水質についてのペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	730	580	14,000	tr(26)	37 [14]	49/49	49/49
	2010	490	380	230,000	tr(37)	50 [20]	49/49	49/49
	2011	480	360	10,000	tr(20)	50 [20]	49/49	49/49
	2012	550	510	14,000	39	31 [12]	48/48	48/48
	2014	460	410	7,500	nd	50 [20]	47/48	47/48
	2015	630	490	4,700	120	29 [11]	48/48	48/48
	2016	330	300	14,000	tr(23)	50 [20]	48/48	48/48
	2018	310	300	4,100	nd	70 [30]	42/47	42/47
	2019	290	260	2,500	nd	80 [30]	47/48	47/48
	2020	330	260	3,700	tr(52)	80 [30]	46/46	46/46
	2021	330	300	3,700	tr(30)	80 [30]	47/47	47/47
	2022	270	220	3,600	nd	80 [30]	46/48	46/48
	2023	230	250	4,100	nd	80 [30]	43/47	43/47
	2024	230	200	3,100	nd	70 [30]	45/47	45/47

（注）2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 4 pg/g-dry において 60 地点全てで検出され、検出濃度は tr(5)～300 pg/g-dry の範囲であった。

2009 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河口域及び海域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2009 年度から 2024 年度における底質についてのペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	78	97	1,900	nd	9.6 [3.7]	180/190	64/64
	2010	82	100	1,700	tr(3)	5 [2]	64/64	64/64
	2011	92	110	1,100	nd	5 [2]	63/64	63/64
	2012	68	84	1,200	tr(7)	9 [4]	63/63	63/63
	2014	59	79	980	nd	5 [2]	62/63	62/63
	2015	91	88	2,200	7	3 [1]	62/62	62/62
	2016	54	61	690	5	5 [2]	62/62	62/62
	2018	43	57	700	nd	7 [3]	55/61	55/61
	2019	44	46	460	nd	9 [4]	60/61	60/61
	2020	40	48	450	tr(3)	5 [2]	58/58	58/58
	2021	52	62	620	tr(5)	6 [3]	60/60	60/60
	2022	55	61	710	tr(5)	9 [4]	61/61	61/61
	2023	46	56	660	nd	9 [4]	58/60	58/60
	2024	38	41	300	tr(5)	9 [4]	60/60	60/60

(注 1) 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 3 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は 120 pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 16 地点全てで検出され、検出濃度は 15～11,000 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 1,200 pg/g-wet 及び 36,000 pg/g-wet であった。

○2009 年度から 2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の検出状況

ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2009	24	28	640	nd	19 [7.4]	17/31	5/7
	2010	72	85	680	nd	25 [9.6]	5/6	5/6
	2011	38	44	100	16	10 [4]	4/4	4/4
	2012	27	21	160	tr(4)	7 [3]	5/5	5/5
	2014	8	6	93	nd	5 [2]	2/3	2/3
	2015	7	tr(2)	210	nd	4 [2]	2/3	2/3
	2016	11	tr(6)	160	nd	9 [3]	2/3	2/3
	2017	22	34	160	nd	12 [4]	2/3	2/3
	2019	10	tr(4)	140	tr(2)	6 [2]	3/3	3/3
	2020	16	8	130	tr(4)	5 [2]	3/3	3/3
	2021	14	5	250	tr(2)	5 [2]	3/3	3/3
	2022	27	13	160	9	6 [3]	3/3	3/3
	2023	nd	---	tr(5)	nd	6 [3]	1/2	1/2
	2024	11	8	120	nd	6 [3]	2/3	2/3

ペルフルオロオクタン スルホン酸 (PFOS)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2009	220	230	15,000	nd	19 [7.4]	83/90	17/18
	2010	390	480	15,000	nd	25 [9.6]	17/18	17/18
	2011	82	95	3,200	nd	10 [4]	16/18	16/18
	2012	110	130	7,300	tr(5)	7 [3]	19/19	19/19
	2014	82	83	4,600	nd	5 [2]	18/19	18/19
	2015	91	90	2,500	nd	4 [2]	18/19	18/19
	2016	79	80	5,200	nd	9 [3]	18/19	18/19
	2017	150	150	11,000	tr(4)	12 [4]	19/19	19/19
	2019	67	80	3,600	tr(3)	6 [2]	16/16	16/16
	2020	76	100	3,000	5	5 [2]	18/18	18/18
	2021	81	130	4,500	tr(2)	5 [2]	18/18	18/18
	2022	280	360	7,200	9	6 [3]	18/18	18/18
	2023	180	280	4,900	nd	6 [3]	17/18	17/18
	2024	300	380	11,000	15	6 [3]	16/16	16/16
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2009	300	360	890	37	19 [7.4]	10/10	2/2
	2010	1,300	---	3,000	580	25 [9.6]	2/2	2/2
	2011	---	---	110	110	10 [4]	1/1	1/1
	2012	160	---	410	63	7 [3]	2/2	2/2
	2014	4,600	---	110,000	190	5 [2]	2/2	2/2
	2015	---	---	790	790	4 [2]	1/1	1/1
	2016	3,600	---	9,100	1,400	9 [3]	2/2	2/2
	2017	9,800	---	32,000	3,000	12 [4]	2/2	2/2
	2019	---	---	360	360	6 [2]	1/1	1/1
	2020	---	---	8,500	8,500	5 [2]	1/1	1/1
	2021	3,000	---	15,000	590	5 [2]	2/2	2/2
	2022	23,000	---	100,000	5,200	6 [3]	2/2	2/2
	2023	12,000	---	100,000	1,400	6 [3]	2/2	2/2
	2024	6,600	---	36,000	1,200	6 [3]	2/2	2/2

(注 1) 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類の 2014 年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2013 年度及び 2018 年度は調査を実施していない。

< 大気 >

大気については、35 地点を調査し、検出下限値 0.2 pg/m³において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 1.1～7.1 pg/m³の範囲であった。

2010 年度から 2024 年度における経年分析の結果、減少傾向が統計的に有意と判定された。


なお、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の大気試料の採取は、調査地点によってハイボリュームエアサンプラー又はミドルボリュームエアサンプラーのいずれかでを行っている。同一地点・同一時刻にこの 2 種類のサンプラーで採取した試料の濃度を比較したところ、ミドルボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度が、ハイボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度に対して 2.5 倍前後であった。この原因として、ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) とともに採取された前駆物質の一部が試料採取中にペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) へと変化し、試料採取時間が長いミドルボリュームエアサンプラーでより多くの前駆物質が変化したことが想定されるが、科学的な根拠をもって究明するには至っていない。

○2010 年度から 2024 年度における大気についてのペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）の検出状況

大気 (pg/m ³)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2010 温暖期	5.2	5.9	14	1.6	0.4 [0.1]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	4.7	4.4	15	1.4		37/37	37/37
	2011 温暖期	4.4	4.2	10	0.9	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	3.7	3.8	9.5	1.3		37/37	37/37
	2012 温暖期	3.6	3.8	8.9	1.3	0.5 [0.2]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	2.7	3.0	5.9	1.0		36/36	36/36
	2013 温暖期	4.6	5.2	9.6	1.2	0.3 [0.1]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	3.7	3.9	7.4	1.6		36/36	36/36
	2014	3.1	3.2	8.6	0.52	0.17 [0.06]	36/36	36/36
	2015	2.8	2.6	8.8	0.59	0.19 [0.06]	35/35	35/35
	2016	3.1	2.4	9.3	0.7	0.6 [0.2]	37/37	37/37
	2017	2.9	2.7	8.9	1.1	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2019	3.8	4.1	7.8	1.3	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2020	3.4	4.2	7.2	1.1	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2021	2.8	3.1	6.5	0.70	0.18 [0.07]	35/35	35/35
	2022	4.6	5.3	8.6	1.2	0.19 [0.07]	36/36	36/36
	2023	3.5	3.7	6.8	1.0	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2024	3.5	3.7	7.1	1.1	0.5 [0.2]	35/35	35/35

(注) 2018 年度は調査を実施していない。


[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

図 3-15-1 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の水質の経年変化 (幾何平均値)


[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

図 3-15-2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の底質の経年変化 (幾何平均値)

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)




(注 1) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

(注 2) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2018 年度は調査を実施していない。

図 3-15-3 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の生物の経年変化 (幾何平均値)

[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度及び 2019 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-15-4 ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS) の大気の経年変化 (幾何平均値)

[16] ペルフルオロオクタン酸（PFOA）

・調査の経緯及び実施状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）は、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）と同様、撥水撥油剤及び界面活性剤等として利用されている。2019 年の 4 月から 5 月に開催された POPs 条約の第 9 回条約締約国会議（COP9）においてペルフルオロオクタン酸並びにその塩及び関連物質を条約対象物質とすることが採択され、2021 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質にペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びその塩が指定されている。

継続的調査としては 2009 年度が初めての調査であり、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2002 年度に水質の調査を、2003 年度に底質及び生物（魚類）の調査を、2004 年度に大気の調査を、2005 年度に水質、底質及び生物（貝類及び魚類）の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2009 年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2010 年度から 2012 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2013 年度に大気の調査を、2014 年度から 2016 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018 年度に水質及び底質の調査を、2019 年度から 2024 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

なお、モニタリング調査では、直鎖のヘプチル基を有するペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ヘプチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 30 pg/L において 47 地点全てで検出され、検出濃度は 210～34,000 pg/L の範囲であった。

2009 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河川域及び湖沼域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、水質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2009 年度から 2024 年度における水質についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2009	1,600	1,300	31,000	250	59 [23]	49/49	49/49
	2010	2,700	2,400	23,000	190	60 [20]	49/49	49/49
	2011	2,000	1,700	50,000	380	50 [20]	49/49	49/49
	2012	1,400	1,100	26,000	240	170 [55]	48/48	48/48
	2014	1,400	1,400	26,000	140	50 [20]	48/48	48/48
	2015	1,400	1,200	17,000	310	56 [22]	48/48	48/48
	2016	1,300	1,200	21,000	260	50 [20]	48/48	48/48
	2018	1,100	1,100	28,000	160	70 [30]	47/47	47/47
	2019	1,000	900	11,000	160	90 [40]	48/48	48/48
	2020	1,100	920	16,000	220	90 [30]	46/46	46/46
	2021	1,100	870	23,000	230	90 [40]	47/47	47/47
	2022	1,100	980	14,000	170	90 [30]	48/48	48/48
	2023	990	770	11,000	140	90 [30]	47/47	47/47
	2024	980	860	34,000	210	70 [30]	47/47	47/47

（注）2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-dry において 60 地点中 59 地点で検出され、検出濃度は 220 pg/g-dry までの範囲であった。

2009 年度から 2024 年度における経年分析の結果、河川域及び河口域の減少傾向が統計的に有意と判定された。また、底質全体としても減少傾向が統計的に有意と判定された。

○2009 年度から 2024 年度における底質についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2009	27	24	500	nd	8.3 [3.3]	182/190	64/64
	2010	28	33	180	nd	12 [5]	62/64	62/64
	2011	100	93	1,100	22	5 [2]	64/64	64/64
	2012	51	48	280	12	4 [2]	63/63	63/63
	2014	44	50	190	tr(6)	11 [5]	63/63	63/63
	2015	48	48	270	8	3 [1]	62/62	62/62
	2016	27	27	190	nd	9 [4]	61/62	61/62
	2018	23	25	190	nd	9 [4]	58/61	58/61
	2019	21	22	190	tr(3)	5 [2]	61/61	61/61
	2020	21	22	190	nd	8 [3]	57/58	57/58
	2021	24	26	260	nd	9 [4]	58/60	58/60
	2022	29	26	370	tr(5)	7 [3]	61/61	61/61
	2023	22	24	410	nd	7 [3]	57/60	57/60
	2024	21	18	220	nd	7 [3]	59/60	59/60

(注 1) 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 3 地点全てで検出され、検出濃度は 9～23 pg/g-wet の範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 16 地点全てで検出され、検出濃度は tr(3)～28 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 100 pg/g-wet 及び 930 pg/g-wet であった。

2009 年度から 2024 年度における経年分析の結果、魚類では低濃度地点数の増加傾向が統計的に有意と判定され、減少傾向が示唆された。

○2009 年度から 2024 年度における生物(貝類、魚類及び鳥類)についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオクタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2009	tr(20)	tr(21)	94	nd	25 [9.9]	27/31	7/7
	2010	28	33	76	nd	26 [9.9]	5/6	5/6
	2011	tr(19)	tr(22)	tr(40)	nd	41 [14]	3/4	3/4
	2012	tr(21)	tr(23)	46	nd	38 [13]	4/5	4/5
	2014	tr(4)	tr(6)	10	nd	10 [3]	2/3	2/3
	2015	tr(6.5)	tr(6.3)	26	nd	10 [3.4]	2/3	2/3
	2016	4	7	9	nd	4 [2]	2/3	2/3
	2017	tr(6)	tr(7)	18	nd	12 [4]	2/3	2/3
	2019	tr(3)	tr(4)	tr(5)	tr(2)	6 [2]	3/3	3/3
	2020	6	tr(5)	14	tr(3)	6 [2]	3/3	3/3
	2021	6	11	16	nd	6 [2]	2/3	2/3
	2022	16	22	35	tr(5)	8 [3]	3/3	3/3
	2023	tr(4)	---	13	nd	8 [3]	1/2	1/2
	2024	14	14	23	9	8 [3]	3/3	3/3

ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2009	tr(23)	tr(19)	490	nd	25 [9.9]	74/90	17/18
	2010	tr(13)	tr(11)	95	nd	26 [9.9]	13/18	13/18
	2011	nd	nd	51	nd	41 [14]	7/18	7/18
	2012	tr(35)	tr(32)	86	nd	38 [13]	18/19	18/19
	2014	tr(6)	tr(4)	85	nd	10 [3]	11/19	11/19
	2015	tr(5.7)	tr(5.3)	99	nd	10 [3.4]	11/19	11/19
	2016	4	tr(3)	20	tr(2)	4 [2]	19/19	19/19
	2017	tr(6)	tr(4)	79	nd	12 [4]	12/19	12/19
	2019	tr(3)	tr(3)	18	nd	6 [2]	12/16	12/16
	2020	tr(4)	tr(2)	49	nd	6 [2]	12/18	12/18
	2021	tr(4)	tr(3)	40	nd	6 [2]	14/18	14/18
	2022	11	13	47	nd	8 [3]	17/18	17/18
	2023	tr(5)	tr(7)	29	nd	8 [3]	11/18	11/18
	2024	8	8	28	tr(3)	8 [3]	16/16	16/16
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2009	32	29	58	tr(16)	25 [9.9]	10/10	2/2
	2010	38	---	48	30	26 [9.9]	2/2	2/2
	2011	---	---	nd	nd	41 [14]	0/1	0/1
	2012	tr(27)	---	tr(28)	tr(26)	38 [13]	2/2	2/2
	2014	62	---	2,600	nd	10 [3]	1/2	1/2
	2015	---	---	31	31	10 [3.4]	1/1	1/1
	2016	130	---	320	52	4 [2]	2/2	2/2
	2017	240	---	680	85	12 [4]	2/2	2/2
	2019	---	---	27	27	6 [2]	1/1	1/1
	2020	---	---	280	280	6 [2]	1/1	1/1
	2021	140	---	410	46	6 [2]	2/2	2/2
	2022	1,100	---	2,600	470	8 [3]	2/2	2/2
	2023	360	---	2,000	66	8 [3]	2/2	2/2
	2024	300	---	930	100	8 [3]	2/2	2/2

(注1) 2009年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2014年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2013年度及び2018年度は調査を実施していない。

< 大気 >

大気については、35地点を調査し、検出下限値 0.2 pg/m³において35地点全てで検出され、検出濃度は3.5～31 pg/m³の範囲であった。

2010年度から2024年度における経年分析の結果、減少傾向が統計的に有意と判定された。


なお、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の大気試料の採取は、調査地点によってハイボリュームエアサンプラー又はミドルボリュームエアサンプラーのいずれかでを行っている。同一地点・同一時刻にこの2種類のサンプラーで採取した試料の濃度を比較したところ、ミドルボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度が、ハイボリュームエアサンプラーで採取された試料の濃度に対して1.5倍前後であった。この原因として、ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) とともに採取された前駆物質の一部が試料採取中にペルフルオロオクタン酸 (PFOA) へと変化し、試料採取時間が長いミドルボリュームエアサンプラーでより多くの前駆物質が変化したことが想定されるが、科学的な根拠をもって究明するには至っていない。

○2010 年度から 2024 年度における大気についてのペルフルオロオクタン酸（PFOA）の検出状況

ペルフルオロオ クタン酸（PFOA）	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2010 温暖期	25	26	210	4.0	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	14	14	130	2.4		37/37	37/37
	2011 温暖期	20	18	240	tr(3.5)	5.4 [1.8]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	12	11	97	nd		36/37	36/37
	2012 温暖期	11	12	120	1.9	0.7 [0.2]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	6.9	6.0	48	1.6		36/36	36/36
	2013 温暖期	23	23	190	3.2	1.8 [0.6]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	14	14	53	3.0		36/36	36/36
	2014	28	29	210	5.4	0.4 [0.1]	36/36	36/36
	2015	19	17	260	tr(3.7)	4.2 [1.4]	35/35	35/35
	2016	17	15	140	3.2	1.3 [0.4]	37/37	37/37
	2017	14	13	150	tr(2.0)	3.3 [1.1]	37/37	37/37
	2019	14	14	46	5.5	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2020	13	12	55	4.9	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	2021	8.3	7.5	42	2.6	0.7 [0.3]	35/35	35/35
	2022	11	10	26	4.1	0.5 [0.2]	36/36	36/36
	2023	11	10	65	4.0	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2024	8.0	8.2	31	3.5	0.5 [0.2]	35/35	35/35

(注) 2018 年度は調査を実施していない。


[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

図 3-16-1 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の水質の経年変化 (幾何平均値)


[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)



(注) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2017 年度は調査を実施していない。

図 3-16-2 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の底質の経年変化 (幾何平均値)

[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)




(注 1) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。

(注 2) 2002 年度から 2008 年度、2013 年度及び 2018 年度は調査を実施していない。

(注 3) 2011 年度の魚類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-16-3 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の生物の経年変化 (幾何平均値)

[16] ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度及び 2018 年度は調査を実施していない。

(注 2) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-16-4 ペルフルオロオクタン酸 (PFOA) の大気の経年変化 (幾何平均値)

[17] ペンタクロロベンゼン

・調査の経緯及び実施状況

ペンタクロロベンゼンは、難燃剤として利用されていた。また、農薬としての用途もあったが、日本では農薬登録されたことはない。農薬製造時の副生成物質でもある他、燃焼に伴い非意図的にも生成する。2009年5月に開催された POPs 条約の第4回条約締約国会議（COP4）において条約対象物質とすることが採択され、2010年4月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

2001年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾で1980年度に生物（貝類及び魚類）について調査を、1981年度から1986年度までの毎年度と1988年度、1990年度、1992年度、1996年度及び1999年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、2007年度、2009年度に大気の調査を、2010年度から2015年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2016年度に底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017年度から2022年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2023年度及び2024年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

・調査結果

<生物>

生物のうち貝類については、3地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において3地点全てで検出され、検出濃度は 3.2～6.5 pg/g-wet の範囲であった。魚類については、16地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において16地点全てで検出され、検出濃度は 1.0～58 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-wet において2地点とも検出され、検出濃度は 280 pg/g-wet 及び 520 pg/g-wet であった。

2007年度から2023年度における経年分析の結果、貝類では低濃度地点数の増加傾向が統計的に有意と判定され、減少傾向が示唆された。

○2007年度から2024年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2007	nd	nd	tr(150)	nd	180 [61]	1/31	1/7
	2010	18	16	110	5.9	1.9 [0.7]	6/6	6/6
	2011	28	16	260	10	4 [1]	4/4	4/4
	2012	16	9.7	110	tr(5.8)	8.1 [2.7]	5/5	5/5
	2013	nd	nd	87	nd	78 [26]	1/5	1/5
	2014	14	11	23	10	9.3 [3.1]	3/3	3/3
	2015	tr(11)	tr(9.7)	18	tr(7.4)	12 [4.0]	3/3	3/3
	2016	tr(13)	tr(12)	15	tr(11)	15 [5.1]	3/3	3/3
	2017	18	19	22	14	4 [1]	3/3	3/3
	2018	tr(8)	tr(7)	tr(13)	tr(5)	15 [5]	3/3	3/3
	2019	10	11	14	7	3 [1]	3/3	3/3
	2020	9	9	9	8	3 [1]	3/3	3/3
	2021	9	11	15	4	4 [1]	3/3	3/3
	2022	4.4	4.7	9.8	1.9	0.6 [0.2]	3/3	3/3
	2023	6.0	---	6.1	6.0	0.6 [0.2]	2/2	2/2
	2024	4.6	4.8	6.5	3.2	1.0 [0.4]	3/3	3/3

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2007	nd	nd	480	nd	180 [61]	36/80	10/16
	2010	42	37	230	5.6	1.9 [0.7]	18/18	18/18
	2011	36	37	220	5	4 [1]	18/18	18/18
	2012	29	37	190	tr(5.0)	8.1 [2.7]	19/19	19/19
	2013	tr(35)	tr(40)	160	nd	78 [26]	11/19	11/19
	2014	38	51	280	nd	9.3 [3.1]	18/19	18/19
	2015	26	40	230	nd	12 [4.0]	18/19	18/19
	2016	19	22	150	nd	15 [5.1]	16/19	16/19
	2017	29	32	170	4	4 [1]	19/19	19/19
	2018	19	29	70	nd	15 [5]	15/18	15/18
	2019	20	19	280	3	3 [1]	16/16	16/16
	2020	11	19	120	nd	3 [1]	14/18	14/18
	2021	21	33	150	nd	4 [1]	16/18	16/18
	2022	18	21	78	3.6	0.6 [0.2]	18/18	18/18
	2023	14	14	150	3.4	0.6 [0.2]	18/18	18/18
	2024	13	15	58	1.0	1.0 [0.4]	16/16	16/16
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2007	tr(140)	tr(140)	210	tr(89)	180 [61]	10/10	2/2
	2010	91	---	170	49	1.9 [0.7]	2/2	2/2
	2011	---	---	52	52	4 [1]	1/1	1/1
	2012	77	---	130	46	8.1 [2.7]	2/2	2/2
	2013	300	---	390	230	78 [26]	2/2	2/2
	2014	56	---	560	tr(5.6)	9.3 [3.1]	2/2	2/2
	2015	---	---	53	53	12 [4.0]	1/1	1/1
	2016	240	---	570	100	15 [5.1]	2/2	2/2
	2017	130	---	470	35	4 [1]	2/2	2/2
	2018	370	---	480	280	15 [5]	2/2	2/2
	2019	---	---	470	470	3 [1]	1/1	1/1
	2020	---	---	390	390	3 [1]	1/1	1/1
	2021	380	---	470	300	4 [1]	2/2	2/2
	2022	290	---	330	260	0.6 [0.2]	2/2	2/2
	2023	290	---	380	220	0.6 [0.2]	2/2	2/2
	2024	380	---	520	280	1.0 [0.4]	2/2	2/2

(注 1) 2007 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) : 鳥類の 2013 年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2008 年度及び 2009 年度は調査を実施していない。

< 大気 >

大気については、35 地点を調査し、検出下限値 0.02 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 37～87 pg/m³ の範囲であった。

○2007 年度から 2024 年度における大気についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2007 温暖期	85	83	310	18	12 [4.8]	78/78	26/26
	2007 寒冷期	60	55	220	27		75/75	25/25
	2009 温暖期	63	64	210	20	6.4 [2.5]	111/111	37/37
	2009 寒冷期	25	22	120	tr(5.0)		111/111	37/37
	2010 温暖期	68	73	140	36	1.2 [0.5]	37/37	37/37
	2010 寒冷期	70	69	180	37		37/37	37/37
	2011 温暖期	61	60	140	30	2.1 [0.70]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	59	57	180	26		37/37	37/37
	2012 温暖期	58	57	150	31	1.8 [0.6]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	55	55	120	27		36/36	36/36
	2013 温暖期	55	58	160	27	1.7 [0.6]	36/36	36/36
	2013 寒冷期	55	52	110	34		36/36	36/36
	2014	83	86	210	39	0.9 [0.3]	36/36	36/36
	2015	67	68	170	34	0.6 [0.2]	35/35	35/35
	2016	75	75	220	33	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2017	71	69	200	32	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2018	59	61	100	30	0.22 [0.08]	37/37	37/37
	2019	64	64	110	36	0.09 [0.04]	36/36	36/36
	2020	69	63	180	35	0.17 [0.07]	37/37	37/37
	2021	61	63	130	36	0.13 [0.05]	35/35	35/35
	2022	60	60	130	30	0.08 [0.03]	36/36	36/36
	2023	59	58	170	36	0.21 [0.08]	35/35	35/35
	2024	55	56	87	37	0.06 [0.02]	35/35	35/35

(注) 2008 年度は調査を実施していない。

・2022 年度までの調査結果 (参考)

< 水質 >

○2007 年度から 2022 年度における水質についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2007	nd	nd	nd	nd	3,300 [1,300]	0/48	0/48
	2010	8	5	100	tr(1)	4 [1]	49/49	49/49
	2011	11	11	170	2.6	2.4 [0.9]	49/49	49/49
	2012	14	11	170	3	3 [1]	48/48	48/48
	2013	12	10	170	tr(3)	4 [1]	48/48	48/48
	2014	10	7.0	180	2.8	0.8 [0.3]	48/48	48/48
	2015	13	11	180	3.0	1.5 [0.5]	48/48	48/48
	2017	8.8	5.9	140	2.0	1.4 [0.6]	47/47	47/47
	2018	12	9.7	320	2.7	1.3 [0.5]	47/47	47/47
	2019	9	7	360	tr(2)	6 [2]	48/48	48/48
	2020	7	5	500	tr(2)	3 [1]	46/46	46/46
	2021	4.8	3.5	140	1.2	1.1 [0.4]	47/47	47/47
	2022	4.5	3.5	51	0.9	0.5 [0.2]	48/48	48/48

(注) 2008 年度、2009 年度及び 2016 年度は調査を実施していない。

<底質>


○2007年度から2022年度における底質についてのペンタクロロベンゼンの検出状況

ペンタクロロ ベンゼン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2007	tr(46)	nd	24,000	nd	86 [33]	79/192	35/64
	2010	90	95	4,200	1.0	0.9 [0.3]	64/64	64/64
	2011	95	76	4,500	tr(3)	5 [2]	64/64	64/64
	2012	33	33	1,100	nd	2.5 [0.8]	62/63	62/63
	2013	84	98	3,800	2.2	2.1 [0.7]	63/63	63/63
	2014	70	78	3,600	tr(1.2)	2.4 [0.8]	63/63	63/63
	2015	65	69	2,600	2.4	1.5 [0.5]	62/62	62/62
	2016	62	71	3,700	tr(1.1)	1.8 [0.6]	62/62	62/62
	2017	61	61	2,800	1.3	1.2 [0.5]	62/62	62/62
	2018	72	77	3,400	1.2	0.9 [0.3]	61/61	61/61
	2019	29	27	3,300	1.2	0.9 [0.4]	61/61	61/61
	2020	63	65	2,900	1.8	0.4 [0.2]	58/58	58/58
	2021	28	32	2,300	tr(0.8)	0.9 [0.3]	60/60	60/60
	2022	24	25	1,300	tr(0.5)	0.6 [0.2]	61/61	61/61

(注1) 2007年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2008年度及び2009年度は調査を実施していない。


[17] ペンタクロロベンゼン



- (注 1) 2007年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は2013年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから2012年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002年度から2006年度、2008年度及び2009年度は調査を実施していない。
 (注 4) 2007年度の貝類及び魚類並びに2013年度の貝類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 3-17-1 ペンタクロロベンゼンの生物の経年変化（幾何平均値）


[17] ペンタクロロベンゼン



- (注 1) 2002年度から2006年度、2008年度は調査を実施していない。
 (注 2) 2014年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に2021年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-17-2 ペンタクロロベンゼンの大気の経年変化（幾何平均値）

[17] ペンタクロロベンゼン




(注 1) 2007 年度は調査を実施したが、それ以後の調査と分析法が大きく異なり、検出下限値が高く、全検体が不検出であったことから、経年変化は示していない。

(注 2) 2002 年度から 2006 年度、2008 年度から 2009 年度、2016 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-17-3 ペンタクロロベンゼンの水質の経年変化（幾何平均値）

[17] ペンタクロロベンゼン



(注 1) 2007 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2002 年度から 2006 年度、2008 年度、2009 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-17-4 ペンタクロロベンゼンの底質の経年変化（幾何平均値）

[18] エンドスルファン類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

エンドスルファン類は、有機塩素系殺虫剤の一種である。2011 年 4 月に開催された POPs 条約の第 5 回条約締約国会議（COP5）において条約対象物質とすることが採択され、2014 年 5 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2011 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)} では、1982 年度に水質及び底質の調査を、1992 年度に大気の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2011 年度及び 2012 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014 年度及び 2015 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2016 年度に大気の調査を、2018 年度に水質及び底質の調査を、2021 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2022 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2021 年度までの調査結果を示す。

・2021 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2011 年度から 2021 年度における水質についての α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの検出状況

α -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	180	nd	120 [50]	2/49	2/49
	2012	nd	nd	30	nd	27 [10]	3/48	3/48
	2018	nd	nd	tr(50)	nd	120 [40]	1/47	1/47
	2021	nd	nd	580	nd	90 [40]	17/47	17/47
β -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	270	nd	22 [9]	8/49	8/49
	2012	nd	nd	tr(12)	nd	24 [9]	1/48	1/48
	2018	nd	nd	tr(20)	nd	30 [10]	3/47	3/47
	2021	nd	nd	250	nd	30 [10]	11/47	11/47

（注）2013 年度から 2017 年度、2019 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

<底質>

○2011 年度から 2021 年度における底質についての α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの検出状況

α -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	tr(13)	tr(11)	480	nd	30 [10]	35/64	35/64
	2012	nd	nd	480	nd	13 [5]	19/63	19/63
	2018	nd	nd	30	nd	5 [2]	21/61	21/61
	2021	1.7	1.8	53	nd	1.4 [0.6]	50/60	50/60
β -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	tr(5)	tr(4)	240	nd	9 [4]	38/64	38/64
	2012	nd	nd	250	nd	13 [5]	8/63	8/63
	2018	nd	nd	41	nd	5 [2]	11/61	11/61
	2021	nd	nd	57	nd	2.2 [0.9]	12/60	12/60

（注）2013 年度から 2017 年度、2019 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2011 年度から 2021 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの検出状況

α -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2011	62	120	330	nd	50 [20]	3/4	3/4
	2012	tr(54)	tr(61)	200	nd	71 [24]	4/5	4/5
	2014	tr(20)	nd	130	nd	60 [20]	1/3	1/3
	2015	nd	nd	130	nd	120 [38]	1/3	1/3
	2020	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2011	tr(20)	tr(20)	140	nd	50 [20]	10/18	10/18
	2012	nd	nd	tr(54)	nd	71 [24]	6/19	6/19
	2014	nd	nd	tr(30)	nd	60 [20]	1/19	1/19
	2015	nd	nd	tr(49)	nd	120 [38]	1/19	1/19
	2020	nd	nd	nd	nd	60 [20]	0/18	0/18
鳥類 ^{注1)} (pg/g-wet)	2011	---	---	nd	nd	50 [20]	0/1	0/1
	2012	nd	---	nd	nd	71 [24]	0/2	0/2
	2014	nd	---	nd	nd	60 [20]	0/2	0/2
	2015	---	---	nd	nd	120 [38]	0/1	0/1
	2020	nd	---	nd	nd	60 [20]	0/2	0/2
β -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2011	16	26	52	4	11 [4]	4/4	4/4
	2012	15	16	43	nd	14 [5]	4/5	4/5
	2014	nd	nd	23	nd	19 [6]	1/3	1/3
	2015	nd	nd	tr(22)	nd	32 [11]	1/3	1/3
	2020	nd	nd	nd	nd	18 [6]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2011	nd	nd	37	nd	11 [4]	9/18	9/18
	2012	nd	nd	15	nd	14 [5]	6/19	6/19
	2014	nd	nd	tr(8)	nd	19 [6]	3/19	3/19
	2015	nd	nd	tr(11)	nd	32 [11]	1/19	1/19
	2020	nd	nd	nd	nd	18 [6]	0/18	0/18
鳥類 ^{注1)} (pg/g-wet)	2011	---	---	nd	nd	11 [4]	0/1	0/1
	2012	nd	---	tr(7)	nd	14 [5]	1/2	1/2
	2014	nd	---	tr(8)	nd	19 [6]	1/2	1/2
	2015	---	---	nd	nd	32 [11]	0/1	0/1
	2020	nd	---	nd	nd	18 [6]	0/2	0/2

(注 1) 鳥類の 2014 年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と継続性がない。

(注 2) 2013 年度及び 2016 年度から 2020 年度は調査を実施していない。


<大気>

○2011 年度から 2021 年度における大気についての α -エンドスルファン及び β -エンドスルファンの検出状況

α -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2011 温暖期	26	24	190	tr(7.8)	12 [4.0]	35/35	35/35
	2011 寒冷期	tr(9.6)	tr(9.8)	45	nd		35/37	35/37
	2012 温暖期	23	22	98	tr(6.0)	16 [5.3]	36/36	36/36
	2012 寒冷期	nd	nd	19	nd		15/36	15/36
	2014	20	23	90	2.6	0.8 [0.3]	36/36	36/36
	2015	10	11	140	1.6	1.0 [0.3]	35/35	35/35
	2016	8.9	9.3	46	1.0	0.8 [0.3]	37/37	37/37
	2021	1.4	1.3	6.0	0.4	0.4 [0.2]	35/35	35/35
β -エンドスルファン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2011 温暖期	2.1	1.8	11	nd	1.2 [0.39]	34/35	34/35
	2011 寒冷期	tr(0.80)	tr(0.90)	8.3	nd		31/37	31/37
	2012 温暖期	1.3	1.3	18	nd	1.2 [0.4]	33/36	33/36
	2012 寒冷期	nd	nd	1.7	nd		17/36	17/36
	2014	1.3	1.4	6.1	nd	1.2 [0.4]	33/36	33/36
	2015	0.7	0.6	38	nd	0.5 [0.2]	33/35	33/35
	2016	0.8	tr(0.7)	3.3	nd	0.8 [0.3]	34/37	34/37
	2021	nd	nd	tr(0.5)	nd	0.7 [0.3]	5/35	5/35

(注) 2013 年度及び 2016 年度から 2020 年度は調査を実施していない。


[18-1] α -エンドスルファン



- (注 1) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2017 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2012 年度の寒冷期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
- (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-18-1-1 α -エンドスルファンの大気の経年変化（幾何平均値）

[18-2] β -エンドスルファン



- (注 1) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2017 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2012 年度の寒冷期及び 2021 年度の温暖期は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
- (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-18-2-1 β -エンドスルファンの大気の経年変化（幾何平均値）

[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類 (参考)

・調査の経緯及び実施状況

1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類は、樹脂用及び繊維用の難燃剤として利用されていた。2013年4～5月に開催された POPs 条約の第6回条約締約国会議（COP6）において α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンを条約対象物質とすることが採択され、2014年5月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては2011年度が初めての調査であり、2001年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)}では1987年度に水質、底質及び生物（魚類）を、2002年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では2003年度に水質及び底質の調査を、2004年度に生物（魚類）の調査をそれぞれ実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンに δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンを加えたものについて、2011年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）調査を、2012年度に底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014年度に水質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2015年度に底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。また、 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについて、2016年度に底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2019年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査、2022年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。また2022年度は、 δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンについても水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を実施している。

2023年度及び2024年度は調査を実施していないため、参考として以下に、2022年度までの調査結果を示す。

・2022年度までの調査結果 (参考)

<水質>

○2011年度、2014年度及び2022年度における水質についての1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類の検出状況

α -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	6,300	nd	1,500 [600]	4/47	4/47
	2014	nd	nd	1,600	nd	1,500 [600]	1/48	1/48
	2022	nd	nd	nd	nd	600 [200]	0/48	0/48
β -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	1,300	nd	1,300 [500]	4/47	4/47
	2014	nd	nd	tr(300)	nd	500 [200]	1/48	1/48
	2022	nd	nd	nd	nd	500 [200]	0/48	0/48

γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	65,000	nd	1,200 [500]	5/47	5/47
	2014	nd	nd	nd	nd	700 [300]	0/48	0/48
	2022	nd	nd	nd	nd	600 [300]	0/48	0/48
δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	nd	nd	790 [300]	0/47	0/47
	2014	nd	nd	nd	nd	600 [200]	0/48	0/48
	2022	nd	nd	nd	nd	700 [300]	0/48	0/48
ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2011	nd	nd	nd	nd	740 [300]	0/47	0/47
	2014	nd	nd	nd	nd	400 [200]	0/48	0/48
	2022	nd	nd	nd	nd	400 [200]	0/48	0/48

<底質>

○2011 年度から 2022 年度における底質についての 1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン類の検出状況

α-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	430	nd	24,000	nd	420 [280]	78/186	35/62
	2012	310	280	22,000	nd	180 [70]	47/63	47/63
	2015	390	410	27,000	nd	150 [60]	47/62	47/62
	2016	260	210	27,000	nd	130 [60]	43/62	43/62
	2022	230	190	9,600	nd	160 [70]	41/61	41/61
β-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	nd	nd	14,000	nd	250 [170]	48/186	21/62
	2012	tr(93)	nd	8,900	nd	150 [60]	29/63	29/63
	2015	tr(120)	tr(92)	7,600	nd	150 [60]	33/62	33/62
	2016	tr(87)	nd	7,400	nd	130 [50]	31/62	31/62
	2022	tr(70)	nd	4,000	nd	100 [40]	30/61	30/61
γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	670	nd	570,000	nd	400 [260]	89/186	36/62
	2012	420	330	55,000	nd	160 [60]	52/63	52/63
	2015	330	450	60,000	nd	110 [42]	48/62	48/62
	2016	250	190	50,000	nd	150 [60]	42/62	42/62
	2022	170	170	33,000	nd	70 [30]	41/61	41/61
δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	nd	nd	800	nd	350 [250]	11/186	6/62
	2012	nd	nd	680	nd	300 [100]	5/63	5/63
	2015	nd	nd	nd	nd	180 [70]	0/62	0/62
	2022	nd	nd	tr(70)	nd	110 [50]	1/61	1/61
ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2011	nd	nd	tr(260)	nd	280 [210]	2/186	1/62
	2012	nd	nd	310	nd	150 [60]	7/63	7/63
	2015	nd	nd	nd	nd	130 [51]	0/62	0/62
	2022	nd	nd	nd	nd	130 [50]	0/61	0/61

(注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2013 年度、2014 年度及び 2017 年度から 2021 年度は調査を実施していない。また、2016 年度は α-1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン、β-1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン及び γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカンのみの調査で、δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカン及び ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブプロモシクロドデカンの調査は実施していない。

<生物>

○2011 年度から 2022 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類の検出状況

α -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2011	1,100	1,200	13,000	tr(86)	170 [70]	10/10	4/4
	2012	530	480	2,500	190	50 [20]	5/5	5/5
	2014	270	270	380	200	30 [10]	3/3	3/3
	2015	260	200	560	150	30 [10]	3/3	3/3
	2016	140	140	180	110	22 [9]	3/3	3/3
	2017	190	200	430	86	24 [9]	3/3	3/3
	2018	120	88	270	76	23 [9]	3/3	3/3
	2019	140	150	260	68	24 [9]	3/3	3/3
	2022	150	160	250	80	40 [20]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2011	770	850	69,000	nd	170 [70]	41/51	16/17
	2012	510	560	8,700	nd	50 [20]	18/19	18/19
	2014	240	290	15,000	nd	30 [10]	18/19	18/19
	2015	160	180	3,000	nd	30 [10]	18/19	18/19
	2016	110	140	1,100	tr(12)	22 [9]	19/19	19/19
	2017	140	140	7,800	tr(9)	24 [9]	19/19	19/19
	2018	89	140	530	nd	23 [9]	17/18	17/18
	2019	79	92	980	nd	24 [9]	15/16	15/16
	2022	70	80	450	nd	40 [20]	14/18	14/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2011	200	nd	530	nd	170 [70]	1/3	1/1
	2012	120	---	1,400	nd	50 [20]	1/2	1/2
	2014	480	---	1,800	130	30 [10]	2/2	2/2
	2015	---	---	80	80	30 [10]	1/1	1/1
	2016	400	---	1,600	100	22 [9]	2/2	2/2
	2017	330	---	2,200	50	24 [9]	2/2	2/2
	2018	600	---	610	590	23 [9]	2/2	2/2
	2019	---	---	1,100	1,100	24 [9]	1/1	1/1
	2022	590	---	750	460	40 [20]	2/2	2/2
β -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2011	tr(70)	tr(85)	240	nd	98 [40]	7/10	3/4
	2012	tr(25)	40	90	nd	40 [10]	4/5	4/5
	2014	tr(10)	tr(10)	tr(20)	tr(10)	30 [10]	3/3	3/3
	2015	tr(10)	tr(10)	30	nd	30 [10]	2/3	2/3
	2016	nd	tr(8)	tr(9)	nd	21 [8]	2/3	2/3
	2017	tr(9)	nd	36	nd	23 [9]	1/3	1/3
	2018	nd	nd	nd	nd	22 [8]	0/3	0/3
	2019	nd	nd	tr(22)	nd	24 [9]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2011	nd	nd	760	nd	98 [40]	11/51	5/17
	2012	nd	nd	40	nd	40 [10]	8/19	8/19
	2014	nd	nd	30	nd	30 [10]	5/19	5/19
	2015	nd	nd	tr(20)	nd	30 [10]	2/19	2/19
	2016	nd	nd	tr(12)	nd	21 [8]	3/19	3/19
	2017	nd	nd	tr(12)	nd	23 [9]	2/19	2/19
	2018	nd	nd	nd	nd	22 [8]	0/18	0/18
	2019	nd	nd	nd	nd	24 [9]	0/16	0/16
	2022	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/18	0/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2011	nd	nd	nd	nd	98 [40]	0/3	0/1
	2012	nd	---	nd	nd	40 [10]	0/2	0/2
	2014	nd	---	nd	nd	30 [10]	0/2	0/2
	2015	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1
	2016	nd	---	nd	nd	21 [8]	0/2	0/2
	2017	nd	---	nd	nd	23 [9]	0/2	0/2
	2018	nd	---	nd	nd	22 [8]	0/2	0/2
	2019	---	---	nd	nd	24 [9]	0/1	0/1
	2022	nd	---	nd	nd	40 [20]	0/2	0/2

γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
貝類 (pg/g-wet)		2011	440	470	3,300	nd	210 [80]	8/10	4/4
		2012	170	180	910	30	30 [10]	5/5	5/5
		2014	60	60	110	30	30 [10]	3/3	3/3
		2015	70	90	200	tr(20)	30 [10]	3/3	3/3
		2016	37	39	61	tr(21)	24 [9]	3/3	3/3
		2017	49	30	200	tr(20)	24 [9]	3/3	3/3
		2018	tr(19)	39	46	nd	21 [8]	2/3	2/3
		2019	34	22	140	tr(13)	22 [9]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)		2022	tr(20)	tr(20)	tr(30)	nd	40 [20]	2/3	2/3
		2011	210	tr(90)	50,000	nd	210 [80]	26/51	10/17
		2012	75	80	1,600	nd	30 [10]	16/19	16/19
		2014	30	tr(20)	2,800	nd	30 [10]	12/19	12/19
		2015	tr(20)	tr(10)	230	nd	30 [10]	10/19	10/19
		2016	tr(16)	tr(13)	160	nd	24 [9]	11/19	11/19
		2017	tr(16)	tr(18)	120	nd	24 [9]	12/19	12/19
		2018	tr(11)	tr(11)	130	nd	21 [8]	10/18	10/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)		2019	tr(12)	tr(13)	62	nd	22 [9]	9/16	9/16
		2022	nd	nd	tr(30)	nd	40 [20]	8/18	8/18
		2011	tr(180)	nd	460	nd	210 [80]	1/3	1/1
		2012	31	---	190	nd	30 [10]	1/2	1/2
		2014	tr(10)	---	tr(10)	tr(10)	30 [10]	2/2	2/2
		2015	---	---	tr(10)	tr(10)	30 [10]	1/1	1/1
		2016	tr(10)	---	tr(20)	nd	24 [9]	1/2	1/2
		2017	tr(9)	---	tr(18)	nd	24 [9]	1/2	1/2
δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン		2018	nd	---	nd	nd	21 [8]	0/2	0/2
		2019	---	---	nd	nd	22 [9]	0/1	0/1
		2022	nd	---	nd	nd	40 [20]	0/2	0/2
		実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
貝類 (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/10	0/4
		2012	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/5	0/5
		2014	nd	nd	nd	nd	30 [10]	0/3	0/3
		2015	nd	nd	nd	nd	30 [10]	0/3	0/3
		2022	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/51	0/17
		2012	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/19	0/19
		2014	nd	nd	nd	nd	30 [10]	0/19	0/19
		2015	nd	nd	tr(20)	nd	30 [10]	1/19	1/19
		2022	nd	nd	nd	nd	50 [20]	0/18	0/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/3	0/1
		2012	nd	---	nd	nd	50 [20]	0/2	0/2
		2014	nd	---	nd	nd	30 [10]	0/2	0/2
		2015	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1
		2022	nd	---	nd	nd	50 [20]	0/2	0/2
ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブ ロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
貝類 (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/10	0/4
		2012	nd	nd	tr(30)	nd	40 [20]	1/5	1/5
		2014	nd	nd	tr(20)	nd	30 [10]	1/3	1/3
		2015	nd	nd	tr(10)	nd	30 [10]	1/3	1/3
		2022	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/51	0/17
		2012	nd	nd	tr(30)	nd	40 [20]	3/19	3/19
		2014	nd	nd	80	nd	30 [10]	3/19	3/19
		2015	nd	nd	tr(10)	nd	30 [10]	1/19	1/19
		2022	nd	nd	nd	nd	40 [20]	0/18	0/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)		2011	nd	nd	nd	nd	140 [60]	0/3	0/1
		2012	nd	---	nd	nd	40 [20]	0/2	0/2
		2014	nd	---	nd	nd	30 [10]	0/2	0/2
		2015	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1
		2022	nd	---	nd	nd	40 [20]	0/2	0/2

(注1) 2011年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2014年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012年度までの結果と継続性がない。

(注 3) 2013 年度、2020 年度及び 2021 年度は調査を実施していない。また、2016 年度から 2019 年度は α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンのみの調査で、 δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ε -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの調査は実施していない。


< 大気 >

○2012 年度から 2022 年度における大気についての 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類の検出状況

α -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
大気 (pg/m ³)		2012 温暖期	1.7	2.2	130	nd	0.6 [0.2]	31/36	31/36
		2012 寒冷期	2.9	3.0	63	nd		35/36	35/36
		2014	tr(0.6)	tr(0.7)	3.1	nd	1.2 [0.4]	25/36	25/36
		2015	tr(0.6)	tr(0.7)	30	nd	0.9 [0.3]	26/35	26/35
		2016	0.5	0.5	2.4	tr(0.1)	0.3 [0.1]	37/37	37/37
		2017	0.5	0.5	3.3	nd	0.3 [0.1]	36/37	36/37
		2019	0.5	0.5	4.1	nd	0.3 [0.1]	35/36	35/36
		2022	0.29	0.28	19	nd	0.16 [0.06]	35/36	35/36
β -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
大気 (pg/m ³)		2012 温暖期	0.5	0.5	29	nd	0.3 [0.1]	30/36	30/36
		2012 寒冷期	0.8	0.8	18	nd		35/36	35/36
		2014	nd	nd	tr(0.8)	nd	1.0 [0.3]	8/36	8/36
		2015	nd	nd	3.9	nd	0.8 [0.3]	7/35	7/35
		2016	tr(0.1)	tr(0.1)	0.7	nd	0.3 [0.1]	21/37	21/37
		2017	tr(0.2)	tr(0.1)	0.8	nd	0.3 [0.1]	33/37	33/37
		2019	tr(0.13)	tr(0.15)	1.2	nd	0.21 [0.08]	26/36	26/36
		2022	tr(0.07)	tr(0.07)	4.1	nd	0.18 [0.07]	19/36	19/36
γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
大気 (pg/m ³)		2012 温暖期	1.6	1.7	280	nd	0.3 [0.1]	31/36	31/36
		2012 寒冷期	2.1	1.8	84	nd		35/36	35/36
		2014	nd	nd	tr(1.2)	nd	1.3 [0.4]	4/36	4/36
		2015	nd	nd	4.4	nd	0.8 [0.3]	11/35	11/35
		2016	tr(0.1)	nd	1.4	nd	0.3 [0.1]	16/37	16/37
		2017	tr(0.1)	tr(0.1)	0.8	nd	0.3 [0.1]	20/37	20/37
		2019	nd	nd	1.5	nd	0.4 [0.2]	15/36	15/36
		2022	0.17	0.16	3.1	nd	0.14 [0.05]	32/36	32/36
δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
大気 (pg/m ³)		2012 温暖期	nd	nd	0.8	nd	0.4 [0.2]	1/36	1/36
		2012 寒冷期	nd	nd	1.1	nd		1/36	1/36
		2014	nd	nd	nd	nd	1.8 [0.6]	0/36	0/36
		2015	nd	nd	1.9	nd	1.9 [0.6]	1/35	1/35
ε -1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン		実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
								検体	地点
大気 (pg/m ³)		2012 温暖期	nd	nd	nd	nd	0.6 [0.2]	0/36	0/36
		2012 寒冷期	nd	nd	tr(0.5)	nd		1/36	1/36
		2014	nd	nd	nd	nd	0.9 [0.3]	0/36	0/36
		2015	nd	nd	nd	nd	0.9 [0.3]	0/35	0/35

(注) 2013 年度、2021 年度及び 2022 年度は調査を実施していない。また、2016 年度以降は α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン、 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンのみの調査で、 δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン及び ε -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの調査は実施していない。


[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2014 年度、2017 年度から 2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
 (注 3) 2011 年度の湖沼域及び海域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-19-1-1 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの底質の経年変化（幾何平均値）


[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-19-1-2 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの生物の経年変化（幾何平均値）


[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2002 年度から 2011 年度、2013 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-19-1-3 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの大気の経年変化（幾何平均値）


[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2014 年度、2017 年度から 2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 3) 2011 年度の全域、河川域、湖沼域及び海域、2012 年度の河川域及び湖沼域、2015 年度の湖沼域並びに 2016 年度の河川域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-19-2-1 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの底質の経年変化（幾何平均値）


[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2002 年度から 2011 年度、2013 年度、2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 2) 2014 年度及び 2015 年度は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。
- (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2022 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-19-2-2 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの大気の経年変化（幾何平均値）


[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2014 年度、2017 年度から 2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 3) 2011 年度の湖沼域は幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-19-3-1 γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの底質の経年変化（幾何平均値）

[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン



- (注 1) 2011 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2012 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
- (注 3) 2002 年度から 2010 年度、2013 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 4) 2022 年度の貝類については幾何平均値が検出下限値未満であったため、検出下限値の 1/2 の値を図示した。

図 3-19-3-2 γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの生物の経年変化（幾何平均値）

[20] 総ポリ塩化ナフタレン（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ポリ塩化ナフタレン類は、機械油等として利用されていた。ポリ塩化ナフタレン類のうち、塩素数が 3 以上のものが 1979 年 8 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約では、2015 年 5 月に開催された第 7 回条約締約国会議（COP7）において塩素数が 2 から 8 までの塩化ナフタレンについて条約対象物質とすることが採択され、化審法に基づく第一種特定化学物質に塩素数が 2 のものが 2016 年 4 月に追加指定されている。

2001 年度までの継続的調査においては、「生物モニタリング」ⁱⁱ⁾ で 1980 年度から 1985 年度までの毎年度と 1987 年度、1989 年度、1991 年度及び 1993 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）について調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査でも、塩素数が 1 から 8 までのものを対象として、2006 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2008 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2014 年度に大気の調査を、2015 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2016 年度及び 2017 年度に底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2018 年度、2019 年度及び 2021 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2022 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2021 年度までの調査結果を示す。

・2021 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2008 年度から 2021 年度における水質についての総ポリ塩化ナフタレンの検出状況

総ポリ塩化ナフタレン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注1)}	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2008	nd	nd	180	nd	85 [30]	9/48	9/48
	2018	tr(32)	tr(34)	260	nd	35 [12]	39/47	39/47
	2019	tr(14)	tr(12)	260	nd	24 [7.5]	32/48	32/48
	2021	tr(9)	tr(8)	170	nd	15 [6]	29/47	29/47

（注 1）定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

（注 2）2009 年度から 2017 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

<底質>

○2008 年度から 2021 年度における底質についての総ポリ塩化ナフタレンの検出状況

総ポリ塩化ナフタレン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2008	410	400	28,000	nd	84 [30]	166/189	58/63
	2016	760	870	160,000	nd	59 [20]	59/62	59/62
	2017	630	800	32,000	tr(16)	27 [9.1]	62/62	62/62
	2018	680	810	34,000	9.9	8.5 [3.2]	61/61	61/61
	2019	600	720	58,000	13	7.3 [2.7]	61/61	61/61
	2021	400	440	14,000	nd	9.7 [3.6]	59/60	59/60

（注 1）2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

（注 2）定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

（注 3）2009 年度から 2015 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

< 生物 >

○2006 年度から 2021 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての総ポリ塩化ナフタレンの検出状況

総ポリ塩化ナフタレン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注2)}	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2006	98	73	1.2	tr(19)	27 [11]	31/31	7/7
	2008	94	73	1,300	tr(11)	26 [10]	31/31	7/7
	2015	70	67	580	nd	54 [18]	2/3	2/3
	2016	72	tr(49)	790	nd	57 [19]	2/3	2/3
	2017	46	68	1,400	nd	33 [12]	2/3	2/3
	2018	58	tr(22)	700	tr(13)	36 [12]	3/3	3/3
	2019	84	96	820	nd	40 [15]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2021	62	60	600	nd	37 [13]	2/3	2/3
	2006	72	49	2,700	nd	27 [11]	78/80	16/16
	2008	59	40	2,200	nd	26 [10]	79/85	17/17
	2015	tr(50)	85	390	nd	54 [18]	13/19	13/19
	2016	tr(44)	tr(48)	340	nd	57 [19]	13/19	13/19
	2017	32	51	360	nd	33 [12]	17/19	17/19
	2018	41	36	520	nd	36 [12]	16/18	16/18
鳥類 ^{注3)} (pg/g-wet)	2019	46	78	270	nd	40 [15]	12/16	12/16
	2021	66	74	360	tr(14)	37 [13]	18/18	18/18
	2006	tr(17)	tr(18)	27	tr(11)	27 [11]	10/10	2/2
	2008	tr(10)	nd	tr(22)	nd	26 [10]	5/10	1/2
	2015	---	---	tr(20)	tr(20)	54 [18]	1/1	1/1
	2016	130	---	320	tr(49)	57 [19]	2/2	2/2
	2017	91	---	460	tr(18)	33 [12]	2/2	2/2
	2018	230	---	250	220	36 [12]	2/2	2/2
	2019	---	---	170	170	40 [15]	1/1	1/1
	2021	290	---	330	250	37 [13]	2/2	2/2

(注 1) 2006 年度及び 2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。

(注 3) 鳥類の 2015 年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2008 年度までの結果と継続性がない。

(注 4) 2007 年度、2009 年度から 2014 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

< 大気 >


○2008 年度から 2021 年度における大気についての総ポリ塩化ナフタレンの検出状況

総ポリ塩化ナフタレン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値 ^{注1)}	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2008 温暖期	200	230	660	35	4.0 [1.3]	22/22	22/22
	2008 寒冷期	tr(9.6)	tr(9.8)	45	nd		36/36	36/36
	2014	110	130	1,600	5.4	2.8 [1.0]	36/36	36/36
	2016	110	130	660	9.0	0.79 [0.28]	37/37	37/37
	2017	110	120	920	7	0.67 [0.24]	37/37	37/37
	2018	86	110	590	5.3	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2019	100	130	1,100	6.5	0.6 [0.2]	36/36	36/36
	2021	80	72	1,000	5.3	0.7 [0.3]	35/35	35/35

(注 1) 定量[検出]下限値は、同族体ごとの定量[検出]下限値の合計とした。


(注 2) 2009 年度から 2013 年度、2015 年度及び 2020 年度は調査を実施していない。

[20] 総ポリ塩化ナフタレン



(注 1) 2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度から 2015 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 3-20-1 総ポリ塩化ナフタレンの底質の経年変化（幾何平均値）



(注 1) 2006 年度及び 2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2015 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから 2008 年度までと継続性がないため、経年変化は示していない。
 (注 3) 2002 年度から 2005 年度、2007 年度、2009 年度から 2014 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-20-2 総ポリ塩化ナフタレンの生物の経年変化（幾何平均値）

[20] 総ポリ塩化ナフタレン



- (注 1) 2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 2002 年度から 2007 年度、2009 年度から 2013 年度、2015 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。
- (注 3) 2014 年度以降は原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-20-3 総ポリ塩化ナフタレンの大気の経年変化（幾何平均値）

[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン

・調査の経緯及び実施状況

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエンは、溶媒として利用されていたが、2005年4月1日に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs条約においては、2015年5月に開催された第7回条約締約国会議（COP7）において附属書A（廃絶）に、2017年4月から5月に開催された第8回条約締約国会議（COP8）において附属書C（非意図的放出の削減）にそれぞれ追加することが採択された。

継続的調査としては2007年度が初めての調査であり、2002年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)}では1981年度に水質及び底質の調査を、2002年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では2007年度に水質及び底質の調査を実施している。

2002年度以降のモニタリング調査では、2007年度及び2013年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2015年度から2019年度に大気の調査を、2020年度から2022年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2023年度及び2024年度に大気の調査を実施している。

・調査結果

<大気>

大気については、35地点を調査し、検出下限値 20 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 1,200～3,500 pg/m³ の範囲であった。

○2015年度から2024年度における大気についてのヘキサクロロブタ-1,3-ジエンの検出状況

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2015	1,100	1,200	3,500	45	29 [11]	102/102	34/34
	2016	850	800	4,300	510	60 [20]	111/111	37/37
	2017	4,200	4,000	23,000	1,100	60 [20]	111/111	37/37
	2018	3,600	3,500	8,500	150	30 [10]	110/110	37/37
	2019	1,500	2,600	5,800	nd	50 [20]	104/108	35/36
	2020	2,500	2,500	9,800	1,500	30 [10]	110/110	37/37
	2021	2,400	2,200	11,000	1,400	40 [20]	105/105	35/35
	2022	2,400	2,300	5,000	1,700	50 [20]	108/108	36/36
	2023	3,100	3,000	6,500	2,100	50 [20]	105/105	35/35
	2024	2,300	2,200	3,500	1,200	60 [20]	105/105	35/35

・2022年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2007年度から2022年度における水質についてのヘキサクロロブタ-1,3-ジエンの検出状況

ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2007	nd	nd	nd	nd	870 [340]	0/48	0/48
	2013	nd	nd	tr(43)	nd	94 [37]	1/48	1/48
	2020	nd	nd	490	nd	100 [40]	1/46	1/46
	2021	nd	nd	nd	nd	180 [70]	0/47	0/47
	2022	nd	nd	nd	nd	100 [40]	0/48	0/48

（注）2006年度から2012年度及び2014年度から2019年度は調査を実施していない。

<底質>

○2007年度から2022年度における底質についてのヘキサクロブタ-1,3-ジエンの検出状況

ヘキサクロブタ-1,3-ジエン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2007	nd	nd	1,300	nd	22 [8.5]	22/192	10/64
	2013	nd	nd	1,600	nd	9.9 [3.8]	40/189	20/63
	2020	nd	nd	180	nd	30 [10]	2/58	2/58
	2021	nd	nd	170	nd	30 [10]	3/60	3/60
	2022	nd	nd	370	nd	30 [10]	4/61	4/61

(注1) 2007年度及び2013年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 2006年度から2012年度及び2014年度から2019年度は調査を実施していない。

<生物>

○2007年度から2022年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのヘキサクロブタ-1,3-ジエンの検出状況


ヘキサクロブタ-1,3-ジエン	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2007	nd	nd	nd	nd	36 [12]	0/31	0/7
	2013	nd	nd	tr(7.1)	nd	9.4 [3.7]	3/13	1/5
	2020	nd	nd	tr(7)	nd	13 [5]	1/3	1/3
	2021	nd	nd	tr(5)	nd	14 [5]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2007	nd	nd	nd	nd	36 [12]	0/80	0/16
	2013	nd	nd	59	nd	9.4 [3.7]	7/57	4/19
	2020	nd	nd	19	nd	13 [5]	8/18	8/18
	2021	tr(7)	tr(10)	24	nd	14 [5]	14/18	14/18
	2022	tr(6)	tr(4)	290	nd	10 [4]	9/18	9/18
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2007	nd	nd	nd	nd	36 [12]	0/10	0/2
	2013	nd	nd	nd	nd	9.4 [3.7]	0/6	0/2
	2020	---	---	nd	nd	13 [5]	0/1	0/1
	2021	nd	---	nd	nd	14 [5]	0/2	0/2
	2022	nd	---	nd	nd	10 [4]	0/2	0/2

(注1) 2007年度及び2013年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の2013年度以降における結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2007年度の結果と継続性がない。

(注3) 2006年度から2012年度及び2014年度から2019年度は調査を実施していない。

[21] ヘキサクロブタ-1,3-ジエン



(注 1) 2002 年度から 2014 年度は調査を実施していない。

(注 2) 原則として温暖期に調査を実施することとしているが、特に 2021 年度以降は一部の地点で寒冷期にずれ込んで調査が実施されている。

図 3-21-1 ヘキサクロブタ-1,3-ジエンの大気の経年変化 (幾何平均値)

[22] ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ペンタクロロフェノールは、木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤等として利用されていた。2015 年 5 月に開催された POPs 条約の第 7 回条約締約国会議（COP7）においてペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類について条約対象物質とすることが採択され、2016 年 10 月 1 日に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2015 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査としてペンタクロロフェノールについて、「化学物質環境調査」^{iv)}では 1974 年度及び 1996 年度に水質及び底質の調査を、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では 2005 年度に水質の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2015 年度にペンタクロロフェノールについて水質の調査を、2016 年度にペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールについて底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査、2017 年度から 2019 年度にペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールについて水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

2020 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2019 年度までの調査結果を示す。

・2019 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2015 年度から 2019 年度における水質についてのペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールの検出状況

ペンタクロロフェノール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2015	tr(130)	tr(90)	26,000	nd	260 [85]	25/48	25/48
	2017	86	110	3,500	nd	30 [10]	43/47	43/47
	2018	50	47	4,400	nd	24 [9]	44/47	44/47
	2019	60	tr(50)	3,500	nd	60 [20]	32/48	32/48
ペンタクロロアニソール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2017	tr(10)	tr(8)	1,000	nd	14 [5]	32/47	32/47
	2018	tr(10)	tr(7)	230	nd	16 [6]	30/47	30/47
	2019	tr(10)	nd	210	nd	30 [10]	20/48	20/48

(注) 2016 年度は調査を実施していない。また、2015 年度はペンタクロロフェノールのみの調査で、ペンタクロロアニソールの調査は実施していない。

<底質>

○2017 年度から 2019 年度における底質についてのペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールの検出状況

ペンタクロロフェノール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	350	390	7,400	8	4 [2]	62/62	62/62
	2018	220	300	3,900	nd	18 [6]	59/61	59/61
	2019	260	380	6,200	7	6 [2]	61/61	61/61
ペンタクロロアニソール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	34	32	190	nd	5 [2]	61/62	61/62
	2018	tr(23)	tr(25)	160	nd	27 [9]	53/61	53/61
	2019	14	15	140	nd	2.1 [0.8]	60/61	60/61

< 生物 >

○2016 年度から 2019 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールの検出状況

ペンタクロロフェノール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	tr(45)	tr(46)	65	tr(30)	63 [21]	3/3	3/3
	2017	nd	nd	tr(35)	nd	36 [12]	1/3	1/3
	2018	tr(20)	tr(20)	30	tr(10)	30 [10]	3/3	3/3
	2019	26	26	54	13	10 [4]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2016	100	130	990	nd	63 [21]	18/19	18/19
	2017	tr(15)	tr(15)	110	nd	36 [12]	14/19	14/19
	2018	tr(10)	tr(10)	80	nd	30 [10]	13/18	13/18
	2019	17	22	57	nd	10 [4]	14/16	14/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	1,200	---	3,100	440	63 [21]	2/2	2/2
	2017	1,800	---	11,000	300	36 [12]	2/2	2/2
	2018	460	---	1,200	180	30 [10]	2/2	2/2
	2019	---	---	430	430	10 [4]	1/1	1/1
ペンタクロロアニソール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	7	3	35	3	3 [1]	3/3	3/3
	2017	6	tr(3)	36	tr(2)	4 [1]	3/3	3/3
	2018	6	tr(4)	21	tr(2)	6 [2]	3/3	3/3
	2019	4	tr(2)	15	tr(2)	3 [1]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2016	8	6	100	tr(1)	3 [1]	19/19	19/19
	2017	7	5	120	tr(1)	4 [1]	19/19	19/19
	2018	8	7	73	nd	6 [2]	16/18	16/18
	2019	5	6	59	tr(1)	3 [1]	16/16	16/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	12	---	14	10	3 [1]	2/2	2/2
	2017	23	---	47	11	4 [1]	2/2	2/2
	2018	15	---	20	11	6 [2]	2/2	2/2
	2019	---	---	91	91	3 [1]	1/1	1/1

< 大気 >

○2016 年度から 2019 年度における大気についてのペンタクロロフェノール及びペンタクロロアニソールの検出状況

ペンタクロロフェノール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	6.3	6.0	25	0.6	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2017	4.6	4.8	33	0.7	0.6 [0.2]	37/37	37/37
	2018	5.1	5.8	30	0.9	0.5 [0.2]	37/37	37/37
	2019	4.1	4.2	22	0.6	0.6 [0.2]	36/36	36/36
ペンタクロロアニソール	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	39	42	220	3.4	1.0 [0.4]	37/37	37/37
	2017	34	36	210	6.0	1.2 [0.5]	37/37	37/37
	2018	34	40	110	4.6	1.1 [0.4]	37/37	37/37
	2019	30	32	180	4.3	0.3 [0.1]	36/36	36/36

[23] 短鎖塩素化パラフィン類

・調査の経緯及び実施状況

短鎖塩素化パラフィン類は、ゴム、塗料及び接着剤の可塑剤、プラスチックの難燃剤並びに金属加工液の極圧潤滑剤等として利用されている。2016 年 4 月から 5 月に開催された POPs 条約の第 8 回条約締約国会議（COP8）において短鎖塩素化パラフィン類について条約対象物質とすることが採択され、2018 年 4 月に塩素の含有量が全重量の 48%を超えるものが化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2016 年度が初めての調査であり、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2004 年度に水質、底質及び生物（魚類）の調査を、2005 年度に水質、底質及び生物（貝類及び魚類）の調査をそれぞれ実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2016 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2017 年度から 2022 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を、2023 年度及び 2024 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

なお、短鎖塩素化パラフィン類の結果は、測定法に様々な課題がある中での試行において得られた暫定的な値である。

・調査結果

<生物>

塩素化デカン類：生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 200 pg/g-wet において 3 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は tr(280) pg/g-wet であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 200 pg/g-wet において 16 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(290) pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 200 pg/g-wet において 2 地点中 1 地点で検出され、検出濃度は tr(200) pg/g-wet であった。

塩素化ウンデカン類：生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 3 地点全てで検出され、検出濃度は tr(330)～tr(490) pg/g-wet の範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 16 地点中 3 地点で検出され、検出濃度は tr(550) pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は tr(320) pg/g-wet 及び tr(590) pg/g-wet であった。

塩素化ドデカン類：生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 3 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(540) pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 16 地点中 5 地点で検出され、検出濃度は tr(510) pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は tr(360) pg/g-wet 及び tr(660) pg/g-wet であった。

塩素化トリデカン類：生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 3 地点中 2 地点で検出され、検出濃度は tr(640) pg/g-wet までの範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 16 地点中 7 地点で検出され、検出濃度は tr(570) pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 300 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は tr(540) pg/g-wet 及び 1,100 pg/g-wet であった。

○2016 年度から 2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての短鎖塩素化パラフィン類の検出状況

塩素化デカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	tr(700)	tr(700)	2,200	nd	1,300 [500]	2/3	2/3
	2017	700	1,700	1,800	nd	500 [200]	2/3	2/3
	2018	nd	tr(400)	tr(400)	nd	1,200 [400]	2/3	2/3
	2019	nd	nd	nd	nd	900 [300]	0/3	0/3
	2020	tr(400)	tr(700)	tr(700)	nd	900 [300]	2/3	2/3
	2021	tr(200)	tr(300)	tr(500)	nd	600 [200]	2/3	2/3
	2022	nd	nd	tr(300)	nd	600 [200]	1/3	1/3
	2023	nd	---	tr(150)	nd	450 [150]	1/2	1/2
	2024	nd	nd	tr(280)	nd	400 [200]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2016	tr(600)	tr(700)	2,800	nd	1,300 [500]	13/19	13/19
	2017	tr(400)	tr(400)	2,100	nd	500 [200]	16/19	16/19
	2018	nd	nd	tr(800)	nd	1,200 [400]	1/18	1/18
	2019	nd	nd	tr(700)	nd	900 [300]	5/16	5/16
	2020	nd	nd	tr(500)	nd	900 [300]	3/18	3/18
	2021	nd	nd	700	nd	600 [200]	4/18	4/18
	2022	nd	nd	tr(400)	nd	600 [200]	6/18	6/18
	2023	nd	nd	tr(270)	nd	450 [150]	6/18	6/18
	2024	nd	nd	tr(290)	nd	400 [200]	2/16	2/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	tr(1,000)	---	1,300	tr(800)	1,300 [500]	2/2	2/2
	2017	tr(400)	---	1,600	nd	500 [200]	1/2	1/2
	2018	nd	---	tr(600)	nd	1,200 [400]	1/2	1/2
	2019	---	---	tr(600)	tr(600)	900 [300]	1/1	1/1
	2020	---	---	nd	nd	900 [300]	0/1	0/1
	2021	tr(400)	---	600	tr(300)	600 [200]	2/2	2/2
	2022	nd	---	tr(200)	nd	600 [200]	1/2	1/2
	2023	500	---	610	tr(410)	450 [150]	2/2	2/2
	2024	nd	---	tr(200)	nd	400 [200]	1/2	1/2
塩素化ウンデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	tr(2,900)	tr(2,000)	6,000	tr(2,000)	3,000 [1,000]	3/3	3/3
	2017	2,200	3,400	11,000	tr(300)	800 [300]	3/3	3/3
	2018	nd	nd	nd	nd	1,800 [700]	0/3	0/3
	2019	nd	nd	600	nd	500 [200]	1/3	1/3
	2020	tr(700)	1,300	1,800	nd	800 [300]	2/3	2/3
	2021	nd	nd	800	nd	800 [300]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	tr(500)	nd	900 [300]	1/3	1/3
	2023	nd	---	nd	nd	1,500 [500]	0/2	0/2
	2024	tr(420)	tr(470)	tr(490)	tr(330)	700 [300]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2016	tr(2,900)	tr(2,000)	15,000	nd	3,000 [1,000]	18/19	18/19
	2017	1,900	1,100	24,000	nd	800 [300]	16/19	16/19
	2018	nd	nd	tr(700)	nd	1,800 [700]	1/18	1/18
	2019	tr(300)	tr(400)	1,100	nd	500 [200]	11/16	11/16
	2020	nd	nd	1,400	nd	800 [300]	4/18	4/18
	2021	nd	nd	1,000	nd	800 [300]	4/18	4/18
	2022	nd	nd	tr(700)	nd	900 [300]	7/18	7/18
	2023	nd	nd	nd	nd	1,500 [500]	0/18	0/18
	2024	nd	nd	tr(550)	nd	700 [300]	3/16	3/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	4,900	---	8,000	3,000	3,000 [1,000]	2/2	2/2
	2017	5,000	---	31,000	800	800 [300]	2/2	2/2
	2018	nd	---	nd	nd	1,800 [700]	0/2	0/2
	2019	---	---	1,400	1,400	500 [200]	1/1	1/1
	2020	---	---	1,100	1,100	800 [300]	1/1	1/1
	2021	1,000	---	2,300	tr(400)	800 [300]	2/2	2/2
	2022	nd	---	nd	nd	900 [300]	0/2	0/2
	2023	tr(550)	---	tr(1,200)	nd	1,500 [500]	1/2	1/2
	2024	tr(430)	---	tr(590)	tr(320)	700 [300]	2/2	2/2

塩素化ドデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	tr(1,400)	tr(1,500)	tr(1,800)	tr(1,100)	2,100 [700]	3/3	3/3
	2017	2,000	1,400	4,700	1,300	900 [300]	3/3	3/3
	2018	nd	nd	nd	nd	1,500 [600]	0/3	0/3
	2019	nd	nd	nd	nd	1,200 [500]	0/3	0/3
	2020	tr(300)	tr(500)	700	nd	600 [200]	2/3	2/3
	2021	nd	nd	400	nd	400 [200]	1/3	1/3
	2022	tr(300)	tr(300)	900	nd	900 [300]	2/3	2/3
	2023	tr(600)	---	1,000	tr(360)	700 [300]	2/2	2/2
	2024	tr(320)	tr(400)	tr(540)	nd	800 [300]	2/3	2/3
塩素化ドデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
魚類 (pg/g-wet)	2016	tr(1,800)	tr(1,800)	8,700	nd	2,100 [700]	17/19	17/19
	2017	2,100	2,100	19,000	nd	900 [300]	18/19	18/19
	2018	nd	nd	nd	nd	1,500 [600]	0/18	0/18
	2019	nd	nd	tr(900)	nd	1,200 [500]	2/16	2/16
	2020	nd	nd	1,400	nd	600 [200]	2/18	2/18
	2021	nd	nd	tr(300)	nd	400 [200]	3/18	3/18
	2022	tr(300)	tr(400)	tr(800)	nd	900 [300]	13/18	13/18
	2023	tr(350)	tr(400)	730	nd	700 [300]	13/18	13/18
	2024	nd	nd	tr(510)	nd	800 [300]	5/16	5/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	3,800	---	6,600	2,200	2,100 [700]	2/2	2/2
	2017	5,500	---	25,000	1,200	900 [300]	2/2	2/2
	2018	nd	---	nd	nd	1,500 [600]	0/2	0/2
	2019	---	---	tr(500)	tr(500)	1,200 [500]	1/1	1/1
	2020	---	---	nd	nd	600 [200]	0/1	0/1
	2021	tr(300)	---	1,000	nd	400 [200]	1/2	1/2
	2022	tr(300)	---	tr(500)	nd	900 [300]	1/2	1/2
	2023	950	---	1,300	700	700 [300]	2/2	2/2
	2024	tr(490)	---	tr(660)	tr(360)	800 [300]	2/2	2/2
塩素化トリデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2016	tr(700)	tr(700)	tr(900)	tr(500)	1,100 [400]	3/3	3/3
	2017	900	700	3,100	tr(300)	500 [200]	3/3	3/3
	2018	nd	nd	nd	nd	1,400 [500]	0/3	0/3
	2019	500	400	1,100	tr(300)	400 [200]	3/3	3/3
	2020	tr(400)	tr(300)	1,700	nd	500 [200]	2/3	2/3
	2021	tr(200)	nd	900	nd	500 [200]	1/3	1/3
	2022	tr(500)	tr(500)	1,000	nd	900 [400]	2/3	2/3
	2023	nd	---	tr(740)	nd	1,200 [500]	1/2	1/2
	2024	tr(390)	tr(620)	tr(640)	nd	800 [300]	2/3	2/3
魚類 (pg/g-wet)	2016	tr(800)	tr(800)	4,900	nd	1,100 [400]	17/19	17/19
	2017	tr(300)	nd	4,100	nd	500 [200]	8/19	8/19
	2018	nd	nd	nd	nd	1,400 [500]	0/18	0/18
	2019	tr(200)	tr(200)	1,300	nd	400 [200]	11/16	11/16
	2020	nd	nd	1,900	nd	500 [200]	2/18	2/18
	2021	nd	nd	7,000	nd	500 [200]	2/18	2/18
	2022	nd	nd	tr(700)	nd	900 [400]	7/18	7/18
	2023	nd	nd	tr(730)	nd	1,200 [500]	7/18	7/18
	2024	nd	nd	tr(570)	nd	800 [300]	7/16	7/16
鳥類 (pg/g-wet)	2016	1,400	---	1,500	1,400	1,100 [400]	2/2	2/2
	2017	900	---	8,100	nd	500 [200]	1/2	1/2
	2018	nd	---	nd	nd	1,400 [500]	0/2	0/2
	2019	---	---	1,300	1,300	400 [200]	1/1	1/1
	2020	---	---	tr(300)	tr(300)	500 [200]	1/1	1/1
	2021	700	---	900	500	500 [200]	2/2	2/2
	2022	tr(400)	---	900	nd	900 [400]	1/2	1/2
	2023	tr(650)	---	1,700	nd	1,200 [500]	1/2	1/2
	2024	tr(770)	---	1,100	tr(540)	800 [300]	2/2	2/2

(注) 塩素数が 5 から 9 までのものを測定の対象とした結果である。

<大気>

塩素化デカン類：大気については、35 地点を調査し、検出下限値 50 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は tr(50)~770 pg/m³ の範囲であった。

塩素化ウンデカン類：大気については、35 地点を調査し、検出下限値 130 pg/m³ において 35 地点中 26 地点で検出され、検出濃度は 4,300 pg/m³ までの範囲であった。

塩素化ドデカン類：大気については、35 地点を調査し、検出下限値 120 pg/m³ において 35 地点中 24 地点で検出され、検出濃度は 910 pg/m³ までの範囲であった。

塩素化トリデカン類：大気については、35 地点を調査し、検出下限値 50 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は tr(100)~640 pg/m³ の範囲であった。

○2016 年度から 2024 年度における大気についての短鎖塩素化パラフィン類の検出状況

塩素化デカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	tr(170)	tr(200)	940	nd	290 [110]	24/37	24/37
	2017	370	380	1,500	tr(70)	140 [50]	37/37	37/37
	2018	370	390	1,700	tr(130)	150 [60]	37/37	37/37
	2019	400	400	1,500	tr(100)	400 [100]	36/36	36/36
	2020	170	170	560	tr(60)	120 [50]	37/37	37/37
	2021	300	tr(200)	900	tr(100)	300 [100]	35/35	35/35
	2022	120	130	490	tr(40)	110 [40]	36/36	36/36
	2023	210	190	940	tr(80)	140 [40]	35/35	35/35
	2024	270	290	770	tr(50)	120 [50]	35/35	35/35
塩素化ウンデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	tr(350)	tr(320)	3,200	nd	610 [240]	20/37	20/37
	2017	500	510	2,300	tr(90)	190 [60]	37/37	37/37
	2018	450	430	2,600	tr(100)	110 [40]	37/37	37/37
	2019	400	400	2,300	tr(100)	300 [100]	36/36	36/36
	2020	220	220	1,900	tr(50)	120 [50]	37/37	37/37
	2021	290	310	850	nd	210 [80]	34/35	34/35
	2022	tr(130)	tr(120)	2,400	nd	300 [100]	22/36	22/36
	2023	tr(320)	tr(290)	1,300	nd	550 [190]	33/35	33/35
	2024	tr(300)	tr(320)	4,300	nd	380 [130]	26/35	26/35
塩素化ドデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	nd	nd	740	nd	430 [170]	7/37	7/37
	2017	190	190	730	tr(30)	100 [30]	37/37	37/37
	2018	190	190	880	tr(60)	110 [40]	37/37	37/37
	2019	tr(140)	tr(170)	1,600	nd	260 [90]	23/36	23/36
	2020	tr(80)	tr(70)	640	nd	140 [50]	29/37	29/37
	2021	tr(110)	tr(120)	370	nd	220 [80]	27/35	27/35
	2022	nd	nd	430	nd	360 [120]	11/36	11/36
	2023	nd	tr(210)	tr(520)	nd	630 [210]	18/35	18/35
	2024	tr(170)	tr(200)	910	nd	360 [120]	24/35	24/35
塩素化トリデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	nd	nd	510	nd	320 [120]	13/37	13/37
	2017	150	160	1,600	nd	120 [40]	35/37	35/37
	2018	tr(100)	tr(110)	470	nd	180 [70]	26/37	26/37
	2019	tr(90)	tr(90)	1,600	nd	250 [80]	19/36	19/36
	2020	tr(40)	tr(40)	360	nd	100 [40]	23/37	23/37
	2021	nd	tr(100)	tr(200)	nd	300 [100]	26/35	26/35
	2022	nd	nd	tr(190)	nd	330 [110]	3/36	3/36
	2023	nd	nd	tr(250)	nd	400 [130]	15/35	15/35
	2024	160	140	640	tr(100)	110 [50]	35/35	35/35

(注) 2016 年度の塩素化デカン類は塩素数が 4 から 6 までのもの、塩素化ウンデカン類、塩素化ドデカン類及び塩素化トリデカン類は塩素数が 4 から 7 までのものをそれぞれ対象とした測定結果である。2017 年度から 2019 年度は、いずれの物質群についても塩素数が 4 から 7 までのものを、2020 年度及び 2020 年度はいずれの物質群についても塩素数が 4 から 8 までのものを測定の対象とした結果である。

- ・2022 年度までの調査結果（参考）

< 水質 >

○2017 年度から 2022 年度における水質についての短鎖塩素化パラフィン類の検出状況

塩素化デカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2017	nd	nd	tr(1,600)	nd	3,300 [1,100]	1/47	1/47
	2018	nd	nd	1,600	nd	1,000 [400]	8/47	8/47
	2019	nd	nd	2,300	nd	600 [200]	17/48	17/48
	2020	nd	nd	1,800	nd	400 [200]	16/46	16/46
	2021	tr(500)	tr(500)	1,100	nd	700 [300]	42/47	42/47
	2022	tr(200)	tr(200)	1,100	nd	300 [100]	47/48	47/48
塩素化ウンデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2017	nd	nd	3,100	nd	1,500 [500]	13/47	13/47
	2018	nd	nd	3,500	nd	2,000 [800]	6/47	6/47
	2019	nd	nd	5,000	nd	1,400 [500]	19/48	19/48
	2020	nd	nd	2,400	nd	900 [300]	4/46	4/46
	2021	tr(300)	tr(300)	1,200	nd	900 [300]	26/47	26/47
	2022	tr(400)	tr(400)	2,200	nd	900 [300]	37/48	37/48
塩素化ドデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2017	nd	nd	10,000	nd	3,300 [1,100]	4/47	4/47
	2018	nd	nd	3,000	nd	3,000 [1,000]	16/47	16/47
	2019	nd	nd	34,000	nd	1,000 [400]	20/48	20/48
	2020	nd	nd	2,600	nd	700 [300]	4/46	4/46
	2021	nd	nd	4,900	nd	1,200 [500]	13/47	13/47
	2022	nd	nd	2,400	nd	900 [300]	17/48	17/48
塩素化トリデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2017	nd	nd	10,000	nd	3,600 [1,200]	7/47	7/47
	2018	nd	nd	11,000	nd	4,500 [1,500]	18/47	18/47
	2019	nd	nd	38,000	nd	1,300 [500]	17/48	17/48
	2020	nd	nd	2,000	nd	500 [200]	8/46	8/46
	2021	nd	nd	8,600	nd	2,000 [800]	7/47	7/47
	2022	tr(400)	tr(400)	3,900	nd	600 [200]	47/48	47/48

(注) 塩素数が 5 から 9 までのものを測定の対象とした結果である。

< 底質 >

○2017 年度から 2022 年度における底質についての短鎖塩素化パラフィン類の検出状況

塩素化デカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	nd	nd	17,000	nd	10,000 [4,000]	12/62	12/62
	2018	nd	nd	7,000	nd	6,000 [2,000]	7/61	7/61
	2019	nd	nd	2,600	nd	2,000 [1,000]	8/61	8/61
	2020	nd	nd	6,000	nd	900 [400]	21/58	21/58
	2021	tr(400)	nd	4,300	nd	800 [300]	30/60	30/60
	2022	300	tr(180)	6,500	nd	210 [70]	48/61	48/61
塩素化ウンデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	nd	nd	37,000	nd	10,000 [4,000]	19/62	19/62
	2018	nd	nd	tr(13,000)	nd	15,000 [5,000]	7/61	7/61
	2019	nd	nd	5,900	nd	2,000 [1,000]	22/61	22/61
	2020	tr(600)	nd	6,900	nd	1,200 [500]	25/58	25/58
	2021	tr(500)	nd	7,000	nd	1,200 [400]	28/60	28/60
	2022	700	300	16,000	nd	300 [100]	57/61	57/61

塩素化ドデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	nd	nd	44,000	nd	11,000 [4,000]	19/62	19/62
	2018	tr(2,000)	nd	38,000	nd	6,000 [2,000]	28/61	28/61
	2019	tr(1,100)	nd	83,000	nd	2,000 [1,000]	27/61	27/61
	2020	tr(1,300)	tr(1,200)	18,000	nd	2,000 [800]	31/58	31/58
	2021	tr(900)	tr(800)	12,000	nd	1,000 [400]	44/60	44/60
	2022	900	500	19,000	nd	400 [200]	53/61	53/61
塩素化トリデカン類	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2017	nd	nd	94,000	nd	12,000 [5,000]	18/62	18/62
	2018	nd	nd	36,000	nd	9,000 [3,000]	24/61	24/61
	2019	tr(1,700)	tr(1,700)	60,000	nd	2,000 [1,000]	39/61	39/61
	2020	1,400	tr(1,100)	26,000	nd	1,200 [500]	40/58	40/58
	2021	1,200	1,000	31,000	nd	1,000 [400]	47/60	47/60
	2022	1,200	900	28,000	nd	500 [200]	54/61	54/61

(注) 塩素数が 5 から 9 までのものを測定の対象とした結果である。

[24] ジコホル（参考）

・調査の経緯及び実施状況

ジコホルは、殺虫剤及び防ダニ剤等として利用されていた。農薬取締法に基づく登録は 2004 年に失効し、2005 年 4 月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。また、POPs 条約では、2019 年の 4 月から 5 月に開催された第 9 回条約締約国会議（COP9）において条約対象物質とすることが採択され、2021 年 4 月に化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2006 年度が初めての調査であり、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2004 年度に底質の調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2006 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2008 年度に水質、底質及び生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2016 年度に大気の調査を、2018 年度に生物（貝類、魚類及び鳥類）の調査を、2019 年度及び 2020 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査実施している。

2021 年度以降は調査を実施していないため、参考として以下に、2019 年度までの調査結果を示す。

・2020 年度までの調査結果（参考）

<水質>

○2008 年度、2019 年度及び 2020 年度における水質についてのジコホルの検出状況

ジコホル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2008	nd	nd	76	nd	25 [10]	13/48	13/48
	2019	nd	nd	40	nd	13 [8]	3/48	3/48
	2020	nd	nd	30	nd	13 [5]	1/46	1/46

<底質>

○2008 年度、2019 年度及び 2020 年度における底質についてのジコホルの検出状況

ジコホル	実施年度	幾何 平均値 ^{注)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2008	nd	nd	460	nd	160 [63]	30/186	13/63
	2019	4	4	84	nd	4 [2]	40/61	40/61
	2020	tr(5)	nd	77	nd	13 [5]	23/58	23/58

（注）2008 年度は各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

<生物>

○2006 年度から 2020 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのジコホルの検出状況

ジコホル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2006	tr(58)	tr(70)	240	nd	92 [36]	22/31	5/7
	2008	tr(110)	120	210	nd	120 [48]	28/31	7/7
	2018	nd	nd	30	nd	30 [10]	1/3	1/3
	2019	nd	nd	tr(10)	nd	30 [10]	1/3	1/3
	2020	nd	nd	tr(20)	nd	30 [10]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2006	nd	nd	290	nd	92 [36]	5/80	1/16
	2008	tr(62)	tr(77)	270	nd	120 [48]	55/85	14/17
	2018	tr(10)	nd	280	nd	30 [10]	9/18	9/18
	2019	tr(10)	tr(10)	120	nd	30 [10]	12/16	12/16
	2020	tr(10)	nd	330	nd	30 [10]	8/18	8/18

ジコホル	実施年度	幾何 平均値 ^{注1)}	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
鳥類 ^{注2)} (pg/g-wet)	2006	nd	nd	nd	nd	92 [36]	0/10	0/2
	2008	nd	nd	300	nd	120 [48]	1/10	1/2
	2018	nd	---	nd	nd	30 [10]	0/2	0/2
	2019	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1
	2020	---	---	nd	nd	30 [10]	0/1	0/1

(注1) 2006 年度及び 2008 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注2) 鳥類の 2018 年度以降の結果は、調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2008 年度までの結果と継続性がない。

(注3) 2007 年度及び 2009 年度から 2017 年度は調査を実施していない。

< 大気 >

○2016 年度、2019 年度及び 2020 年度における大気についてのジコホルの検出状況

ジコホル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2016	nd	nd	1.0	nd	0.5 [0.2]	10/37	10/37
	2019	nd	nd	0.4	nd	0.4 [0.2]	5/36	5/36
	2020	nd	nd	tr(0.3)	nd	0.5 [0.2]	3/37	3/37

[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)

・調査の経緯及び実施状況

ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) は、フッ素ポリマー加工助剤、界面活性剤等として利用されていた。2021 年 7 月及び 2022 年 6 月に開催された POPs 条約の第 10 回条約締約国会議 (COP10) においてペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) とその塩及び PFHxS 関連物質について条約対象物質とすることが採択され、2023 年 12 月にはペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) 及びその塩が化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

2001 年度までの継続的調査及び「化学物質環境調査」^{iv)}並びに 2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、本物質を調査していない。

2002 年度以降のモニタリング調査では、ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) を分析対象として、2018 年度及び 2019 年度に水質及び底質の調査を、2020 年度から 2024 年度に水質、底質、生物（貝類、魚類及び鳥類）及び大気の調査を実施している。

なお、モニタリング調査では、直鎖のヘキシル基を有するペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)を分析対象としている。ただし、ヘキシル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 40 pg/L において 47 地点中 38 地点で検出され、検出濃度は 2,300 pg/L までの範囲であった。

○2018 年度から 2024 年度における水質についてのペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) の検出状況

ペルフルオロヘキサ ンスルホン酸 (PFHxS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
水質 (pg/L)	2018	190	130	2,600	nd	120 [50]	44/47	44/47
	2019	150	120	1,800	nd	60 [30]	45/48	45/48
	2020	160	120	1,500	nd	60 [20]	44/46	44/46
	2021	160	110	2,300	nd	70 [30]	44/47	44/47
	2022	130	120	1,800	nd	70 [30]	42/48	42/48
	2023	110	100	2,200	nd	70 [30]	38/47	38/47
	2024	140	130	2,300	nd	90 [40]	38/47	38/47

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-dry において 60 地点中 15 地点で検出され、検出濃度は 18 pg/g-dry までの範囲であった。

○2018 年度から 2024 年度における底質についてのペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) の検出状況

ペルフルオロヘキサ ンスルホン酸 (PFHxS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
底質 (pg/g-dry)	2018	nd	nd	27	nd	11 [5]	15/61	15/61
	2019	nd	nd	15	nd	13 [5]	10/61	10/61
	2020	nd	nd	10	nd	6 [3]	13/58	13/58
	2021	nd	nd	15	nd	6 [3]	19/60	19/60
	2022	tr(3)	nd	16	nd	6 [3]	28/61	28/61
	2023	nd	nd	20	nd	6 [3]	19/60	19/60
	2024	nd	nd	18	nd	6 [3]	15/60	15/60

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 3 地点全てで検出されなかった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 16 地点中 9 地点で検出され、検出濃度は 1,900 pg/g-wet までの範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 94 pg/g-wet 及び 180 pg/g-wet であった。

○2020 年度から 2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）の検出状況

ペルフルオロヘキサ ンスルホン酸 (PFHxS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
貝類 (pg/g-wet)	2020	tr(2)	tr(3)	tr(3)	nd	5 [2]	2/3	2/3
	2021	nd	nd	tr(3)	nd	5 [2]	1/3	1/3
	2022	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/3	0/3
	2023	nd	---	nd	nd	7 [3]	0/2	0/2
	2024	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2020	tr(3)	tr(2)	18	nd	5 [2]	10/18	10/18
	2021	tr(2)	nd	16	nd	5 [2]	7/18	7/18
	2022	tr(4)	tr(6)	20	nd	7 [3]	10/18	10/18
	2023	tr(3)	nd	34	nd	7 [3]	7/18	7/18
	2024	tr(5)	tr(5)	1,900	nd	7 [3]	9/16	9/16
鳥類 (pg/g-wet)	2020	---	---	190	190	5 [2]	1/1	1/1
	2021	20	---	40	10	5 [2]	2/2	2/2
	2022	400	---	630	250	7 [3]	2/2	2/2
	2023	110	---	230	56	7 [3]	2/2	2/2
	2024	130	---	180	94	7 [3]	2/2	2/2

<大気>


大気については、35 地点を調査し、検出下限値 0.2 pg/m³ において 35 地点全てで検出され、検出濃度は 0.7～6.1 pg/m³ の範囲であった。

なお、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）の大気試料の採取は、調査地点によってハイボリウムエアサンプラー又はミドルボリウムエアサンプラーのいずれかで行っている。同一地点・同一時刻にこの 2 種類のサンプラーで採取した試料の濃度を比較したところ、ミドルボリウムエアサンプラーで採取された試料の濃度が、ハイボリウムエアサンプラーで採取された試料の濃度に対して 3.5 倍前後であった。この原因として、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）とともに採取された前駆物質の一部が試料採取中にペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）へと変化し、試料採取時間が長いミドルボリウムエアサンプラーでより多くの前駆物質が変化したことが想定されるが、科学的な根拠をもって究明するには至っていない。

○2020 年度から 2024 年度における大気についてのペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）の検出状況

ペルフルオロヘキサ ンスルホン酸 (PFHxS)	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度	
							検体	地点
大気 (pg/m ³)	2020	2.5	2.4	6.1	0.7	0.3 [0.1]	37/37	37/37
	2021	2.2	2.3	6.6	0.46	0.18 [0.07]	35/35	35/35
	2022	3.1	3.2	7.0	0.79	0.11 [0.04]	36/36	36/36
	2023	2.4	2.1	5.6	0.8	0.5 [0.2]	35/35	35/35
	2024	2.4	2.2	6.1	0.7	0.5 [0.2]	35/35	35/35

[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)



(注) 2002年度から2017年度は調査を実施していない。

図 3-25-1 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS) の水質の経年変化 (幾何平均値)

[26] メトキシクロル

・調査の経緯及び実施状況

メトキシクロルは、殺虫剤として利用されていたが、農薬取締法に基づく登録は 1960 年に失効している。2023 年 5 月に開催された POPs 条約の第 11 回条約締約国会議（COP11）において条約対象物質とすることが採択され、2024 年 12 月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2023 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)} では 1985 年度に水質及び底質の調査を、2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、2005 年度に水質、底質及び生物（魚類）の調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2023 年度に水質及び底質を、2024 年度に水質、底質及び生物の調査を実施している。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 40 pg/L において 47 地点全てで検出されなかった。

○2023 年度及び 2024 年度における水質についてのメトキシクロルの検出状況

メトキシクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
水質 (pg/L)	2023	nd	nd	nd	nd	80 [30]	0/47	0/47
	2024	nd	nd	nd	nd	110 [40]	0/47	0/47

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 3 pg/g-dry において 60 地点全てで検出されなかった。

○2023 年度及び 2024 年度における底質についてのメトキシクロルの検出状況

メトキシクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2023	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/60	0/60
	2024	nd	nd	nd	nd	7 [3]	0/60	0/60

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 4 pg/g-wet において 3 地点全てで検出されなかった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 4 pg/g-wet において 16 地点全てで検出されなかった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 4 pg/g-wet において 2 地点とも検出されなかった。

○2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についてのメトキシクロルの検出状況

メトキシクロル	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
貝類 (pg/g-wet)	2024	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/3	0/3
魚類 (pg/g-wet)	2024	nd	nd	nd	nd	10 [4]	0/16	0/16
鳥類 (pg/g-wet)	2024	nd	---	nd	nd	10 [4]	0/2	0/2

[27] デクロランプラス類

・調査の経緯及び実施状況

デクロランプラスは、電気及び電子製品、樹脂並びにゴム等の難燃剤として主に用いられていた。2023年5月に開催された POPs 条約の第 11 回条約締約国会議（COP11）において条約対象物質とすることが採択され、2024 年 12 月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2023 年度が初めての調査であり、2001 年度までの調査として「化学物質環境調査」^{iv)}では、1976 年度に水質、底質及び生物（魚類）の調査を実施している。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2023 年度に水質及び底質を、2024 年度に水質、底質及び生物の調査を実施している。

・調査結果

<水質>

Anti-デクロランプラス：水質については、47 地点を調査し、検出下限値 0.9 pg/L において 47 地点中 44 地点で検出され、検出濃度は 4,400 pg/L までの範囲であった。

Syn-デクロランプラス：水質については、47 地点を調査し、検出下限値 1.0 pg/L において 47 地点中 31 地点で検出され、検出濃度は 11,000 pg/L までの範囲であった。

○2023 年度及び 2024 年度における水質についての *anti*-デクロランプラス及び *syn*-デクロランプラスの検出状況

<i>anti</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
水質 (pg/L)	2023	6.8	5.0	410	nd	1.7 [0.7]	44/47	44/47
	2024	7.2	5.0	4,400	nd	2.2 [0.9]	44/47	44/47
<i>syn</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
水質 (pg/L)	2023	3.8	2.3	1,100	nd	2.2 [0.9]	36/47	36/47
	2024	3.4	tr(2.5)	11,000	nd	3.0 [1.0]	31/47	31/47

<底質>

Anti-デクロランプラス：底質については、60 地点を調査し、検出下限値 1.8 pg/g-dry において 60 地点中 56 地点で検出され、検出濃度は 5,800 pg/g-dry までの範囲であった。

Syn-デクロランプラス：底質については、60 地点を調査し、検出下限値 0.4 pg/g-dry において 60 地点全てで検出され、検出濃度は tr(0.6)～2,100 pg/g-dry の範囲であった。

○2023 年度及び 2024 年度における底質についての *anti*-デクロランプラス及び *syn*-デクロランプラスの検出状況

<i>anti</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2023	150	190	7,300	nd	16 [6]	53/60	53/60
	2024	170	280	5,800	nd	5.4 [1.8]	56/60	56/60
<i>syn</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2023	59	60	2,000	nd	3 [1]	57/60	57/60
	2024	64	100	2,100	tr(0.6)	1.1 [0.4]	60/60	60/60

<生物>

Anti-デクロランプラス：生物のうち貝類については、3地点を調査し、検出下限値0.8 pg/g-wetにおいて3地点中1地点で検出され、検出濃度は5.4 pg/g-wetであった。魚類については、16地点を調査し、検出下限値0.8 pg/g-wetにおいて16地点中11地点で検出され、検出濃度は51 pg/g-wetまでの範囲であった。鳥類については、2地点を調査し、検出下限値0.8 pg/g-wetにおいて2地点とも検出され、検出濃度は16 pg/g-wet及び160 pg/g-wetであった。

Syn-デクロランプラス：生物のうち貝類については、3地点を調査し、検出下限値0.5 pg/g-wetにおいて3地点中1地点で検出され、検出濃度はtr(1.1) pg/g-wetであった。魚類については、16地点を調査し、検出下限値0.5 pg/g-wetにおいて16地点中11地点で検出され、検出濃度は29 pg/g-wetまでの範囲であった。鳥類については、2地点を調査し、検出下限値0.5 pg/g-wetにおいて2地点とも検出され、検出濃度は7.3 pg/g-wet及び100 pg/g-wetであった。

○2024年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての *anti*-デクロランプラス及び *syn*-デクロランプラスの検出状況

<i>anti</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
貝類 (pg/g-wet)	2024	tr(1.0)	nd	5.4	nd	2.0 [0.8]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2024	2.2	2.4	51	nd	2.0 [0.8]	11/16	11/16
鳥類 (pg/g-wet)	2024	51	---	160	16	2.0 [0.8]	2/2	2/2
<i>syn</i> -デクロランプラス	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
貝類 (pg/g-wet)	2024	nd	nd	tr(1.1)	nd	1.2 [0.5]	1/3	1/3
魚類 (pg/g-wet)	2024	1.5	1.6	29	nd	1.2 [0.5]	11/16	11/16
鳥類 (pg/g-wet)	2024	27	---	100	7.3	1.2 [0.5]	2/2	2/2

[28] UV-328

・調査の経緯及び実施状況

UV-328 は、塗料及びプラスチックの紫外線吸収剤として主に用いられていた。2023 年 5 月に開催された POPs 条約の第 11 回条約締約国会議（COP11）において条約対象物質とすることが採択され、2024 年 12 月には化審法に基づく第一種特定化学物質に指定されている。

継続的調査としては 2023 年度が初めての調査で、2001 年度までの「化学物質環境調査」^{iv)} 並びに 2002 年度以降の化学物質環境実態調査の初期環境調査及び詳細環境調査等では、本物質を調査していない。

2002 年度以降のモニタリング調査では、2023 年度に水質及び底質を、2024 年度に水質、底質及び生物の調査を実施している。

・調査結果

<水質>

水質については、47 地点を調査し、検出下限値 20 pg/L において 47 地点中 28 地点で検出され、検出濃度は 120 pg/L までの範囲であった。

○2023 年度及び 2024 年度における水質についての UV-328 の検出状況

UV-328	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
水質 (pg/L)	2023	tr(50)	tr(40)	540	nd	60 [20]	36/47	36/47
	2024	tr(30)	tr(30)	120	nd	60 [20]	28/47	28/47

<底質>

底質については、60 地点を調査し、検出下限値 8 pg/g-dry において 60 地点全てで検出され、検出濃度は tr(14)~50,000 pg/g-dry の範囲であった。

○2023 年度及び 2024 年度における底質についての UV-328 の検出状況

UV-328	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
底質 (pg/g-dry)	2023	1,400	1,500	71,000	tr(12)	21 [8]	60/60	60/60
	2024	1,200	1,600	50,000	tr(14)	20 [8]	60/60	60/60

<生物>

生物のうち貝類については、3 地点を調査し、検出下限値 6 pg/g-wet において 3 地点全てで検出され、検出濃度は 31~240 pg/g-wet の範囲であった。魚類については、16 地点を調査し、検出下限値 6 pg/g-wet において 16 地点全てで検出され、検出濃度は tr(17)~900 pg/g-wet の範囲であった。鳥類については、2 地点を調査し、検出下限値 6 pg/g-wet において 2 地点とも検出され、検出濃度は 36 pg/g-wet 及び 230 pg/g-wet であった。

○2024 年度における生物（貝類、魚類及び鳥類）についての UV-328 の検出状況

UV-328	実施年度	幾何 平均値	中央値	最大値	最小値	定量[検出] 下限値	検出頻度 検体 地点	
貝類 (pg/g-wet)	2024	79	66	240	31	20 [6]	3/3	3/3
魚類 (pg/g-wet)	2024	100	66	900	tr(17)	20 [6]	16/16	16/16
鳥類 (pg/g-wet)	2024	91	---	230	36	20 [6]	2/2	2/2

●参考文献（全物質共通）

- i) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」水質・底質モニタリング調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- ii) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」生物モニタリング調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- iii) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)
- iv) 環境省環境保健部環境安全課、「化学物質と環境」化学物質環境調査
(<http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/>)

●参考資料 1 継続的調査としての継続性に関する考察

1974年度に「化学物質環境実態調査」が実施されて以降、一般環境中に残留する化学物質の早期発見及びその濃度レベルの把握を目的として、種々の対象物質が選定され、調査が実施されてきており、2011年度においては「初期環境調査」及び「詳細環境調査」として実施されている。こうした年度別の調査とは別に、一定の調査対象物質を経年的に追う継続的調査として、1978年度に開始した「生物モニタリング」をはじめ、「水質・底質モニタリング」、「指定化学物質等検討調査」、「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」及び「指定化学物質等検討調査」等が実施され、2002年度より「モニタリング調査」として実施されるに至った。こうした継続的調査の実施経過の概要は次のとおりである。

調査名称 ^(注)	実施期間	媒体	調査対象物質
生物モニタリング	1978年度～ 2001年度	生物（貝類、魚類、鳥類）	PCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、HCH類等
水質・底質モニタリング	1986年度～ 2001年度	水質、底質	HCB、ディルドリン、DDT類、クロルデン類、HCH類等
非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査	1985年度～ 2001年度	水質、底質、生物（魚類、貝類）、大気	PCB類等
指定化学物質等検討調査	1988年度～ 2001年度	水質、底質等	トリブチルスズ化合物、トリフェニルスズ化合物等
モニタリング調査	2002年度～	水質、底質、生物（貝類、魚類、鳥類）、大気	PCB類、HCB、アルドリン、ディルドリン、エンドリン、DDT類、クロルデン類、ヘプタクロル類、トキサフェン類、マイレックス、HCH類等

（注）調査名称は実施期間中の代表的なものであり、年度によって異なる場合がある。

1974年度から2022年度までのモニタリング調査対象物質の継続的調査における年度別実施状況は表1、継続的調査の年度別調査地点の状況は表2-1から表2-4のとおりである。

また、定量下限値および定量下限値については、2001年度の検出下限値は後述する「統一検出限界値」であり、2002年度以降の検出下限値は、分析を担当した民間分析機関における検出下限値である。なお、2002年度の水質及び底質は装置検出下限値（IDL）を、2003年度以降の水質及び底質並びに2002年度以降の生物及び大気は分析方法の検出下限値（MDL）をそれぞれ検出下限値として扱っている。

また、検出下限値の変化に対応した検出状況の変動については表3にまとめた。その際、地点の相違の影響を除外するため、継続して調査されている地点のみをみることにした。

検出下限値については、2001年度までの値と比べ2002年度以降の値が大きく改善している。

2001年度まで実施されていた「生物モニタリング」においては、主として地方公共団体による分析によっていたため、分析機関間の装置の違い等を考慮してデータ処理を行う必要があり、調査に当たりあらかじめ同一の検出下限値（「統一検出限界値」と称していた。）を設定し、データ処理をしてきた。用いていた「統一検出限界値」は、開始当初のGC-ECDによる分析を勘案して設定されたものであり、GC/MSが主流となっている現在の分析法では十分に定量可能な値であり、より高感度の分析を行った地方公共団体からは「トレース値」として別報告を受ける状況が続いていた。2002年度以降は分析機関が媒体ごとに一機関になったことに加え、高感度のGC/HRMSを用いた分析に移行しており、検出下限値は「統一検出限界値」に比べて一千分の一程度又はそれ以下となっている。

同じく2001年度まで実施されていた「水質・底質モニタリング」においては、開始当初からGC/MSによる

分析であり、水質は0.01µg/L (= 10,000pg/L)、底質は1ng/g-dry (=1,000pg/g-dry)を「統一検出下限値」として実施してきた。2002年度以降は高感度のGC/HRMSを用いた分析に移行し、2001年度に比べて、検出下限値は水質で一万分の一、底質で一千分の一程度に下がっている。

「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」におけるPCB類は、1996年度及び1997年度はGC/MSで測定されたが、2000年度及び2001年度は高感度のHRGC/HRMSにより測定された。このため、2000年度及び2001年度は1996年度及び1997年度の一万分の一程度の検出下限値となっている。2002年度以降は2000年度及び2001年度と同等の検出下限値であった。なお、コプラナーPCBについては1996年度よりHRGC/HRMS分析が行われていたため、2002年度以降とほぼ同等の検出下限値であった。

表1 継続的調査の年度別調査物質・媒体一覧

(注) PCB類の水質は1975年2月に環境基準が設定され、地方公共団体が常時監視を行っている。また底質については1975年2月に暫定除去基準が定められており、地方公共団体において測定されているが、ここでは触れない。なお、1974年の化審法施行以前の調査として、1972年度に水質、底質及び生物についての一斉調査を行っている。

[illegible]

(注1) ◎：非意図の生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。
(注2) ●：水質・底質モニタリング又は生物モニタリングにおいて実施したことを意味する。
(注3) ○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。
(注4) △：継続的調査以外の調査において実施したことを意味する。
(注5) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

[illegible][illegible][illegible][illegible]

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																	
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
[7-3]	オキシクロルデン	水質									△				●	●															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■						
		底質									△				●	●															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■				
		貝類											●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■			■			
		魚類									△	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		鳥類										●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
	大気												△																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■					

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																		
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[8-1]	ヘブタクロル	水質								△																						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■								
		底質								△																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■							
		貝類																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■				
		魚類								△																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		鳥類																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■				
		大気														△																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		
[8-2]	cis-ヘブタクロルエ ポキシド	水質																															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■							
		底質																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■						
		貝類																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		魚類																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		鳥類																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		大気																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■		
[8-3]	trans-ヘブタクロル エポキシド	水質								△																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■							
		底質									△																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■						
		貝類																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		魚類									△																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		鳥類																																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			
		大気														△																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				■			

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																			
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	
[9-1]	Parlar-26	水質									△																					■	■	■	■	■	■	■								■								
[9-2]	Parlar-50	底質									△																						■	■	■	■	■	■	■								■							
[9-3]	Parlar-62	貝類																															■	■	■	■	■	■	■								■							
		魚類																																■	■	■	■	■	■	■								■						
		鳥類																																	■	■	■	■	■	■	■								■					
		大気																															■	■	■	■	■	■	■	■									■					

(注) 1983年度はトキサフェン類の総量を対象としている。

[illegible][illegible]

(注) ▲：γ-体についてのみ調査を実施した。

□：HCH類の大気については、2003年度から2008年度に用いた大気試料採取装置の一部からHCH類が検出され、HCH類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

[illegible]

[illegible]

(注) 1982年度は総エンドスルファン類

[illegible]

(注) 1987年度は総ヘキサブROMシクロドデカン類、2003年度及び2004年度は総1,2,5,6,9,10-ヘキサブROMシクロドデカン類

[illegible]

[illegible][illegible][illegible]

(注) 2005年度の水質及び底質では[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が5のもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-1] 塩素化トリデカン類は塩素数が6のものを、貝類及び魚類では[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が4から6までのもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-4] 塩素化トリデカン類は塩素数が5から7までのものをそれぞれ対象とした。

2016年度以降の水質、底質並びに貝類、魚類及び鳥類では、塩素数が5から9までのものを対象とした

大気では、2016年度の[23-1] 塩素化デカン類は塩素数が4から6までのもの、[23-2] 塩素化ウンデカン類、[23-3] 塩素化ドデカン類及び[23-4] 塩素化トリデカン類は塩素数が4から7までのものを対象とし、2017年度以降はいずれの物質についても塩素数が4から7までのものを対象とした。

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
[24]	ジコホル	水質					△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
[25]	ペルフルオロヘキサ ンスルホン酸 (PFHxS)	水質																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
[26]	メトキシクロル	水質											△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

物質 調査 番号	調査対象物質	調査 媒体	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
[27-1]	Anti-デクロランプラス	水質			△																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

(注) 1976年度は総デクロランプラス類

・1974年度から2023年度までの調査地点の推移

表2-1 継続的調査の年度別調査地点の一覧（水質）

地方 公共団体	調査地点	年度																																								
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24		
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）															◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	苫小牧港	●	●	●												◎	◎																									
青森県	埴川河口（青森市）												○	○	○	○																										
	十三湖						●	●	●	●	●	●	●	●	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
岩手県	雫石川															◎	◎																									
	豊沢川豊沢橋（花巻市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
宮城県	仙台湾（松島湾）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
秋田県	八郎湖				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山形県	最上川黒滝橋															◎	◎																									
	最上川須川合流点															◎	◎																									
	最上川河口（酒田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福島県	阿武隈川															◎	◎																									
	小名浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	利根川河口利根川大橋（波崎町）																	■																								
栃木県	霞ヶ浦			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									
	田川給分地区頭首工（宇都宮市）																			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	田川谷地賀橋（下野市）																																						■			
群馬県	利根川利根大堰上流（千代田町）																																				■	■	■	■		
埼玉県	新河岸川															◎	◎																									
	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）																									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
千葉県	市原・姉崎海岸				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									
千葉市	花見川河口（千葉市）											○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
東京都	荒川河口（江東区）															◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	隅田川河口（港区）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	東京湾中瀬			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									
横浜市	鶴見川河口																◎	◎																								
	横浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
川崎市	多摩川河口															◎	◎																									
	川崎港京浜運河扇町地先															◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
新潟県	新潟東港			●																																						
	信濃川河口（新潟市）			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																												
	信濃川下流（新潟市）															○	◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
富山県	神通川河口荻浦橋（富山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

地方 公共団体	調査地点	年度																																							
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	
石川県	珠洲市沖	●	●	●																																					
	犀川河口（金沢市）	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）															◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
山梨県	荒川（甲府市）					●	●	●	●	●	●	●	●																												
長野県	千曲川屋島橋（須坂市）	●	●	●																																					
	諏訪湖湖心	●	●	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
静岡県	清水港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								
	天竜川掛塚橋（磐田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
愛知県	名古屋港			○	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三重県	長良川河口（桑名市）			○																																					
	四日市港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
滋賀県	琵琶湖早崎港沖															◎	◎																								
	琵琶湖唐崎沖中央			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	琵琶湖浜大津沖				●	●		●	●	●	●	●	●	●																											
京都府	宮津港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	桂川渡月橋（京都市）	●	●	●																																					
京都市	桂川宮前橋（京都市）	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪府	大和川河口（堺市）	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	泉大津沖	●	●	●																																					
大阪市	大阪港	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○		◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	大阪港外															◎	◎																								
	淀川河口	●	●	●												◎	◎																								
兵庫県	香住三田浜	●	●	●																																					
	姫路沖	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
神戸市	神戸港中央								●		●	●	●	●		◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）															◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
岡山県	水島沖	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○		◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	太濃地島西沖	●	●	●																																					
広島県	呉港				●	○	○											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	広島湾			○				○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

地方 公共団体	調査地点	年度																																							
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’23	
山口県	徳山湾			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	宇部沖																																								
	萩沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
徳島県	紀伊水道															◎	◎																								
	吉野川河口（徳島市）					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
香川県	高松港			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
高知県	四万十川河口（四万十市）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福岡県	大牟田沖			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								
北九州市	関門海峡		●	●																																					
	洞海湾		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福岡市	博多湾				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								
佐賀県	伊万里湾					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長崎県	太村湾																																								
	長崎港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎																							
熊本県	緑川平木橋（宇土市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
鹿児島県	天降川新川橋（霧島市）																				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	甲突川松方橋（鹿児島市）	●	●	●																																					
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
沖縄県	中城湾															◎	◎																								
	那覇港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

- (注1) ◎：非意図の生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。
(注2) ●：水質・底質モニタリングにおいて実施したことを意味する。
(注3) ○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。
(注4) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。
(注5) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。
(注6) ■は水質・底質モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表2-2 継続的調査の年度別調査地点の一覧（底質）

地方 公共団体	調査地点	年度																																						
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24
北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
	十勝川すずらん大橋（帯広市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	●	●	●	●	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	苫小牧港	●	●	●								○	○					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
青森県	堤川河口（青森市）											○	○	○	○	○																								
	十三湖						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
岩手県	雫石川											○			○	○																								
	豊沢川豊沢橋（花巻市）																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮城県	北上川											○	○			○	○																							
	仙台湾（松島湾）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
秋田県	八郎湖				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山形県	最上川黒滝橋											○	○			○	○																							
	最上川須川合流点											○	○			○	○																							
	最上川河口（酒田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福島県	阿武隈川											○	○			○	○																							
	小名浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）																		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	利根川河口利根川大橋（波崎町）																	■																						
	利根川布川栄橋（利根町）											○																												
	霞ヶ浦			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																								
	霞ヶ浦北浦											○	○			○	○																							
栃木県	霞ヶ浦西浦											○	○			○	○																							
	田川給分地区頭首工（宇都宮市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
埼玉県	田川谷地賀橋（下野市）																																							
	新河岸川											○	○			○	○																							
千葉県	市原・姉崎海岸				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
千葉市	花見川河口（千葉市）											○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
東京都	荒川河口（江東区）												○			○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	隅田川河口（港区）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	東京湾中瀬				○	○	○	○	○	○	○																													
横浜市	東京港外											○																												
	鶴見川河口																○																							
川崎市	横浜港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	多摩川河口（川崎市）											○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
川崎市	川崎港京浜運河扇町地先											○	○			○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

地方 公共団体	調査地点	年度																																						
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24
新潟県	新潟東港			●								◎	◎																											
	信濃川河口（新潟市）			● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	●		●																								
	信濃川下流（新潟市）															● ○	◎ ○	◎ ○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
石川県	珠洲市沖	●	●	●																																				
	犀川河口（金沢市）	●	●	● ○	○	○	● ○	● ○	● ○	○	○	○	○	○	○	○	○	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）											◎	◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長野県	千曲川屋敷橋（須坂市）	●	●	●																																				
	諏訪湖湖心	●	●	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	● ○	◎	◎	●	●	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
静岡県	木曽川三根橋（南木曽町）											◎	◎			◎	◎																							
	清水港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	天竜川掛塚橋（磐田市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
愛知県	衣浦港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	名古屋港			○	●	○	●	●	○	●	○	●	◎	◎	●	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
三重県	長良川河口（桑名市）			○																																				
	四日市港				○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	鳥羽港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
滋賀県	琵琶湖早崎港沖															◎	◎	■																						
	琵琶湖南比良沖中央											◎	◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	琵琶湖唐崎沖中央			○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	琵琶湖浜大津沖				●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																							
京都府	宮津港				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	桂川渡月橋（京都市）	●	●	●																																				
京都市	桂川宮前橋（京都市）	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
大阪府	淀川枚方大橋（高槻市）											◎	◎			◎	◎																							
	大和川河口（堺市）	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	泉大津沖	●	●	●																																				
大阪市	大阪港	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	●	●	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	大阪港外			○	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	淀川河口（大阪市）	●	●	●								◎	◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	大川毛馬橋（大阪市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

地方 公共団体	調査地点	年度																																							
		’86	’87	’88	’89	’90	’91	’92	’93	’94	’95	’96	’97	’98	’99	’00	’01	’02	’03	’04	’05	’06	’07	’08	’09	’10	’11	’12	’13	’14	’15	’16	’17	’18	’19	’20	’21	’22	’23	’24	
兵庫県	香住三田浜	●	●	●																																					
	西宮沖											◎																													
	姫路沖	●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
神戸市	神戸港中央										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
奈良県	大和川大正橋（王寺町）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）										◎	◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
鳥取県	中海											◎			◎	◎																									
岡山県	水島沖	●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	太濃地島西沖	●	●	●							◎	◎	◎	◎	◎	◎																									
広島県	呉港				●	●	●											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	広島湾										◎	◎			◎	◎	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
山口県	徳山湾			○							○	○	○	○	○	○		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	宇部沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	萩沖																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
徳島県	紀伊水道											◎			◎	◎																									
	吉野川河口（徳島市）						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
香川県	高松港			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
愛媛県	新居浜港																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
高知県	四万十川河口（四万十市）				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
福岡県	大牟田沖			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○																									
	関門海峡		●	●																																					
北九州市	洞海湾		●	●	●	●	●	●	●	●	●	◎	◎	●	●	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	博多湾					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
福岡市	博多湾					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
佐賀県	伊万里湾						○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
長崎県	大村湾											◎	◎			◎	◎																								
	長崎港					○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎																								
大分県	大分川河口（大分市）											◎			◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）				○	○	○	○	○	○	◎	◎	○	○	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
鹿児島県	天降川（霧島市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	甲突川松方橋（鹿児島市）	●	●	●																																					
	五反田川（いちき串木野市）	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
沖縄県	中城湾										◎	◎			◎	◎																									
	那覇港																●	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		

(注1) ◎：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

(注2) ●：水質・底質モニタリングにおいて実施したことを意味する。

(注3) ○：指定化学物質等検討調査において実施したことを意味する。

(注4) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

(注5) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあつては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

(注6) ■は水質・底質モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表2-3 継続的調査の年度別調査地点の一覧（生物）

[illegible]

[illegible]

地方 公共団体	調査地点	生物種	年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			'78	'79	'80	'81	'82	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04	'05	'06	'07	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
香川県	高松港	ボラ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

(注1) ◎：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

(注2) ●：生物モニタリングにおいて実施したことを意味する。

(注3) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

(注4) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあつては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

(注5) ■は生物モニタリング及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表2-4 継続的調査の年度別調査地点の一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	年度																								
		‘00	‘01	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
北海道	上川保健福祉事務所（名寄市）					■			■																	
	釧路市立春採中学校（釧路市）			■			■																			
	北海道釧路総合振興局（釧路市）									■			■			■			■			■			■	
	北海道立総合研究機構環境科学研究センター（札幌市）	◎	◎																						■	
	北海道渡島総合振興局（函館市）				■			■			■			■			■			■			■			
	北海道上川総合振興局（旭川市）										■			■				■			■			■		
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
岩手県	網張スキー場（雫石市）			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■									
	巢子一般環境大気測定局（滝沢市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮城県	宮城県保健環境センター（仙台市）				■	■	■	■	■	■	■	■						■	■	■	■	■	■	■	■	■
	国設仙台測定局（仙台市）	◎		■																						
	宮城県消防学校（仙台市）													■	■	■	■									
山形県	山形県環境科学研究所センター（村山市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
茨城県	茨城県環境監視センター（水戸市）			■	■	■	■	■																		
	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
群馬県	群馬県衛生環境研究所（前橋市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■									
千葉県	市原松崎一般環境大気測定局（市原市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	東京都立衛生研究所（調査当時）（新宿区）			■																						
	小笠原父島				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
神奈川県	神奈川環境科学センター（平塚市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
横浜市	旧横浜市環境科学研究所（横浜市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	横浜市環境科学研究所（横浜市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	◎		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
山梨県	富士吉田合同庁舎（富士吉田市）			■	■	■	■	■	■	■																
	山梨県衛生環境研究所（甲府市）											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
京都府	京都府立城陽高校（城陽市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					■	■	■				■	■	■
大阪府	地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所（大阪市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	大阪合同庁舎2号館別館（大阪市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
兵庫県	兵庫県環境研究センター（神戸市）	◎	◎			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
神戸市	葺合一般環境大気測定局（神戸市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■													
	神戸市役所（神戸市）													■	■		■	■	■	■	■					
	神戸市健康科学研究所（神戸市）																				■	■	■	■	■	■
奈良県	天理一般環境大気測定局（天理市）			■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

地方 公共団体	調査地点	年度																								
		‘00	‘01	‘02	‘03	‘04	‘05	‘06	‘07	‘08	‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	萩市役所見島支所（萩市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■														
	萩市見島ふれあい交流センター（萩市）												■	■	■	■	■									
	萩健康福祉センター（萩市）																	■	■	■	■	■	■	■	■	■
徳島県	徳島県保健環境センター（徳島市）			■	■	■	■	■	■	■	■															
	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市）	◎		■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■										
	香川県立総合水泳プール（高松市）						■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■					
	香川県環境保健研究センター（高松市）																					■	■	■	■	■
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
福岡県	大牟田市役所（大牟田市）	◎	◎	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
北九州市	北九州観測所（北九州市）	◎																								
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	◎		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
長崎県	長崎県庁（長崎市）	◎	◎																							
	小ヶ倉支所測定局（長崎市）		◎																							
	北消防署測定局（長崎市）		◎																							
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎県）				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
沖縄県	辺野古岬（国頭村）			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

(注1) ◎：非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査において実施したことを意味する。

(注2) ■：モニタリング調査において実施したことを意味する。

(注3) 「地方公共団体」は、試料採取を実施した地方公共団体の名称であり、複数年度実施している地点にあっては直近の年度に試料採取を実施した地方公共団体の名称を示した。

(注4) ■は非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査及びモニタリング調査を継続して実施している地点を意味する。

表3 2001年度以前の継続的調査と2002年度以降のモニタリング調査の継続調査地点における検出頻度の比較

物質 調査 番号	調査対象物質	水質																							
		1998	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	総 PCB	10/10	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15	15/15	14/14	13/13	13/13	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14	13/14	13/14	14/14	14/14	14/14
[2]	HCB	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	12/15	15/15	14/14	13/13	13/13	14/14	14/14	14/14	14/14	13/14	14/14	14/14	14/14	14/14	14/14
[4]	ディルドリン	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	---	15/15	---	---	13/13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	---	---	---	13/13	---	---	---	---	---	---	13/14	---	---	---
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	---	---	---	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	---	---	---	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	14/15	15/15	14/14	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---	---
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15	15/15	14/14	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---	---
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	14/14	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---	---
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	13/15	15/15	14/14	13/13	---	---	---	---	---	---	14/14	---	---	---	---
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	14/14	13/13	13/13	14/14	14/14	14/14	---	14/14	---	---	14/14	---	---
	[11-2] β -HCH	0/15	14/14	14/14	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	15/15	14/14	13/13	13/13	14/14	14/14	14/14	---	14/14	---	---	14/14	---	---

物質 調査 番号	調査対象物質	底質																							
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	総 PCB	24/24	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	15/17	17/17	16/16	15/15	15/15	16/16	16/16	16/16	15/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
[2]	HCB	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	14/15	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16	16/16
[4]	ディルドリン	1/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	17/17	---	17/17	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---	---	---	---
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	2/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	---	---	---	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	7/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	---	---	---	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	5/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	---	---	---	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---	---
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	5/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---	---
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---	---
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	4/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	---	---	---	---	---	---	16/16	---	---	---	---
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	1/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	15/15	16/16	16/16	16/16	---	16/16	---	---	16/16	---	---
	[11-2] β -HCH	3/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	15/15	15/15	16/16	16/16	16/16	---	16/16	---	---	16/16	---	---

物質 調査 番号	調査対象物質	生物																							
		2000	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	総 PCB	3/3	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	13/13	12/12	13/13	13/13	13/13	11/11	12/12	12/12	12/12	12/12	11/11
[2]	HCB	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	13/14	13/13	12/12	13/13	13/13	13/13	11/11	12/12	12/12	12/12	12/12	11/11
[4]	ディルドリン	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	---	12/12	---	---	13/13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
[6]	DDT 類																								
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	15/16	---	---	14/14	---	---	---	---	13/13	---	---	11/12	---	---	---
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	12/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	---	---	14/14	---	---	---	---	13/13	---	---	12/12	---	---	---
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	6/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	---	---	13/14	---	---	---	---	13/13	---	---	12/12	---	---	---
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	1/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	14/16	---	---	14/14	---	---	---	---	13/13	---	---	12/12	---	---	---
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	1/17	16/16	16/16	15/16	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	15/16	---	---	14/14	---	---	---	---	12/13	---	---	11/12	---	---	---
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	2/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	16/17	17/17	16/16	---	---	14/14	---	---	---	---	12/13	---	---	11/12	---	---	---
[7]	クロルデン類																								
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	7/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	---	---	13/13	13/13	---	---	12/12	---	---	---	---
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	5/17	16/16	16/16	15/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	---	---	13/13	13/13	---	---	12/12	---	---	---	---
	[7-3] オキシクロルデン	3/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	---	---	13/13	13/13	---	---	12/12	---	---	---	---
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	---	---	13/13	13/13	---	---	12/12	---	---	---	---
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	9/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	---	---	13/13	13/13	---	---	12/12	---	---	---	---
[11]	HCH 類																								
	[11-1] α -HCH	1/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	15/16	14/14	14/14	9/12	12/13	12/13	---	8/11	---	---	12/12	---	---
	[11-2] β -HCH	4/17	16/16	16/16	16/16	17/17	17/17	17/17	17/17	17/17	16/16	12/12	16/16	14/14	14/14	12/12	13/13	13/13	---	11/11	---	---	12/12	---	---

物質 調査 番号	調査対象物質	大気																							
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
[1]	総 PCB	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	10/10	8/8	9/9	10/10	10/10	10/10	10/10	9/9	9/9	9/9	8/8	8/8	8/8	8/8	8/8	7/7	7/7	6/6	6/6

(注 1) 「---」は 2001 年度以前からの継続調査地点なし又は調査対象外であることを意味する。
(注 2) 水質については、1999 年度から 2001 年度に継続的調査が行われなかったため、1998 年度の値と比較することとした。
(注 3) 生物については、2001 年度に継続調査地点の一つが調査されていないため、2000 年度調査の値と比較することとした。
(注 4) 2001 年度以前から調査が実施されており、比較可能な調査対象物質についてのみ記載した。
(注 5) 継続調査地点における検出頻度の比較ができない調査対象物質については記載しなかった。
(注 6) 継続地点とは、表 2-1 から表 2-4 に示した地点のうち調査実施状況の欄を■で強調した地点を意味する。

2001年度以前の調査結果を含めた評価を行うに当たっては以下の点を考慮する必要がある。

- ・PCB類

2001年度以前に実施してきたPCB類の継続的調査としては、水質、底質及び大気については「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」、生物（貝類、魚類及び鳥類）については「生物モニタリング」が該当する。これらの調査におけるPCB類の調査実績は、水質及び大気は2000年度及び2001年度の2年間、底質は1996年度、1997年度、2000年度及び2001年度の4年間、生物は1978年度から2001年度までの24年間である。したがって、生物については経年推移を評価するのに十分な期間にわたっての調査が実施されているといえる。

PCB類の調査地点については、水質及び底質の2002年度以降の調査地点は2001年度以前の調査地点を一部引き継いでいるものの、少なくない地点が入れ替わっている。このため、これらの媒体では2002年度以降と2001年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。生物では2001年度以前の調査地点・生物種の多くが2002年度以降にも引き継がれたが、2002年度に2地点・生物種（釧路沖のオオサガ及び祝言島地先のスズキ）が減り、2003年度に1地点・生物種（三浦半島のムラサキイガイ）が減ったものの、2005年度に1地点・生物種（釧路沖のシロサケ）の調査が、2008年度にも1地点・生物種（大分川のスズキ）の調査がそれぞれ再開された。経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。大気の2002年度以降の調査地点は、水質及び底質と同様、2001年度以前の調査地点を一部引き継いでいるものの、少なくない地点が入れ替わっている。このため、これらの媒体では2002年度以降と2001年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。また、大気では2007年度の温暖期及び寒冷期並びに2008年度の温暖期にそれぞれ3分の1程度の地点で欠測となっており、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。

総PCBの検出下限値については、水質、底質、生物（「生物モニタリング」に係るものを除く。）及び大気ともに2001年度以前の値は、2002年度以降の値とほぼ同等であるため経年的な評価に当たり支障はない。一方、「生物モニタリング」に係る検出下限値は、2002年度以降の検出下限値に比べて到底及びぶレベルではなく、検出頻度や幾何平均値（検出下限値未満の値は検出下限値の1/2として計算）により残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。また、検出下限値未満の検体が多いことから、中央値、70%値、80%値等で推移を見ることも困難である。

- ・PCB類以外のPOPs条約の発効当初から条約対象物質に指定されている物質及びHCH類

2001年度以前に実施してきた継続的調査としては、水質及び底質については、「水質・底質モニタリング」（1999年度～2001年度は「底質モニタリング」）、生物（貝類、魚類及び鳥類）については「生物モニタリング」が該当する。大気について継続的調査は実施していなかった。また、ヘプタクロル類については、全媒体において2001年度以前に継続的調査を実施していない。なお、2002年度以降においても、大気のHCH類は2002年度の調査では対象外であった。

PCB類以外のPOPs条約の発効当初から条約対象物質に指定されている物質及びHCH類における2001年度以前の調査実績として、水質及び底質ではHCB、ディルドリン、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*cis*-クロロデン、*trans*-クロロデン、*cis*-ノナクロル、*trans*-ノナクロル、 α -HCH及び β -HCHについて1986年度から1998年度までの13年間（底質は1986年度から2001年度までの16年間）モニタリングを実施した。オキシクロロデンについては1986年度及び1987年度の2年間のみ実施し、その他の物質（アルドリン、エンドリン、*o,p'*-

DDT、*o,p'*-DDE、*o,p'*-DDD、ヘプタクロル類、トキサフェン類、マイレックス、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCH）については水質及び底質の継続的調査は実施していなかった。生物は、アルドリン、エンドリン、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHについては1978年度から開始されたものの2001年度よりも前に中断され、その他の物質（ヘプタクロル類、トキサフェン類及びマイレックスを除く。）については1978年度又は1983年度から2001年度まで継続的調査を実施した（調査開始年度は物質により異なる。また1997度及び1999年度には調査を実施していない物質がある。詳細は表4を参照のこと。）。

以上より、継続的調査を実施していない物質（ヘプタクロル等）及び媒体（大気等）については2001年度以前からの経年的な残留状況の傾向を判断できないほか、オキシクロルデンの水質及び底質、アルドリン、エンドリン、 γ -HCH（別名：リンデン）及び δ -HCHの生物については、過去の調査実施から間隔が開いたため2001年度以前からの経年的な残留状況の傾向を評価する場合には考慮を要する。

PCB類以外のPOPs及びHCH類の調査地点については、水質及び底質の2002年度以降の調査地点は2001年度以前にはなかったものが大幅に追加されている。このため、これらの媒体では2002年度以降と2001年度以前の残留状況の傾向を経年的に評価する場合には考慮を要する。生物ではPCB類と同様、2001年度以前の調査地点・生物種の多くが2002年度以降に引き継がれたが2002年度以降、いくつかの調査地点・生物種に変更があり、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。大気ではPCB類と同様、HCBが2007年度の温暖期及び寒冷期並びに2008年度の温暖期にそれぞれ3分の1程度の地点で欠測となっており、経年的に評価する場合には、この点に留意する必要がある。


総PCB以外のPOPs及びHCH類の検出下限値については、2002年度以降の値は2001年度以前の値と比較して、水質では一万分の一程度に、底質及び生物では一千分の一程度に下がっている。これに伴い検出数が増え、検出頻度や幾何平均値（検出下限値未満の値は検出下限値の1/2として計算）により残留状況の傾向を評価する場合には考慮を要する。生物についても、2001年度以前は検出下限値未満の検体が多く、中央値、70%値、80%値等での推移を見ることも困難である。

モニタリング調査は長期にわたり実施されてきており、その間に調査地点、分析法、生物種等の変更が行われている。そのため、調査開始当初と最近の調査結果をそのまま比較可能な値として扱うことは困難であるが、共通の調査地点及び分析法が同一である期間ごとにみれば継続性をもって評価を行うことができると考えられる。

特に水質のHCB、ディルドリン、*p,p'*-DDT、*p,p'*-DDE、*p,p'*-DDD、*cis*-クロルデン、*trans*-クロルデン、オキシクロルデン、*cis*-ノナクロル、*trans*-ノナクロル、 α -HCH、 β -HCHについては、2001年度以前に調査実績はあるものの、検出下限値が高い（10,000pg/L）ため検出頻度が低いことに留意が必要である。

2001年度以前からの継続的調査実施物質の経年変化は、図1から図7に示すとおりである。


・2001年度以前からの継続的調査実施物質の経年変化



(注 1) PCB 類の水質については、継続的調査において 1999 年度以前に調査が実施されていない。

(注 2) 2002 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 1-1 総 PCB の水質の経年変化（幾何平均値）




(注 1) PCB 類の底質については、継続的調査において 1995 年度以前に調査が実施されていない。

(注 2) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。


(注 3) 1998 年度及び 1999 年度は調査を実施していない。

図 1-2 総 PCB の底質の経年変化（幾何平均値）




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。

図 1-3 総 PCB の生物の経年変化 (幾何平均値)




(注) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

図 2-1 HCB の底質の経年変化 (幾何平均値)



- （注 1）2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- （注 2）鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- （注 3）1997 年度及び 1999 年度は調査を実施していない。


図 2-2 HCB の生物の経年変化（幾何平均値）



- （注 1）2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- （注 2）2010 年度、2012 年度から 2017 年度及び 2019 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-1 デイルドリンの底質の経年変化（幾何平均値）


[4] デルドリン



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011 年度までの結果と 2014 年度の結果に継続性がないため、2014 年度の結果を示していない。
 (注 3) 1997 年度、1999 年度、2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 3-2 デルドリンの生物の経年変化（幾何平均値）


[5] エンドリン



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2014 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2011 年度までの結果と 2014 年度の結果に継続性がないため、2014 年度の結果を示していない。
 (注 3) 2010 年度、2012 年度、2013 年度及び 2015 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 4 エンドリンの生物の経年変化（幾何平均値）

[6-1] p,p' -DDT




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図5-1-1 p,p' -DDTの底質の経年変化（幾何平均値）

[6-1] p,p' -DDT



● 貝類 ▲ 魚類 ◆ 鳥類


(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。

(注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-1-2 p,p' -DDT の生物の経年変化（幾何平均値）


[6-2] p,p' -DDE



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-2-1 p,p' -DDE の底質の経年変化 (幾何平均値)


[6-2] p,p' -DDE



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
 (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-2-2 p,p' -DDE の生物の経年変化 (幾何平均値)


[6-3] p,p' -DDD



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2011 年度から 2013 年度、2015 年度から 2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 5-3-1 p,p' -DDD の底質の経年変化（幾何平均値）

[6-3] p,p' -DDD




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
 (注 3) 2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-3-2 p,p' -DDD の生物の経年変化（幾何平均値）




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 1997 年度、1999 年度、2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-4 *o,p'*-DDT の生物の経年変化（幾何平均値）




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 1997 年度、1999 年度、2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-5 *o,p'*-DDE の生物の経年変化（幾何平均値）




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 1997 年度、1999 年度、2011 年度、2012 年度、2014 年度から 2017 年度、2019 年度、2020 年度及び 2022 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 5-6 *o,p'*-DDD の生物の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-1-1 *cis*-クロルデンの底質の経年変化 (幾何平均値)




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-1-2 *cis*-クロルデンの生物の経年変化（幾何平均値）




- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-2-1 *trans*-クロルデンの底質の経年変化（幾何平均値）



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 6-2-2 *trans*-クロルデンの生物の経年変化 (幾何平均値)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-3 オキシクロルデンの生物の経年変化 (幾何平均値)


[7-4] *cis*-ノナクロル



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。


図 6-4-1 *cis*-ノナクロルの底質の経年変化（幾何平均値）

[7-4] *cis*-ノナクロル




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-4-2 *cis*-ノナクロルの生物の経年変化（幾何平均値）




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2014 年度から 2016 年度、2018 年、2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-5-1 *trans*-ノナクロルの底質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2010 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
 (注 3) 2014 年度、2015 年度、2017 年度から 2019 年度及び 2021 年度から 2024 年度は調査を実施していない。

図 6-5-2 *trans*-ノナクロルの生物の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 7-1-1 α -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
 (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
 (注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。


図 7-1-2 α -HCH の生物の経年変化 (幾何平均値)



(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 7-2-1 β -HCH の底質の経年変化 (幾何平均値)




(注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。

(注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。

(注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図 7-2-2 β -HCH の生物の経年変化 (幾何平均値)


[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図7-3 γ -HCH (別名：リンデン) の生物の経年変化（幾何平均値）

[11-4] δ -HCH



- (注 1) 2002 年度から 2009 年度は、各地点における算術平均値を求め、その算術平均値から全地点の幾何平均値を求めた。
- (注 2) 鳥類は 2013 年度に調査地点及び調査対象生物を変更したことから、2012 年度までの結果と 2013 年度以降の結果に継続性がないため、2013 年度以降の結果を示していない。
- (注 3) 2018 年度、2020 年度、2021 年度、2023 年度及び 2024 年度は調査を実施していない。

図7-4 δ -HCH の生物の経年変化（幾何平均値）

●参考資料2 経年分析の方法等に関する補足説明

・対数線形回帰モデル

環境中に残留している化学物質の濃度減少は、1次反応（図1（左）：濃度の高低によらず、ある一定の期間において一定の割合で減少する反応）を仮定するとき、図1（右）に示すように濃度の対数と時間との関係は線形で回帰できるため、対数線形回帰モデルを利用することとした。




図1 対数線形回帰モデルの利点

環境中に残留している化学物質の濃度分布が、図2（左）に示すような傾向であるとき、図2（右）のように対数正規分布で近似することが出来る。




図2 真数及び対数による濃度分布

更に、図3に示すとおり、真数において作成する線形回帰の傾きは時間に対して一定の割合で濃度が減少する場合、低濃度に比べ、より高濃度のデータ変動の影響を受けやすい。しかし、対数濃度では高濃度と低濃度でデータの変動の影響は等価となるため、全体の傾向を一つの傾きで評価できる。





図3 対数線形回帰モデルにおける濃度変動の影響

・実データに基づいた残差分布による最尤推定法^{さいゆうすいていほう}

経年変化解析を行うために直線回帰を行う場合には、最小二乗法による回帰直線がよく利用される手法であるが、前提条件として残差分布が正規分布である必要がある。しかし、本手法では、回帰直線を算出する際にパラメトリックな残差分布を仮定せず、正規分布以外のデータについても直線回帰を行うことができる。

最尤推定法とは「最も尤^{もつと}もらしい」パラメータを探索する方法である。回帰直線を算出する場合には傾き a 及び切片 b の2つのパラメータに対して様々な値を代入し、その結果として算出された回帰直線が「最も尤もらしいとき」のパラメータを最も適した回帰直線とすることとした。


この「最も尤もらしいとき」とは、図4に示すように、回帰直線を算出した際に各データの尤度が最も高くなる事とし、データが複数ある場合には各データの尤度を全て掛け算した値（同時尤度）が最も高くなることとした。また、各データの尤度は、母集団の確率密度分布において、その分布のどの位置にデータが存在するかによって求めることができる。



より同時尤度が高い左図の回帰直線がより適しており、最も尤もらしい回帰直線は、 $a = -0.5$, $b = 5$ であると判断する。

図4 最尤法による最適な回帰直線の決定方法

各解析データはそれぞれで特徴的な分布を持っている場合が多いため、経年変化解析には図5に示すように、回帰直線からの残差で表した各年度の残差分布を作成し、その後足し合わせた各年度共通の残差分布を用いて解析することとした。



例において、適当な回帰直線 $a = -0.4$, $b = 10$ による同時尤度は 5.0×10^{-7} である。同様に様々な回帰直線で同時尤度を算出し、最も平均尤度の大きい回帰直線を最適な回帰直線とした。

図5 最尤法に用いる残差分布の算出と最適な回帰直線の決定方法

・AIC（赤池情報量規準）

AIC（赤池情報量規準）とは、有効なモデルの選択基準の代表的な指標である。

回帰モデルではパラメータを増やすほどデータに対する誤差は小さくなる傾向にあるが、モデルが複雑となるため、必ずしも良いモデルになるとは限らない。AICは、パラメータ数が増えることを不適として評価を修正する性質を持つことから、パラメータ数を考慮してより良いモデルを把握するための指標となる。また、モデルの母集団の分布に制限もない。これらの理由からAICを用いて最適なパラメータ数のモデルを選択することとした。以下にAICの算出式を示す。

$$AIC = -2 \times \text{最大対数尤度} + 2 \times \text{モデルのパラメータ数}$$

最尤法を用いて求めた回帰直線は、図6に示すように年度をパラメータとする1次式である。この対数線形回帰モデルから計算される AIC_1 と、回帰直線の傾きが偶然の変動によるもので全体を代表する一定値から変動しないと考える0次式（傾き0における対数線形回帰直線モデル）から計算される AIC_0 を比較し、どちらがより適切なモデルであるかを判断した。通常、AICの値の小さいモデルが適切と判断する。更に、AICの差が少ない場合にも安全性を見込んで適切に判断できるよう、ベイズの定理を利用して事後確率の考え方を導入した。

$$p_1 = \exp \{ -0.5 AIC_1 \} / (\exp \{ -0.5 AIC_0 \} + \exp \{ -0.5 AIC_1 \})$$

（ p_1 : 1次のモデルの事後確率、 AIC_1 : 1次式におけるAIC、 AIC_0 : 0次式におけるAIC）

1次モデルのAIC事後確率 p_1 は0から1の値をとり、1に近い値ほど1次式に近い事を示す。1次式のAIC事後確率 p_1 が0.950以上の場合には安全性を見込んだ上で、経年変化において傾きを持つことが適切と判断した。また、0.950のしきい値は危険率5%の考え方を参考に設定することとした。




図 6 AIC を利用した傾きの有無の判断方法

・ブートストラップ法による平均値の差の検定

一般的に用いられる t 検定による平均値の差の検定は、前提として正規性が得られている 2 つのデータ群間を比較する場合に用いる手法である。しかし、ブートストラップ法による平均値の差の検定では、ランダムサンプリングによる繰り返し抽出によって正規性のない母集団に漸近正規性を持たせることが可能なため、平均値を比較する 2 群の各データがどのような分布であっても平均値の差の検定を行うことが可能となる。

具体的には図7に示すように、前期6か年（A群）と後期6か年（B群）において有意に濃度差があるか確認するために、平均値の差の検定を実施した。2つの標本に対し、それぞれ無作為に抽出した際の平均値を求め、それを繰り返すことにより得られる平均値の分布は t 分布であるが、自由度が極めて大きいことからそれぞれ正規分布とみなすことが出来ることを利用し、標本間で差があるか検定する方法である。




図 7 ブートストラップ法による平均値の差の検定手法

繰り返し抽出して算出した平均値の差の分布において、95%信頼区間が正（負）の範囲にある場合、前期 6 か年と比較して後期 6 か年は有意に低（高）値であると判断した。

・検出した検体数の割合による経年変化傾向の解析

解析の対象とした期間における最も高い検出下限値に検出した検体数の割合に着目し、その検出下限値を下回る地点を「低濃度地点」と定義し、その低濃度地点数の増加（または減少）傾向を確認することとした。各物質の調査結果は、検出・不検出のデータとして考え、二項分布を想定した最尤法による回帰直線を算出することとし、同時尤度の値が最も高い際のパラメータ a, b を尤もらしい回帰直線とした。なお、安全を見込んだ上で事後確率の考え方を利用し、1 次式の AIC 事後確率 P_1 が 0.950 以上の場合に傾きを持つと判断した。

また、各年度で検出下限値が異なることによる影響を除外するため、調査年度で最も高い検出下限値を統一検出下限値とし、統一した検出下限値における各調査年度の低濃度地点数の割合を算出して解析した。

●参考資料3 カワウの卵の測定結果

2024年度のモニタリング調査においてPCB類、HCB、ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタ酸（PFOA）、ペンタクロロベンゼン、短鎖塩素化パラフィン類、ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）、メトキシクロル、デクロランプラス類及びUV-328の10物質（群）について、カワウの卵を対象に調査を実施した。山梨県水産技術センターにより笛吹川豊積橋上流左岸（中央市）において、兵庫県環境部水大気課及び伊丹市都市交通部みどり自然課により昆陽池においてそれぞれカワウの卵を採取し、卵黄と卵白をそれぞれ検体として対象物質濃度の測定を行った。試料採取地点については図1に、検体の概要については表1に、測定結果については表2に示すとおりである。




図1 カワウの卵採取地点

表1 2024年度モニタリング調査（生物 カワウの卵）検体の概要

調査地点	検体 番号	採取年月	個体数	卵高 (cm) × 卵径 (cm) () 内は算術平均値	重量 (g) () 内は算術平均値
笛吹川豊積橋上流 左岸 (中央市)	1	2024年5月2日	9	5.5 × 3.4 ~ 6.2 × 4.0 (5.8 × 3.7)	35.7 ~ 51.3 (43.7)
昆陽池 (伊丹市)	1	2024年4月16日	17	5.2 × 3.6 ~ 6.5 × 4.1 (5.8 × 3.8)	38.2 ~ 55.5 (45.7)
	2	及び18日	19	5.4 × 3.6 ~ 6.5 × 4.0 (5.7 × 3.8)	37.4 ~ 54.0 (43.7)

表2 カワウの卵の測定結果

単位：pg/g-wet

物質 調査 番号	調査対象物質	定量[検出] 下限値	カワウの卵				カワウの成鳥 ^{注2)}	
			笛吹川豊積橋上流左岸 (中央市)		昆陽池 (伊丹市)		琵琶湖北湖 竹生島	天神川 (倉吉市)
			卵白	卵黄	卵白	卵黄		
[1]	総 PCB ^{注1)}	21 [8]	2,000	3,600,000	10,000	17,000,000	910,000	46,000
[2]	HCB	1.2 [0.4]	53	47,000	57	79,000	4,400	3,000
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	6 [3]	61	59,000	270	130,000	36,000	1,200
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	8 [3]	tr(5)	2,000	15	1,800	930	100
[17]	ペンタクロロベンゼン	1.0 [0.4]	3.6	4,400	24	38,000	520	280
[23]	短鎖塩素化パラフィン類							
	[23-1] 塩素化デカン類	400 [200]	nd	2,000	nd	1,700	tr(200)	nd
	[23-2] 塩素化ウンデカン類	700 [300]	nd	3,700	nd	2,000	tr(320)	tr(590)
	[23-3] 塩素化ドデカン類	800 [300]	nd	3,900	nd	2,900	tr(360)	tr(660)
	[23-4] 塩素化トリデカン類	800 [300]	nd	5,100	nd	4,100	tr(540)	1,100
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	7 [3]	tr(4)	1,900	17	2,700	180	94
[26]	メトキシクロル	10 [4]	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[27]	デクロランプラス類							
	[27-1] <i>Anti</i> -デクロランプラス	2.0 [0.8]	nd	1,600	nd	1,300	160	16
	[27-2] <i>Syn</i> -デクロランプラス	1.2 [0.5]	nd	1,000	nd	1,200	100	7.3
[28]	UV-328	20 [6]	tr(8)	5,100	tr(10)	4,500	230	36

(注1) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。

(注2) 本編において既出であるが、カワウの卵からの成長段階の参考として再掲載した。

●参考資料 4 大気中の POPs 残留状況の高頻度監視結果

POPs 条約では、化学物質の存在並びに当該化学物質の地域的及び世界的規模の自然の作用による移動に関する比較可能な監視に基づいて、その有効性を評価することが定められている。

我が国では、この有効性評価に資することを目的として、東アジア POPs モニタリングネットワークにおける活動のなかで、沖縄県辺戸岬（国頭村）及び長崎県五島福江島（五島市）において大気中の POPs 残留状況を高頻度で監視している。

POPs 残留状況の高頻度監視を実施することで得られた結果の年度別平均値は表 1 に、定量[検出]下限値は表 2 に、2024 年度の経月変化は表 3 に、測定開始からの経月変化は図 1～図 21 にそれぞれ示すとおりである。なお、全検体のうち不検出の割合が 3 割を超過した場合には、図示していない。

辺戸岬においては、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンを除く物質ではハイボリウムエアーサンプラー（HV）で、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンではローボリウムエアーサンプラー（LV）で、年間を通じて月毎に連続した 3 日にそれぞれ 24 時間かけて 3 試料を採取しており、各月の濃度は 3 試料の濃度の算術平均値としている。

五島福江島において、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンを除く物質は、2016 年度までは、ミドルボリウムエアーサンプラー（MV）で、年間を通じて月毎に 7 日間かけて 1 試料を採取し、その測定結果を各月の濃度としている。2017 年度以降は、ハイボリウムエアーサンプラー（HV）で各月（2017 年度から 2020 年度は 10 月から 3 月までの 6 か月間のみ、2021 年度から 2024 年度は 12 か月間）に連続した 3 日それぞれ 24 時間かけて 3 試料を採取しており、各月の濃度は 3 試料の濃度の算術平均値としている。ヘキサクロブタ-1,3-ジエンでは、測定を開始した 2016 年度以降、ローボリウムエアーサンプラー（LV）で、年間を通じた各月（2017 年度及び 2018 年度は 10 月から 3 月までの 6 か月間のみ）に連続した 3 日それぞれ 24 時間かけて 3 試料を採取しており、各月の濃度は 3 試料の濃度の算術平均値としている。

また、五島福江島では、PAH 類の試料採取及び測定も POPs 条約対象物質の資料採取及び測定と合わせて実施しており、それらの結果についても本紙において示している。

個別の測定結果については、環境省ホームページに「令和 7 年度版 化学物質と環境 調査結果報告書詳細版」に添付している。

表 1-1 POPs 残留状況の高頻度監視で得られた年度別平均値（沖縄県辺戸岬）

物質 調査 番号	調査対象物質	沖縄県辺戸岬 大気 (pg/m³)															
		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[1]	総 PCB	---注4)	80	46	49	47	50	38	56	58	54	41	50	49	62	67	81
[2]	HCB	120	110	110	110	110	110	100	110	120	110	86	79	82	91	100	89
[3]	アルドリン	0.08	0.10	0.18	0.11	0.10	0.08	0.15	0.11	0.11	0.17	0.19	0.18	0.13	nd	nd	nd
[4]	ディルドリン	1.6	1.4	1.3	0.98	1.0	1.1	1.2	1.1	1.2	0.99	1.1	0.97	0.98	0.89	0.95	0.74
[5]	エンドリン	tr(0.08)	tr(0.08)	tr(0.08)	tr(0.06)	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.06	tr(0.05)	tr(0.06)	nd	nd	tr(0.09)	tr(0.06)
[6]	DDT 類																
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	1.5	0.82	0.57	0.54	0.43	0.51	0.38	0.34	0.36	0.30	---注5)	0.41	0.24	0.24	0.26	0.21
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	1.4	1.3	0.98	1.3	0.92	0.95	0.88	0.77	0.76	0.49	---注5)	0.54	0.53	0.55	0.62	0.53
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.14	0.098	0.06	0.06	0.058	0.079	0.049	0.037	0.032	0.038	---注5)	0.034	tr(0.020)	0.021	0.025	0.021
	[6-4] <i>o,p</i> -DDT	1.1	0.70	0.54	0.48	0.40	0.40	0.36	0.30	0.34	0.24	---注5)	0.24	0.21	0.19	0.23	0.16
	[6-5] <i>o,p</i> -DDE	0.33	0.28	0.17	0.23	0.18	0.15	0.13	0.13	0.14	0.089	---注5)	0.09	0.09	0.10	0.12	0.09
[7]	[6-6] <i>o,p</i> -DDD	0.14	0.11	0.06	0.08	0.06	0.08	0.06	tr(0.04)	tr(0.04)	tr(0.03)	---注5)	0.04	0.04	tr(0.04)	0.04	nd
	クロルデン類																
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	4.5	3.9	4.2	2.8	3.1	2.9	3.6	3.1	3.7	3.1	3.1	2.6	2.9	3.1	3.7	2.6
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	4.9	4.3	4.7	3.1	3.2	3.2	4.2	3.5	3.6	3.3	3.5	3.1	3.4	3.6	4.4	3.4
	[7-3] オキシクロルデン	0.62	0.49	0.44	0.37	0.38	0.37	0.36	0.41	0.34	0.28	0.31	0.28	0.26	0.24	0.24	0.24
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.56	0.47	0.46	0.31	0.35	0.35	0.39	0.35	0.41	0.36	0.35	0.30	0.28	0.30	0.35	0.24
[8]	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	4.3	3.5	3.7	2.5	2.8	2.7	3.1	2.9	3.1	2.8	2.7	2.4	2.4	2.5	3.0	2.4
	ヘブタクロル類																
	[8-1] ヘブタクロル	0.84	0.82	0.92	0.61	0.65	0.52	0.71	0.66	0.62	0.45	0.48	0.52	0.54	0.70	0.76	0.75
	[8-2] <i>cis</i> -ヘブタクロルエポキシド	0.59	0.54	0.48	0.45	0.42	0.42	0.35	0.37	0.35	0.29	0.30	0.28	0.26	0.26	0.28	0.26
[9]	[8-3] <i>trans</i> -ヘブタクロルエポキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	トキサフェン類																
	[9-1] Parlar-26	tr(0.16)	tr(0.17)	tr(0.13)	nd	tr(0.2)	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	nd	0.09	tr(0.11)	0.09
	[9-2] Parlar-50	nd	tr(0.08)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.04)
[10]	[9-3] Parlar-62	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	マイレックス	0.20	0.17	0.14	0.16	0.18	0.14	0.14	0.13	0.18	0.14	0.18	0.12	0.12	0.09	0.11	0.07
[11]	HCH類																
	[11-1] α -HCH	15	11	15	13	11	7.9	8.1	8.9	6.5	6.8	4.2	4.2	3.6	5.2	6.5	9.6
	[11-2] β -HCH	0.94	0.84	0.80	0.78	0.81	0.70	0.59	0.63	0.54	0.53	0.52	0.44	0.40	0.48	0.58	0.67
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	3.3	2.1	2.8	2.5	2.4	1.8	1.7	2.0	1.5	1.4	0.97	1.0	0.88	1.2	1.4	2.0
	[11-4] δ -HCH	0.10	0.11	0.10	0.09	0.10	0.07	0.06	tr(0.10)	tr(0.07)	tr(0.06)	tr(0.06)	tr(0.05)	tr(0.03)	tr(0.06)	0.08	0.12
[12]	クロルデコン		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[13]	ヘキサブプロモビフェニル類		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[14]	ポリブプロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)																
	[14-1] テトラブプロモジフェニルエーテル類		0.33	0.21	tr(0.2)	0.5	0.7	0.5	0.3	0.38	0.4	tr(0.2)	tr(0.2)	tr(0.1)	nd	nd	tr(0.1)
	[14-2] ペンタブプロモジフェニルエーテル類		tr(0.09)	tr(0.07)	nd	0.23	0.40	tr(0.17)	0.22	0.23	0.19	tr(0.18)	tr(0.12)	nd	nd	nd	nd
	[14-3] ヘキサブプロモジフェニルエーテル類		nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-4] ヘプタブプロモジフェニルエーテル類		nd	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-5] オクタブプロモジフェニルエーテル類		tr(0.12)	tr(0.08)	nd	nd	tr(0.1)	nd	tr(0.1)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-6] ノナブプロモジフェニルエーテル類		tr(0.5)	nd	nd	nd	tr(0.4)	nd	tr(0.5)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-7] デカブプロモジフェニルエーテル		tr(4)	nd	nd	nd	nd	nd	tr(5)	nd	nd	nd	tr(4)	nd	nd	tr(2)	tr(3)

[illegible]

- (注1) 年度平均値は、月毎の平均値を算出し、年度毎にそれぞれの月別平均値から年度平均値を算出することにより求めた。測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載している。
- (注2) PCB類及びポリ塩化ナフタレン類は、総量としての総PCB及び総ポリ塩化ナフタレンの結果のみを示しているが、各同族体およびコプラナーPCBの測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載している。
- (注3) ■は未測定であることを意味する。
- (注4) 2009年度の4月から12月並びに2月及び3月のPCB類の大气については、モノクロロビフェニル及びジクロロビフェニルにおいて大気試料採取装置由来と考えられる汚染により濃度の増加が疑われたことから、総PCBも含めて欠測扱いとすることとし、年平均値としての集計も行わなかった。
- (注5) 2020年度の8月から12月の試料において、DDT類の大气については分析施設由来と考えられる汚染により濃度の増加が疑われたことから、欠測扱いとすることとし、年平均値としての集計も行わなかった。
- (注6) 2020年度のジコホルの大气について一部の検体で欠測となったため、年平均値としての集計も行わなかった。

表 1-2 POPs 残留状況の高頻度監視で得られた年度別平均値（長崎県五島福江島）

物質 調査 番号	調査対象物質	長崎県五島福江島 大気 (pg/m ³)															
		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[1]	総 PCB						37	42	50	37	35	32	---注6)	50	73	62	58
[2]	HCB						140	140	150	96	94	83	---注6)	88	100	95	92
[3]	アルドリン						0.27	0.60	0.15	0.07	0.13	0.13	---注6)	0.10	nd	nd	nd
[4]	ディルドリン						1.3	1.8	1.6	0.71	0.50	0.69	---注6)	1.1	1.2	0.95	1.5
[5]	エンドリン						0.06	0.07	0.06	tr(0.04)	tr(0.04)	nd	---注6)	nd	nd	nd	tr(0.05)
[6]	DDT 類																
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT						0.44	0.44	0.45	0.22	---注4)	0.42注5)	---注6)	0.25	0.25	0.22	0.26
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE						1.0	1.0	1.0	0.66	0.69	0.69注5)	---注6)	0.61	0.58	0.55	0.51
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD						0.085	0.074	0.072	0.035	0.053	0.04注5)	---注6)	0.037	0.039	0.036	0.033
	[6-4] <i>o,p</i> -DDT						0.46	0.48	0.44	0.21	---注4)	0.31注5)	---注6)	0.20	0.21	0.19	0.19
	[6-5] <i>o,p</i> -DDE						0.19	0.18	0.17	0.11	0.12	0.13注5)	---注6)	0.09	0.10	0.08	0.08
	[6-6] <i>o,p</i> -DDD						0.10	0.09	0.09	tr(0.05)	tr(0.05)	tr(0.04)注5)	---注6)	0.05	tr(0.05)	0.05	tr(0.04)
[7]	クロルデン類																
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン						2.9	4.1	4.0	1.6	0.90	1.6	---注6)	3.3	3.8	2.7	4.3
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン						3.0	4.1	3.9	1.8	1.0	1.6	---注6)	3.5	4.0	2.8	4.4
	[7-3] オキシクロルデン						0.29	0.32	0.32	0.18	0.15	0.18	---注6)	0.21	0.21	0.20	0.23
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル						0.35	0.47	0.49	0.17	0.10	0.18	---注6)	0.37	0.46	0.33	0.57
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル						2.4	3.3	3.3	1.4	0.77	1.3	---注6)	2.6	3.2	2.3	3.8
[8]	ヘプタクロル類																
	[8-1] ヘプタクロル						0.40	0.49	0.54	0.32	0.18	0.26	---注6)	0.44	0.62	0.38	0.45
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエボキシド						0.43	0.44	0.41	0.27	0.24	0.28	---注6)	0.27	0.26	0.27	0.29
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエボキシド						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[9]	トキサフェン類																
	[9-1] Parlar-26						nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.2)	---注6)	tr(0.08)	0.08	tr(0.11)	tr(0.08)
	[9-2] Parlar-50						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	tr(0.03)
	[9-3] Parlar-62						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[10]	マイレックス						0.17	0.16	0.16	0.063	0.055	0.15	---注6)	0.08	0.10	0.07	0.07
[11]	HCH類																
	[11-1] α -HCH						13	14	14	3.8	4.1	5.5	---注6)	7.9	7.6	11	14
	[11-2] β -HCH						0.77	0.78	0.81	0.33	0.35	0.48	---注6)	0.49	0.61	0.68	0.87
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)						2.4	2.5	2.5	0.83	0.89	1.1	---注6)	1.4	1.6	2.0	2.4
	[11-4] δ -HCH						0.10	0.11	0.12	tr(0.05)	tr(0.05)	tr(0.07)	---注6)	0.08	tr(0.08)	0.12	0.16
[12]	クロルデコン						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[13]	ヘキサブプロモビフェニル類						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[14]	ポリブプロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)																
	[14-1] テトラブプロモジフェニルエーテル類						0.6	0.6	0.7	0.31	tr(0.2)	tr(0.1)	---注6)	nd	tr(0.1)	nd	nd
	[14-2] ペンタブプロモジフェニルエーテル類						0.26	0.25	0.41	tr(0.13)	tr(0.08)	tr(0.07)	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[14-3] ヘキサブプロモジフェニルエーテル類						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[14-4] ヘプタブプロモジフェニルエーテル類						tr(0.1)	nd	nd	tr(0.1)	tr(0.12)	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[14-5] オクタブプロモジフェニルエーテル類						tr(0.3)	tr(0.1)	tr(0.1)	tr(0.2)	tr(0.22)	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[14-6] ノナブプロモジフェニルエーテル類						tr(0.8)	nd	tr(0.5)	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[14-7] デカブプロモジフェニルエーテル類						tr(4)	nd	tr(5)	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	tr(2)	tr(3)

物質 調査 番号	調査対象物質	長崎県五島福江島 大気 (pg/m ³)															
		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)						8.1	6.0	8.1	3.2	1.6	1.8	---注6)	3.4	1.7	2.8	2.4
[16]	ペルフルオロオクタ酸 (PFOA)						15	15	17	9.2	13	6.9	---注6)	9.7	9.7	7.5	7.0
[17]	ペンタクロロベンゼン						67	73	82	60	55	56	---注6)	55	60	53	50
[18]	エンドスルファン類																
	[18-1] α -エンドスルファン						32	27	20	3.3	3.3	2.1	---注6)	1.9	2.6	1.9	1.1
	[18-2] β -エンドスルファン						2.8	2.1	1.4	0.5	0.5	nd	---注6)	tr(0.2)	tr(0.17)	tr(0.13)	nd
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン						1.0	0.8	0.7	0.7	1.1	0.4	---注6)	0.4	nd	nd	tr(0.1)
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン						0.39	0.3	0.3	0.3	0.5	tr(0.1)	---注6)	tr(0.1)	nd	nd	nd
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン						1.1	1.0	1.3	0.8	1.0	0.3	---注6)	nd	nd	tr(0.2)	nd
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン						tr(0.11)	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン						nd	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[20]	総ポリ塩化ナフタレン								21	26	24	19	---注6)	13	15	13	13
[21]	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン								1,000	5,100	5,200	5,000	3,000	3,000	3,000	3,400	2,700
[22]	ペンタクロロフェノール並びにその塩及びエステル類																
	[22-1] ペンタクロロフェノール								1.2	1.0	0.8	tr(0.5)	---注6)	1.0	1.7	1.0	tr(0.7)
	[22-2] ペンタクロロアニソール								10	tr(4)	5	tr(5)	---注6)	tr(5)	6	5	6
[23]	[23] 短鎖塩素化パラフィン類																
	[23-1] 塩素化デカン類								160	180	120	---注6)	330	560	420		470
	[23-2] 塩素化ウンデカン類								120	170	90	---注6)	180	320	300		280
	[23-3] 塩素化ドデカン類								51	70	40	---注6)	67	98	100		120
	[23-4] 塩素化トリデカン類								52	50	30	---注6)	32	52	50		60
[24]	ジコホル											nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)												---注6)	2.3	0.8	1.8	1.6
[26]	PAH 類																
	[26-1] ビレン						310	180	190	310	390	150	---注6)	160	210	110	130
	[26-2] フルオランテン						410	290	270	510	670	250	---注6)	180	230	140	170
	[26-3] ベンゾ[a]アントラセン						50	25	tr(20)	43	58	23	---注6)	tr(13)	16	nd	15
	[26-4] クリセン						190	130	110	200	340	130	---注6)	60	70	34	63
	[26-5] ベンゾ[a]ピレン						70	24	30	76	91	41	---注6)	23	29	14	28
	[26-6] ベンゾ[e]ピレン						100	56	60	110	150	62	---注6)	36	53	22	43
	[26-7] ベンゾ[b]フルオランテン						160	110	94	190	290	93	---注6)	58	68	33	60
	[26-8] ベンゾ[k]フルオランテン						60	34	30	61	91	33	---注6)	20	24	tr(13)	24
	[26-9] ベンゾ[g,h,i]ペリレン						90	55	50	100	140	73	---注6)	33	43	21	36
	[26-10] インデノ[1,2,3-c,d]ピレン						110	70	50	110	160	61	---注6)	36	35	21	41
	[26-11] ジベンゾ[a,c]アントラセン						tr(10)	nd	nd	nd	nd	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd
	[26-12] ジベンゾ[a,h]アントラセン						tr(10)	nd	nd	tr(10)	tr(20)	nd	---注6)	nd	nd	nd	nd

- (注1) ヘキサクロブタ-1,3-ジエンを除く物質の年度平均値のうち、2016年度までは、年間を通じて毎月1回の頻度でMVにより7日間かけて採取した試料の濃度から年平均値を算出した。2017年度以降は、10月から3月までの各月にHVで連続した3日それぞれで24時間かけて採取した3試料の濃度の平均値を算出し、それらの年度毎の平均値を算出した。ヘキサクロブタ-1,3-ジエンは、年間を通じて毎月1回の頻度でHVにより連続した3日それぞれで24時間かけて採取した3試料の濃度の平均値を算出し、それらの年度毎の平均値を算出した。測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載している。
- (注2) PCB類及びポリ塩化ナフタレン類は、総量としての総PCB及び総ポリ塩化ナフタレンの結果のみを示しているが、各同族体およびコプラナーPCBの測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載している。
- (注3) ■は未測定であることを意味する。
- (注4) 2018年度の*p,p'*-DDT及び*o,p'*-DDTについて一部の検体で欠測となったため、年平均値としての集計も行わなかった。
- (注5) 2019年度の10月及び11月の全試料並びに12月の1試料において、DDT類の大气については分析施設由来と考えられる汚染により濃度の増加が疑われたことから、欠測扱いとすることとし、それらを除いて年平均値を算出した。
- (注6) 2020年度は、台風による停電のため、ヘキサクロブタ-1,3-ジエンは9月、10月の採取が実施できず、その他の項目は、10月～2月の採取が実施できなかった。このため、ヘキサクロブタ-1,3-ジエン以外の年度平均値は算出しなかった。

表 2 POPs 残留状況の高頻度監視における定量[検出]下限値

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)															
		‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
[1]	総 PCB 注 3)	0.8 [0.3]	1.3 [0.6]	2.3 [0.9]	1.7 [0.7]	0.9 [0.3]	0.6 [0.2]	0.9 [0.4]	1.7 [0.6]	1.3 [0.4]	0.8 [0.3]	1.0 [0.4]	0.5 [0.2]	0.6 [0.2]	0.8 [0.2]	0.6 [0.2]	0.6 [0.2]
[2]	HCB	0.22 [0.08]	1.8 [0.7]	0.6 [0.2]	0.6 [0.2]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.11 [0.04]	0.23 [0.09]	0.23 [0.09]	0.18 [0.07]	0.16 [0.06]
[3]	アルドリノ	0.04 [0.02]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.10 [0.04]	0.09 [0.04]	2.7 [1.1]	3.1 [1.2]	1.4 [0.6]
[4]	ディルドリン	0.24 [0.09]	0.10 [0.04]	0.08 [0.03]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.08 [0.03]	0.09 [0.03]	0.09 [0.03]	0.10 [0.04]	0.13 [0.05]	0.17 [0.06]	0.17 [0.07]	0.19 [0.07]	0.14 [0.05]
[5]	エンドリン	0.10 [0.04]	0.10 [0.04]	0.09 [0.04]	0.07 [0.03]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.13 [0.05]	0.14 [0.05]	0.17 [0.06]	0.18 [0.07]	0.14 [0.05]	0.13 [0.05]
[6]	DDT 類																
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.08 [0.03]	0.19 [0.07]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.09 [0.03]
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.08 [0.03]	0.09 [0.03]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.04 [0.01]	0.05 [0.02]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.025 [0.009]	0.024 [0.009]	0.04 [0.01]	0.04 [0.01]	0.018 [0.007]	0.018 [0.007]	0.018 [0.007]	0.017 [0.007]	0.018 [0.007]	0.020 [0.008]	0.03 [0.01]	0.020 [0.008]	0.021 [0.008]	0.017 [0.007]	0.020 [0.008]	0.017 [0.007]
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.04 [0.01]	0.04 [0.01]	0.018 [0.007]	0.023 [0.009]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.04 [0.01]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.04 [0.01]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.025 [0.009]	0.03 [0.01]	0.04 [0.02]	0.04 [0.01]	0.023 [0.009]	0.023 [0.009]	0.019 [0.007]	0.020 [0.008]	0.020 [0.008]	0.020 [0.008]	0.04 [0.02]	0.04 [0.01]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	0.04 [0.01]	0.03 [0.01]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.08 [0.03]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.06 [0.02]	0.04 [0.02]	0.08 [0.03]
[7]	クロルデン類																
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	0.14 [0.05]	0.17 [0.06]	0.24 [0.09]	0.22 [0.08]	0.12 [0.05]	0.08 [0.03]	0.2 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.21 [0.08]	0.24 [0.09]	0.22 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.23 [0.09]
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	0.17 [0.06]	0.23 [0.09]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.15 [0.06]	0.11 [0.04]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[7-3] オキシクロルデン	0.04 [0.01]	0.03 [0.01]	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.03 [0.01]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.04 [0.01]	0.04 [0.02]	0.09 [0.03]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.03 [0.01]	0.021 [0.008]	0.04 [0.02]	0.12 [0.05]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.04 [0.02]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.09 [0.04]	0.08 [0.03]	0.04 [0.02]
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	0.09 [0.03]	0.12 [0.05]	0.18 [0.07]	0.24 [0.09]	0.11 [0.04]	0.10 [0.04]	0.21 [0.08]	0.22 [0.09]	0.2 [0.1]	0.18 [0.07]	0.16 [0.06]	0.13 [0.05]	0.10 [0.04]	0.16 [0.06]	0.14 [0.05]	0.14 [0.06]
[8]	ヘブタクロル類																
	[8-1] ヘブタクロル	0.06 [0.02]	0.08 [0.03]	0.09 [0.04]	0.09 [0.03]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.09 [0.03]	0.08 [0.03]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.08 [0.03]	0.06 [0.02]	0.09 [0.03]	0.04 [0.02]	0.09 [0.03]
	[8-2] <i>cis</i> -ヘブタクロルエポキシド	0.022 [0.008]	0.024 [0.009]	0.04 [0.01]	0.05 [0.02]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.05 [0.02]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.07 [0.03]	0.06 [0.02]	0.06 [0.02]
	[8-3] <i>trans</i> -ヘブタクロルエポキシド	0.16 [0.06]	0.16 [0.06]	0.13 [0.05]	0.12 [0.05]	0.12 [0.05]	0.11 [0.04]	0.10 [0.04]	0.10 [0.04]	0.11 [0.04]	0.11 [0.04]	0.13 [0.05]	0.13 [0.05]	0.14 [0.06]	0.09 [0.03]	0.14 [0.05]	0.12 [0.05]

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)															
		‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
[9]	トキサフェン類																
	[9-1] Parlar-26	0.22 [0.08]	0.23 [0.09]	0.22 [0.08]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.17 [0.07]	0.05 [0.02]	0.14 [0.05]	0.09 [0.03]
	[9-2] Parlar-50	0.25 [0.09]	0.15 [0.06]	0.15 [0.06]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.4 [0.1]	0.4 [0.1]	0.22 [0.09]	0.3 [0.1]	0.5 [0.2]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.14 [0.06]	0.19 [0.07]	0.14 [0.05]	0.07 [0.03]
	[9-3] Parlar-62	1.6 [0.6]	1.2 [0.5]	1.3 [0.5]	4 [2]	1.6 [0.6]	2.1 [0.8]	2.4 [0.9]	1.2 [0.5]	1.4 [0.5]	1.8 [0.7]	1.7 [0.7]	2.3 [0.9]	1.3 [0.5]	0.8 [0.3]	1.2 [0.4]	0.5 [0.2]
[10]	マイレックス	0.03 [0.01]	0.020 [0.008]	0.04 [0.01]	0.021 [0.008]	0.020 [0.008]	0.017 [0.007]	0.023 [0.009]	0.019 [0.007]	0.021 [0.008]	0.022 [0.008]	0.023 [0.009]	0.03 [0.01]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]
[11]	HCH 類																
	[11-1] α -HCH	0.10 [0.04]	0.17 [0.06]	0.24 [0.09]	0.16 [0.06]	0.21 [0.08]	0.10 [0.04]	0.3 [0.1]	0.20 [0.08]	0.14 [0.06]	0.13 [0.05]	0.12 [0.05]	0.10 [0.04]	0.09 [0.03]	0.12 [0.05]	0.06 [0.02]	0.09 [0.03]
	[11-2] β -HCH	0.04 [0.01]	0.07 [0.03]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.06 [0.02]	0.05 [0.02]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.06 [0.02]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]	0.13 [0.05]	0.11 [0.04]	0.09 [0.03]
	[11-3] γ -HCH (別名：リンデン)	0.07 [0.03]	0.11 [0.04]	0.21 [0.08]	0.14 [0.05]	0.15 [0.06]	0.06 [0.02]	0.18 [0.07]	0.16 [0.06]	0.09 [0.03]	0.10 [0.04]	0.10 [0.04]	0.05 [0.02]	0.10 [0.04]	0.08 [0.03]	0.11 [0.04]	0.08 [0.03]
	[11-4] δ -HCH	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]	0.07 [0.03]	0.05 [0.02]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.11 [0.04]	0.08 [0.03]	0.08 [0.03]	0.08 [0.03]	0.08 [0.03]	0.07 [0.03]	0.10 [0.04]	0.07 [0.03]	0.07 [0.03]
[12]	クロルデコン		0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.03 [0.01]	0.04 [0.01]	0.03 [0.01]	0.04 [0.02]	0.04 [0.02]	0.05 [0.02]	0.05 [0.02]
[13]	ヘキサブプロモビフェニル類		0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.3 [0.1]	0.7 [0.3]	0.3 [0.1]	0.9 [0.3]	0.18 [0.07]	0.18 [0.07]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
[14]	ポリブプロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)																
	[14-1] テトラブプロモジフェニルエーテル類		0.12 [0.05]	0.18 [0.07]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.24 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[14-2] ペンタブプロモジフェニルエーテル類		0.12 [0.05]	0.16 [0.06]	0.14 [0.06]	0.18 [0.07]	0.18 [0.07]	0.18 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.07]	0.19 [0.08]	0.18 [0.07]	0.20 [0.08]	0.19 [0.08]
	[14-3] ヘキサブプロモジフェニルエーテル類		0.16 [0.06]	0.14 [0.05]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.5 [0.2]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.4 [0.1]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.4 [0.2]
	[14-4] ヘプタブプロモジフェニルエーテル類		0.26 [0.1]	0.3 [0.1]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.18 [0.07]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[14-5] オクタブプロモジフェニルエーテル類		0.15 [0.06]	0.20 [0.08]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.23 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[14-6] ノナブプロモジフェニルエーテル類		0.7 [0.3]	0.9 [0.4]	0.7 [0.3]	1.0 [0.4]	0.9 [0.4]	1.3 [0.5]	1.1 [0.4]	1.0 [0.4]	1.1 [0.4]	1.0 [0.4]	1.1 [0.4]	1.0 [0.4]	1.0 [0.4]	1.1 [0.4]	1.1 [0.4]
	[14-7] デカブプロモジフェニルエーテル		6 [2]	7 [3]	8 [3]	8 [3]	8 [3]	11 [4]	10 [4]	10 [4]	9 [3]	3 [1]	5 [2]	5 [2]	5 [2]	4 [1]	5 [2]
[15]	ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)		0.4 [0.1]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)		0.5 [0.2]	0.6 [0.2]	0.7 [0.3]	0.4 [0.1]	0.4 [0.1]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]
[17]	ペンタクロロベンゼン		0.3 [0.1]	0.6 [0.2]	0.3 [0.1]	0.5 [0.2]	0.21 [0.08]	0.17 [0.07]	0.5 [0.2]	0.4 [0.1]	0.18 [0.07]	0.18 [0.07]	0.24 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.13 [0.05]	0.4 [0.1]

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)															
		'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
[18]	エンドスルファン類																
	[18-1] α -エンドスルファン			2.2 [0.8]	1.7 [0.7]	2.1 [0.8]	1.4 [0.5]	1.7 [0.7]	1.2 [0.5]	1.5 [0.6]	1.5 [0.6]	1.5 [0.6]	0.8 [0.3]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[18-2] β -エンドスルファン			0.4 [0.1]	0.6 [0.2]	0.6 [0.2]	0.3 [0.1]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.20 [0.08]	0.20 [0.08]	0.3 [0.1]
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類																
	[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン				0.6 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン				0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.22 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン				0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.22 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]
	[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン				0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.23 [0.09]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.4 [0.1]
	[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン				0.6 [0.2]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.6 [0.2]	0.7 [0.3]	0.5 [0.2]	0.5 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]
[20]	総ポリ塩化ナフタレン ^{注3)}								1.0 [0.4]	0.7 [0.3]	0.7 [0.3]	0.8 [0.3]	0.8 [0.3]	0.7 [0.3]	0.8 [0.3]	0.6 [0.2]	0.5 [0.2]
[21]	ヘキサクロプタ-1,3-ジエン								50 [20]	80 [30]	60 [20]	30 [10]	80 [30]	80 [30]	80 [30]	50 [20]	50 [20]
[22]	ペンタクロフェノール並びにその塩及びエステル類																
	[22-1] ペンタクロフェノール								0.8 [0.3]	0.8 [0.3]	0.8 [0.3]	0.8 [0.3]	0.9 [0.4]	1.0 [0.4]	1.0 [0.4]	1.0 [0.4]	1.0 [0.4]
	[22-2] ペンタクロアニソール								6 [2]	6 [2]	5 [2]	6 [2]	5 [2]	6 [2]	6 [2]	3 [1]	5 [2]
[23]	[23]短鎖塩素化パラフィン類 ^{注3)}																
	[23-1] 塩素化デカン類									21 [8]	23 [9]	30 [10]	40 [10]	22 [9]	20 [8]	23 [9]	21 [8]
	[23-2] 塩素化ウンデカン類									10 [4]	50 [20]	20 [10]	30 [10]	30 [10]	22 [8]	24 [9]	24 [9]
	[23-3] 塩素化ドデカン類									14 [5]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	24 [9]	14 [5]	12 [5]	22 [9]
	[23-4] 塩素化トリデカン類									14 [5]	24 [9]	30 [10]	30 [10]	23 [9]	13 [5]	10 [4]	15 [6]
[24]	ジコホル											3 [1]	0.8 [0.3]	0.9 [0.3]	0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.7 [0.3]
[25]	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)												0.4 [0.2]	0.4 [0.2]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]	0.3 [0.1]

物質 調査 番号	調査対象物質	大気 (pg/m ³)															
		‘09	‘10	‘11	‘12	‘13	‘14	‘15	‘16	‘17	‘18	‘19	‘20	‘21	‘22	‘23	‘24
[26]	PAH 類																
	[26-1]ピレン						30 [10]	21 [8]	30 [10]	17 [7]	9 [3]	21 [8]	18 [7]	16 [6]	18 [7]	16 [6]	17 [6]
	[26-2]フルオランテン						22 [9]	21 [8]	24 [9]	18 [7]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]
	[26-3]ベンゾ[a]アントラセン						30 [10]	20 [8]	30 [10]	15 [6]	15 [6]	15 [6]	13 [5]	18 [7]	15 [6]	17 [7]	15 [6]
	[26-4]クリセン						40 [10]	21 [8]	24 [9]	14 [5]	22 [9]	17 [6]	17 [7]	18 [7]	19 [7]	20 [8]	18 [7]
	[26-5]ベンゾ[a]ピレン						30 [10]	20 [8]	30 [10]	17 [7]	13 [5]	14 [5]	12 [5]	14 [5]	12 [5]	12 [5]	14 [6]
	[26-6]ベンゾ[e]ピレン						30 [10]	19 [7]	30 [10]	12 [5]	13 [5]	14 [5]	12 [5]	14 [6]	15 [6]	16 [6]	17 [7]
	[26-7]ベンゾ[b]フルオランテン						30 [10]	20 [8]	24 [9]	12 [5]	16 [6]	14 [5]	13 [5]	14 [5]	14 [6]	16 [6]	18 [7]
	[26-8]ベンゾ[k]フルオランテン						30 [10]	19 [8]	30 [10]	13 [5]	14 [5]	16 [6]	14 [6]	15 [6]	17 [7]	18 [7]	18 [7]
	[26-9]ベンゾ[g,h,i]ペリレン						30 [10]	21 [8]	30 [10]	9 [4]	11 [4]	13 [5]	13 [5]	13 [5]	15 [6]	19 [7]	17 [6]
	[26-10]インデノ[1,2,3-c,d]ピレン						30 [10]	20 [8]	30 [10]	22 [8]	16 [6]	17 [7]	16 [6]	18 [7]	18 [7]	20 [8]	20 [8]
	[26-11]ジベンゾ[a,c]アントラセン						30 [10]	21 [8]	30 [10]	30 [10]	22 [9]	20 [8]	18 [7]	18 [7]	22 [8]	24 [9]	24 [9]
	[26-12]ジベンゾ[a,h]アントラセン						30 [10]	20 [8]	22 [9]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]	20 [10]	30 [10]	30 [10]	30 [10]

(注1) 上段は定量下限値、下段は検出下限値

(注2) ■は未測定であることを意味する。

表 3-1 POPs 残留状況の高頻度監視で得られた月別平均値 (2024 年度、沖縄県辺戸岬)

物質 調査 番号	調査対象物質	沖縄県辺戸岬 2024年度 大気 (pg/m ³)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
[1]	総 PCB 注2	120	59	48	160	180	120	120	35	39	25	24	36
[2]	HCB 注2	110	84	98	85	93	97	68	100	92	73	83	86
[3]	アルドリン注2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[4]	ディルドリン注2	1.1	0.76	0.55	1.4	1.1	0.88	0.80	0.55	0.59	0.31	0.32	0.51
[5]	エンドリン注2	nd	tr(0.05)	tr(0.07)	0.16	tr(0.09)	tr(0.12)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[6]	DDT 類注2												
	[6-1] p,p'-DDT	0.33	0.20	0.10	0.31	0.44	0.24	0.29	0.12	0.12	0.09	0.09	0.14
	[6-2] p,p'-DDE	0.59	0.37	0.29	0.59	0.65	0.46	0.52	0.41	0.39	0.74	0.59	0.73
	[6-3] p,p'-DDD	0.024	0.019	tr(0.010)	0.024	0.048	0.032	0.025	0.018	tr(0.012)	tr(0.016)	tr(0.013)	tr(0.015)
	[6-4] o,p'-DDT	0.29	0.18	0.08	0.14	0.22	0.15	0.16	0.13	0.13	0.14	0.11	0.15
	[6-5] o,p'-DDE	0.11	0.07	tr(0.04)	0.11	0.10	0.08	0.07	0.07	0.08	0.10	0.08	0.11
	[6-6] o,p'-DDD	tr(0.03)	nd	nd	tr(0.04)	tr(0.04)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[7]	クロルデン類注2												
	[7-1] cis-クロルデン	4.1	2.5	2.1	5.4	5.8	3.4	3.0	1.6	1.3	0.49	0.41	1.4
	[7-2] trans-クロルデン	5.3	3.2	2.0	8.1	7.7	4.8	4.0	1.9	1.6	0.5	0.4	1.8
	[7-3] オキシクロルデン	0.28	0.24	0.33	0.31	0.37	0.25	0.24	0.25	0.20	0.12	0.10	0.20
	[7-4] cis-ノナクロル	0.39	0.22	0.22	0.41	0.53	0.34	0.35	0.15	0.12	tr(0.02)	tr(0.02)	0.12
	[7-5] trans-ノナクロル	3.4	2.3	2.1	4.8	5.0	2.9	2.7	1.6	1.3	0.43	0.37	1.4
[8]	ヘプタクロル類注2												
	[8-1] ヘプタクロル	1.7	0.37	0.39	1.1	2.3	0.87	1.4	0.23	0.35	0.10	tr(0.06)	0.17
	[8-2] cis-ヘプタクロルエ ボキシド	0.23	0.26	0.31	0.28	0.37	0.29	0.24	0.26	0.29	0.24	0.19	0.16
	[8-3] trans-ヘプタクロルエ ボキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[9]	トキサフエン類注2												
	[9-1] Parlar-26	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09	0.09	tr(0.08)	tr(0.08)	tr(0.07)	tr(0.08)	tr(0.08)	tr(0.07)
	[9-2] Parlar-50	tr(0.04)	tr(0.04)	tr(0.05)	tr(0.05)	tr(0.06)	tr(0.06)	tr(0.05)	tr(0.04)	nd	nd	nd	nd
	[9-3] Parlar-62	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[10]	マイレックス注2	0.12	tr(0.05)	0.08	0.08	0.12	0.14	0.07	tr(0.05)	tr(0.05)	nd	tr(0.04)	tr(0.06)
[11]	HCH 類注2												
	[11-1] α-HCH	18	8.0	8.7	8.7	31	8.5	18	3.3	3.3	3.6	2.1	2.2
	[11-2] β-HCH	0.93	0.40	0.43	0.92	1.9	0.95	1.3	0.32	0.25	0.19	0.17	0.27
	[11-3] γ-HCH (別名：リン デン)	3.4	1.4	1.4	2.2	6.2	2.0	3.8	0.75	0.90	0.88	0.57	0.49
	[11-4] δ-HCH	0.23	tr(0.05)	tr(0.05)	0.13	0.49	0.09	0.29	nd	tr(0.03)	nd	nd	nd
[12]	クロルデコン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[13]	ヘキサブロモビフェニル 類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[14]	ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)												
	[14-1] テトラブロモジフ ェニルエーテル類	tr(0.2)	nd	tr(0.1)	tr(0.1)	tr(0.2)	tr(0.1)	tr(0.2)	nd	nd	nd	nd	tr(0.2)
	[14-2] ペンタブロモジフ ェニルエーテル類	tr(0.10)	nd	tr(0.08)	nd	nd	nd	tr(0.09)	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-3] ヘキサブロモジフ ェニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-4] ヘプタブロモジフ ェニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-5] オクタブロモジフ ェニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-6] ノナブロモジフ ェニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-7] デカブロモジフ ェニルエーテル	tr(2)	nd	tr(2)	tr(3)	6	9	tr(3)	nd	tr(2)	nd	tr(3)	tr(3)
[15]	ペルフルオロオクタンス ルホン酸 (PFOS)	3.6	2.3	2.8	4.4	4.1	4.3	4.9	3.0	0.6	1.0	0.9	3.8
[16]	ペルフルオロオクタンス 酸 (PFOA)	12	9.1	5.7	3.0	3.3	4.2	2.5	4.7	8.9	9.5	10	7.9
[17]	ペンタクロロベンゼン注2	85	53	49	39	35	36	22	38	48	43	59	71

物質 調査 番号	調査対象物質	沖縄県辺戸岬 2024年度 大気 (pg/m³)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
[18]	エンドスルファン類 ^{注2}												
	[18-1] α-エンドスルファン	2.3	1.3	0.9	0.9	1.4	1.0	0.9	0.5	0.9	0.4	0.7	1.0
	[18-2] β-エンドスルファン	tr(0.1)	nd	nd	nd	tr(0.2)	nd	tr(0.1)	nd	nd	nd	nd	nd
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類												
	[19-1] α-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	tr(0.2)	nd	nd
	[19-2] β-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[19-3] γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[19-4] δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[19-5] ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロドデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[20]	総ポリ塩化ナフタレン ^{注2}	13	7.0	5.7	8.0	14	13	12	8.2	6.7	13	11	11
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジ エン	4,500	3,200	2,900	1,400	1,600	1,700	970	1,900	2,400	2,400	2,400	3,000
[22]	ベンタクロフェノール並びにその塩及びエステル類 ^{注2}												
	[22-1] ベンタクロフェ ノール	1.0	tr(0.9)	tr(0.9)	tr(0.8)	tr(0.9)	tr(0.8)	tr(0.7)	tr(0.8)	tr(0.6)	tr(0.5)	tr(0.6)	tr(0.7)
	[22-2] ベンタクロアニ ソール	8	tr(4)	tr(3)	7	11	8	8	tr(4)	tr(4)	tr(3)	tr(3)	tr(3)
[23]	[23]短鎖塩素化パラフィン類 ^{注2}												
	[23-1] 塩素化デカン類	800	540	290	1,200	1,100	1,100	730	240	380	240	410	430
	[23-2] 塩素化ウンデカン 類	360	280	220	930	770	880	320	210	230	130	200	250
	[23-3] 塩素化ドデカン類	96	98	78	330	270	380	61	110	75	53	78	85
	[23-4] 塩素化トリデカン 類	51	41	30	120	160	170	47	39	35	31	44	32
[24]	ジコホル	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[25]	ペルフルオロヘキサンス ルホン酸 (PFHxS)	2.0	1.8	2.2	3.6	3.2	3.3	3.2	2.6	0.5	0.6	0.8	2.3
[24]	PAH 類												
	[26-1] ビレン												
	[26-2] フルオランテン												
	[26-3] ベンゾ[a]アントラ セン												
	[26-4] クリセン												
	[26-5] ベンゾ[a]ピレン												
	[26-6] ベンゾ[e]ピレン												
	[26-7] ベンゾ[b]フルオラ ンテン												
	[26-8] ベンゾ[k]フルオラ ンテン												
	[26-9] ベンゾ[g,h,i]ペリ レン												
	[26-10] インデノ [1,2,3- c,d]ピレン												
	[26-11] ジベンゾ[a,c]アン トラセン												
	[26-12] ジベンゾ[a,h]アン トラセン												

- (注1) 各月ともハイボリュームエアサンプラー (HV) により連続した3日それぞれで試料を採取しており、原則として、各月の濃度として3日間の濃度の算術平均値を示した。測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載してある。
- (注2) 6月の1日目及び2日目並びに7月の1日目はそれぞれ欠測で、6月は3日目の濃度を、7月は2日目及び3日目の平均濃度を示した。
- (注3) PCB類及びポリ塩化ナフタレン類は、総量としての総PCB及び総ポリ塩化ナフタレンの結果のみを示しているが、各同族体の測定値はホームページに一覧表として掲載してある。
- (注4) ■ は未測定であることを意味する。

表 5-2 POPs 残留状況の高頻度監視で得られた月別平均値（2024 年度、長崎県五島福江島）


物質 調査 番号	調査対象物質	長崎県五島福江島 2024年度 大気 (pg/m³)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
[1]	総 PCB	68	58	100	87	120	69	79	50	19	22	11	16
[2]	HCB	130	87	110	80	120	81	100	110	76	88	56	62
[3]	アルドリン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[4]	ディルドリン	0.62	0.50	2.4	0.81	5.9	2.4	2.4	1.4	0.36	0.37	0.29	0.36
[5]	エンドリン	nd	nd	tr(0.08)	tr(0.05)	0.16	tr(0.08)	tr(0.07)	nd	nd	nd	nd	nd
[6]	DDT 類												
	[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	0.24	0.31	0.32	0.34	0.63	0.41	0.32	0.18	0.09	0.12	tr(0.07)	0.24
	[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	0.51	0.44	0.58	0.43	0.81	0.60	0.57	0.49	0.49	0.65	0.24	0.51
	[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	0.017	0.028	0.028	0.074	0.061	0.077	0.036	0.024	0.018	0.020	tr(0.009)	0.017
	[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.21	0.23	0.25	0.19	0.45	0.21	0.25	0.15	0.10	0.13	0.06	0.21
	[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.09	0.08	0.08	0.07	0.12	0.06	0.08	0.07	0.07	0.11	0.05	0.09
	[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	nd	tr(0.04)	tr(0.04)	0.09	0.08	tr(0.06)	tr(0.05)	tr(0.04)	tr(0.03)	tr(0.03)	nd	nd
[7]	クロルデン類												
	[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	2.5	1.4	6.3	1.9	20	7.2	7.0	3.7	0.59	0.52	0.30	2.5
	[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	3.2	1.6	5.7	2.1	18	7.6	8.0	4.1	0.6	0.6	tr(0.2)	3.2
	[7-3] オキシクロルデン	0.15	0.17	0.34	0.15	0.65	0.28	0.35	0.23	0.12	0.10	0.09	0.15
	[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	0.28	0.16	0.80	0.31	2.6	1.2	0.90	0.44	0.04	tr(0.03)	nd	0.28
	[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	2.3	1.3	5.4	1.6	17	6.5	6.5	3.1	0.54	0.48	0.28	2.3
[8]	ヘプタクロル類												
	[8-1] ヘプタクロル	0.29	0.32	0.61	0.40	1.2	0.75	0.99	0.56	tr(0.07)	tr(0.06)	nd	0.11
	[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエ ボキシド	0.22	0.25	0.39	0.24	0.75	0.29	0.40	0.27	0.18	0.18	0.14	0.15
	[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエ ボキシド	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[9]	トキサフェン類												
	[9-1] Parlar-26	tr(0.07)	0.09	0.11	0.10	0.12	0.10	tr(0.06)	0.09	tr(0.06)	tr(0.06)	tr(0.07)	tr(0.06)
	[9-2] Parlar-50	nd	nd	tr(0.05)	tr(0.06)	tr(0.06)	0.07	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[9-3] Parlar-62	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[10]	マイレックス	0.08	tr(0.03)	0.12	0.10	0.15	0.08	0.08	tr(0.06)	nd	tr(0.06)	nd	nd
[11]	HCH 類												
	[11-1] α -HCH	17	14	28	25	22	5.5	29	12	3.1	2.0	1.4	3.3
	[11-2] β -HCH	0.80	0.70	1.4	1.9	1.6	0.82	1.9	0.73	0.16	0.15	tr(0.08)	0.18
	[11-3] γ -HCH (別名：リン デン)	2.6	2.2	4.8	4.0	4.3	1.7	5.1	2.2	0.50	0.46	0.20	0.65
	[11-4] δ -HCH	0.16	0.16	0.35	0.33	0.19	0.14	0.41	0.14	nd	nd	nd	nd
[12]	クロルデコン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[13]	ヘキサブプロモビフェニル 類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[14]	ポリブプロモジフェニルエーテル類 (臭素数が 4 から 10 までのもの)												
	[14-1] テトラブプロモジフ エニルエーテル類	tr(0.1)	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	0.3	tr(0.1)	tr(0.1)	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)
	[14-2] ペンタブプロモジフ エニルエーテル類	nd	nd	nd	tr(0.09)	tr(0.10)	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-3] ヘキサブプロモジフ エニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-4] ヘプタブプロモジフ エニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[14-5] オクタブプロモジフ エニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.2)	tr(0.1)	nd	tr(0.2)	nd	nd
	[14-6] ノナブプロモジフエ ニルエーテル類	nd	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.4)	tr(0.4)	nd	nd	nd	nd
	[14-7] デカブプロモジフエ ニルエーテル	tr(3)	tr(2)	tr(3)	tr(4)	tr(2)	nd	5	6	nd	nd	tr(4)	tr(3)
[15]	ペルフルオロオクタンス ルホン酸 (PFOS)	2.4	0.6	2.8	4.6	3.5	4.4	3.9	1.5	0.9	0.9	0.6	2.4
[16]	ペルフルオロオクタン酸 (PFOA)	11	7.8	6.8	4.1	7.2	4.4	6.5	4.9	7.1	14	5.1	11
[17]	ペンタクロロベンゼン	94	54	59	30	59	29	49	58	45	54	31	94

物質 調査 番号	調査対象物質	長崎県五島福江島 2024年度 大気 (pg/m ³)											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
[18]	エンドスルファン類												
	[18-1] α-エンドスルファン	1.8	2.1	2.3	0.6	1.9	0.7	1.2	1.1	0.3	0.4	tr(0.2)	0.3
	[18-2] β-エンドスルファン	tr(0.2)	tr(0.2)	tr(0.1)	nd	tr(0.2)	tr(0.1)	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[19]	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類												
	[19-1] α-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	0.3	tr(0.2)	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)	tr(0.2)	0.3	nd	nd
	[19-2] β-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[19-3] γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	tr(0.2)	nd	nd	nd	nd	nd	tr(0.1)	nd	nd	tr(0.2)	nd	nd
	[19-4] δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[19-5] ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサ ブロモシクロデカン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[20]	総ポリ塩化ナフタレン	7.3	7.0	10	15	17	16	18	14	16	20	6.7	9.9
[21]	ヘキサクロブタ-1,3-ジ エン	5,200	2,800	3,700	1,600	2,200	1,400	2,400	3,200	2,100	3,300	1,900	2,000
[22]	ベンタクロフェノール並びにその塩及びエステル類												
	[22-1] ベンタクロフェ ノール	tr(0.9)	1.0	1.4	tr(0.6)	1.2	tr(0.6)	tr(0.8)	tr(0.7)	tr(0.5)	tr(0.6)	nd	nd
	[22-2] ベンタクロアニ ソール	5	5	8	6	15	8	9	6	tr(3)	tr(3)	nd	tr(2)
[23]	[23]短鎖塩素化パラフィン類												
	[23-1] 塩素化デカン類	700	520	820	770	660	400	590	390	230	350	80	110
	[23-2] 塩素化ウンデカン 類	390	330	510	530	400	260	330	200	130	180	48	70
	[23-3] 塩素化ドデカン類	140	120	220	240	200	150	110	74	54	87	28	tr(18)
	[23-4] 塩素化トリデカン 類	79	61	110	140	76	49	46	32	38	71	tr(11)	nd
[24]	ジコホル	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
[25]	ペルフルオロヘキサンス ルホン酸 (PFHxS)	1.5	0.5	2.4	1.6	2.4	3.3	2.4	0.9	0.6	0.6	0.5	2.2
[24]	PAH 類												
	[26-1] ビレン	92	92	150	140	130	84	220	160	130	240	130	51
	[26-2] フルオランテン	120	110	120	100	100	60	210	180	270	450	230	80
	[26-3] ベンゾ[a]アントラ セン	tr(11)	tr(7)	nd	nd	nd	nd	29	20	26	51	21	nd
	[26-4] クリセン	48	39	tr(16)	nd	34	tr(8)	100	88	100	200	100	22
	[26-5] ベンゾ[a]ビレン	21	16	nd	nd	15	nd	62	44	43	77	40	tr(10)
	[26-6] ベンゾ[e]ビレン	36	26	tr(8)	nd	24	nd	81	75	67	110	65	tr(14)
	[26-7] ベンゾ[b]フルオラ ンテン	45	33	tr(13)	nd	30	tr(8)	100	87	100	190	95	19
	[26-8] ベンゾ[k]フルオラ ンテン	tr(17)	tr(13)	nd	nd	tr(10)	nd	46	36	41	74	35	tr(8)
	[26-9] ベンゾ[g,h,i]ペリレ ン	32	22	tr(8)	nd	tr(14)	nd	57	50	67	120	48	tr(11)
	[26-10] インデノ [1,2,3- c,d]ビレン	31	24	nd	nd	tr(17)	nd	72	62	74	130	60	tr(14)
	[26-11] ジベンゾ[a,c]アン トラセン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd
	[26-12] ジベンゾ[a,h]アン トラセン	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd

(注1) 各月ともハイボリュームエアサンプラー (HV) により連続した3日それぞれで試料を採取しており、各月の濃度として3日間の濃度の算術平均値を示した。測定値は環境省ホームページに一覧表として掲載してある。

(注2) PCB類及びポリ塩化ナフタレン類は、総量としての総PCB及び総ポリ塩化ナフタレンの結果のみを示しているが、各同族体の測定値はホームページに一覧表として掲載してある。

(注3) ■ は未測定であることを意味する。



(注) 2009年度の4月から12月並びに2月及び3月のPCB類の 대기について、モノクロロビフェニル及びジクロロビフェニルにおいて
 大気試料採取装置由来と考えられる汚染により濃度の増加が疑われたことから、総PCBも含めて欠測扱いとすることとした。

図 1 総 PCB の経月変化





図 2 HCB の経月変化



(注1) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

(注2) 試料採取前の捕集材に添加したサロゲート物質の回収率が低かったことから、22年度以降はMDL試験で得られたMDL及びMQL
 を回収率の最小値で補正したものを検出下限値及び定量下限値とした。

図 3 アルドリンの経月変化





図 4 デイルドリンの経月変化



(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 5 エンドリンの経月変化




図 6-1 p,p' -DDT の経月変化




図 6-2 *p,p'*-DDEの経月変化




図 6-3 *p,p'*-DDDの経月変化




図 6-4 *o,p'*-DDTの経月変化





図 6-6 o,p' -DDDの経月変化







図 7-4 *cis*-ノナクロルの経月変化






図 8-1 ヘプタクロルの経月変化








図 10-3 γ -HCH (別名：リンデン) の経月変化



(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 10-4 δ -HCHの経月変化



(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 11-1 テトラブロモジフェニルエーテル類の経月変化






図 15-2 β -エンドスルファンの経月変化




(注1) 辺戸岬については全検体で不検出の割合が高くなったことから、図示していない。
 (注2) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 16-1 α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの経月変化




(注1) 辺戸岬については全検体で不検出の割合が高くなったことから、図示していない。
 (注2) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 16-2 β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの経月変化




(注1) 辺戸岬については全検体で不検出の割合が高くなったことから、図示していない。
 (注2) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 16-3 γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカンの経月変化




(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-4 クリセンの経月変化




(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-5 ベンゾ[a]ピレンの経月変化




(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-6 ベンゾ[e]ピレンの経月変化




(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-7 ベンゾ[b]フルオランテンの経月変化



(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-8 ベンゾ[k]フルオランテンの経月変化



(注) 月平均値が検出下限値未満であった月については、検出下限値の1/2の値を図示した。

図 22-9 ベンゾ[g,h,i]ペリレンの経月変化

