

## 8 中型ネコ類〈ネコ科〉

### 〈ネコ属〉

ア 和名：ジャングルキャット

英名：Jungle cat

学名：*Felis ohaus*

分布：エジプトからインドシナ半島、スリランカ



【ジャングルキャット】


(財) 東京動物園協会提供

イ 和名：オセロット

英名：Ocelot

学名：*Felis pardalis*

分布：アリゾナからアルゼンチン北部



【オセロット】

### 〈オオヤマネコ属〉

ウ 和名：オオヤマネコ

学名：*Lynx lynx*

英名：*Eurasian lynx*

分布：西ヨーロッパからシベリア



【オオヤマネコ】

(財) 東京動物園協会提供

## (1) 動物の特徴と同定

中型ネコ類

食肉目、ネコ種動物のうちヒョウ属を除く。ネコ属、オオヤマネコ属 12 種類が特定（危険）動物に指定されている。ネコ科動物全種

CITES II

### ア ジャングルキャット

英名：Jungle cat

学名：Felis chaus

分布：エジプトからインドシナ半島

特徴：体色は砂色を帯びた褐色、黄褐色で四肢と顔面に 2 本の黒色のしま模様が見られ、尾には横しまがある。

体長：60～75 cm

尾長：25～35 cm

体重：7～13 kg

習性等：

- ・日中も活動が見られ、ネズミやカエル等を餌としている。
- ・妊娠期間は 66 日。1 産 2～5 仔。

CITES II

### イ オセロット

英名：Ocelot

学名：*Felis pardalis*

分布：中央アメリカからアルゼンチン北部

特徴：体色は黄褐色で黒い斑点としま模様が見られる。尾には輪状のしま模様がある。

体長：70～97 cm

尾長：27～40 cm

体重：11～16 kg

習性等：

- ・日中樹上で休息していることが多く、樹上生活に適応している。
- ・主に夜間活動し、カニ、トカゲ、小動物を餌としている。
- ・妊娠期間は 75 日。1 産 1～2 仔。
- ・寿命は飼育下で 20 年の記録がある。

CITES II

## ウ オオヤマネコ

英名：Eurasian Lynx

学名：*Lynx lynx*

分布：西ヨーロッパからシベリア、インド北部、中国朝鮮半島

特徴：体色は淡い灰色、黄褐色、暗かっ色、斑点が足などに見られる。耳の先端には、黒色の房毛が見られる。

体長：80～100 cm

尾長：10～20 cm

体重：18～38 kg

習性等：

- ・森林にすみ、夜行性で、リス、レミング、ノウサギ等の動物を餌としている。
- ・妊娠期間は63～74日。1産2～3頭。
- ・寿命は飼育下では26年8ヶ月の記録がある。
- ・カナダオオヤマネコ、スペインオオヤマネコと同種とされることもある。

CITES II

## (2) 保定方法とマイクロチップの埋込み

### ア 保定の方法

保定の基本はイヌと同じであるが、イヌに比べ体が柔軟に動く。牙とともに鋭い爪にも注意する。

#### A 器具を使用しない保定法

体重10kg以上の個体を人力で保定することは危険である。

#### B 器具を使用した保定法

10kg以下の個体なら深い玉網で捕獲する。捕獲後、厚手の革手袋か金属メッシュの手袋をはめ、頭の付け根を親指と人差し指でしっかりと確保し、次に四肢を保定する。保定できたら玉網とともに、あるいは玉網から動物を出して診療台やマットの上に横臥させる。

小型スクイズ・ケージの利用が可能なら、スクイズ・ケージに動物を収容し、ケージの可動壁を手前に引き寄せ、動物が動かないように固定する。

#### C 麻酔法

マイクロチップの埋込み処置は短時間で終了するため、原則的には深い麻酔は必要がない。成獣のネコ類は麻酔24時間から絶食、12時間前から絶水する。麻酔時は必要に応じ酸素吸入ができるように準備をしておく。ケタミン 5～10mg/kg 単独、ケタミン 3.0～5.0mg/kg とキシラジン 3～5.0mg/kg を併用して筋肉内に投与する。拮抗剤としてキシラジンに対してヨヒンビン 0.125mg/kg を筋肉内に投与する。

#### D 特に注意すべき事項

化学的保定の管理はイヌと同様である。肉眼で全身状態を観察するとともに呼吸数、体温、心拍数をモニターするなど定法に従う。

## イ マイクロチップの埋込みの方法

### A 埋込みの部位

肩甲骨間の皮下に埋めこむ。

### B マイクロチップ埋込みの実際

玉網に入れたままマイクロチップを埋込むときは、診察台ゴムマットの上で頭の付け根をしっかり持ち横臥姿勢とし、上記皮下に埋込み器の針を刺入する。

化学的保定時は、物理的保定時と同様に安全のために頭の付け根をつかみ、体の右を下にした横臥姿勢をとり、マイクロチップを埋込む。術部はイソジン綿か70%アルコール綿で消毒し、埋込み器の針を上記の皮下に穿刺しマイクロチップを埋込む。マイクロチップの脱落を防ぐため、皮膚の穿刺痕に外科用接着剤を塗布し、外用散剤を散布する。