

# 令和6年度 ヒアリ防除等に関する専門家会合

日時：令和7年2月17日(月)

15:00～17:00

場所：オンライン会議

## 議事次第

### 1. 開会

### 2. 出席者紹介

### 3. 議事

(1) 令和6年度のヒアリ対策の実施状況について

(2) 令和7年度のヒアリ対策(案)について

(3) その他

### 4. 閉会

## 資料一覧

資料１－１：令和６年度のヒアリ対策の実施状況

資料１－２：港湾調査の実施状況等の情報整理

資料１－３：マイクロカプセル化わさび成分によるヒアリのコンテナ貨物侵入阻止と  
シリコン樹脂充填によるコンテナヤードでのヒアリ営巣阻止技術（委員提供資料）

資料２：令和７年度のヒアリ対策（案）の概要

資料３：マニュアル類の主な変更点

参考資料１－１：令和６年度のヒアリ類確認状況（詳細）

参考資料１－２：侵入元への対策について

参考資料２：港湾におけるヒアリ類確認調査の実施状況

参考資料３：ヒアリ相談ダイヤル対応状況

参考資料４：ヒアリ類の確認事例に係る公表方法の見直し（案）

参考資料５：ヒアリ防除に関する基本的考え方 ver. 4. 1（案）

参考資料６：ヒアリ同定マニュアル ver. 3. 1（案）

## 出席者名簿

### 【出席者（敬称略）】

#### ■専門家

|       |                                               |       |
|-------|-----------------------------------------------|-------|
| 岸本 年郎 | ふじのくに地球環境史ミュージアム 教授                           | 【御欠席】 |
| 五箇 公一 | 国立研究開発法人国立環境研究所生物多様性領域<br>生態リスク評価・対策研究室 室長    |       |
| 坂本 洋典 | 国立研究開発法人国立環境研究所生物多様性領域<br>生態リスク評価・対策研究室 主任研究員 |       |
| 辻 和希  | 琉球大学農学部・鹿児島大学大学院連合農学研究科 教授                    |       |
| 橋本 佳明 | 兵庫県立大学自然環境科学研究所 特任教授                          |       |

（※専門家は五十音順）

#### ■環境省

|       |                        |
|-------|------------------------|
| 松本 英昭 | 自然環境局野生生物課外来生物対策室 室長   |
| 藤田 道男 | 自然環境局野生生物課外来生物対策室 室長補佐 |
| 田中 里奈 | 自然環境局野生生物課外来生物対策室 室長補佐 |
| 村澤 一樹 | 自然環境局野生生物課外来生物対策室 係員   |

#### ■事務局

一般財団法人自然環境研究センター

### 【オブザーバー（敬称略）】

#### ■関係省庁

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 木村 研太 | 財務省関税局業務課 係長                   |
| 那知 佑紀 | 財務省関税局業務課 調査主任                 |
| 中山 幸量 | 厚生労働省健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 課長補佐    |
| 茂呂 禎侑 | 厚生労働省健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 課長補佐    |
| 佐藤 裕範 | 厚生労働省健康・生活衛生局 がん・疾病対策課 専門官     |
| 古林 五月 | 農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 課長補佐 |
| 湊谷 陽太 | 農林水産省大臣官房みどりの食料システム戦略グループ 係長   |
| 山本 陽介 | 国土交通省港湾局総務課 専門官                |
| 中泉 陽成 | 国土交通省港湾局総務課 係長                 |
| 齊藤 雅彦 | 国土交通省港湾局港湾経済課 専門官              |
| 杉原 啓太 | 国土交通省航空局総務課危機管理室 主査            |

#### ■環境省

関東地方環境事務所野生生物課  
中部地方環境事務所野生生物課  
近畿地方環境事務所野生生物課  
中国四国地方環境事務所野生生物課  
中国四国地方環境事務所四国事務所野生生物課  
沖縄奄美自然環境事務所野生生物課  
沖縄奄美自然環境事務所石垣自然保護官事務所  
沖縄奄美自然環境事務所西表自然保護官事務所

## 令和6年度のヒアリ対策の実施状況

### 1. 基本方針

令和元年10月21日ヒアリ関係閣僚会議申合せ事項及び令和元年度に実施された緊急対応を踏まえ、引き続き複数の女王アリを含む大規模な集団への対応及び全国における水際対策を徹底するとともに、改正外来生物法による規制の強化及び関連指針や基準等の適切な運用を通じ、政府一丸となってヒアリの国内定着を防ぐ。

### 2. 法的規制の強化（環境省、農水省）

令和5年4月1日に全面施行した改正外来生物法に基づき、ヒアリ類と疑われる生物が付着等している貨物等の移動制限、移動禁止等の規定について引き続き適切に運用。

#### （実施概要）

要緊急対処特定外来生物に指定されたヒアリ類について、改正外来生物法の規定に基づき適切に対応。

### 3. 水際等における調査及び防除の徹底

#### ○港湾調査の実施（環境省、国交省）

- ・中国等と定期コンテナ航路を有する全国65港湾を対象に、年2回実施。特にヒアリの侵入の可能性が高い15港湾（外貨コンテナ取扱量の多い10港湾及びその他過去にヒアリが確認された5港湾）において、自治体や港湾管理者が実施する調査等と連携しながら、ヒアリの主な活動期間（春～秋）を通じて月1回程度調査を実施。

#### （実施概要）

各港湾で調査を実施。東京港、横浜港、名古屋港、大阪港においてヒアリを確認。

#### ○空港調査の実施（国交省、環境省）

- ・国際線が定期的に就航する全国15空港を対象に、年2回以上実施。特に貨物取扱量（国際）の多い3空港において、ヒアリの主な活動期間（春～秋）を通じて月1回程度調査を実施。
- ・その他の空港は国際線の就航実績に応じて実施。
- ・貨物取扱量（国際）の多い3空港の周辺部において、ヒアリのモニタリングを実施。

#### （実施概要）

全国17空港を対象に実施。（国際貨物便が定期的に就航している14空港は年2回実施。特に国際貨物取扱量の多い3空港においては、ヒアリの主な活動期間（春～秋）を通じて月1回程度調査を実施。）現時点で調査によるヒアリ発見実績はなし。

全国の空港関係者等に対し、ヒアリの混入の防止とヒアリと疑われるアリの発見した場合の行政への連絡の徹底を要請。

国際貨物取扱量の多い6空港の周辺部において、ヒアリのモニタリングを実施し、ヒアリ発見実績はなし。

○植物防疫所におけるヒアリ調査の実施（農水省）

- ・ 輸入植物検査時に荷口の目視調査を実施。
- ・ ヒアリと疑われる昆虫の同定依頼への対応を実施。

**（実施概要）**

令和6年4月から令和7年1月までの間、輸入植物検査時の荷口の調査では発見実績は1件。また、ヒアリと疑われる昆虫の同定依頼が16件あり、ヒアリと同定されたものは0件。

○大規模な集団への対応（福山港及び博多港周辺地域）（環境省）

- ・ 港湾地域及び周辺において、生息リスクの高い場所を中心に春季及び秋季に可能な限り面的にヒアリ確認調査を実施。
- ・ 自治体等が実施する各管理施設等での調査と連携して実施。
- ・ 港湾関係者、関係事業者等への注意喚起を実施。さらに関係自治体を通じた住民、利用者への注意喚起を実施。

**（実施概要）**

福山港及び博多港周辺地域において、港湾施設や事業者敷地、公園、緑地、道路等を対象に極力面的にヒアリ確認調査を実施。春と秋の2回の調査を実施し、集団の拡散は確認されず。

○ヒアリ確認地点での防除（環境省、国交省）

- ・ 発見個体はすべて殺虫処分し、確認地点の周辺2kmにおいて確認調査を実施。
- ・ 周辺2kmの調査は、フォローアップとして確認の年から3シーズン目まで実施。

**（実施概要）**

令和6年5月から11月までに計24事例を確認。関係機関と連携して薬剤による駆除及びモニタリングを実施するとともに、必要に応じて周辺調査を実施し、集団の拡散は確認されず。

#### 4. 関係機関・関係者との連携体制の強化

○ヒアリ類に係る対処指針の適切な運用（環境省、国交省、経産省その他省庁）

- ・ 改正外来生物法を受け、環境省及び国交省が令和5年4月25日に公布した「ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）に係る対処指針」の内容について、対象事業者への一層の周知を図るとともに、当該指針に基づき、事業者がヒアリ類発見時の通報体制の整備やヒアリ類の侵入・定着を防止するための措置をとるよう適切に運用。
- ・ 関係者との連携及びモニタリング強化を目的に四日市港において実施してきたモデル港の取組や、令和6年3月に策定された「四日市港ヒアリ類対策マニュアル」を踏まえ、同様の取組について各港湾の状況に応じて関係事業者への周知を実施。

**（実施概要）**

対処指針に基づくヒアリ類発見時の連絡体制の整備やとるべき拡散防止措置などについて、国土交通省の協力を得て四日市港をモデルに取りまとめた「四日市港ヒアリ類対策マニュアル」も活用しながら、ヒアリ講習会等の様々な機会を通じて、関係行政機関と協力して関係事業者への周知を実施した。

○ヒアリ類の消毒、廃棄基準の適切な運用（環境省）

- ・改正外来生物法を受け、令和5年5月に公布された消毒、廃棄基準に基づき、ヒアリが発見された際に適切に消毒、廃棄が行われるように運用。

**（実施概要）**

ヒアリ類が発見された場合には、消毒・廃棄基準に基づき適切に対応を行った。

○水際・防災対策連絡会議の枠組みを活用した情報共有と連携強化（国交省、環境省）

- ・水際・防災対策連絡会議の枠組みを活用し、ヒアリ対策の関係者による情報共有やヒアリ対処指針に関する関係者への詳細な説明の場を設ける等連携強化を推進。

**（実施概要）**

全国の水際・防災対策連絡会議に環境省地方環境事務所も参加し、連携を強化するとともに、ヒアリ同定時の情報を関係者に横断的かつ迅速に展開するなどの情報共有を実施した。

○輸入事業者等向け協力依頼（国交省、農水省、経産省、財務省、国税庁）

- ・ヒアリ類に係る対処指針に基づくヒアリ類発見時の連絡体制の整備やとるべき拡散防止措置などについて関係事業者等に周知を徹底する。
- ・侵入元対策の必要性や技術情報等について、専門家からの最新の提案を踏まえ情報提供を実施。

**（実施概要）**

令和6年9月に国土交通省及び環境省から協力を依頼し、各省庁から関係団体に対処指針の内容に関する周知を実施。

○船会社等への協力依頼（国交省）

- ・ヒアリが生息する国から我が国に寄港している国内外の主な船会社等に対し、ヒアリに関する情報収集を依頼。

**（実施概要）**

令和6年9月に、国土交通省から船会社等の関係団体に協力依頼を実施。

## 5. 新規技術による対策の強化

○新規技術の導入や関係者との協力による水際対策の強化（国交省、環境省）

- ・効果的な除草や舗装面の簡易な補修技術の導入等による港湾管理の向上。
- ・ヒアリ探知犬や画像判定技術等の技術導入による調査の効率・効果の向上の検討。
- ・人材育成や役割分担を通じた体制の強化。

**（実施概要）**

環境省において、ヒアリが入り込む舗装面のひび割れなどの簡易な補修技術やわさび成分入りシートなどの新規技術（環境研究総合推進費の研究成果）について、ヒアリ講習会等の様々な機会を通じて、関係事業者への周知を実施した。

## 6. 侵入元への対策

○関係者と協力した侵入予防対策（環境省、国交省、農水省、経産省、国税庁）

- ・中国との連携・協議を継続。
- ・日中韓三カ国環境大臣会合、日中韓生物多様性政策対話、生物多様性条約等の枠組みを活用した国際連携の強化。
- ・日中韓外来種専門家会合を開催し、新規技術を含む各国のヒアリ対策について情報共有や意見交換を実施。
- ・わさび成分やワンプッシュ製剤等の新規技術の検討と事業者による導入の促進。

**（実施概要）**

令和6年7月に日中韓外来種専門家会合を開催し、ヒアリを始めとする侵略的外来種について、三カ国の専門家及び行政担当者が、科学的な見地から対策に関する議論や情報交換を実施。併せて港湾の視察も行い、ヒアリ防除に関する最新技術として、シリコン樹脂充填によるコンテナヤード補修技術やわさび成分入りシートを実演、紹介した。議長サマリーを取りまとめ、引き続き意見交換、協力を行うことを確認した。また、その成果は同年9月に開催された日中韓三カ国環境大臣会合において歓迎された。

**7. 情報発信及び普及啓発**

○国民への情報発信（全省庁）

- ・ヒアリ相談ダイヤルやチャットボット、HP等を通じ、常時正確な情報を提供。
- ・地方公共団体等と連携して適時・適確な情報発信を行い、ヒアリに対する正しい理解を広め、国を挙げた定着防止の取組に理解と協力を得る。

**（実施概要）**

ヒアリ相談ダイヤルで継続的に問合せに対応（令和6年4月～令和7年1月末まで対応件数約460件）。チャットボット（自動相談受付）では深夜・休日を含め5.5万件以上（令和6年4月～令和7年1月末）のアクセスに対応。

○関係者へのヒアリ講習会の内容・参加機会の充実（環境省）

- ・自治体・事業者向けのヒアリ講習会を引き続き開催し、ヒアリ類に関する基礎知識や対処指針に基づきとるべき措置等について普及啓発を図る。また、オンライン開催も併用することで幅広い参加者の参加機会を確保するとともに、開催に当たっては関係府省庁と連携して周知を図る。

**（実施概要）**

ヒアリ類の主な導入経路となっている海上コンテナのヒアリ類の確認方法などについての実習を含む、港湾関係者向けヒアリ講習会を令和6年12月～令和7年1月に東京（川崎）、名古屋、大阪で実施し、対面で約160人、オンラインで約120人が参加。また、行政向けヒアリ講習会を令和7年1～2月にかけて札幌、仙台、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡の7都市でオンラインを併用しつつ開催中であり、約230人が参加（予定含む）。

○消防関係機関・医療関係機関への注意喚起（消防庁、厚労省）

- ・都道府県の関係部局、消防関係機関及び日本医師会等の医療関係機関に対して、ヒアリに刺された場合の傷病者に対する適切な対応や留意事項について周知を図る。

**（実施概要）**

資料 1-1

都道府県の関係部局、消防関係機関及び日本医師会等の医療関係機関に対して、「ヒアリに関する対応について」（令和6年7月12日付け消防庁救急企画室事務連絡）及び「ヒアリに刺された場合の医療的留意事項について」（令和6年7月12日付け厚生労働省健康・生活衛生局がん・疾病対策課事務連絡）を発出。

港湾調査の実施状況等情報整理

平成 29 年（2017 年）以降、全国の港湾及び空港において、ヒアリの侵入に対応した水際対策を継続的に実施している。今後の対策に当たっては、これまでの対策を通じて得られた知見や現地の状況等を踏まえた、侵入防止及び防除の実効性を高めるためのアップデートが重要となる。このため、現在までの港湾での調査の実施状況等を整理した。

1. 港湾等の状況整理

（1）65 港湾調査対象港湾の状況について

1）輸入貨物量とヒアリ確認事例数

各港湾における主なヒアリ定着国・地域からの輸入貨物量と比較すると、ヒアリの確認事例数は、これらの国・地域からの貨物の取り扱いが多い港湾ほど多い傾向となっている。これらの港湾については、今後も数年単位で貨物量や品目、貨物の輸入元の組成に大きな変化があるとは考えにくく、引き続きヒアリの侵入機会の多い港湾であると考えられる。

ただし貨物取扱量の少ない港湾でも確認事例が多い港湾もあることや、令和 4 年には福山港のコンテナから大規模なコロニーが見つかるような事例もあり、ヒアリ定着国・地域からの輸入がある港湾については、取扱貨物量による侵入機会の多寡に関わらず、ヒアリの侵入リスクが常に存在するため、どの港湾においても、引き続き監視や港湾管理の体制の維持・構築が望まれる。




図 1. 主なヒアリ定着国・地域からの輸入貨物量(上位 20 港)と港湾におけるヒアリの確認事例数  
(国土交通省令和 5 年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査、および環境省発表ヒアリ確認 135 事例より)

2）65 港湾調査における情報整理

全国 65 港湾におけるヒアリ確認調査では、調査対象地においてヒアリ類の確認の他、ヤードの亀裂や植栽、雑草繁茂状況について「多い～少ない」といった定性評価によりヒアリ類が営巣可能な場所についての確認を行っている。また確認調査にあたっては GPS ロガーによる踏査ルート履歴をとっている。これらのデータは、今後の対策を検討する材料として活用することを想定している。

65 港湾調査にあたっては、多くの場合、コンテナが配置されている場所を中心に実施されている。これまでの発見状況を考慮すると、調査における確認の優先度は、コンテナを配置している場所が中心となる。一方で、コンテナ未配置の場所でも、ヒアリ類の生息に適した環境があれば、侵入後ヤード内において拡散し容易に生息することが可能であり、今後ヒア리를定着させないためには、コンテナヤード内の雑草などの状況を把握するとともに、別途環境省が定める「ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）に係る対処指針」等に準じたコンテナヤード内の適切な環境管理や監視体制の取組が重要である（例：四日市港ヒアリ類対策マニュアル）。

次年度以降の調査に向けて、調査状況を整理するため、環境省で実施している 65 港湾調査の調査対象区内に 6m 四方のグリッドを発生させ、65 港湾調査の踏査ルート履歴と重なるグリッドを抽出した。四日市港の踏査状況を例にとると、令和 4 年度から令和 6 年度までに実施されている踏査履歴を重ね合わせると 3 年間の調査を通じて、調査可能な範囲はほぼ全面がカバーできているが、3 年間のうち 1 箇年しか踏査できていない範囲や一度も踏査できていない範囲も存在する。これらの踏査が不十分な地点については、今後可能な限り調査を行うことが望ましい（図 2）。なお、この整理に使用したグリッドは機械的に発生させたものであり、調査当日のコンテナヤードの混雑状況やコンテナの配置状況を考慮しておらず、また工事箇所や管理棟などの調査員が立ち入って調査ができない部分にも発生していることに留意が必要である。

次年度以降のヒアリ調査における踏査にあたっては、当日のコンテナの配置による調査可能範囲だけではなく、これらの踏査履歴を考慮に入れ、踏査範囲における見落とし部分の発生を最小限にとどめるように実施する必要がある。また、令和 5 年には、博多港アイランドシティのコンテナヤード外側のフェンス沿いの地表面でヒアリが確認される事例があったことから、ヤード内だけに限らず定期的な周辺調査も含めて行われることが望まれる。

## 【個票でのデータ取りまとめ例】

| ヒアリ調査対象地（調査員が確認したヒアリの発生状況） |                  |                            |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| 区画                         | 項目               | 調査結果<br>(調査員が確認したヒアリの発生状況) | 備考               |
| 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
| 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
| 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
| 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |
|                            | 調査員が確認したヒアリの発生状況 | 調査員が確認したヒアリの発生状況           | 調査員が確認したヒアリの発生状況 |





図 2. 港湾における調査実施状況の一例(上段:四日市港北ふ頭、下段:四日市港南ふ頭及び浜園ふ頭)

赤丸地点は管理棟、上屋等の建造物が存在


※地理院地図(標準地図)を背景に加工・作成

# マイクロカプセル化わさび成分によるヒアリのコンテナ 貨物侵入阻止とシリコン樹脂充填によるコンテナヤード でのヒアリ営巣阻止技術

資料 1 - 3




# ヒアリ侵入は中国からのコンテナ



## コンテナ積載国

- 中国
- ジブチ (via Ningbo Port, 中国積み替え)
- ベトナム (via Hong Kong Port, 中国積み)
- イタリア (via Shekou Port, 中国積み替え)
- フランス (via Singapore Port, 中国積み替え)
- 台湾
- 米国 (航空コンテナ)



2017年6月以降の確認事例は、18都道府県で135事例

# 中国南部広東省は洪水地帯




<https://www.aljazeera.com/news/2017/5/11/the-annual-plum-rains-in-east-asia>

台風来襲翌日のコンテナ



# 日本各地の主要港湾でヒアリの営巣



**2024年12月時点11港湾で96件の営巣確認**

# なぜ、ヒアリがヤードで営巣できる？



364日・24時間稼働している主要港湾のコンテナヤードでは、大規模な補修工事は不可能で、舗装面に経年劣化が生じている

# 港湾の背地は都市圏

人口密集地でヒアリの定着が起こる最悪のシナリオ



有翅女王の飛翔分散

コンテナヤード  
で営巣

ヒアリの新女王アリは母巢から1.6から5.4kmほど飛翔でき、風などに乗ると最大30kmも分散して、創巢することが知られている。

# **ヒアリの国内定着を阻止するには**

- 1. ヒアリのコンテナ貨物への侵入を阻止する**
- 2. 国内定着の橋頭堡であるコンテナヤードでのヒアリ営巣を阻止する**

# マイクロカプセル化わさび成分による ヒアリのコンテナ貨物侵入阻止



海上コンテナに紛れ込んでいたヒアリ



# わさび成分（AITC）は食品由来で，健康被害や環境汚染の懸念が無い強力な忌避剤



**AITC**  
**過剰揮発**




高い揮発性と刺激性をコントロールできれば，食品から機械部品まで様々な貨物で使用でき，コンテナ貨物へのヒアリ忌避剤として最適！

# マイクロカプセル化わさびシート

## ポリエチレン樹脂にAITCを包埋

徐放性



AITCの放出期間や  
濃度などを調整可能



AITCの刺激性  
を緩和できる



利便性



梱包資材として  
取り扱える

AITCをマイクロカプセル化し，揮発性・刺激性をコントロールすることで，広く梱包資材として利用可能な樹脂製品化に成功（日本の技術）

# ヒアリは、特に「わさび」の香りが苦手

## わさび成分AITCによる忌避，殺虫効果は検証済み





マイクロカプセル化わさびシート

# 実物コンテナを使ったヒアリの忌避効果実験



# 実物コンテナを使ったヒアリの忌避効果実験

## 7日後にコンテナを開封



# コンテナ貨物の上と下に設置したわさびシートで ヒアリの忌避効果を確認

4X3枚

6X3枚

わさびシート上



ヒアリ50匹




わさびシート下



ヒアリ生存率




ヒアリ生存率



貨物にわさびの匂い  
移りが生じないこと  
を、嗅覚鑑定士によ  
る官能評価で確認

コンテナ貨物へのわさびシート設置の手間を軽減可能

# マイクロカプセル化わさび成分を用いた ヒアリ忌避コンテナ輸送のスキーム




☆ 環境省主催のモデル事業として中国（上海）等からの海上コンテナへのわさびシート同梱を実施済み

# コカミアリもワサビが苦手

- 特定外来生物であるコカミアリ(*Wasmannia auropunctata*)  
に対しても、マイクロカプセル化わさびシートが燻蒸  
殺虫効果を発揮することを台湾での実験で確認



# アカカミアリの確認件数



ヒアリだけでなく、特定外来種アカカミアリの侵入確認も止まらない

# アカカミアリもワサビが苦手

- 特定外来生物であるアカカミアリ(*Solenopsis geminata*) に対しても、マイクロカプセル化わさびシートが忌避殺虫効果を発揮することを台湾での実験で確認



# わさびシートは海上コンテナによる 外来生物の導入率減少に貢献できる

mAITCシートは湿度に反応して、多くのガスを放出



海上コンテナは輸送中  
に結露が起こりやすい



外来種の一括燻蒸

mAITCシートは湿度に反応して、多くのガスを放出

- AITCはヒアリのような昆虫だけでなく、節足動物、脊椎動物や植物、菌類など広い範囲の生物にも忌避や燻蒸効果を有し、海上コンテナを介した外来種導入率の削減に貢献可能

# シリコン樹脂充填によるコンテナ ヤードでのヒアリ営巣阻止



## 新規開発シリコン樹脂 Niche Pro

# 未補修コンテナヤードはヒアリの好営巣場所

イネ科等植物  
(種子は餌源)



アスファルト  
舗装  
4cm

## コンテナ

- 夏の高温や冬の低温は舗装やコンクリート板、コンテナなどの構造物によって避けられる
- イネ科植物などの雑草は、餌源や蜜源になり、さらに、その根は土中水分量を好適化
- 目立つアリ塚ができないので、人知れず大量の新女王を飛翔・分散

コンテナ載荷板  
(コンクリート)

↑  
23cm  
↓

路盤 (土壌)

営巣場所



裏込グラウト  
(ドライモルタル)

# 従来のコンテナヤード 亀裂補修法 アスファルト系注入剤

長い作業時間が必要

- 特殊な機材や技術習得が必要  
加熱式注入機などの大型機材  
常温硬化型充填材は有機溶剤
- 粘性が高く浸透性が低い  
細い亀裂の充填は難しい

特殊な機材



\* ヒアリの頭幅は1.2~0.72mmで、細い亀裂を巣口にする


# 新規開発シリコン樹脂 Niche Pro

高い浸透率




粘性係数 70 mPas

高い引張強度



抗張力 29 %



シリコン樹脂：無毒

超高速硬化



指触乾燥時間 20分

高い耐候性



促進耐候性試験 1320時間



高い浸透性と超高速硬化性によって、簡便で短時間の補填作業が可能

# シリコン樹脂による亀裂補修 コンテナヤードの1レーンを60分で施工




# シリコン樹脂による亀裂補修 マニュアル化



- 環境省とともに、東京港をはじめ、ヒアリの営巣が確認された10港湾のコンテナヤードで、シリコン樹脂による亀裂補填の実験施工を行い、その施工法を確立し、マニュアル化して公表した  
(<https://youtu.be/Gm30coJjUGw?si=qlHBar8nyq0-orXz>)
- NICHE Pro Agri 1kgあたり7000円（税込み7700円）


# シリコン樹脂補填の高い防草性



- 植物体を含浸して枯死
- 種子の発根を阻止

# コンテナヤードの路面温度

8月の平均路面温度



# シリコン樹脂補填技術は外来種の 国内定着率減少に貢献できる

## 未補修のヤードは外来生物国内定着の橋頭堡

生物が生息できる環境



未補修のコンテナヤード



シリコン樹脂



外来生物の定着を阻止

COP15

2030 年までに侵略的外来生物の国内定着率を 50%削減

# 新規技術は社会実装化済み

## マイクロカプセル化わさびシート

食品加工にも使われているわさび成分「アリルからし油」を使用  
物流用副資材  
輸出入製品の防カビ・抗菌・防虫対策に

PRD CO.,LTD

wasap<sup>™</sup>  
わさびー

wasap<sup>™</sup> オンラインショップ

wasap<sup>™</sup>  
わさびー

（有効成分）わさびの油  
アリルからし油  
（食品添加物にも使用されている成分）

わさびの成分を活かした抗菌・防カビ・消臭・防虫剤  
「わさびー」は、わさびの成分【アリルからし油】を  
有効成分として、様々な用途に使用可能に開発した製品です。

株式会社PRDから  
販売

<https://www.wasap.jp/item.php>

## シリコン樹脂

SC TI 一社）小規模保全技術研究所  
smart conservation technology institute

HOME ABOUT 施工事例 資

外来生物や雑草の繁茂を  
樹脂でコントロールする

強力な粘着性樹脂  
Niche Pro  
Agri コンクリート・防水層用樹脂

業務専用  
VOC 無害な環境にやさしい

安全対策  
【使い方】 土壌に雑草が生える前に、コンクリートや防水層に塗布します。乾燥後は、雑草の根が伸びて土壌に侵入するのを防ぎ、雑草の生育を抑制します。また、コンクリートや防水層の劣化を防ぎ、耐久性を向上させます。

Niche Pro Agri

¥8500 /kg

目地から生える雑草の抑制  
農業用水路の補修  
発注量により価格変わりますのでお問い合わせください

見積依頼はこちら

— NICHEシリーズの特徴

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 安全性<br>高い安全性               | 低粘度<br>浸透性が高く、細かい亀裂にまで浸透して硬化する。       |
| 痩せない<br>固形分が約99%で硬化後も痩せない。 | 誰でも施工ができる<br>工具要らずの簡単施工。誰でも簡単に施工できます。 |

社団法人小規模保  
全技術研究所から  
販売

<https://conservation-tec.org/>

## 令和 7 年度のヒアリ対策（案）の概要

### 1. 水際等における調査及び防除の徹底

- 全国港湾での定期調査
- 空港及びその周辺での調査
- 植物防疫所におけるヒアリ調査の実施
- ヒアリ確認地点及び過年度確認地点での防除の徹底【別紙】
- 自治体との連携・協力
- 輸入事業者等への注意喚起、協力依頼文書の発出

### 2. 関係機関・関係者との連携体制の強化

- ヒアリ対処指針及び消毒廃棄基準の適切な運用
- 水際・防災対策連絡会議を活用した連携強化の継続
- 対処指針に基づくヒアリ類発見時の初動対応などの周知徹底（四日市港ヒアリ類対策マニュアルの活用等）

### 3. 新規技術による対策の強化

- 港湾におけるヒアリ対策に有効な技術の社会実装の推進（シリコン樹脂充填による舗装補修技術等、環境研究総合推進費の研究成果の活用）
- 効率的・効果的な調査手法の実証結果を踏まえた検討

### 4. 侵入元への対策

- 中国との連携・協議の継続、日中韓環境大臣会合（TEMM）や日中韓外来種専門家会合等の議論の場を活用した国際連携の強化の働きかけ
- コンテナの清浄化に効果のあるわさび成分入りシートやワンプッシュ式エアゾール剤といった新規技術の、事業者による導入促進を図るための優良事例を形成

### 5. 情報発信及び普及啓発

- ヒアリ相談ダイヤルを引き続き毎日開設
- HP 等による適時の情報提供（報道発表に係る基準の見直し）
- ヒアリへの注意喚起・関心を高めるため、一般向けの情報発信を図る

## 【別紙】過年度確認事案にかかる取組

### 1. 複数の女王アリを含む大規模な集団への対応

- ・福山港国際コンテナターミナルで陸揚げされたコンテナ関係（令和4年10月コンテナ内で確認）

○令和6年度調査で拡散が確認されなかったことから調査を終了

- ・博多港アイランドシティ（令和5年11月確認地点）

○令和8年度まで、春・秋に、確認地点及び周辺地域の面的調査を実施

※関係機関が実施する調査と時期・場所を調整しながら実施

### 2. その他のヒアリ確認地点

- 新たな確認地点等のフォローアップ調査（確認地点において確認から3シーズン目まで継続する調査）を実施。

## マニュアル類の主な変更点

環境省では、ヒアリ同定マニュアル及びヒアリの防除に関する基本的考え方を平成 30 年に整備し、必要に応じて適宜改訂している。令和 6 年度においては、大きな変更点はないが、時点修正等一部下記の通り修正し、改訂版を公開する見込みである（公開時期：令和 7 年春頃）。

## （１）ヒアリの防除に関する基本的考え方の改訂

令和 5 年度ヒアリ専門家会合で提示した「ヒアリの防除に関する基本的考え方 Ver.4.1（案）」に対する議論等を受けて修正案を作成した（参考資料 5）。

## ●主な改訂内容

## ＜全体共通＞

- ・ 確認事例等の時点修正。

## ＜改訂履歴の更新＞

- ・ これまでの改訂履歴を更新。

## ＜これまでの発見事例＞

- ・ 確認事例の一覧表を都道府県ごとの事例一覧に変更。

## ＜ヒアリと疑わしいアリを確認したときの連絡体制＞

- ・ フロー図について、現時点の状況と「ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）に係る対処指針」の解説資料の URL やサムネイル画像を追加。

## ＜ヒアリの基本的な防除に関する考え方＞

- ・ 粘着トラップとの混同を避けるため、「ベイトトラップ」を「ベイト」に変更。

## ＜コラム⑤＞

- ・ 国際貨物取扱量の比較的小さい港湾でもヒアリ確認事例があることから留意は必要である点を記載。

## ＜各主体による取組例＞

- ・ 四日市港ヒアリ類対策マニュアルの取組例を追加し、URL やサムネイル画像を追加。

## （２）ヒアリ同定マニュアルの改訂

現在公開されている「ヒアリ同定マニュアル Ver.3.0」の改訂及び修正を行い、「ヒアリ同定マニュアル Ver.3.1」とした（参考資料６）。

### ●主な改訂内容

＜ヒアリと疑われるアリの発見・同定フロー＞

- ・連絡元に向かう点線による矢印は、発見者目線では不要と判断して削除。

＜【参考】同定用サンプルの保存法＞

- ・サンプル瓶がどのようなものかが分かるよう、参考写真を追加掲載。


# 令和6年度のヒアリ確認状況（R7年1月時点）

参考資料1－1

| 番号 | 確認地点                  | 公表日   | 確認状況              | 個体数    | 女王等の有無           | 出港地                                                 |
|----|-----------------------|-------|-------------------|--------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 5/22  | コンテナヤード：空コンテナ内    | 1000以上 | 有翅女王アリ20個<br>体以上 | 中国・蛇口港（厦門港経由）                                       |
|    | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）       | 6/11  | コンテナヤード地面         | 3      | －                | －                                                   |
| 2  | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）       | 6/11  | コンテナヤード地面         | 約10    | －                | －                                                   |
| 3  | 東京都江東区（東京港青海ふ頭）       | 6/17  | コンテナヤード地面         | 約100   | －                | －                                                   |
| 4  | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 6/19  | コンテナヤード地面         | 約50    | －                | －                                                   |
| 5  | 神奈川県横浜市（横浜港南本牧ふ頭）     | 6/24  | コンテナヤード地面         | 約60    | －                | －                                                   |
| 6  | 大阪府大阪市（大阪港）           | 6/28  | コンテナヤード地面         | 約550   | －                | －                                                   |
| 7  | 愛知県飛島村（名古屋港飛島ふ頭）      | 7/10  | コンテナヤード地面         | 約60    | －                | －                                                   |
| 8  | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）       | 7/12  | コンテナヤード地面         | 約120   | －                | －                                                   |
| 9  | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 7/25  | コンテナヤード地面         | 約200   | －                | －                                                   |
| 10 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 7/25  | コンテナヤード地面         | 約60    | －                | －                                                   |
| 11 | 東京都大田区（東京港中央防波堤外側コンテナ | 7/30  | コンテナヤード地面         | 約620   | －                | －                                                   |
| 12 | 兵庫県神戸市                | 8/15  | 事業者敷地内：コンテナ内      | 1      | －                | 中国・天津港                                              |
| 13 | 大阪府大阪市（大阪港）           | 8/23  | コンテナヤード地面         | 約600   | －                | －                                                   |
| 14 | 愛知県一宮市                | 8/30  | 事業者敷地内：コンテナ内      | 約1000  | 蛹                | 中国・蛇口港                                              |
| 15 | 神奈川県横浜市（横浜港南本牧ふ頭）     | 9/5   | コンテナヤード地面         | 約70    | －                | －                                                   |
| 16 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 9/20  | コンテナヤード地面         | 約50    | －                | －                                                   |
| 17 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 9/20  | コンテナヤード地面         | 約50    | －                | －                                                   |
| 18 | 東京都大田区（東京港中央防波堤外側コンテナ | 9/30  | コンテナヤード地面         | 約300   | －                | －                                                   |
| 19 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）       | 10/7  | コンテナヤード地面         | 約50    | －                | －                                                   |
| 20 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）       | 10/7  | コンテナヤード地面         | 約70    | －                | －                                                   |
| 21 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 10/10 | コンテナヤード地面         | 約50    | －                | －                                                   |
| 22 | 東京都江東区（東京港青海ふ頭）       | 10/16 | コンテナヤード地面         | 約80    | －                | －                                                   |
| 23 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）      | 11/6  | コンテナ外面及びコンテナヤード地面 | 約60    | －                | オーストラリア・アデレード<br>港（シンガポール・シンガ<br>ポール港、中国・厦門港経<br>由） |
| 24 | 愛知県飛島村（名古屋港飛島ふ頭）      | 11/20 | コンテナヤード地面         | 約30    | 幼虫               | －                                                   |

- ・ **計24事例** ※H29：26事例、H30：12事例、R1：10事例、R2：16事例、R3：20事例、R4：8事例、R5：19事例
- ・ ほとんどが**65港湾調査での確認かつコンテナヤード内の地面での確認**
- ・ コンテナ内やコンテナ外面での確認事例4件はいずれも**中国由来または中国経由**

# 65 港湾におけるヒアリの確認状況



# 令和6年度のアカカミアリ確認状況（R7年1月時点）

| 番号 | 確認地点                     | 確認日  | 確認状況                          | 個体数   | 女王等の有無 | 出港地    |
|----|--------------------------|------|-------------------------------|-------|--------|--------|
| 1  | 福岡県博多区（福岡空港）             | 4/16 | 植物防疫所の検査にて発見                  | 1     |        | タイ王国   |
| 2  | 兵庫県神戸市（神戸港）              | 4/25 | 事業者敷地内：コンテナ内                  | 約10   |        | 台湾     |
| 3  | 東京都品川区（東京港品川ふ頭）          | 6/7  | バンブール地面                       | 約10   |        | —      |
| 4  | 東京都江東区（東京港青海ふ頭）          | 6/12 | コンテナヤード内3カ所で確認。いずれも土中の出入りを確認。 | 計約400 | —      | 中国 廈門港 |
| 5  | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）         | 6/14 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約600  | —      | —      |
| 6  | 神奈川県横浜市（横浜港南本牧ふ頭）        | 6/19 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約200  | —      | —      |
| 7  | 愛知県飛島村（名古屋港飛島ふ頭）         | 6/19 | バンブール：空コンテナ内                  | 100以上 | 蛹：数十   | 中国 三水港 |
| 8  | 大阪府大阪市（大阪南港）             | 6/21 | コンテナヤード地面                     | 約50   | —      | —      |
| 9  | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）          | 6/27 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約30   | —      | —      |
| 10 | 香川県高松市（高松港）              | 6/30 | コンテナヤード地面                     | 約200  | —      | —      |
| 11 | 静岡県静岡市（清水港新興津ふ頭）         | 7/4  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約100  | —      | —      |
| 12 | 茨城県東海村（茨城港常陸那珂港区北ふ頭）     | 7/8  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約150  | —      | —      |
| 13 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）          | 7/24 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約20   | —      | —      |
| 14 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）          | 7/24 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約20   | —      | —      |
| 15 | 東京都江東区（東京港青海ふ頭）          | 7/25 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約650  | —      | —      |
| 16 | 東京都大田区（東京港中央防波堤外側コンテナふ頭） | 7/26 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約20   | —      | —      |
| 17 | 千葉県千葉市（千葉港千葉中央地区）        | 7/26 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約10   | —      | —      |
| 18 | 愛知県弥富市（名古屋港鍋田ふ頭）         | 7/29 | コンテナヤード地面                     | 約50   | —      | —      |
| 19 | 静岡県静岡市（清水港新興津ふ頭）         | 8/2  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約200  | —      | —      |
| 20 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）         | 9/2  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。          | 約70   | —      | —      |

# 令和6年度のアカカミアリ確認状況（続き）

|    |                   |       |                                                 |      |   |                                       |
|----|-------------------|-------|-------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------|
| 21 | 静岡県御前崎市（御前崎港）     | 9/5   | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約150 | — | —                                     |
| 22 | 静岡県静岡市（清水港新興津ふ頭）  | 9/5   | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約300 | — | —                                     |
| 23 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）   | 9/9   | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約200 | — | —                                     |
| 24 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）   | 9/11  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約150 | — | —                                     |
| 25 | 静岡県御前崎市（御前崎港）     | 9/25  | 事業者敷地内：積荷                                       | 約40  | — | インド・ナバシェバ港<br>（シンガポール・シン<br>ガポール港で積替） |
| 26 | 愛知県飛島村（名古屋港飛島ふ頭）  | 9/29  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約500 | — | —                                     |
| 27 | 神奈川県横浜市（横浜港南本牧ふ頭） | 10/1  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約50  | — | —                                     |
| 28 | 東京都品川区（東京港大井ふ頭）   | 10/3  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約500 | — | —                                     |
| 29 | 愛知県飛島村（名古屋港飛島ふ頭）  | 10/6  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約100 | — | —                                     |
| 30 | 神奈川県横浜市（横浜港本牧ふ頭）  | 10/8  | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約50  | — | —                                     |
| 31 | 東京都江東区（東京港青海ふ頭）   | 10/11 | コンテナヤード地面。土中の出入りを確認。                            | 約950 | — | —                                     |
| 32 | 大阪府大阪市（大阪港）       | 10/15 | 事業者敷地内：コンテナ内及び周辺<br>コンテナヤード地面<br>いずれも土中の出入りを確認。 | 約430 | — | ベトナム                                  |
| 33 | 静岡県島田市            | 10/28 | 事業者敷地内：積荷                                       | 約300 | — | メキシコ                                  |

## ・計33事例で、例年より大幅に増加


※H29：19事例、H30：18事例、R1：18事例、R2：20事例、R3：20事例、R4:20事例、R5:21事例

## ・ほとんどがコンテナヤード内の地面での確認

## ・確認個体数は数百個体程度の事例が多い

## ・コンテナ内や積荷内での確認事例の出港地はタイ、台湾、中国、インド（シンガポール経由）、ベトナム、メキシコと多様

# 65 港湾におけるアカカミアリの確認状況



## ご意見を伺いたい点

- 近年の気候の変化（真夏の港湾調査時の気温が非常に高くなっていること等）を踏まえた対応について
- アカカミアリの確認件数が過去最多（例年は20件程度であるところ今年度は33件）となっていることへの対応について
- その他、個別の確認事例の対応についてご意見・ご助言等があればいただきたい。

# 過年度の大規模事案に係るフォローアップ調査の実施状況

| 港湾名            | R1               | R2                 | R3                 | R4                        | R5                        | R6<br>(今年度)        | R7<br>(予定)         |
|----------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|
| 東京港<br>(青海ふ頭)  | 多数の女王アリを含むコロニー確認 | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) | 周辺2km程度調査<br>(春・秋)<br>→終了 |                           |                    |                    |
| 名古屋港<br>(飛島ふ頭) |                  | 多数の女王アリを含むコロニー確認   | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) | 周辺2km程度調査<br>(春・秋)<br>→終了 |                           |                    |                    |
| 大阪港<br>(咲洲)    |                  |                    | 多数の女王アリを含むコロニー確認   | 周辺2km程度調査<br>(春・秋)        | 周辺2km程度調査<br>(春・秋)<br>→終了 |                    |                    |
| 福山港            |                  |                    |                    | 多数の女王アリを含むコロニー確認          | 周辺2km程度調査<br>(春・秋)        | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) |                    |
| 博多港            |                  |                    |                    |                           | 多数の女王アリを含むコロニー確認          | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) | 周辺2km程度調査<br>(春・秋) |

・多数の女王アリを含むコロニーが確認されるような大規模事案について、**確認された年から3シーズン目まで、年2回程度のフォローアップ調査を実施。**

※東京港は、R3年7月にコンテナヤード内で無翅女王1匹が確認され、潜在的な拡散リスクが残っている可能性があったことから4シーズン目まで調査を実施。

・令和6年度は**福山港**と**博多港**で実施。

# 今後の対応の考え方

○福山港でも、博多港でも、これまでのフォローアップ調査ではヒアリ類は確認されていない。

○今後の対応の考え方は以下のとおり。

## <福山港>

確認された年から3シーズン目までの調査が完了したため、**フォローアップ調査は今年度（R6年度）で終了**とする。

## <博多港>

確認されたのはR5年度であるが、確認地点における防除が完了したのはR6年度に入ってからであるため、**R6年度から起算して3シーズン目となるR8年度までフォローアップ調査を実施**予定。

# 令和6年度のヒアリ対策の実施状況 侵入元への対策(中国との連携)

参考資料1-2

## ■ 日中韓外来種専門家会合の開催

2017年～ 日本国内で、中国由来の海上コンテナからヒアリが発見される事例が数多く発生。

2019年5月 ヒアリ等緊急性の高い外来種への対策について協議するため、第5回日中韓生物多様性対話(TPDB5)と併せて、第1回外来種専門家会合@韓国を開催。

2024年7月 TPDB10ホスト国として、日本が第2回外来種専門家会合@横浜を開催。



# 令和6年度のヒアリ対策の実施状況 侵入元への対策(中国との連携)

## ■第2回日中韓外来種専門家会合の概要と成果

- ・ 3カ国の専門家及び行政担当者が、科学的な見地から対策に関する議論や情報交換を実施
- ・ 港湾の視察を行い、ヒアリ防除に関する最新技術として、シリコン樹脂充填によるコンテナヤード補修技術やわさび成分入りシートを実演、紹介
- ・ 議長サマリーを取りまとめ、引き続き意見交換、協力を行うことを確認



港湾におけるヒアリ類確認調査の実施状況（2024年度）

参考資料 2

ヒアリが分布する国又は地域と定期コンテナ航路を有する全国の65港湾について実施したヒアリ確認調査の結果。

65港湾のうち特にヒアリの侵入可能性が高いと考えられる15港湾（外貨コンテナ取扱量上位10港と過去にヒアリが確認された5港）においては春から秋にかけて関係機関の調査とも連携して1月1回程度の頻度で行った。

ヒアリが確認された場合は赤字で記載。また、産卵者以外の関係機関が実施した調査については（他）と記載している。

| 港名 | 品名  | 品名                    | 6月調査日                            | 6月結果                                                     | 7月調査日                       | 7月結果                                                 | 8月調査日        | 8月結果                         |
|----|-----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 3  | 青小牧 | 中央ふ頭荷役<br>国際コンテナターミナル |                                  |                                                          | 7月18日                       | ヒアリの確認なし                                             | 8月24日        | ヒアリの確認なし                     |
| 15 | 千葉  |                       | 6月14日                            | ヒアリの確認なし                                                 | 7月26日                       | <b>アカミミアリを確認</b>                                     |              |                              |
| 16 | 東京  | 品川<br>大井<br>青海        | 6月15日<br>6月5日、6日、7日<br>6月3日、12日  | ヒアリの確認なし<br><b>ヒアリを確認</b><br><b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b>        | 7月23日<br>7月10日、24日<br>7月25日 | ヒアリの確認なし<br><b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br><b>アカミミアリを確認</b> |              |                              |
|    |     | 中央防波堤                 | 6月3日                             | ヒアリの確認なし                                                 | 7月26日                       | <b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b>                                 |              |                              |
| 17 | 横浜  | 本牧<br>大黒<br>南本牧       | 6月14日<br>6月24日<br>6月19日          | <b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし<br><b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b> | 7月22日<br>7月19日<br>7月19日     | <b>ヒアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                |              |                              |
| 19 | 新潟  |                       | 6月28日                            | ヒアリの確認なし                                                 | 7月30日                       | ヒアリの確認なし                                             |              |                              |
| 24 | 清水  | 新興津<br>船越             |                                  | <b>アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし                             | 7月4日<br>7月4日                | <b>アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし                         | 8月2日<br>8月9日 | <b>アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし |
| 26 | 名古屋 | 鳴島                    | 6/24、29（他）、6/10、13（他）            | ヒアリの確認なし                                                 | 7月17・18日（他）、7月7・14、28日      | <b>ヒアリを確認</b>                                        | 8月19、22日（他）  | ヒアリの確認なし                     |
|    |     | 瀬田                    | 6/24（他）、6/10（他）                  | ヒアリの確認なし                                                 | 7月4日（他）、7月29、31日            | <b>アカミミアリを確認</b>                                     | 8月22日（他）     | ヒアリの確認なし                     |
| 28 | 西日市 | 北<br>南<br>笠原          | 6月17日（他）<br>6月17日（他）<br>6月17日（他） | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                         | 7月9日<br>7月8日<br>7月8日        | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                     | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—                  |
| 29 | 大阪  |                       | 6/23、6/26-27                     | <b>ヒアリを確認</b>                                            | 7/7、19-21、23、24             | ヒアリの確認なし                                             | 8/20、31      | ヒアリの確認なし                     |
| 32 | 神戸  | 4神戸港は神戸<br>市5月独自調査を実施 | 6/20、6/10、11、19、20               | ヒアリの確認なし                                                 | 7月22日                       | ヒアリの確認なし                                             | 8/5、6        | ヒアリの確認なし                     |
| 36 | 広島  | 広島                    | 6月10日（他）、6月30日                   | ヒアリの確認なし                                                 | 7月8日（他）                     | ヒアリの確認なし                                             | 8月6日（他）      | ヒアリの確認なし                     |
| 37 | 広島  | 広島                    | 6月3日・25日（他）、6月21日                | ヒアリの確認なし                                                 | 7月8日・23日（他）                 | ヒアリの確認なし                                             | 8月6日・23日（他）  | ヒアリの確認なし                     |
|    |     | 尾道                    | 6月10日・26日（他）、6月21日               | ヒアリの確認なし                                                 | 7月16日・24日（他）                | ヒアリの確認なし                                             | 8月2日・27日（他）  | ヒアリの確認なし                     |
| 38 | 福山  | 尾道CT<br>三笠船越          | 6月2日・8月16日（他）                    | ヒアリの確認なし                                                 | 7月7日・21日（他）、7月28日<br>7月4日   | ヒアリの確認なし                                             | 8月4日・18日（他）  | ヒアリの確認なし                     |
| 51 | 北九州 | 太力港第1・第2、<br>第3、ひびきCT | 6月30日                            | ヒアリの確認なし                                                 | 8月20日                       | ヒアリの確認なし                                             | 7月18日        | ヒアリの確認なし                     |
| 52 | 博多  | 青橋1、アイランドシティ          | 6月26日                            | ヒアリの確認なし                                                 | 8月30日                       | ヒアリの確認なし                                             | 7月21日        | ヒアリの確認なし                     |


| 港名 | 品名  | 品名                    | 9月調査日                                    | 9月結果                                              | 10月調査日                        | 10月結果                                                    | 11月調査日                        | 11月結果                |
|----|-----|-----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 3  | 青小牧 | 中央ふ頭荷役<br>国際コンテナターミナル | 9月20日                                    | ヒアリの確認なし                                          | 10月29日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 15 | 千葉  |                       | 9月6日、9月25日                               | ヒアリの確認なし                                          | 10月25日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 16 | 東京  | 品川<br>大井<br>青海        | 9月6日<br>9月9日、11日<br>9月13日                | ヒアリの確認なし<br><b>アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし          | 10月21日<br>10月2日、3日<br>10月11日  | <b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br><b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし |                               |                      |
|    |     | 中央防波堤                 | 9月25日                                    | <b>ヒアリを確認</b><br><b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b>             | 10月25日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 17 | 横浜  | 本牧<br>大黒<br>南本牧       | 9月2日、18日<br>9月4日<br>9月4日                 | <b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし<br><b>ヒアリを確認</b> | 10月8日、21日<br>10月1日<br>10月1日   | <b>ヒアリ、アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし<br><b>アカミミアリを確認</b>     |                               |                      |
| 19 | 新潟  |                       | 9月20日                                    | ヒアリの確認なし                                          | 10月16日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 24 | 清水  | 新興津<br>船越             | 9月5日<br>7月8日                             | <b>アカミミアリを確認</b><br>ヒアリの確認なし                      |                               |                                                          | 11月8日<br>11月8日                | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし |
| 26 | 名古屋 | 鳴島                    | 9月17、19、27、30日（他）、9月29日                  | <b>アカミミアリを確認</b>                                  | 10月22、24日（他）、10月6日            | <b>アカミミアリを確認</b>                                         | 11月11、14日（他）                  | ヒアリの確認なし             |
|    |     | 瀬田                    | 9月5日（他）、9月29、30日                         | ヒアリの確認なし                                          | 10月10、11日（他）                  |                                                          | 11月11日（他）                     | ヒアリの確認なし             |
| 28 | 西日市 | 北<br>南<br>笠原          | 9月18日（他）<br>9月18日（他）<br>9月18日（他）         | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                  | 10月22日<br>10月21日<br>10月22日    | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                         | —<br>—<br>—                   | —<br>—<br>—          |
| 29 | 大阪  |                       | 9/16、12、16、19                            | ヒアリの確認なし                                          | 10/22、23、25                   | <b>アカミミアリを確認</b>                                         |                               |                      |
| 32 | 神戸  |                       | 9月17日                                    | ヒアリの確認なし                                          | 10/8、17、21、32                 | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 36 | 広島  | 広島                    | 9月2日（他）、9月29日                            | ヒアリの確認なし                                          | 10月7日（他）                      | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 37 | 広島  | 広島                    | 9月13日、9月17日・25日（他）<br>9月13日、9月16日・26日（他） | ヒアリの確認なし<br>ヒアリの確認なし                              | 10月15日・22日（他）<br>10月8日・23日（他） | ヒアリの確認なし                                                 | 11月8日・19日（他）<br>11月12日・20日（他） | ヒアリの確認なし             |
| 38 | 福山  | 尾道CT<br>三笠船越          | 9月11・15日（他）、9月29日<br>9月24日               | ヒアリの確認なし                                          | 10月6日・29日（他）                  | ヒアリの確認なし                                                 | 11月16日・24日（他）                 | ヒアリの確認なし             |
| 51 | 北九州 | 太力港第1・第2、<br>第3、ひびきCT | 9月5日、9月1日・15日                            | ヒアリの確認なし                                          | 10月17日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |
| 52 | 博多  | 青橋1、アイランドシティ          | 9月8日                                     | ヒアリの確認なし                                          | 10月20日                        | ヒアリの確認なし                                                 |                               |                      |

これまでと同様に5月から11月の間に2回程度（春期及び秋期）実施している15港湾以外の50港湾の調査結果

|    | 港名    | 調査年度                   | 希留調査結果           | 秋期調査年度                   | 秋期調査結果           |
|----|-------|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | 室蘭    | 7月11日                  | ヒアリの確認なし         | 9月19日                    | ヒアリの確認なし         |
| 3  | 石狩清水  | 7月11日                  | ヒアリの確認なし         | 9月19日                    | ヒアリの確認なし         |
| 4  | 函館    | 7月20日                  | ヒアリの確認なし         | 9月20日                    | ヒアリの確認なし         |
| 5  | 小樽    | 7月10日                  | ヒアリの確認なし         | 9月27日                    | ヒアリの確認なし         |
| 6  | 釧路    | 7月19日                  | ヒアリの確認なし         | 9月26日                    | ヒアリの確認なし         |
| 7  | 八戸    | 7月24日                  | ヒアリの確認なし         | 9月18日                    | ヒアリの確認なし         |
| 8  | 室石    | 7月23日                  | ヒアリの確認なし         | 9月17日                    | ヒアリの確認なし         |
| 9  | 仙台港   | 6月17日                  | ヒアリの確認なし         | 10月2日                    | ヒアリの確認なし         |
| 10 | 秋田港   | 8月5日                   | ヒアリの確認なし         | 9月19日                    | ヒアリの確認なし         |
| 11 | 酒田    | 7月22日                  | ヒアリの確認なし         | 10月11日                   | ヒアリの確認なし         |
| 12 | 小名浜   | 7月24日                  | ヒアリの確認なし         | 10月1日                    | ヒアリの確認なし         |
| 13 | 宇城    | 7月8日                   | <b>アカミミアリを確認</b> | 9月30日                    | ヒアリの確認なし         |
| 14 | 鹿島    | 7月8日                   | ヒアリの確認なし         | 9月30日                    | ヒアリの確認なし         |
| 18 | 川崎    | 6月24日                  | ヒアリの確認なし         | 9月18日                    | ヒアリの確認なし         |
| 20 | 五反津   | 6月28日                  | ヒアリの確認なし         | 9月26日                    | ヒアリの確認なし         |
| 21 | 佐木富山  | 7月5日                   | ヒアリの確認なし         | 9月4日                     | ヒアリの確認なし         |
| 22 | 金沢    | 7月18日                  | ヒアリの確認なし         | 10月10日                   | ヒアリの確認なし         |
| 23 | 飯沼    | 7月18日                  | ヒアリの確認なし         | 10月24日                   | ヒアリの確認なし         |
| 25 | 堺新崎   | 6月21日                  | ヒアリの確認なし         | 9月5日                     | <b>アカミミアリを確認</b> |
| 27 | 三河    | 7月19日                  | ヒアリの確認なし         | 9月24日                    | ヒアリの確認なし         |
| 29 | 青森    | 7月9日                   | ヒアリの確認なし         | 11月19日                   | ヒアリの確認なし         |
| 31 | 伊東港   | 6月24日                  | ヒアリの確認なし         | 9月25日                    | ヒアリの確認なし         |
| 33 | 和歌山下津 | 7月3日                   | ヒアリの確認なし         | 11月18日                   | ヒアリの確認なし         |
| 34 | 横     | 7月5日                   | ヒアリの確認なし         | 9月25日                    | ヒアリの確認なし         |
| 35 | 浜田    | 6月20日                  | ヒアリの確認なし         | 9月12日                    | ヒアリの確認なし         |
| 39 | 大竹    | 6月19日                  | ヒアリの確認なし         | 9月11日                    | ヒアリの確認なし         |
| 40 | 下関    | 7月21日                  | ヒアリの確認なし         | 9月8日                     | ヒアリの確認なし         |
| 41 | 穂山下松  | 横海埠頭 8月17日<br>新南関 7月5日 | ヒアリの確認なし         | 横海埠頭 10月15日<br>新南関 9月10日 | ヒアリの確認なし         |
| 42 | 宮城    | 6月16日                  | ヒアリの確認なし         | 10月8日                    | ヒアリの確認なし         |
| 43 | 三田尻中瀬 | 6月22日                  | ヒアリの確認なし         | 9月7日                     | ヒアリの確認なし         |
| 44 | 宇奈    | 6月18日                  | ヒアリの確認なし         | 9月9日                     | ヒアリの確認なし         |
| 45 | 徳島小松島 | 6月19日                  | ヒアリの確認なし         | 9月25日                    | ヒアリの確認なし         |
| 46 | 高松    | 6月30日                  | <b>アカミミアリを確認</b> | 9月8日                     | ヒアリの確認なし         |
| 47 | 松山    | 6月30日                  | ヒアリの確認なし         | 9月29日                    | ヒアリの確認なし         |
| 48 | 三島川之江 | 6月30日                  | ヒアリの確認なし         | 9月29日                    | ヒアリの確認なし         |
| 49 | 宇治    | 6月19日                  | ヒアリの確認なし         | 9月27日                    | ヒアリの確認なし         |
| 50 | 五反    | 7月15日                  | ヒアリの確認なし         | 10月25日                   | ヒアリの確認なし         |
| 53 | 三浦    | 7月8日                   | ヒアリの確認なし         | 10月13日                   | ヒアリの確認なし         |
| 54 | 伊予星   | 7月1日                   | ヒアリの確認なし         | 10月18日                   | ヒアリの確認なし         |
| 55 | 長崎    | 7月6日                   | ヒアリの確認なし         | 10月31日                   | ヒアリの確認なし         |
| 56 | 八代    | 7月7日                   | ヒアリの確認なし         | 11月1日                    | ヒアリの確認なし         |
| 57 | 熊本    | 7月5日                   | ヒアリの確認なし         | 10月31日                   | ヒアリの確認なし         |
| 58 | 大分    | 7月9日                   | ヒアリの確認なし         | 10月15日                   | ヒアリの確認なし         |
| 59 | 徳島    | 7月10日                  | ヒアリの確認なし         | 10月1日                    | ヒアリの確認なし         |
| 60 | 高島    | 7月22日                  | ヒアリの確認なし         | 10月12日                   | ヒアリの確認なし         |
| 61 | 鹿児島   | 7月4日                   | ヒアリの確認なし         | 10月8日                    | ヒアリの確認なし         |
| 62 | 志布志   | 7月12日                  | ヒアリの確認なし         | 10月9日                    | ヒアリの確認なし         |
| 63 | 川内    | 7月3日                   | ヒアリの確認なし         | 10月28日                   | ヒアリの確認なし         |
| 64 | 那覇    | 10月10日                 | ヒアリの確認なし         | 12月17日                   | ヒアリの確認なし         |
| 65 | 石巻    | 10月16日                 | ヒアリの確認なし         | 12月13日                   | ヒアリの確認なし         |

# コールセンターの受電状況(年度別)

コールセンターの受電状況(年度別)




(注) 令和 6 年度は令和 7 年 1 月末までの実績を集計したもの


## チャットボット経由の問合せ等の件数(年度別)

### チャットボット経由の問合せ等の件数(年度別)

#### 同定依頼アクセス件数




#### 同定依頼等問合せ件数



(注) 同定依頼アクセスとは、チャットボットのフローで、写真もしくは現物による同定依頼の依頼先の案内に到達（アクセス）した件数であり、実際の案内に応じて同定を依頼する電子メールを送信した件数（同定依頼件数）とは異なる。


# コールセンターの月別の受電状況(1)

## 月別の受電状況の推移




# チャットボットの月別アクセス状況

## 月別のアクセス状況の推移



# チャットボットの同定依頼アクセス<sup>(注)</sup>状況(月別)


## チャットボットの同定依頼アクセス状況の推移



(注) 同定依頼アクセスとは、チャットボットのフローで、写真もしくは現物による同定依頼の依頼先の案内に到達（アクセス）した件数であり、実際の案内に応じて同定を依頼する電子メールを送信した件数（同定依頼件数）とは異なる。

## コールセンターとチャットボットの月別問合せ内容<sup>(注)</sup>


## 月別問合せ内容



(注) コールセンターは電話による問合せ内容、チャットボットはメールによる問合せ内容

コールセンターとチャットボットの月別の問合せ者区分<sup>(注)</sup>


## 月別問合せ者区分



(注) コールセンターは電話による問合せ、チャットボットはメールによる問合せ

# コールセンターとチャットボットの月別の問合せ者区分(業種) (注)


## 4月～1月の問合せ者区分(業種)



(注) コールセンターは電話による問合せ、チャットボットはメールによる問合せ  
「公務」には個人や他の業種から依頼された問合せ者も含まれている。

# 月別の簡易・専門家同定結果

## 4月～1月の簡易同定結果



○ヒアリ類の確認事例に係る公表方法は、これまで以下のとおりとしてきたところ。

＜平成29年度～令和元年度＞

基本的に**全てのヒアリ又はアカカミアリ確認事例**について、**個別に報道発表**を実施。

＜令和2年度～現在＞

**重要案件（※1）のみ個別に報道発表**。それ以外の定常的な案件はHPへの掲載のみ。

※1 周囲への拡散のおそれの高い大規模な営巣の確認事例、市民等への被害拡大が懸念される状況での確認事例、その他国民に広く速やかに周知する必要があると考えられる事例、シーズン初確認事例のいずれかに該当するもの。

※2 アカカミアリについては、R2年度以降は内陸部での確認事例など、ごく限られた事例のみ報道発表を実施している。

○上記※1の整理はあるものの、ヒアリは土中に営巣している場合、大規模な営巣かどうかを直ちに判断することが難しいことから、これまでは**土中との出入りが確認された営巣事例については全ての案件を「重要案件」として個別の報道発表を行ってきた。**

## ヒアリ類の確認事例に係る公表方法の見直し（案）

○一方で、近年報道で取り上げられるものは「**各年度の初確認事例**」「**個体数が多い（数千匹等の）事例**」「**注目される場所での確認事例**」等に限られている。

○以上の状況を踏まえ、関係者の負担軽減及び真に重要な情報の取捨選択のため、**ヒアリ確認事例に係る報道発表の基準を見直し、基準に該当しない事例は環境省ホームページの「ヒアリ確認事例一覧」の更新によって公表することとしたい。**

○合わせて、関係機関が必要な情報を速やかに得られるよう、これまで**報道発表時に環境省からメールで情報共有を行っていた機関**（関係省庁、専門家会合委員、地方自治体、地方環境事務所等）に対しては、**ホームページの更新を行ったことを環境省からその都度メールで共有することとしたい。**

○また、**アカカミアリの報道発表基準もヒアリと統一することとしたい。**

○なお、都道府県による公表はこの基準にとらわれず、地域の実情に応じて判断されるものとする。

# ヒアリ類の確認事例に係る公表方法の見直し（案）

| 現行の報道発表基準 |                                                                              | R5<br>件数 | R6<br>件数 | R7<br>件数<br>(見込み) | 見直し（案）                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重要案件      | 周囲への拡散の恐れの高い <b>大規模な営巣</b> の確認事例                                             | 12       | 17       | 数件                | <p>これまでは土中との出入りが確認された事例は全て報道発表としていたが、今後は<b>土中との出入りがあり、かつ女王アリや雄アリ、卵、サナギのいずれかが確認された事例のみ報道発表とし、それ以外の事例はHPでの公表のみ</b>とする。</p> <p>※発見当初は働きアリのみ確認されていたが、その後の調査で女王アリや雄アリ、卵、サナギが確認された場合は、その時点で報道発表を行う。</p> |
|           | <b>市民等への被害拡大が懸念される状況</b> での確認事例                                              |          |          |                   | <p><b>引き続き報道発表</b>とする。</p> <p>※「市民等への被害拡大の懸念」や「国民に広く速やかに周知する必要性」の有無については、確認場所や営巣状況等を踏まえ、<b>環境省外来生物対策室と地方環境事務所で協議して個別に判断</b>する。</p>                                                                |
|           | その他 <b>国民に広く速やかに周知する必要性がある</b> と考えられる事例                                      |          |          |                   |                                                                                                                                                                                                   |
|           | <b>今シーズン初事例</b>                                                              | 1        | 1        | 1                 | <b>引き続き報道発表</b> とする。                                                                                                                                                                              |
| 定常的な案件    | いわゆる水際（港湾や輸送先の倉庫、コンテナ等）で発見され、 <b>死亡個体又は既に駆除済み、小規模な集団である等により、被害拡大の懸念がないもの</b> | 3        | 3        | 20件程度             | <p><b>引き続きHPでの公表のみ</b>とする。</p> <p>※これまで重要案件として扱っていた「土中との出入りが確認された事例」についても、見直し後の重要案件の基準に該当しないものは、こちらの定常的な案件として扱うこととする。</p>                                                                         |

# **ヒアリの防除に関する基本的考え方 Ver.4.1**

## **(案)**

**2025 年○月**

**環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室**

## ヒアリの防除に関する基本的考え方 改訂履歴

| Ver. | 発行日        | 主な修正点                                                                                                                                                           |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | 2018 年 1 月 | ・初版発行                                                                                                                                                           |
| 2.0  | 2019 年 2 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・概要のフロー図の追加</li> <li>・各主体の取組を追記</li> <li>・駆除方法の構成の変更</li> <li>・各主体による取組例を追加</li> </ul>                                   |
| 3.0  | 2020 年 3 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・定着について注釈の追加</li> <li>・概要のフロー図の修正</li> <li>・生息状況調査の変更</li> <li>・拡散が疑われる場合の対応の修正</li> <li>・コラムの追加</li> </ul>              |
| 3.1  | 2021 年 3 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「定着」について注釈の修正</li> <li>・薬剤の説明の追記及び修正</li> <li>・事例の追加</li> <li>・コラムの更新</li> </ul>                                        |
| 3.2  | 2022 年 3 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事例の追加</li> <li>・コラムの更新</li> </ul>                                                                                       |
| 4.0  | 2023 年 4 月 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・「要緊急対処特定外来生物」及び「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」に関連する修正</li> <li>・事例の追加</li> <li>・対応と連絡体制のフローの修正</li> </ul>                    |
| 4.1  | 2025 年〇月   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・これまでの発見事例一覧表の体裁変更</li> <li>・「ヒアリ類(要緊急対処特定外来生物)に係る対処指針」の普及啓発資料サムネイル追加</li> <li>・コラムの更新</li> <li>・各主体による取組例の追加</li> </ul> |

## 目次

|     |                        |    |
|-----|------------------------|----|
| 1.  | はじめに                   | 4  |
| 2.  | これまでの発見事例              | 7  |
| 3.  | ヒアリの基本的な生態             | 8  |
| 4.  | 種の同定                   | 9  |
| 5.  | ヒアリと疑わしいアリを確認したときの連絡体制 | 10 |
| 6.  | ヒアリの基本的な防除に関する考え方      | 12 |
| (1) | ヒアリの生息可能環境の排除          | 12 |
| (2) | 侵入の監視                  | 12 |
| ア   | 定期的な監視                 | 13 |
| イ   | 日常的な監視                 | 13 |
| (3) | 生息状況調査                 | 14 |
| ア   | 調査方法                   | 14 |
| イ   | ヒアリ確認時の調査範囲            | 17 |
| ウ   | ヒアリ確認後の調査期間            | 17 |
| エ   | 役割分担                   | 18 |
| (4) | 駆除方法                   | 20 |
| ア   | 生息状況の確認                | 20 |
| イ   | 駆除方法の選択                | 20 |
| ウ   | 薬剤の特徴                  | 23 |
| (5) | 拡散が疑われる場合の対応           | 25 |
| ア   | 発見した巣の処理               | 25 |
| イ   | 周辺の営巣確認調査の考え方          | 26 |
| ウ   | 発見場所に応じた対応方法及び注意点      | 27 |
| エ   | 各主体の協力による情報集約          | 27 |
| 7.  | 防除の事例～過去の教訓から～         | 29 |
| 8.  | 各主体による取組例              | 31 |

## 1. はじめに

南米原産のヒアリ (*Solenopsis invicta*) は、攻撃性が強く、刺された場合体質によってはアナフィラキシー症状を起こす可能性があるなど、人体にとって危険な生物です。また、在来のアリ類を駆逐してしまうなど生態系への影響が懸念されており、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（外来生物法）」に基づく「特定外来生物」にヒアリ類（ヒアリ、アカカミアリを含む4種群 23 種とその種間交雑個体）が指定されており、令和 5 年 4 月からはまん延した場合に著しく重大な影響を与えるおそれがある「要緊急対処特定外来生物」に指定されました。要緊急対処特定外来生物については、ヒアリ類が付着又は混入するおそれのある物品等の輸入、輸送又は保管を行う事業者がとるべき措置を定めた「ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）に係る対処指針（以下、「対処指針」という。）」を策定し、2023（令和 5）年 6 月に施行されました。対象となる事業者は対処指針に準拠していただくとともに、本考え方も参考としてください。

国内では、2017（平成 29）年 6 月に初めて確認され、2025（令和 7）年 3 月現在、18 都道府県で 135 事例が確認されています。多くは、港湾地域のコンテナヤードの地面、コンテナの内部や外面、コンテナに積まれていた荷物から見つかっています。ヒアリが確認されたコンテナの多くは中国（特に南部）を出港したものです。

これまでのところ、港湾エリアにおいてのみ、地中に集団で生息しているものが見つかりますが、定着※には至っていないものと考えられます。ヒアリへの対応は、日本に定着させないよう、早期に発見し根絶することが重要です。

本考え方は、ヒアリの国内定着を防止するための水際対策として、国の機関や地方公共団体、港湾管理者、荷主、物流事業者等が、実際に防除（ここでは、ヒアリの駆除及び侵入確認や生息状況確認のための調査等をいう）を行うための参考となるよう、ヒアリの生態や防除の専門家の助言に基づき、環境省が各地方公共団体や港湾等の関係者の方々の協力を得ながら実施してきたヒアリの防除の実務を踏まえて、2018（平成 30）年 1 月に Ver.1.1 として作成しました。以降も、新たに集積された情報や知見に基づいて改訂版を作成しており、本 Ver.4.1 は、引き続き集積された情報、環境省や関係省庁、自治体で行われている調査の実績や専門家の助言、外来生物法の改正等を踏まえて改訂を行ったものです。

日本におけるヒアリ対策は始まったばかりで、ヒアリに関する情報や知見はまだ十分とは言えないため、今後得られる新しい防除手法の研究や知見を踏まえ、本考え方は適宜追加・修正を加えていきます。また、現時点ではヒアリだけではなく、ヒアリ類について本指針に準じた対応を行うことを想定していますが、実際の防除事例や知見が乏しいため、新たな種の侵入が確認された場合には、専門家の助言等を踏まえ、最新の知見による追加や修正を加えていきます。

### ※「定着」について

言葉の定義としては『生態系、生息地及び種を脅かす外来種の影響の予防、導入、影響緩和のための指針原則（2002，第 6 回生物多様性条約締約国会議）』において「継続的に生存可能な子孫をつくることに成功する過程のこと」とされ、プロセスを表す言葉として定義されています。

ヒアリの繁殖形態の特徴を踏まえ、我が国のヒアリ対策（本考え方）においては、「総合的に見て同一由来のヒアリの集団の発達を抑えることができなくなった状態」について「定着した」状態と判断することとし、例えば、①発達した集団が確認され、さらに複数年に渡ってこれに

由来した次世代の集団が形成される、②輸送等の人為による侵入が考え難い地点において発達した集団が確認されるなどの場合を想定します。

ただし、定着した状態か否かを即時に判断することは難しいので、とにかく、発達した集団を確認した際の対策を進める上では、上記のような状態を招かぬよう、巣から新女王が拡散した可能性を常に念頭に置いて確実に対処することが重要です。なお、当初、海外の定着地域の事例では発達した巣はアリ塚状となることから、「巣（アリ塚）の存在」を定着の指標としてきましたが、我が国でこれまでに確認された巣は、塚を作らずに発達を見せており、**Ver.3.0**（2020年3月改訂）以降では、「アリ塚の存在」は定着の判断材料としないこととしました。

### 侵入の監視

- ・ 定期的な監視 . . . . . p.13  
環境省の実施する主要港の調査
- ・ 日常的な監視 . . . . . p.13  
コンテナの周辺の日常的な監視

未発見

監視を継続

ヒアリ同定マニュアルによる同定

発見！

### 生息状況調査

- ・ 調査方法 . . . . . p.14  
状況に応じて①目視調査、②ベイトトラップ調査、③粘着トラップ調査から選択して調査を実施。
- ・ 調査範囲 . . . . . p.17  
発見場所周辺を確認。営巣が確認された場合または発見までに時間を要した場合は周囲2km程度を調査。発見された荷物等の移動経路も調査。
- ・ 調査の期間 . . . . . p.17  
発見場所で生存個体が確認されなくなるまで。営巣が確認された場合または発見までに時間を要した場合は生存が確認されなくなっても1ヶ月以上継続。周囲2kmの調査については初めの年から3年間継続。

### 駆除

- ・ 生息状況の確認 . . . . . p.20  
生息状況調査（p.14～18）を参照。
- ・ 駆除方法の選択 . . . . . p.20  
ヒアリの数、侵入経路の確認の可否、対応までにかかった期間に応じて対応方法を選択。
- ・ 薬剤の特徴 . . . . . p.23  
薬剤の特徴を把握した上で、目的に応じて薬剤を選択。

野生巣未発見

駆除終了後、  
監視を継続

野生巣の発見！

### 拡散が疑われる場合の対応

- ・ 発見した巣の処理 . . . . . p.25  
巣周辺へのベイト剤（フィプロニル、IGR）を1週間おきに継続設置。専門家の指導の下、必要に応じて遅効性液剤を巣に注入。
- ・ 周辺の営巣確認調査の考え方 . . . . . p.26  
巣の周囲4～6kmの範囲に30m間隔で誘引のベイトを設置してヒアリの有無を確認。ベイトの位置を15mずらした同じ調査を2年間の間に最低2回実施。

ヒアリ防除に関する対応フロー

## 2. これまでの発見事例

これまでヒアリが確認された事例は以下のとおりであり、コンテナヤードや、中国を出港したコンテナから見つかる事例が多いことが読み取れます。アリは一般に土中に巣を作るとされていますが、ヒアリは朽木のような自然物から、機械部品や電子機器、自動車の中などの人工物の空間にも巣を作って繁殖することが知られています。これまで日本で確認された事例では、腐食したコンテナの床板の中に営巣していることもありましたし、防草シート裏での営巣も確認されています。また、一般家庭に運ばれた荷物の中から死骸が発見されたほか、アメリカから航空機で運ばれた貨物からも発見されるなどの発見事例もありました。2019年には東京港青海ふ頭のコンテナヤード内において、2020年には名古屋港飛島ふ頭の事業者敷地内、2021年には大阪港咲洲の事業者敷地内において、有翅女王アリを多数含む一定規模のコロニーが確認される事例もあり、対策の一層の強化が図られました。2022年には福山港で陸揚げされたコンテナ内で、複数の無翅女王アリを含む70,000匹以上のヒアリの大規模な集団が確認されています。

| 場所   |             | 確認状況       | 件数 | 個体数<br>※最小～最大     | 女王の有無 |
|------|-------------|------------|----|-------------------|-------|
| 北海道  | 苫小牧港        | コンテナヤード内   | 1  | 2                 | 無     |
| 茨城県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 約10               | 無     |
| 栃木県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 数十/1000程度         | 無     |
|      |             | 個人購入品      | 1  | 1                 | 無     |
| 埼玉県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 1                 | 有     |
| 千葉県  | 千葉港         | コンテナヤード内   | 1  | 1                 | 無     |
|      |             | 船内         | 1  | 1000以上            | 有     |
|      | 成田空港        | 空港内貨物上屋    | 1  | 約160              | 無     |
| 東京都  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 2  | 3～110             | 無     |
|      | 東京港青海ふ頭     | コンテナヤード内   | 21 | 1～500以上           | 有     |
|      | 東京港大井ふ頭     | コンテナヤード内   | 14 | 約100～約1500        | 有     |
|      |             | 空コンテナヤード内  | 1  | 200以上             | 無     |
|      | 東京港品川ふ頭     | コンテナヤード外   | 1  | 100以上             | 無     |
|      | 東京港中央防波堤    | コンテナヤード内   | 5  | 3～約620            | 無     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 約200              | 無     |
| 神奈川県 |             | 一般住宅(郵便物内) | 1  | 2                 | 無     |
|      | 横浜港本牧ふ頭     | コンテナヤード内   | 15 | 約30～多数            | 無     |
|      |             | 空コンテナヤード内  | 1  | 約60               | 無     |
|      | 横浜港南本牧ふ頭    | コンテナヤード内   | 6  | 1～約600            | 無     |
|      |             | 空コンテナヤード内  | 1  | 約300              | 有     |
|      | 横浜港大黒ふ頭     | コンテナヤード内   | 1  | 2                 | 無     |
| 静岡県  | 清水港         | 事業者敷地内     | 1  | 1200以上            | 無     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 2  | 1～20              | 有     |
|      |             | 事業者敷地内     | 2  | 2～600以上           | 有     |
| 愛知県  | 名古屋港飛島ふ頭    | コンテナヤード内   | 1  | 約200              | 無     |
|      |             | 事業者敷地内     | 5  | 17～70             | 無     |
|      |             | 陸港道路       | 2  | 20～1000以上         | 有     |
|      | 名古屋港鍋田ふ頭    | コンテナヤード内   | 1  | 700以上             | 無     |
|      |             | 空コンテナヤード内  | 7  | 2～約300            | 無     |
|      | 名古屋港船見ふ頭    | 事業者敷地内     | 2  | 約100              | 無     |
| 三重県  | 四日市港        | コンテナヤード内   | 1  | 約1000             | 有     |
|      |             | 事業者敷地内     | 6  | 30～約1000          | 有     |
|      |             | 事業者敷地内     | 2  | 約20～約300          | 無     |
| 京都府  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 約2000             | 有     |
| 大阪府  | 大阪港         | コンテナヤード内   | 10 | 約20～2000以上        | 有     |
|      |             | 事業者敷地内     | 1  | 詳細不明              | 有     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 5  | 約100～1000以上       | 有     |
|      |             | 個人購入品      | 1  | 1                 | 有     |
| 兵庫県  | 神戸ポートアイランド  | コンテナヤード内   | 2  | 100以上～5000以上(推測値) | 無     |
| 岡山県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 2  | 1～500以上           | 有     |
|      | 水島港         | 空コンテナヤード内  | 1  | 200以上             | 有     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 2  | 1～70000以上         | 有     |
| 広島県  | 広島港         | コンテナヤード内   | 4  | 7～131             | 無     |
|      | 福山港         | コンテナヤード内   | 1  | 数百                | 無     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 3  | 1～73              | 無     |
| 福岡県  | 博多港アイランドシティ | コンテナヤード内   | 1  | 約300              | 無     |
|      |             | コンテナヤード外   | 1  | 約300              | 無     |
|      | 北九州港        | コンテナヤード内   | 2  | 7～約10             | 無     |
|      | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 30                | 無     |
| 佐賀県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 2  | 約100～300以上        | 無     |
| 大分県  | 港湾外         | 事業者敷地内     | 1  | 約20               | 無     |

【留意点】報道発表時点の情報に基づく。また、1つの案件に複数の発見地点が含まれる場合もあるため、件数の合計は135事例以上の数値となる。詳細は環境省HP中の「ヒアリの全国確認情報」参照  
<https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiari.html>

### 3. ヒアリの基本的な生態

ヒアリも含む「アリ」は、ミツバチやスズメバチなどと同じ社会性昆虫です。その特徴は、産卵を行う少数の女王アリと、幼虫の世話や餌集めなどを担当する多くの働きアリが、分業をしながら巣の中で暮らしていることです。働きアリが大量に死亡するなど巣に異変が生じると、女王アリは巣を捨てて逃げ出すこともあります。このため、ヒアリの防除を考える際には、働きアリの駆除だけでなく、女王アリや幼虫を含めた集団の駆除を念頭に置くことが重要なポイントとなります。

アリが新しい巣を作るときには、いわゆる羽アリ（有翅の新女王アリと雄アリ）が巣から飛び出し（結婚飛行）、元の巣から離れた場所に新女王アリが新しい巣を作ります（単女王制コロニー。タンポポのような植物が、種子を飛ばして広がり増えるのと似ています）。ヒアリの防除を考える際には、この羽ア리를飛散させないことも重要なポイントです。また、ヒアリの場合、巣の中に多数の女王が存在し、巣の中や巣の周辺で交尾が行われ、元の巣の近隣で巣分かれをし、コロニー全体を巨大化させながら生息域を拡大する場合があります（多女王制コロニー）。女王アリは交尾後に翅を落とすので、無翅女王アリを見落とさないよう注意が必要です。



ヒアリの生活史

#### 4. 種の同定

ヒアリの疑いがあるアリが発見されたとしても、それが真に本種であるかどうかの判定には専門家による種の同定が必要です。環境省では、疑わしいアリが発見された際には、地方環境事務所やヒアリ相談ダイヤルで簡易な確認を行った後、専門家に同定を依頼しています。早急な対応をとるため、独自に同定依頼ができる専門家を確保している地方公共団体もあります。

具体的な同定の流れについては、『ヒアリ同定マニュアル』に詳しく説明していますが、主に以下の STEP に分かります。

●STEP 1 野外で、肉眼で見分ける 【ヒアリ類（ヒアリ・アカカミアリ）の可能性はあるか】

→ 一般の事業者や市民でも可能

●STEP 2 ルーペや実体顕微鏡で見分ける 【ヒアリ類の可能性が高いかどうか】

→ 国の機関や地方自治体の職員、一般の事業者でも可能

●STEP 3 専門家による確認 【ヒアリかどうか】

ヒアリを含む外来種の防除においては、早期発見・早期駆除が重要であり、港湾関係者等ヒアリ侵入の水際にいる人がヒアリを見分けられることで迅速な対応が可能となります。従って、今後、水際の警戒を強化・継続する上では、現場で STEP 2 に対応できる人材の育成も望まれます。

## 5. ヒアリと疑わしいアリを確認したときの連絡体制

ヒアリと疑わしいアリが見つかった場合には、数の大小に関わらず、また、専門家による同定を待たずに、環境省の他、国の関係機関、地方公共団体等に連絡し、各主体が協力して対応に当たることが必要です。これまで、港湾管理者、港湾事業者、物流事業者、倉庫管理者、荷主等による地方公共団体や国への通報により侵入が確認された例が多数あります。迅速な対応のためには、連絡先を関係機関で把握しておくことが重要です。現状では、概ね下図のように連絡が取られています。なお、2023（令和5）年4月に改正外来生物法が全面施行され、2023（令和5）年6月以降は、「ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）」に係る対処指針」に基づきヒアリ類が付着・混入するおそれのある物品の輸入や輸送、保管等に関わる事業者は、ヒアリ類発見・通報のための体制を整備し、ヒアリ類と疑わしいアリを確認した場合は、構築した体制に従って速やかに通報することが求められます。



**「ヒアリ類かな？」と思ったら**

地方環境事務所に連絡

| 地方環境事務所等    | 連絡先          | 住所                                              |
|-------------|--------------|-------------------------------------------------|
| 北海道地方環境事務所  | 011-299-1954 | 〒060-0808 北海道札幌市北区北8条西2丁目<br>札幌第1合同庁舎3階         |
| 釧路自然環境事務所   | 0154-32-7500 | 〒085-8639 北海道釧路市幸町10-3<br>釧路地方合同庁舎4階            |
| 東北地方環境事務所   | 022-722-2876 | 〒980-0014 仙台市青葉区本町3丁目2-23<br>仙台第2合同庁舎6F         |
| 関東地方環境事務所   | 048-600-0817 | 〒330-9720 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1<br>さいたま新都心合同庁舎1号館6階 |
| 中部地方環境事務所   | 052-955-2139 | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸2-5-2                        |
| 信越自然環境事務所   | 026-231-6573 | 〒380-0846 長野県長野市旭町1108<br>長野第1合同庁舎              |
| 近畿地方環境事務所   | 06-6881-6505 | 〒530-0042 大阪市北区天満橋1丁目8番75号<br>桜ノ宮合同庁舎4階         |
| 中国四国地方環境事務所 | 086-223-1561 | 〒700-0907 岡山市北区下石井1丁目4番1号<br>岡山第2合同庁舎11F        |
| 四国事務所       | 087-811-6227 | 〒760-0019 香川県高松市サンポート3-33<br>高松サンポート合同庁舎南館2F    |
| 九州地方環境事務所   | 096-322-2413 | 〒860-0047 熊本県熊本市西区春日2-10-1<br>熊本地方合同庁舎B棟4階      |
| 沖縄奄美自然環境事務所 | 098-836-6400 | 〒900-0022 沖縄県那覇市穂川1丁目15番15号<br>那覇第1地方合同庁舎1階     |

※ヒアリ相談ダイヤル：0570-048110（IP電話の場合は0676347300）一斉通話中でも受け付けます。  
受付時間：AM9:00～PM5:00（12/29～1/3は除く）

**見つけた際の注意事項**

- ヒアリ類かどうか疑わしい場合は、地方環境事務所等に連絡するとともに、判別用のアリの写真を撮影。
- 合わせて判別用に少数のアリを殺虫してから回収し、保存容器等に入れ、指定先に送付。この時、アリをテープなどに貼り付けないこと。
- コンテナ等の中で少数がいた場合は、不安なら地方環境事務所等に相談の上、殺虫剤等で殺虫。死骸でも素手で触らないように注意。
- それ以外の場合は、まずは地方環境事務所等に連絡し、対応を相談。




スマホとマクロレンズによる撮影方法例


- 多数のアリがいる、巣があるときは、頭んがり、水をかけたりといった刺激は絶対にNG。
- ヒアリ類と確認されるまでむやみに殺虫剤等を置くことは避ける。在来のアリやその他の生物を殺してしまい、かえってヒアリ類が定着しやすくなる恐れがある。

さらに詳しく知りたい方はこちらへ「要緊急対処特定外来生物ヒアリに関する情報」  
<https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/hiairi.html>  
 発行：環境省 制作：一般財団法人自然環境研究センター イラスト：ウラケン・ポルボックス  
 発行元：環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室 TEL 03-5521-8344  
 2023年7月発行

ヒアリ類（要緊急対処特定外来生物）対処指針冊子（普及版）

※全体は以下の環境省 HP に掲載

[https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/file/taisho\\_sasshi.pdf](https://www.env.go.jp/nature/intro/2outline/attention/file/taisho_sasshi.pdf)



専門家には、種の同定を依頼するほか、発見状況に応じた防除手法について助言を得ることが考えられます。日頃から地域の専門家との連携を図ることが望まれますが、必要な場合は環境省が関係する専門家の紹介や派遣に協力します。

## 6. ヒアリの基本的な防除に関する考え方

これまでの海外の事例から、国内でヒアリの定着を許してしまうと、分布の拡大を止められず、根絶することは難しいと考えられます。ヒアリは、今後も海外からの物資の輸入に伴い日本に侵入してくることが予想されます。このため、定着阻止のためには関係する各主体（環境省を始めとした国の機関や地方公共団体、港湾関係者、荷主、物流事業者、土地や施設の管理者等）の取組が欠かせません。

国内での定着が確認されていない現段階では、ヒアリの防除は、ヒアリの侵入の監視と生息状況の把握、ヒアリの侵入を確認した場合の確実な駆除が中心となります。国は発見時の確実な防除や全国的な観点から侵入・拡散防止のための調査を実施するほか、侵入を未然に防ぐ対策の検討、地方公共団体を始めとした各主体の行う防除等への支援に取り組んでいます。地方公共団体や港湾管理者においても、侵入・拡散防止のための調査に取り組むほか、ヒアリが確認された際、地域や現場の実態に合わせ、迅速かつ細やかに対応するなど、早期防除において大きな役割を果たしています。疑わしいアリを確認した際の物流事業者等からの速やかな連絡や防除への協力が早期発見・定着阻止につながっています。今後も、各主体が連絡を取り合い必要な作業を分担するなどしながら、より効率的・効果的な防除方法を検討します。

効率的・効果的な対策には、各主体が予め役割分担や連携内容を整理し、各地域の特性を考慮した上で、地方環境事務所や関連する事業者との連絡体制を整備することが重要です。この際、専門家による指導や助言を得ることは、様々な関係者の間の連携をコーディネートし、円滑な防除を実施するために有効です。

### (1) ヒアリの生息可能環境の排除

これまでに発達したコロニーが発見された事例から、海外由来のコンテナが留め置かれる港湾のコンテナヤード内やコンテナの移送先などにおいては、地面のひび割れの補修や雑草除去等を定期的実施することにより、侵入時にヒアリ等外来種が潜みやすい環境をなくすことが侵入防止の観点から重要です。なお、ヒアリが確認された場所においては、補修や雑草処理時に出た廃土を含む廃棄物等についても、廃棄に伴ってヒアリが付着して移動することがないようにする必要があり、それらもワンプッシュ式エアゾール剤やくん蒸等による処理後に廃棄することが重要です。

### (2) 侵入の監視

侵入を監視する観点からは、海外由来のコンテナと、コンテナが留め置かれる場所（陸揚げされる港湾地域、コンテナの移送・荷下ろし先、荷下ろしされて空になったコンテナの集積場、それらの場所周辺の地面）での監視の重要性が高いと考えられます。国内でのヒアリの拡散を阻止するためには、コンテナからの荷下ろし時やコンテナ返却時、荷主等へのコンテナ貸し出し時のコンテナの徹底的な確認が必要です。そのほか、ヒアリの生息地からの物資が運び込まれる物流の拠点となっている地域では、侵入を警戒する必要性が高いといえます。働きアリや雄アリだけでは子孫は残せず定着はしませんので、特に、女王アリの侵入と定着に注意を払う必要があります。ただし、一見女王アリが見当たらなくても、隙間等に潜んでいる可能性があることを十分に理解しておく必要があります。

次項の生息状況調査を、前述のようなコンテナが留め置かれる場所で定期的を実施することも、侵入監視・早期発見の有効な手段です。また、荷主、物流事業者によりヒアリが発見されることも多いことから、日常的に情報の提供や共有を行い、関係者間の連絡・協力体制を構築しておくことが重要です。

#### ア 定期的な監視

環境省では、国土交通省の協力を得つつ、中国、台湾等ヒアリが定着している国や地域からの定期コンテナ航路を有する港湾において生息状況の確認調査を行い、定期的（年に２回）に監視を実施しています。加えて、特に危険性が高い港湾等において地方公共団体や港湾管理者による独自の調査等とも連携して、より高い頻度で調査ができるようにしています。

厳冬期及び盛夏（炎天下）ではヒアリの活動が低下し、検出の精度が低下すると予想されます。より確かな生息状況を把握するためには、適切な時間帯での実施や、春または秋の調査とすることが有効です。

#### イ 日常的な監視

物流に関係する各者が日々の業務の中で注意することが重要です。特に、輸入に使用されたコンテナや貨物にはヒアリ等の外来生物が混入、付着している可能性があります。これら輸入コンテナにおける外来生物の侵入監視においては、以下の点について重点的にチェックすることで効率的に監視することができます。

##### ①コンテナ外部

コンテナの開口部および下縁部、上部が開閉式のコンテナの場合はその開口部の周辺および通気口からアリ等が逸出していないかを確認する。合わせて土砂等が付着しているとそこに営巣する可能性があるため、除去して土砂内部にアリ等がないかを確認する。



##### ②コンテナ内部

コンテナ内部を確認する際には、床板の縁や貼り合わせ部、壁際に沿って確認し、床板の裏面や隙間および通気口から表面にアリ等が出入りしていないかを確認する。また、積荷の表面や隙間にアリが付着していないかを確認する。



### (3) 生息状況調査

ヒアリの侵入を監視するための調査や、ヒアリが確認された場合の調査は、以下の考え方で実施します。

#### コラム① 調査・防除作業の実施にあると有用な装備例

ヒアリの防除作業の際は刺されたり怪我をしたりすることのないよう、十分な準備の上で作業を行いましょう。また、手際よく作業をするための物品も準備しておくとう便利です。下記には装備の例を紹介します。

| 装備               | 用途                  |
|------------------|---------------------|
| 長袖、長ズボン、手袋       | 肌の露出を避ける。           |
| ヘッドランプ           | コンテナ内等、暗部の確認。       |
| マスク              | 薬剤散布時の経口摂取防止。       |
| 即効性殺虫剤（スプレー剤等）   | 少数個体の確認対応。          |
| 遅効性殺虫剤（液剤、ベイト剤等） | 集団の確認対応（液剤の使用は慎重に）。 |
| ブルーシート           | 当該荷の開封や移動時の逸出防止。    |
| 大型ビニール袋          | 当該荷の一時密封等           |
| チャックビニル          | サンプル等の保存、逸出防止。      |
| ガムテープ、養生テープ      | コンテナや服装の隙間の遮断。      |
| 無水エタノール入りサンプル瓶   | 標本の保存。              |
| ピンセット            | 標本の捕獲。              |
| ハンディクリーナー        | 標本をたくさん採集する場合。      |
| ルーペ（15～20倍）      | 標本の確認。              |
| スマートフォン、マクロレンズ   | 標本の確認、個体の写真撮影用      |

#### ア 調査方法

ヒアリ類の調査には主に3つの方法があります。専門知識のある調査員の有無や調査範囲の広さ、立入可能な時間の制限の有無などの状況に応じて調査方法を選択します。専門知識のある調査員が確保できる場合は、極力①②の方法を採用することが推奨されます。

③の粘着トラップ調査については、ヒアリの生態を考えると検出能力が他の調査に劣る可能性が指摘されているので、専門業者による調査時における使用は推奨しません。

各調査の具体的な方法は以下に示す通りです。

### ①目視調査

人工的に開かれた土の地面等、ヒアリが巣を作りやすい場所を中心に探します。コンテナヤードなどでは、コンテナから逸出したヒアリ等の外来生物が、逃げ込むと考えられる、コンテナ周辺の草地や、土壌部につながるアスファルト亀裂、舗装の継ぎ目について重点的にチェックします。コンテナの移送されるコンテナヤード以外の土地や施設では、防草シートなど様々な資材がヒアリの巣の温床になる可能性があります。

国内の事例では、コンテナの床板、舗装の割れ目やコンテナ板の吊り上げ用のフック穴、風化したあと塊になった紙、アスファルトに溜まった土の下等からもヒアリの集団が見つかっています。



コンテナヤードでの確認

目視調査は比較的容易に行うことができ、トラップを用いるよりも短時間で広範囲を確認する事ができますが、肉眼で疑わしいアリか否かを判別できる技術が必要です。不安な場合は②を併用することも検討します。

調査中に疑わしいアリを確認した場合は、市販の殺虫剤（スプレー、液体型殺虫剤）で殺虫するか、アルコールをかけて動きを止めると、容易にピンセット等で捕まえることができます。粘性の高い液（グリセリンやプロピレングリコール）に浸した綿棒で掬い上げる方法もあります。吸虫管で捕獲する方法もありますが、慣れた作業員が実施する必要があります。また、多数確認された場合等には、殺虫剤によりかえって拡散を招かないよう、注意が必要です。

### ②ベイト調査＜推奨＞

プラスチック製のシートの上や容器の中にベイト（誘引餌）を置いたものを一定の間隔（ヒアリ発見地点周辺等の重点範囲：6m 間隔、周囲のモニタリング範囲：6～30m を推奨）で地面に設置し、40～50 分程度後に集まったアリを確認します。捕獲の際は、容器のふたを閉めるか、①と同様に殺虫処理の上で採集します。③の手法に比べて短時間で確認できます。捕獲したアリの同定には専門的な技術が必要ですが、サンプルを採集するので、現場で見分けられなくても、後日専門知識を有する者が確認することが可能です。一方で、

ベイトについてのアリ類の回収・捕獲にも一定の技術や経験が必要で、回収時にはアリを逃がさないように注意する必要があります。



ベイトの設置例

### ③粘着トラップ調査

粘着トラップは、粘着シートを用いた床置き式の歩行性昆虫用のトラップです。一定の間隔（30～50mを推奨）で地面に数日間（3～4日を推奨）設置し、周囲を歩行するアリを捕らえます。（設置時間を短くする必要がある場合には、トラップ内に誘引餌を設置する手法も用いられていますが、トラップの種類との組み合わせによっては検出効果が低下する可能性も指摘されており、必要に応じて、専門家の指導のもとで実施します。）

頻繁に人が立ち入れない場所（コンテナヤード等作業可能な時間が限られている場所）や、夜間（目視が困難な時間）、大面積（①、②の調査が制限時間内に実施できない場所）の調査が必要な場合には有効です。捕獲したアリの同定には専門的な技術が必要ですが、サンプルを採集するので、現場で見分けられなくても、後日専門知識を有する者が確認することが可能です。

設置時間が長すぎると捕獲したアリの死体が捕食者に回収されたり、トラップ自体が紛失したりして検出精度が低下することがあるため、現場の環境に応じた適度な設置時間とします。また、ヒアリ類は地下のトンネルを潜行しながら移動することから、①や②の調査と比べて捕獲効率が劣る可能性も示唆されています。



粘着トラップの設置例

#### コラム② 誘引餌

現在は、ヒアリ定着国での知見に基づき、スナック菓子（成形型ポテトチップス、コーンチップス、クラッカー等）などが使われています。それらが日本においても適した誘引剤であるのか、また、誘引効果を示す化学成分は何か等の詳細はわかっておらず、更なる知見が必要です。現在、日本での調査では、小麦粉とえびを主成分とするスナック菓子を中心に調査が行われています。

#### コラム③ 環境省における実施事例

ヒアリが確認された地点を中心に、目視調査(①)を実施しながら、コンテナ周辺の草地や、土壌部につながるアスファルト亀裂、舗装の継ぎ目などで、6m 間隔（周囲 1ha 程度）に設置したベイト(②)を用いた確認作業を行います（ベイトは市販のスナック菓子を使用）。設置後、30～40 分程度後にベイトに集まったアリを確認、必要に応じて捕獲するとともに、ベイトも回収します。調査に係る人員は各地点の状況（調査面積や調査実施可能時間、トラップの設置数等）に応じて調整し、調査を実施します。また、調査の方法については様々な検証試験が行われており、必要に応じて今後も見直されます。

#### **イ ヒアリ確認時の調査範囲**

発見場所付近を集中的に調査するとともに、コンテナ等で運ばれてきたことが判明している場合は、当該コンテナの国外・国内の運搬経路を確認し、国内の他の場所に立ち寄っている場合はその場所でも同様に調査を行います（コンテナには個別のコンテナ番号が付されており、これと、船会社や船名等の情報を用いて、寄港地、蔵置されたコンテナヤードの場所等の追跡ができます）。国内での経路については、陸上輸送も含めて移動経路を把握することにも注意が必要です。また、侵入経路が確認できない場合や、侵入経路は確認できるが対応までに一定時間を要した場合、地面等で営巣が確認された場合など、侵入から発見までに一定の時間が経過したと考えられる場合は、周囲を調査した上で、女王アリを含むコロニーの存在の有無を確認します。

周囲にコロニーが存在するか、その可能性が考えられる場合は、既に過去に女王アリが逃げ出している可能性を考慮して、周囲 2km 程度の調査も行います。周囲を調査した段階で、女王アリの拡散が考えにくい状況が確認された場合など（例：働きアリ数匹がコンテナ周辺で確認されたものの、周囲の調査で個体が確認されなかった場合等）は、当該年度に関しては、2km 調査を要しない場合もあります。

#### **ウ ヒアリ確認後の調査期間**

確認地点における生息状況調査はヒアリが確実に生息しなくなったことが確認できるま

で実施します。運ばれてきたばかりのコンテナから発見された場合は、その場で殺虫すればコンテナとその周辺の確認のみで終了できますが、地面に営巣が確認された等の場合には生存個体が確認されなくなってから 1 ヶ月以上は調査を継続する必要があります（p.22 参照）。

確認地点の周辺 2km の調査については始めの年から 3 年間継続して実施します。

## エ 役割分担

発見地点とその周辺の土地・施設管理に関わる関係省庁、地方公共団体、事業者等と環境省が連携して調査を行います。

### コラム④ 新たな技術による生息状況調査

アリの侵入を確認した場合、防除の対応が必要な外来のアリかどうかを確認する必要があります。アリの同定は一定の研修を受ければある程度までは可能となりますが、個体による色彩や形態の変異もあるなど、正確な同定には専門家による判断が必要となります。また、研修によりヒアリ・アカカミアリの可能性が高いという判断までは可能になりますが、それでも多くの個体を確認するには時間がかかります。より簡易に確実な同定を行えるよう、現在新たな調査手法の開発が行われています。


LAMP（Loop-Mediated Isothermal Amplification）法の簡易調査キットは、試料の中にヒアリの DNA が含まれていれば試薬の白濁反応が起こります。体の一部が含まれた土壌を採取するだけで、ヒアリの分布の有無が確認できる技術であり、より汎用性を高めるための実証が行われています。

## コラム⑤ 調査の優先度

2024（令和6）年度現在、環境省は国内におけるヒアリの侵入状況を監視するため、国土交通省の協力を得つつ、中国、台湾、フィリピン、マレーシア、オーストラリア、ニュージーランド、北米、カリブ、中米、南米からの定期コンテナ航路を有する 65 港湾を対象として、侵入の監視調査を実施しています。これらの調査は今後も継続的に実施する必要があることから、効率的に行えるよう、調査の優先度を把握しておくことが重要です。

これまでの国内におけるヒアリの確認事例では、中国由来や中国経由のコンテナや荷物で多く確認されています（2025（令和7）年2月現在、ヒアリの確認事例 135 例中、出所が判明したもの 48 例、このうち 45 例が中国由来又は中国経由と考えられる）。これに加えてヒアリが広く定着しているアメリカ（出所が判明したもの 1 例）、近隣のヒアリ定着地域である台湾を含めた 3 か所からのコンテナ輸入量を見ると、東京港、大阪港、名古屋港、横浜港、神戸港の 5 港の輸入量が多いことがわかります。これら 5 港は他の港に比べてヒアリの侵入リスクが高く、特に調査の優先順位を高めて警戒することが必要です。同様に、ヒアリの確認事例のある苫小牧港、清水港、四日市港、水島港、福山港、広島港、北九州港、博多港も当該の輸入量の上位であり、優先度は高くなると考えられます。また、輸入量に対して確認事例数が多い港湾もあることから、輸入量の多寡に限らず、ヒアリ定着国や地域との定期コンテナ航路を有する港湾では注意が必要です。なお、港湾の物流量や輸出地は年によって大きく異なることもあるため、直近の複数年の情報を元にして調査を計画することが望ましいと言えます。

このように、物流量等の状況を踏まえ、調査対象港湾の範囲や頻度を精査していくことは重要です。



国内の主な港湾における中国、台湾、アメリカからのコンテナ輸入量とヒアリ発見事例  
 ※2023（令和5）年度全国輸出入コンテナ貨物流動調査より（総輸入貨物量上位 20 港のみ）。

#### (4) 駆除方法

ヒアリの侵入を確認した際には、迅速に駆除する必要があります。科学的知見に基づき適切な駆除方法を検討し、計画的に駆除を実施することで、効果的に被害を防止することができる期待されます。他地域への分布拡大防止などの観点から、見つかった場所や周囲の状況、確認されたヒアリの数、営巣状況など、諸条件を勘案し、必要に応じて専門家の助言を得て、具体的な防除の方法を決定します。

##### ア 生息状況の確認

侵入したヒアリの分布域（生息範囲）を確認するために、(2)で示した手法により生息状況を把握します。

コンテナでヒアリが確認された場合は、そのコンテナが置かれていた場所（陸揚げ港、コンテナの移送・荷下ろし先、空になったコンテナの集積場等）の追跡を行い、それぞれの場所においてヒアリが侵入していないか確認します。

なお、確認された個体の中に女王アリや幼虫、さなぎ、卵（いずれも白色で卵は 0.2～0.3mm、働きアリの幼虫は 0.3～1.2mm、女王アリの幼虫は 4～5mm、さなぎは 2～5mm 程度。）が含まれるかどうかは、侵入状況の推定や対策の検討のために重要な情報なので特に注意し、確実にサンプルを確保するようにします。また、複数の個体が見られる場合には、できるだけ大型の個体を選んで確保するようにします（種の特徴が分かりやすいため）。



ヒアリの卵塊（左）、幼虫（中央）、さなぎ（右）※目盛りは1mm

##### イ 駆除方法の選択

防除を効果的・効率的に実施するためには、生息状況等に応じて適切な手法を組み合わせで実施することが重要です。

###### ○ヒアリの数が少ない場合

全ての個体をすぐに殺虫できる場合、即効性のエアゾール型（スプレー式）殺虫剤や液体型殺虫剤を用いた手法が一般的です。

###### ○ヒアリの数が多い場合、目視で確認できない場所に隠れているおそれがある場合

個体の逃走や拡散を招く危険性があるため、即効性の殺虫剤の使用は避けます。代わりに、

餌として巣に持ち込まれる置き型殺虫剤（以下、ベイト剤）の設置等の手法が採られています。

＊地上で見られるヒアリは、地域に生息している集団のごく一部である可能性があります。特に野外で見つけた場合は、見つけた個体を殺虫するだけでなく、巣がある可能性を考慮にいれ、その他の個体を効率的に駆除する必要があります。このためには、ベイト剤のうち遅効性で連鎖殺虫効果のある殺虫剤（仲間のアリと触れ合う習性により、ほかのアリにも殺虫成分を伝える）の使用が効果的です。なお、同様の効果を持つ液体型殺虫剤（液剤）は、巣が成長している場合等は、女王が逃げ出すなど、かえって拡散を招いてしまうおそれがあることが示唆されているため、使用については専門家の指導のもと、慎重に判断する必要があります。

＊定着を防ぐために女王アリを含む集団の逃走や、羽アリの飛散がないよう、注意しながら駆除を進める必要があります。

以下に標準的な対応例を示します。個々の事例に応じて条件が異なるため、詳細は関係者と相談しながら進めます。駆除する際には、周囲に生存個体や巣がないかを確認した上で、ヒアリに刺されないよう、また薬剤の人体への暴露を最低限にするよう、注意しながら対応します。

#### ①侵入経路が確認できる場合

- ・ 海外から輸送されたコンテナや、コンテナで運ばれてきた荷物から発見された場合
- ・ 少数であればスプレー式殺虫剤で駆除します。コンテナ内部だけでなく外側、周囲にも生存個体がないか目視で確認します。床板の中に営巣していた事例もありますので、見えにくい場所も十分に確認が必要です。可能であればトレーラーにコンテナを載せた状態で床板の裏側から検査します。駆除後、追加の確認作業で個体が確認できなければ、防除が完了したものとみなします。
- ・ 多数の個体が確認された場合や、ヒアリが逃げ出してしまいそうな時、また、ヒアリが荷物の隙間やコンテナ内に多数潜んでいる可能性が高い場合は、刺激を与えないよう静置し、環境省や地方公共団体に連絡して、専門家の指示を仰ぎます（※1）。

（※1）個々の場合で必要な対応は変わりますが、一般的には、以下のように対応します。

- ・ ヒアリの拡散させないよう注意しながら、液剤（即効性）、液剤（遅効性）、ベイト剤（遅効性）、ワンプッシュ式エアゾール剤、くん蒸剤・くん煙剤のいずれかを状況に応じて選択、または併用します。また、ヒアリの拡散を確認及び防止するため、状況に応じて、周囲に粘着トラップを併置します。
- ・ 遅効性の薬剤を使用する場合は、3日後を目途に状況を確認し、生存個体が確認されなくなるまで、液剤の追加散布・ベイト剤補充・粘着トラップ交換等を行います。
- ・ 以上で、新たにヒアリが確認されなければ、防除が完了したとみなします。

#### ②侵入経路が確認できない場合や、侵入経路は確認できるが対応開始までに一定期間を要

## した場合

:例えば、コンテナヤードなど地面で発見され、どこから持ち込まれたか不明な場合や、海外から輸送されたコンテナ・荷物から発見されたが、気づかないまま一定期間放置されていた場合等

- ・ 少数であればスプレー式殺虫剤で駆除の上、周囲に生存個体がいらないか目視で確認します。
- ・ 多数いる場合や、ヒアリが逃げ出してしまうような時は、刺激を与えないよう静置し、環境省や地方公共団体に連絡し指示を仰ぎます（※2）。


(※2) 個々の場合で必要な対応は変わりますが、一般的には、以下のように対応します。

- ・ まずは、分布範囲を特定することが何より重要です。
- ・ 範囲が特定されれば、ヒア리를拡散させないように注意しながら、液剤（即効性）、液剤（遅効性）、ベイト剤（遅効性）、くん蒸剤・くん煙剤のいずれかを状況に応じて選択、または併用します。また、ヒアリの拡散を防止するため、状況に応じて、周囲に粘着トラップや忌避剤を併置します。なお、地面での営巣が見つかった際は、遅効性のものも含めて液剤の使用は控えます。
- ・ 遅効性の薬剤を使用する場合は、3 日後を目途に状況を確認し、生存個体を確認されなくなるまで、ベイト剤補充・粘着トラップ交換を行います。
- ・ 生存個体を確認されなくなれば、粘着トラップもしくはベイトを用いて、1 週間～10 日おきに確認を行い、1 ヶ月以上生存個体を確認されなければ、防除がいったん完了したとみなします。
- ・ 上記と並行して、周囲の調査を実施し、周囲に女王を含むコロニーが存在するか、その可能性が考えられる場合は、既に過去に女王アリが逃げ出している可能性を考慮して、周辺 2km 程度の調査を、目視やトラップを用いて行います。
- ・ 翌年、翌々年に、確認地点周辺で同様の調査を年に 2 回行います。また、当該年度に女王を含むコロニーが確認されなくても、女王が拡散した可能性がある場合は、翌年以降から周辺 2km 程度の調査を実施し、3 年間は調査を継続します。
- ・ 以上で、新たにヒアリが確認されなければ、防除が完了したとみなします。

## ③ヒアリと確認されるまでの対応

ヒアリの同定は専門家でないと困難であり、疑わしいアリがヒアリであると同定されるまでには一定の時間がかかります。このため、家庭や施設内で少数個体を確認された場合等は、ヒアリと同定される前であっても、一般的な衛生害虫（普通のアリ、ゴキブリ、ダニ等）と同様に考え、可能であれば見つけた人がスプレー式殺虫剤で駆除します。駆除する際には、周囲にほかのヒアリがいらないかを十分確認した上で、ヒアリに刺されないよう、また薬剤の暴露を受けないよう、注意しながら対応します。

ただし、疑わしいアリが多数いる場合や、少数でも駆除することにより人体への危険が生じたり、アリが逃げ出してしまうような時は、環境省や地方公共団体、事業者、施設管理者等が連携して対応に当たります。



## ウ 薬剤の特徴

殺虫成分としては、即効性のもの（合成ピレスロイド系薬剤など）と遅効性のもの（フィプロニルなど）があります。使用に当たっては、市販の製品を含め、いずれのタイプも商品に添付されている説明書を遵守して、薬剤による暴露を避けるため適正な保護具（ゴーグル、マスク、手袋など）を着用する等、適切に取り扱ってください。また、魚毒性がある成分もあるので、水域に流入しないよう注意が必要です。

### ① ベイト剤（置き型殺虫餌：遅効性）

アリが餌として巣に持ち帰って幼虫や成虫に分け与えるので、連鎖的に殺虫効果が得られることから、巣の奥に潜む個体にまで薬剤が浸透し、アリを巣ごと駆除する効果が期待できます。主にフィプロニルを主成分とするものが広く市販されています。ベイト剤は、ヒアリの侵入が確認された時にその確認地点及び周囲に設置するもので、ヒアリの侵入が確認されていない場所で予防的措置として使用しても効果は期待されません。むしろ在来のアリ等他の昆虫を駆除してしまい、ヒアリが侵入した際にその定着を容易にするリスクをもたらします。公共施設等一般の利用者がある施設で使用する際には、乳幼児やペット等の誤食予防対策が必要です。防除計画区域の住民へ注意喚起を行うなど、周知を徹底します。

昆虫成長制御剤（IGR: Insect Growth Regulator）を用いたタイプもあります。幼虫に与えると成長が阻害され、成虫まで成長することができずに死亡するもので、昆虫の表皮を形成するキチンの合成酵素を阻害して脱皮不全をおこさせる脱皮阻害剤や、幼虫の摂食阻害（拒食効果）をもたらす、成長を止める摂食阻害剤に分けられます。これらはヒトを含む脊椎動物には影響を与えないため環境への負荷を低減できることが利点です。成虫を死亡さ

せるものではないので、効果が現れるまでに時間を要しますが、世代の更新を阻害することにより個体群の増加を阻止します。海外でヒアリ用に開発された IGR 剤が輸入されており、現在では、地面での営巣が確認された時には継続的に使用されています。



実際に使用されている IGR 剤（左から 10 g、100g、1kg）

## ② エアゾール型殺虫剤（スプレー式・ワンプッシュ式：即効性）

スプレー式の殺虫剤は一般に広く市販されており、取扱いが容易でかつ即効性が高く、目の前で効果が現れるため、緊急的な対策には向いています。しかし、スプレー噴射の勢いにより個体が飛散したり、入り組んだ貨物の奥や地面の穴の中には届かないことから、目に見える範囲に少数しかいない場合に用います。また、巣や集団が確認された場合に使用すると、目に見えない範囲のヒアリが移動してしまう可能性があるため、そのような場合には使用しないことが重要です。根絶に向けた計画的な取組の上では、連鎖的な殺虫効果のある遅効性の殺虫剤の使用が望ましいと考えられます。

使用に当たっては、狭い場所で噴霧する場合、十分な換気をし、火気の近くでの使用を避けるなど、当該商品の使用上の注意に留意して使用する必要があります。

また、ボタンを押すだけで、一度に定量の内用液を噴射するワンプッシュ式の殺虫剤も市販されています。スプレー式のものと異なり、短時間で高濃度の有効成分を噴射することにより、コンテナのような閉鎖空間内での高い防除効果が期待されます。コンテナにおいて使用する際には、目張り等で密閉性を高め、生存個体が逃げ出さないように注意する必要があります。ワンプッシュ式の殺虫剤をコンテナで使用する場合は、火気の近くでの使用を避けるなど、当該商品の使用上の注意に留意するほか、環境省や専門家の助言の下で、使用する必要があります。

## ③ 液体型殺虫剤（液剤：即効性・遅効性）

散布液がかかったヒアリを即時的に殺虫する即効性のものと、急激な個体の死亡等による巣内への刺激を抑え、巣全体を効率的に防除することを期待する遅効性のものがあります。ヒアリが大量に確認された場合で、コンテナの床板内に潜んでいるなど、生息場所が明確かつ範囲が限定されている場合に向いています。

本剤は上記の適した状況では有効性が高い一方、遅効性であっても巣中の個体に刺激を

与えることがあるため、これまでの対応事例において、かえって巢の拡散を招いたことが示唆されている事例もあることから、薬剤の使用については専門家や専門業者への照会などにより慎重に判断する必要があります。その上で、少量散布の場合には、市販の製品を購入し、シャワーノズル等を使用して散布します。侵入の初期段階や防除の最終段階で生息域がごく狭い場合や高密度に営巣している（女王を含むコロニーが巣を作っている）場合には、巣の場所に浸透させるように散布することが重要です。大量に散布する場合は、散布範囲や手順を十分に検討した上で、専門のペストコントロール業者に高圧噴霧器で散布してもらう方法が効率的・効果的です。

#### ④ くん蒸剤・くん煙剤

くん蒸は薬剤をガス化、くん煙は薬剤を煙や霧状にすることにより一定の空間に行き渡らせ、殺虫します。ヒアリが荷物の隙間やコンテナ内に多数潜んでいる可能性が高い場合に使用を検討します。

専門業者によるくん蒸は、燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤など粒子が細かく強力な殺虫成分をもつ薬剤を用いることから、効果が高いと考えられるものの、本製剤が「毒物及び劇物取締法」、及び「毒物及び劇物指定令」により特定毒物に指定されていることから、取扱者や使用できる場所が限られるといった制約があり、また、終了までに日数がかかる、高価である、積荷へ影響を与える場合がある等の問題もあります。

一方、市販のくん蒸剤やくん煙剤は、場所を選ばず使用できますが、薬剤の浸透能力は専門業者が使用する薬剤ほどはなく、また、確実に殺虫するための使用量や必要な時間が異なります。このため、コンテナを目張りするなど密閉性を高め、他の薬剤を主に用いた上で、専門家の助言や関係機関と調整の上、生存個体が逃げ出さないよう注意しながら使用します。

専門業者によるくん蒸が理想的ですが、場所や予算の都合上、実施が難しい場合は市販のくん蒸剤やくん煙剤を使用するなど状況に応じた判断が必要です。ただし、一部の事例において、市販くん煙剤等で、生存個体が確認されたこともあるため、使用後には生存個体がいなかを確認する必要があります。

#### (5) 拡散が疑われる場合の対応

現在のところ国内においてヒアリの定着は確認されていませんが、確認された巣からの拡散が疑われる場合は、巣を個別に処理するとともに、5km 程度に範囲を広げて周辺に別の営巣がないかを確認する調査を行う必要があるとされています。

以下に、発見した巣への対処方法と、周囲の定着状況を確認するための調査の考え方を示します。なお、巣への対処方法は、個々の巣に対するものです。周囲に複数の巣が発見された場合には更なる拡散を防ぐため、全ての営巣範囲を取り囲むように対処する範囲を設定し、周辺部から順に営巣範囲を狭めていく形で巣の処理を実施していく必要があります。

#### ア 発見した巣の処理

発見した巣や巣の存在が疑われる地点の周囲に約 1 週間おきにベイト剤（フィプロニル

及び IGR 剤) を継続的に設置して、アリが持ち帰ることで薬剤を巣内に浸透させます。専門家の指導のもとで、ベイト剤の設置と併せて、遅効性の液剤を使用することが最適であると判断された場合には、巣に直接注入して処理する場合があります。巣内へ液剤を注入する際は、噴霧器などを用いて圧力をかけて薬剤を巣の深部まで浸透させます。なお、薬剤の使用が困難である地域では、巣に熱湯や液体窒素を注入する方法もあります。営巣の規模によって防除の方法は変わるため、必ず専門家の指導のもとで実施します。

## イ 周辺の営巣確認調査の考え方

専門家の研究結果によると、ヒアリの巣が発見された場合には、他にも巣がないか確認することが必要であり、見落としがないようにするためには、次のような調査方法が挙げられます。

- ・確認したヒアリの巣の周囲 4～6km の範囲に 30m 間隔で誘引力の高いベイトを置きヒアリの在不在を検出
- ・ベイトを置く場所を 15m ずらしながら 2 年間の間に最低 2 回調査する  
(2 回の調査は、温暖な地域は春と秋、寒冷な地域は翌年の活動適期など、定着した場合の巣の成長が推測される期間をあけて実施する)
- ・調査で新たな巣が発見されたら、その巣を中心にして同上の周囲 4～6km の範囲の調査を行う。

下記に、周囲 4～6km の範囲で 20～30m 間隔にベイトを設置した場合に必要なベイトの数や労力の試算を示しています。例えば、半径 6km の範囲に 20m 間隔でベイトを設置すると、ベイトの数は年間 28 万個以上となり、それを設置するためには 1,400 人日以上の労力がかかります。半径 4km、30m 間隔では年間 5.5 万個、280 人日となります。

この調査は、国や地方公共団体が連携し、土地所有者や管理主体等の理解を得ながら実施する必要があります。早急かつ効率的・効果的に実施するため、専門家や関係者の協力を広く募ることが不可欠です。

万全な調査により確実な確認を行うことは大切ですが、現状においては、専門的な調査員を十分に確保することが難しく、上記のような対応が困難な場合も考えられます。その場合には、以下のように、優先度をつけて調査を設計することも考えられます。

- ①発見場所周囲（コンテナヤード等の物理的な空間を単位とする）については、専門家による目視調査、ベイト調査を高密度に実施
- ②半径 2km を目安にベイト調査を実施（公道や施設外構を中心に実施し、高リスク箇所は重点的に調査）
- ③2km～5km の範囲については、②に準じて高リスク箇所の調査を検討するとともに、必要に応じ土地や施設の管理者（特に公的機関）や住民等に注意喚起し、通報を呼びかけ

| 半径<br>(km) | ベイトの間隔<br>(m) | 面積<br>(km <sup>2</sup> ) | ベイトの数   |         | 所要人日数 |       | 検出率% |     |
|------------|---------------|--------------------------|---------|---------|-------|-------|------|-----|
|            |               |                          | 1年間     | 2年間     | 1年間   | 2年間   | 楽観   | 悲観  |
| 6          | 20            | 113.0                    | 282,679 | 565,358 | 1,413 | 2,827 | 100  | 100 |
|            | 30            | 113.0                    | 125,611 | 251,222 | 628   | 1,256 | 100  | 100 |
| 5          | 20            | 78.5                     | 196,287 | 392,574 | 981   | 1,963 | 100  | 99  |
|            | 30            | 78.5                     | 87,256  | 174,512 | 436   | 873   | 100  | 99  |
| 4          | 20            | 50.2                     | 125,611 | 251,222 | 628   | 1,256 | 100  | 94  |
|            | 30            | 50.2                     | 55,828  | 111,656 | 279   | 558   | 100  | 94  |

巣が確認された場合の調査労力の試算



ベイトを 30m 間隔で均等に配置した場合のイメージ

#### ウ 発見場所に応じた対応方法及び注意点

ヒアリは日当たりが良く開けた場所を好むため、畑や校庭、運動公園、ゴルフ場、都市公園、河川敷、緑地帯等は、営巣のおそれが高いと考えられます。特に学校や都市公園等多くの利用者がいる場所で営巣が発見された場合には、巣周辺から迅速に人々を隔離すること、正確な情報で注意喚起することが必要となります。

また、駅や船舶の発着所のような交通の要所においては、夜間の灯りに誘引された有翅女王が飛来して鉄道や船に紛れ込み遠方へ運ばれるおそれがあります。このような場所で発見された場合はベイトの配置を密にして調査を実施するなどして十分に注意をする必要があります。

#### エ 各主体の協力による情報集約

早期発見と被害拡大防止のためには、畑や校庭、運動公園、ゴルフ場、都市公園、河川敷、緑地帯等で営巣していた場合などに、速やかに情報共有されるよう、各施設の管理者と日頃から協力関係を構築することが重要です。また、ヒアリ刺傷の治療事例が発生した場合に速やかに情報共有されるよう、医療機関への普及啓発と協力体制の構築も有効です。

#### コラム⑥ ヒアリ対策の新技术

- ・ヒアリ探知犬

低密度段階でのヒアリの生息確認の手法として、台湾ではヒアリ探知犬が導入されています。ヒアリ探知犬の最大の特徴は、人間には見えない地中（20cm 程度）に潜む少数のヒアリも見つけることができる点です。拡散した初期巢の調査時に巢の見落としを防ぐことに大きく貢献できるとされています。

- ・画像診断によるヒアリ判別技術

AI を用いた画像診断の技術の進展はめざましく、台湾では 1 次スクリーニングに実用できる程度まで技術開発が進んでいます。

- ・ヒアリとわさび成分

国内の研究で、わさび成分（アリルイソチオシアネート）にヒアリに対する忌避効果と殺虫効果があることが明らかになっています。わさび成分をマイクロカプセル化してシートやペレット状に加工する技術も確立されています。積荷にわさび成分入りのシートを封入することで、貨物へのヒアリの紛れ込みを防ぐことが期待されています。また、貨物のくん蒸時にわさび成分を用いる方法は、有害な残留物がなく、くん蒸した荷物を廃棄する必要もないことから、簡便かつ安全なヒアリくん蒸法になることが示唆されています。

- ・コンテナヤードの補修技術

主な侵入ルートであるコンテナヤードでの営巣を防ぐためには、舗装面の割れ目の修復や繁茂する雑草の除去が重要です。コンテナヤードの操業を止めずに舗装面を修復するためにシリコン樹脂を用いた簡易な補修技術の開発も進められています。液状の封入剤を割れ目に流し込むだけで、人や車が踏みつけても壊れない強度になることから、短い時間で確実に補修することが期待されています。

## 7. 防除の事例

### ● 事例1 事業者敷地に運ばれたコンテナ内からのヒアリ確認時の対応

発見状況：コンテナを陸揚げ後、事業者敷地内へ陸送し積荷を出す作業時に、コンテナ内で大量のヒアリと疑わしいアリを発見。

初期対応：くん蒸可能な場所にコンテナを移動しくん蒸消毒（リン化アルミニウムを使用）。コンテナの経路を特定し、コンテナが一時的に留置された場所（陸揚げ港及び事業者敷地内）においてモニタリングを実施。陸揚げ港で実施したモニタリングにおいて、ヒアリを確認。遅効性の液剤及びベイト剤を使用して駆除を行い、粘着トラップを設置し、他に生存個体がないかを調査。

### ● 事例2 積荷搬出後の空コンテナ内からのヒアリ確認時の対応

発見状況：コンテナを陸揚げ後、事業者敷地内で荷物の運搬・搬出を終え、ふ頭に戻ってきた空コンテナ内で100頭以上を発見。

初期対応：薬剤散布により駆除を実施。コンテナ内部を確認したところ、床板の一部が腐食しその内部に営巣していたため、液剤を十分にかけ目視で確認できる個体を死滅させた後、床板をコンテナから外して腐食部分をはがして再度液剤をかけ、さらにコンテナ全体をブルーシートで密閉して市販の家庭用くん蒸剤でくん蒸。また、コンテナの経路を特定し、コンテナが一時的に留置された場所において、粘着トラップによるモニタリングを実施。

### ● 事例3 コンテナヤード内にあるコンテナ内からのヒアリ確認時の対応

発見状況：港湾における調査実施時に、コンテナヤードの凹みで数十頭のヒアリを発見。その後の目視調査により複数回ヒアリを確認したことから、周辺のコンテナ周りを確認。その結果、ヒアリが混入している可能性のあるコンテナを特定し、開封したところ、コンテナ内で大量のヒアリを発見。

初期対応：当該コンテナには荷物が多く積載されていたため、清浄なコンテナ1個を別途用意し、積荷の半分を移動の上、市販の家庭用くん蒸剤でくん蒸。さらに、コンテナの底面及び留置地点周辺の目視調査を実施。また、周辺でモニタリング調査を実施。

### ● 事例4 コンテナの床板内にいるヒアリへの対応

発見状況：コンテナを陸揚げ後、事業者敷地内へ陸送。積荷を出す作業時に、コンテナ内で数十頭のヒアリを発見。

初期対応：発見と同時にコンテナの経路を特定し、コンテナや積荷の周辺や、コンテナが一時的に留置された場所周辺に粘着トラップ及びベイト剤を設置。さらに、コンテナを市販の家庭用くん蒸剤でくん蒸し、翌日床板を剥がし、速やかに焼却処分。その後、コンテナは新しい床板を張り直して使用。

● 事例 5 コンテナヤードにおける大規模な営巣への対応

発見状況：港湾における調査実施時に、コンテナヤードで数十頭のヒアリを発見し駆除を実施。  
その後の周辺調査により、コンテナヤードの舗装の継ぎ目を出入りするヒアリを確認。  
多数の有翅女王アリも確認された。

初期対応：専門家がコンクリート舗装の継ぎ目の土砂を掘り起こしながら液剤を集中散布・注入した。その後、継続的に IGR 剤による防除を実施した。さらに、当該コンテナヤード及び周辺の地域において継続的にモニタリング調査を実施。

● 事例 6 防草シート下で大規模な営巣確認

発見状況：港湾における調査実施時に、港湾臨港道路沿いで働きアリが多数確認された。数日後、道路に隣接する事業者敷地内でも、数百個体以上のヒアリを発見。土中への出入りの他、防草シートの切れ間への出入りも確認。さらに、シートの下に数十個体以上の有翅女王アリを含む多数のヒアリを確認。

初期対応：発見後から継続してベイト剤を散布した。周辺調査を実施後、防草シートの下などで大規模なコロニーが確認されたため、専門家の指導の下、液剤による集中的な防除を実施した。その後、約 2 か月にわたりモニタリング調査の他、ベイト剤及び IGR 剤による継続的な防除を実施した。発見事業者敷地周辺の他、高リスクエリアを中心に当該港湾の広域的なモニタリング調査を実施。

● 事例 7 生息調査範囲における立ち入れない場所での大規模な営巣


発見状況：港湾における調査実施時に、コンテナヤードと事業者敷地境界にある側溝継ぎ目で 300 個体程度のヒアリを確認。ヒアリ確認後、周辺の生息調査を実施したが、事業者敷地内の一部は工事により本来調査すべき場所に立入りができなかった。工事終了後、事業者敷地内を調査したところ当該緑地において、新たに有翅女王アリ 5 匹、無翅女王アリ 2 匹を含む 3000 匹以上のヒアリを確認。また、土中への出入りも確認。

初期対応：最初の確認後から、継続して確認場所及びその周辺にベイト剤を継続的に設置したが、工事により事業者敷地内の生息調査ができず実態把握が遅れたことによって、ヒアリの拡散リスクが高まった。確認されたヒアリは、専門家の指導の下、液剤による集中的な防除を実施した。その後、モニタリング調査やベイト剤及び IGR 剤による継続的な防除、緑地や公園など高リスクエリアを中心に緊急的な広域的なモニタリング調査、周辺事業者への注意喚起等を実施。

## 8. 各主体による取組例

## 定着を防ぐための対策

港湾におけるコンテナヤードでは、舗装の割れ目の土の部分に集団で生息しているヒアリが見ついている事例もあることから、ヒアリの定着を防止するため、コンテナヤードにおける施設管理者が舗装の改良等の対策を実施することが重要です。平成 29 年度から、国土交通省の支援を活用するなどして適宜港湾管理者による対処が行われています。



### 事業イメージ①(コンクリート舗装化)




事業イメージ②(鉄板敷設)

## 自治体独自のマニュアル～神戸市

神戸市で自治体独自としては初めてのヒアリ対策マニュアルが作成されました。この「神戸市ヒアリ対策マニュアル」（2018（平成30）年4月第1版公開、2019（平成31）年1月第2版公開）においては、対策区域や対策主体ごとの対策の考え方や対処手法が具体的に示されています。他の自治体でも同様の取組が進んでいます。

● 神戸市ヒアリ対策マニュアル

[https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/solenopsis\\_invicta.html](https://www.city.kobe.lg.jp/a66324/kurashi/recycle/biodiversity/solenopsis_invicta.html)




## 港湾独自のマニュアル～四日市港

四日市港に係る行政・関係事業者等から構成される「四日市港ヒアリ対策連絡会議」にて、令和6年3月に「四日市港ヒアリ類対策マニュアル」が策定されました。本マニュアルは、ヒアリ類発生時の初動対応を時系列で分かりやすく記載したアクションカードの作成例を掲載していること等が特徴で、専門家による現地講習での最新技術も盛り込んだ内容となっており、全国の他の港湾の取組においても参考となるものです。

### ● 四日市港ヒアリ対策マニュアル

<https://www.yokkaichi-port.or.jp/pdf/kishahappyou/20240410-1.pdf>



## ヒアリ監視体制の構築

京都府ではヒアリなどの特定外来生物の侵入定着を防ぐための「特定外来生物バスターズ」を結成（2018（平成30）年度）し、侵入初期にある特定外来生物（ヒアリ、オオバナミズキンバイ、クビアカツヤカミキリ）の侵入モニタリングと初期段階での徹底防除を実施するとしています。早期発見・早期防除のために重要な取組であり、他の自治体でも同様の検討が進められています。

# ヒアリ同定マニュアル Ver.3.~~0~~1

(案)

202~~5~~3年~~0~~4月

環境省自然環境局野生生物課外来生物対策室

## ◇はじめに

「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に基づき特定外来生物に指定されているヒアリ (*Solenopsis invicta*) は、平成 29 年 6 月に国内で初めて確認され、その後も全国の港湾地域等で確認・防除される事例が相次いでいます。これらの状況等を踏まえ、水際対策を強化するため、ヒアリを含むヒアリ類 23 種とその種間交雑個体が、令和 5 年 4 月に「要緊急対処特定外来生物」に指定されました。

本マニュアルは、専門家の協力を得ながら、これまで環境省が実施してきたヒアリの同定の実務をふまえ、一般的な同定の流れを示すとともに、各ポイントにおける留意事項等を整理したものです。国、地方公共団体等の職員が対応する際の参考となれば幸いです。なお、日本での確認事例のほとんどは、ヒアリとアカカミアリなので、本マニュアルではこの 2 種について例示します。

日本におけるヒアリ対策は始まったばかりで、ヒアリに関する情報や知見はまだ十分とは言えないため、今後得られる新しい防除手法の研究や知見を踏まえ、本マニュアルは適宜追加・修正を加えていきます。

### 〈注：著作権について〉

本マニュアルについては、内容を改変せず、かつ、営利目的でなければ、データの複製、ウェブサイトへの掲載、印刷して配布いただくことは差し支えありません。



ただし、本マニュアルの一部のみの二次利用については、以下に従ってください。

- ・ページ単位、一部抜粋（ただし、内容の改変がないこと）：「環境省 ヒアリ同定マニュアル」等と出典を記載してください。
- ・写真のみ／C（著作権）マークがついている写真：ご提供者との個別の相談が必要です
- ・写真のみ／C（著作権）マークがついていない写真：「自然環境研究センター」または「JWRC」とクレジットを記載してください。写真に新たに説明等を加える場合は、文責が利用者にあることを明記してください。

#### ◇ヒアリ類と疑われるアリの発見・同定のフロー

市民や事業者からヒアリ類と疑われるアリに関する多くの情報が、環境省や地方公共団体に寄せられています。ヒアリ類と疑われるアリの発見から種の同定に至るフローはおおむね下図のとおりです。

各主体が行う簡易的な同定と、専門家による種の確定のための同定の判断のポイントを、STEP 1～3で示しています。



## ◇目次

●ヒアリ・アカカミアリの同定フローチャート(働きアリの場合)

●アリのからだの名称とカースト

●働きアリと女王アリの形態の違い

### 働きアリ編

●STEP1 野外で、肉眼で見分ける・採取する

●STEP2 ルーペや実体顕微鏡で見分ける

●STEP3 専門家による確認

【参考】ヒアリとアカカミアリの比較

### 女王アリ編


●女王アリの同定について

【参考】ヒアリ・アカカミアリ以外のヒアリ類について


【参考】同定用サンプルの保存方法

【参考】写真撮影方法と留意点(一般の方に撮影してもらう場合)


# ヒアリ・アカカミアリ等ヒアリ類の同定フローチャート（働きアリの場合）




## アリのからだの名称



### 頭部



### 触角



## アリのカースト

社会性昆虫であるアリには、**女王アリ**、**雄アリ**、**働きアリ**のカースト(役割分担とそれに伴って現れる形態変異)があります。

同じ種であってもカーストによって形態(大きさ・色・形など)が大きく異なります。一般的に個体数が多いのも多く、よく見られるのは働きアリで、女王アリや雄アリは全体のごくわずかしが存在しません。

なお、働きアリは種によって、大きさがそろっているもの(単型)、明確に大小の 2 タイプに分かれるもの(二型)、小から大まで連続的にさまざまな大きさがいるもの(多型)があります。ヒアリは多型です。

**本マニュアルでは、働きアリと女王アリを対象にそれぞれの同定の仕方について示しています。**

## 働きアリと女王アリの形態の違い

働きアリと女王アリでは形態が異なり、同定の際のチェックポイントも異なる点があります。そのため、同定しようとするサンプルが、働きアリなのか、女王アリなのか、以下を参考に確認した上で、同定を行ってください。

※下の写真は全てヒアリ

### ■大きさ

一般的に女王アリは働きアリより体が大きく、ヒアリの場合、働きアリは 2.5～6mm、女王アリは 7～8mm 程度です。

### ■翅の有無と胸部の形

女王アリは、翅で飛ぶために胸部が発達しています。ただし、交尾後に脱翅するため、普通、巣の中の女王には翅がありません。



働きアリ



女王アリ

### ■複眼の大きさ、単眼の有無

女王アリは働きアリに比べて複眼が大きく、頭部のでっぺんには3つの単眼があります。




働きアリ



女王アリ



働きアリ



女王アリ(単眼がある)

(ただし、一部の大型働きアリは単眼を持つ場合があります)

### ■触角の節数

働きアリと女王アリでは、触角の節数が異なる場合があります。ヒアリの場合、働きアリの触角は 10 節ですが、女王アリの触角は 11 節です。ただし、触角の棍棒部はどちらも2節です。なお、ヒアリの雄アリの触角は 12 節で、棍棒部はありません。



働きアリの触角(10 節)



女王アリの触角(11 節)


## STEP1 野外で、肉眼で見分ける・採取する

ヒアリやアカカミアリかどうかを肉眼だけで判断することはできませんが、可能性の有無について、ある程度の絞込み（スクリーニング）を行うことは可能です。なお、**ここでは働きアリを対象**にしています。**女王アリについては、18 ページの女王アリ編をご覧ください。**雄アリの判別は非常に難しいので、専門家に同定を依頼してください。

## 野外で、肉眼で見分ける

次の①～④に該当するか確認してください。

- ① 体長は 2.5～6 mm程度。
- ② ヒアリ:頭部・胸部・腹柄部は暗赤褐色で、腹部は黒褐色。  
アカカミアリ:全体が黄褐色。  
(但し、暗色型の事例もあり、色は見分けにくい場合が多い)
- ③ 全体的に光沢があり、ツヤツヤしている。
- ④ 集団の場合には、大きさに連続的な変異がみられる。



ヒアリの働きアリ



▲ヒアリの集団

様々な大きさの働きアリがいる。  
黒っぽい方が腹部（おしり側）。



▲アズマオオズアリ（在来種）の集団

小型の働きアリと 大型の働きアリ（赤丸内の中央の1匹）の2サイズがいる。小型のアリはサイズがそろっている。

上記①～④のいずれかに該当する場合は、ヒアリまたはアカカミアリの可能性があります。  
サンプルを採取して、STEP2に進んでください。（※判然としない場合も STEP2 へ）

次のいずれかに該当する場合は、ヒアリやアカカミアリではありません。

- × 体全体が黒く、光沢（ツヤ）がない。  
(黒っぽい色をしたヒアリもありますが、体に光沢（ツヤ）があります。)
- × 頭部が黒く、胸部が赤っぽい。
- × 毛に覆われている。


## 肉眼で見分ける場合の留意点

### アリグモ類にだまされないで！

「見慣れないアリがいるが、ヒアリではないか？」という問い合わせの中で特に多いのがアリグモ類です。アリグモは体長 5～7mm のとても小さなハエトリグモの仲間で、脚は 8 本(4 対)ありますが、アリに擬態し第1肢(一番前の脚)を触角のように持ち上げて動かすため、**アリそっくりに見えます。**

日本では 6 種(諸説あり)の在来種のアリグモ類が確認されています。いずれも頭部は黒っぽい色をしています。体の一部に赤みや白線がある個体もあります。よく見られる(間違えられる)のは、右上の写真の 2 種です。

アリグモは、アリのように集団をつくって地面で生活するのではなく、**単独で、草木の葉や人工物の上などにいます。**また、**アリのようにせわしく動き回らず、しばしばピョンピョン跳ねるように動くのが特徴です。**見つけた時の状況(場所や数、動き)も識別する際の参考にしてください。



アリグモ  
(オス)

ヤガタアリグモ  
(メス)



街路樹の葉にとまるアリグモ

### アリ塚(巣)による見分けの落とし穴

ヒアリは、**掘り出した土でドーム状のアリ塚をつくり**ます。大きくなると**高さ 50 cm にもなる富士山型の塚**となり、ヒアリ発見の有効な目印となります。

しかし、**定着初期のアリ塚は小さく**、塚の成長には 2～3 年程度かかります。また、この時期のアリ塚は在来種のアリの巣と似ていることがあるため、**巣だけでヒアリかどうかを見分けることは困難**です。日本では現在、侵入初期段階のため、大きなアリ塚が発見される可能性は低いと考えられます。また、夏季(気温が高い時期)は、アリ塚は小さく目立たなくなることが台湾で確認されています。そのため、**アリ塚のみを目印にヒアリの在・不在を見分けることは、現実的ではありません。**

ヒアリが侵入すればアリ塚ですぐに見つけることができると誤解し、アリ塚が見つかったら対策をとればよいと楽観視されがちですが、むしろ、大きなアリ塚が確認された時には、すでにヒアリのコロニー(集団)がかなり大きくなっており、根絶には多くの予算、年月、労力がかかる段階となってしまう。

そのため、アリ塚ができる前にヒアリを発見し(早期発見)、早い段階で駆除(早期防除)することがとても重要です。



初期のアリ塚



やや発達したアリ塚



大きく発達したアリ塚

在来種のアリの巣との見分けは困難

※在来種でも、エゾアカヤマアリ等は、本州の山地や北海道に生息し、**枯草や針葉樹の落葉で大きな塚をつくり**ます。

## サンプルを採取する

ここでは、目の前に疑わしいアリがいるという状況下で、**同定用の個体**を迅速かつ安全に採取する方法を示しています。なお、**複数の個体が見られる場合には、なるべく大きな個体を採集して下さい。**

【あらかじめ準備しておくもの】 ピンセット、広口の容器（フタがねじ式でしっかり閉まり、誘引餌が丸ごと入る広口のもの）、小瓶（サンプル瓶）、70%以上のアルコール（消毒用エタノール等）、殺虫スプレー、厚手のゴム手袋、長めのピンセットまたは菜箸等

### 【注意事項】

- ◆ 採取時には、ヒアリに刺されないよう長袖、長ズボン、手袋や長靴等を着用し、肌の露出を極力避けてください。ズボンや靴にベビーパウダーを振りかけておくと、ヒアリが登りにくくなると言われています。また、アリや巣に刺激を与えると攻撃的になるため、むやみに刺激しないようにしてください。
- ◆ セロハンテープ貼り付けや粘着トラップで捕獲すると、顕微鏡で細かな部位を確認することが難しくなるため、正確な同定には適していません。ただし、緊急の場合は捕獲することを優先します。
- ◆ ヒアリと確認されていない段階では、むやみに置き型殺虫剤（ベイト剤）をおくことは避けてください<sup>注</sup>。在来のアリやその他の生物を殺してしまい、生態系や生物多様性に影響を及ぼすおそれがあります。

<sup>注</sup>一定の専門的知識を有する者がヒアリの可能性ありと判断した場合は除きます。

## 単独または少数個体が発見された場合

1. 市販の殺虫スプレー等をアリに噴霧する。その際、アリを吹き飛ばさないよう注意する。
2. 動きの鈍くなった個体をピンセット等で採取し、アルコール（消毒用エタノール）の入った小瓶（サンプル瓶等）に入れる。

※ やむを得ずセロハンテープで採取した場合には、テープを密着させず、すぐにアルコールに浸けるとアリがはがれやすくなります。

## 集団で発見された場合

1. アリの集団の近くに、誘引餌（スナック菓子等）を置いて、アリが集まるのを待つ。
2. 広口ビン（フタがしっかり閉まるもの）に、アルコール（消毒用エタノールで可）を1～2cm 程度入れておく。
3. 誘引餌にアリが数十個体集まったら、厚手のゴム手袋等をはめて、長めのピンセットや菜箸（さいばし）でアリの付いた餌をつかみ、そのまま広口ビンに入れて、フタをしっかり閉める（※）。
4. 広口ビンを軽く振って、全てのアリがアルコールに浸るようにする。アリが全て死んでいることを確認したら、誘引餌を取り出す。
5. アリを広口ビンから小瓶（サンプル瓶）に移し、新しいアルコールを満たす。

※ 刺されないよう注意してください。

※ フタの周囲にアリが付着していないか、よく確認してください。

※ ピンセットや菜箸にアリがのぼってくる場合がありますので、ご注意ください。



奥：広口ビンの例（右の2本は100円ショップで販売しているもの）  
手前：小瓶の例（サンプル瓶やバイアルと呼ばれるもの）

### ●誘引餌は何が効果的？

現在は、ヒアリ定着国での知見に基づき、スナック菓子（成形型ポテトチップス、コーンチップス、クラッカー等）が使われています。日本におけるヒアリ確認調査では、これらの他に小麦粉とえびを主成分とするスナック菓子でも、誘引・発見の実績がありますが、より適した誘引剤があるのか、また、誘引効果を示す化学成分は何か等の詳細はわかっておらず、更なる知見が必要です。

### ●吸虫管を使う場合は？

吸虫管は一般的なアリの採集方法としてよく用いられます。簡単に生きたまま捕獲できる点がメリットですが、捕獲したアリは別の密閉できる容器に素早く移し替える必要があります。慣れないとアリが途中で逃げてしまうおそれがありますので、使用する場合は他のアリで練習してからの方がよいでしょう。

## STEP2 ルーペや実体顕微鏡で見分ける

Check1 から Check3 について確認してください。同じ集団にいる個体でも、個体によっては特徴が不明瞭なものもあるため、なるべく複数の個体を、また、大きい個体の方が特徴を確認しやすいので、なるべく大きい個体を選んで確認してください。

ルーペ(15~20 倍のもの)や実体顕微鏡(ズーム付きで総合倍率 20 倍程度のもの)のほか、マクロ機能のついたデジタルカメラやマクロレンズ(100 円ショップで購入可能)を取り付けたスマートフォンで確認したい部位を撮影し、拡大して見ることで確認できる場合もあります。その際は、カメラの設定を最高画質にして、なるべく明るい状態で撮影するのがコツです。

Check1 から Check3 の全てにおいて、「ヒアリ・アカカミアリの可能性がある」に該当した場合は、STEP3へ進んでください。1つでも該当しない場合は進む必要はありません。

なお、以下の Check1 から Check3 は、ヒアリ・アカカミアリの女王アリにも当てはまります。

## Check1 腹柄は 2 節か？

難易度★



アリには、腹柄が 1 節の種類と 2 節の種類があり、ヒアリやアカカミアリは腹柄が 2 節あります。腹柄部分に脚が重なっていると見えにくいので、なるべく重なりのない個体を選んで、確認してください。



腹柄が 2 節である



ヒアリ・アカカミアリの可能性がある



腹柄は 1 節である (2 節ではない)



ヒアリ・アカカミアリではない

## Check2 前伸腹節に 1 対のトゲまたは突起(前伸腹節刺)が無い？ 難易度★



アリには、前伸腹節の後端に 1 対のトゲまたは突起がある種類と、これらが無い種類があります。ヒアリやアカカミアリにはトゲや突起はありません。

なお、トゲや突起がある種類でも、見る角度によっては見えにくいこともありますので、角度を変えながらしっかり確認してください。



前伸腹節にトゲまたは突起が無い



ヒアリ・アカカミアリの可能性がある



前伸腹節に 1 対のトゲまたは突起がある



ヒアリ・アカカミアリではない

## Check3 触角先端の棍棒部は 2 節か？


難易度★★



アリには触角先端の棍棒部(ふくらんでいる部分)が、2 節の種類、3 節の種類、または棍棒部が不明瞭な種類があります。ヒアリやアカカミアリの棍棒部は 2 節です。



棍棒部が 2 節である  
↓  
ヒアリ・アカカミアリの可能性がある



棍棒部が 3 節または不明瞭  
↓  
ヒアリ・アカカミアリではない


なお、在来種のトフシアリとオキナワトフシアリは、STEP2の Check1 から Check3 の全てに該当しますが、体長は 1.5mm 程度とヒアリに比べて小さく、体色は黄色から黄褐色をしているため、ヒアリやアカカミアリと区別できます(STEP1を参照)。

## 【参考】スマートフォンによる撮影



スマートフォン用のマクロレンズ(100円ショップで購入)  
をレンズの部位に装着

適した高さになるように箱で調整



アリ撮影中

## 働きアリ編

＜間違えやすい種類の例＞ ※標本写真のため生きている時と色合いがやや異なります。 **緑色** はヒアリ・アカカミアリとの主な識別点。

|                 | ヒアリ                                                                                                                                                                                                                                                                         | オオズアリの仲間<br>(写真はアズマオオズアリの大型・小型の働きアリ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | アミメアリ                                                                                                                                                                                                                                                          | オオシワアリ                                                                                                                                                                                                                                                            | ハリブツシリアゲアリ                                                                                                                                                                                                                                                        | キロシリアゲアリ                                                                                                                                                                                                                                                          | トフシアリ・オキナワトフシアリ<br>(写真はトフシアリの働きアリ)                                                                                                                                                                                                                                | ヒメアリの仲間<br>(写真はミゾヒメアリの働きアリ)                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 円内は実物の大きさとシルエット | <br><br><br>サイズは連続的にさまざま | <br><br><br><br>サイズは2タイプ | <br><br> | <br><br> | <br><br> | <br><br> | <br><br> | <br><br> |
| 腹柄              | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 前伸腹節のトゲ・突起      | なし                                                                                                                                                                                                                                                                          | あり                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | あり(長い)                                                                                                                                                                                                                                                         | あり(長い)                                                                                                                                                                                                                                                            | あり                                                                                                                                                                                                                                                                | あり                                                                                                                                                                                                                                                                | なし                                                                                                                                                                                                                                                                | なし                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 触角先端の棍棒部        | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 節                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 節                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 節                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 節                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 触角の節数           | 10 節<br>(女王アリは 11 節)                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | —                                                                                                                                                                                                                                                              | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | —                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 節<br>(女王アリも 11 節)                                                                                                                                                                                                                                              | 10 節<br>(女王アリは 11 節)                                                                                                                                                                                                                                              | 12 節<br>(国産種に限る)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 肉眼で見える特徴        | ・全体にツヤがあり、腹部がやや黒っぽい<br>・集団では色々なサイズが混ざる                                                                                                                                                                                                                                      | ・働きアリは、小型と大型の 2 タイプに顕著に分かれる<br>・大型の働きアリは頭が大きい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ・上から見ると頭部と腹部が丸く、鉄アレイ型にみえる<br>・腹部にツヤがある                                                                                                                                                                                                                         | ・頭部、胸部にツヤがない<br>・頭部から腹柄節は黄色っぽく、腹部は暗褐色                                                                                                                                                                                                                             | ・おしり(腹部)の先端がツンと尖がり、上から見ると細長いハート型にみえる                                                                                                                                                                                                                              | ・おしり(腹部)の先端がツンと尖がり、上から見ると細長いハート型にみえる<br>・体色は黄色っぽい                                                                                                                                                                                                                 | ・働きアリの体長は 1.5mm 程度と非常に小さい                                                                                                                                                                                                                                         | ・色彩や体形がヒアリ類によく似ている種を含む。働きアリの体長は 1.5mm～3.5mm 程度。                                                                                                                                                                                                                   |
| ルーペ・顕微鏡で見える特徴   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ・頭部と胸部に粗い網目模様がある                                                                                                                                                                                                                                               | ・頭部から後腹柄節にかけて粗い網目状のシワがある                                                                                                                                                                                                                                          | ・後腹柄節が腹部の上方に接続する                                                                                                                                                                                                                                                  | ・後腹柄節が腹部の上方に接続する                                                                                                                                                                                                                                                  | ・働きアリの複眼は小さく、2～4 個の個眼からなる                                                                                                                                                                                                                                         | 触角の棍棒部は 3 節からなる                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 国内の分布           |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島、小笠原諸島、南西諸島                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 北海道(南部)、本州、四国、九州、対馬、屋久島、南西諸島、小笠原諸島                                                                                                                                                                                                                             | 本州(太平洋岸)、四国、九州、屋久島、南西諸島、小笠原諸島                                                                                                                                                                                                                                     | 北海道(稀)、本州、四国、九州、対馬                                                                                                                                                                                                                                                | 北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島、奄美大島など                                                                                                                                                                                                                                        | 北海道、本州、四国、九州、対馬、屋久島、南西諸島                                                                                                                                                                                                                                          | 本州、四国、九州、対馬、屋久島、小笠原諸島、南西諸島など                                                                                                                                                                                                                                      |
| 分類              | フタフシアリ亜科                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 | トフシアリ属                                                                                                                                                                                                                                                                      | オオズアリ属                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | アミメアリ属                                                                                                                                                                                                                                                         | シワアリ属                                                                                                                                                                                                                                                             | シリアゲアリ属<br>シリアゲアリ亜属                                                                                                                                                                                                                                               | シリアゲアリ属<br>キロシリアゲアリ亜属                                                                                                                                                                                                                                             | トフシアリ属                                                                                                                                                                                                                                                            | ヒメアリ属                                                                                                                                                                                                                                                             |

## STEP3 専門家による確認（最終チェック）

Check4以降は難易度が高いため、専門家に依頼します。なお、同じ巣の働きアリでも、個体によっては特徴が不明瞭なものもいるため、できるだけ複数の個体を、また、大きい個体の方が特徴を確認しやすいので、なるべく大きい個体を選んで専門家に提供してください。

## Check4 触角べん節の2節目は長い？

難易度★★★



ヒアリ類の触角べん節は全体的に長く、特にべん節2節目は細長く見えます。一方で、在来トフシアリ属等を含む、ヒアリ類以外のトフシアリ属は、べん節が全体的に短く、べん節の2節目は細長くなりません。



べん節の2節目は長い  
↓  
ヒアリ類の可能性が高い



べん節の2節目は短い  
↓  
ヒアリ類以外のトフシアリ属の可能性が高い

## 【参考】ヒアリ類以外のトフシアリの複眼の大きさ

ヒアリ類に比べ、thief ants と呼ばれるヒアリ類以外のトフシアリ類は、頭部の大きさに対して複眼が小さく見えます（在来トフシアリの複眼は5個以下の個眼から形成されます）。ただし、thief ants の中でも、複眼が60個程度の個眼からなり、複眼が大きく見える種もいるとされているため、注意が必要です。



ヒアリ



トフシアリ

Check5 とうじゅんぜんえん 頭盾前縁の中央に突起があるか？

難易度★★★



中央の突起は角度によって見えにくいことがありますので、少しずつ見る角度を変えながら確認します。アリの頭部を正面に向ける際、ティッシュペーパーにのせて体を支えると、角度の調整がしやすくなります。



中央に突起がある



ヒアリの可能性が高い



中央に突起がない



アカカミアリの可能性が高い

Check6 前脚の付け根付近の胸部側面に、突起物があるか、無いか？

難易度★★★



アカカミアリは、前脚の付け根付近の胸部側面に、突起状またはひさし状の覆いのような突起物があります。前脚の付け根に重なっているため見えにくいことがありますので、少しずつ見る角度を変えながら確認します。

ヒアリには、このような突起物はありません。



突起物が無い



ヒアリの可能性が高い



突起状



ひさし状

突起物がある




アカカミアリの可能性が高い

## 【参考】ヒアリとアカカミアリの比較

ヒアリとアカカミアリは非常に近縁で、互いに極めて似た特徴をもっています。  
最終的に種名を確定させる際には、必ず専門家の確認を受けてください。

## ヒアリ（働きアリ）



**アカカミアリ（働きアリ）** 大型個体は頭部が相対的に大きくなるのが特徴。大型個体は頭部正面の中央に溝があり、女王も含めてヒアリとの有効な識別点になる。



## 女王アリの同定について

ヒアリ・アカカミアリの女王アリには、以下のような特徴があります。①～⑥に該当するかどうかをチェックし、ヒアリ・アカカミアリの可能性が高い場合には、専門家に確認を依頼してください。

実物の大きさ  
のイメージ



- ① 体長は 7～8 mm 程度
- ② ヒアリ: 頭部、胸部、腹柄部は暗赤褐色、腹部は黒褐色。  
アカカミアリ: 頭部、胸部、腹柄部は黄褐色、腹部は褐色で、第 1 節の基半は黄褐色。  
(但し、暗色型の事例もあり、色では見分けにくい場合が多い)

- ③ 全体的に光沢があり、ツヤツヤしている。

- ④ 腹柄は 2 節 → 12 ページ参照

- ⑤ 前伸腹節にトゲまたは突起(前伸腹節刺)が無い → 12 ページ参照

- ⑥ 触角先端の棍棒部は 2 節(触角は全 11 節で働きアリと異なる) → 13 ページ参照

【基本的には専門家による確認】頭盾前縁の中央の突起の有無 → 16 ページ参照

ある場合→ヒアリの可能性が高い

ない場合→アカカミアリの可能性が高い ※③以降は働きアリと共通の見分け方です。

<間違えやすい種の識別ポイント> 緑色 はヒアリ・アカカミアリとの主な識別点。

|              | ヒアリ・アカカミアリ(女王)<br>(写真はヒアリの女王)                                                                                                      | キイロシリアゲアリ(女王)                                                                                                                                                                | トフシアリ・オキナワトフシアリ(女王)<br>(写真はトフシアリの女王)                                                                                                                   |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |  <p>体長 7～8mm。</p> <p>やや急峻な山型</p> <p>なだらかな山型</p> |  <p>体長 7mm 程度。ヒアリ女王とほぼ同じ大きさ。</p> <p>横から見ると細長い</p> <p>背面は平たい</p> <p>前伸腹節の 1 対の突起(痕跡的)</p> |  <p>体長 5～5.5mm。ヒアリ女王より一回り小さい。</p> <p>やや急峻な山型</p> <p>丸みを帯びたお椀型</p> |
| 体色等          | 頭部、胸部、腹柄部は暗赤褐色、腹部は黒褐色(ヒアリ)。頭部、胸部、腹柄部は黄褐色、腹部は褐色(アカカミアリ)。                                                                            | 全体的に黄色っぽい。                                                                                                                                                                   | 全身黒色。                                                                                                                                                  |
| 腹柄           | 2 節                                                                                                                                | 2 節                                                                                                                                                                          | 2 節                                                                                                                                                    |
| 腹柄節・後腹柄節の形   | ・腹柄節は、やや急峻な山型。<br>・後腹柄節は、なだらかな山型で、トフシアリよりも上方に突出。                                                                                   | ・腹柄節は弱く鈍角状に突出する程度で、側方からみると明らかに高さよりも長さの方が長い。<br>・後腹柄節は背面がほとんど平ら。                                                                                                              | ・腹柄節はやや急峻な山型。<br>・後腹柄節は、丸みを帯びたお椀型。                                                                                                                     |
| 後腹柄節と腹部の接続位置 | ・後腹柄節は、腹部の下方に接続する。<br>                          | ・後腹柄節は、腹部の上方(背面側)に接続する。<br>                                                              | ・後腹柄節は、腹部の下方に接続する。<br>                                            |
| 前伸腹節のトゲ・突起   | なし                                                                                                                                 | あり(ただし痕跡的)                                                                                                                                                                   | なし                                                                                                                                                     |
| 触角先端の棍棒部     | 2 節                                                                                                                                | 2 節                                                                                                                                                                          | 2 節                                                                                                                                                    |
| 触角の節数        | 11 節                                                                                                                               | 11 節                                                                                                                                                                         | 11 節                                                                                                                                                   |
| 結婚飛行の時期      | 春から晩秋。海外では特に 5、6 月に多い。                                                                                                             | 8 月下旬～10 月で 9 月に多い。この時期に羽アリがよく見られる。                                                                                                                                          | 9～10 月。午前から昼に結婚飛行する。(トフシアリの場合)                                                                                                                         |

## 【参考】ヒアリ・アカカミアリ以外のヒアリ類について

これまで外来生物法で特定外来生物に指定されていたヒアリ類は、ヒアリとアカカミアリの2種のみでしたが、令和2(2020)年11月2日に、これら2種を含めたヒアリ類全種(4種群23種)及び、これらの種間の交雑により生じた生物が特定外来生物に指定され、規制が開始されました。実際にヒアリ・アカカミアリ以外の種が日本国内でも確認されています。すべての種群はヒアリ・アカカミアリにとっても近縁で形態的に酷似していて、生態的にも同様の危険性があります。また、米国ではヒアリとクロヒアリの交雑種が耐寒性を獲得することが知られていて、ヒアリ類の定着可能圏が拡大する新たなリスクも生じています。これらのヒアリ類全種とその交雑個体について、令和5(2023)年4月1日から、「要緊急対処特定外来生物」に指定され、対策が強化されることになりました。

### ■特定外来生物に指定されているヒアリ類

|                                                                 |      |                            |
|-----------------------------------------------------------------|------|----------------------------|
| ① ソレノプシス・ゲミナタ種群<br><i>Solenopsis geminata</i> species group     | 全6種  | ※アカカミアリ、<br>クロヒアリなどが含まれます。 |
| ② ソレノプシス・サエヴィシマ種群<br><i>Solenopsis saevissima</i> species group | 全14種 | ※ヒアリなどが含まれます。              |
| ③ ソレノプシス・トリデンス種群<br><i>Solenopsis tridens</i> species group     | 全2種  |                            |
| ④ ソレノプシス・ヴィルレンス種群<br><i>Solenopsis virulens</i> species group   | 全1種  |                            |

### ヒアリ・アカカミアリ以外のヒアリ類の発見事例！

2017年に日本国内で初めてヒアリが発見されて以来、ヒアリとアカカミアリの2種が全国各地で相次いで確認されています。このような中、2020年秋には、*Solenopsis xyloni* (一部文献では「ホクベイヒアリ」と呼ばれています)という北米原産のヒアリ類の一種について、国内に届いた荷物の中で死骸が確認されました。

このことは、ヒアリ・アカカミアリ以外の種でも、現実的に国内への侵入の可能性があります、十分な留意が必要であることを示しています。

ただし、ヒアリ類は、ヒアリやアカカミアリと同様、本マニュアルのSTEP2までで他のアリとの区別が可能です。また、その先の同定は専門家でないと困難である一方で、必要な対応はヒアリやアカカミアリと同様です。『ヒアリの防除に関する基本的考え方』等に沿った対応をお願いします。




*Solenopsis xyloni*

*Solenopsis xyloni* は上表の①ソレノプシス・ゲミナタ種群に属し、米国では southern fire ant (SFA) や California fire ant、あるいは cotton ant と呼ばれています。

## 【参考】同定用サンプルの保存法

専門家に確認を依頼する際には、下記の要領でサンプルを提出してください。[サンプルの採取方法は 10 ページをご覧ください。](#)

- サンプル瓶(小瓶)に 70%以上のアルコール(市販の消毒用エタノールで可)を入れ、その中にアリを浸けて、フタをしっかりと閉めて保存する。
  - ◆ セロハンテープに貼り付けたものや、粘着トラップで捕獲したサンプルは、細かな部位が見えないため、同定用サンプルとしては不適です。
  - ◆ 乾燥状態での保管は、体の部位がバラバラになりやすいため不適です。
  - ◆ 小瓶がないときは、少しアルコールでしめらせたティッシュや綿で軽く包んで、チャック付きポリ袋(2重)などに収めてください。さらに、小さなタッパーに入れるなどすることで、アリが動いたり、押しつぶされたりしてバラバラになることが防げます。



左:アリを入れたサンプル瓶、右:アリを入れる前のサンプル瓶

- 同定用のサンプルには、なるべく複数個体を含める。大きい個体の方がヒアリの特徴がよく表れるため、大きいサイズの働きアリがいた場合には、大きい働きアリを必ず含める。
- サンプルと一緒に、採取時のデータを添付する。これらのデータは、同定にあたって非常に重要な情報となる。
  - ① 採取年月日
  - ② 採取場所
  - ③ 採取位置の特徴(コンテナ内(荷物の種類も)、コンクリート張りの地面、草地等)
  - ④ コンテナや輸入品の場合、どこの国から来たか、どこの港に到着したか
  - ⑤ 採集者の名前と連絡先

## 【参考】写真の撮影方法と留意点(一般の方に撮影してもらう場合)

---

地域住民など一般の方に撮影してもらう場合には、下の点に留意してもらうようにしてください。  
スマートフォンで撮影する場合も、基本的な留意事項は同じです。

### ○生きているアリの場合

※刺されないよう長袖、長ズボン、手袋や長靴等を着用し、肌の露出を極力避けてください。

※ズボンや靴にベビーパウダーを振りかけておくと、ヒアリが登りにくくなると言われています。

※アリや巣に刺激を与えると攻撃的になるため、むやみに刺激しないようにしてください。

#### 1. アリにピントを合わせる。

- ・複数個体いる場合は、1 個体にピントを合わせる。
- ・接写やズーム機能を使用した方がよいが、ピンボケになる場合は、無理に近づけず、ピントを合わせ  
ることを最優先する。

#### 2. 明るい状態で撮影する。

- ・フラッシュまたはストロボを使用するか、ライトがあれば照らして撮影する。

#### 3. 群れの場合は、1 個体を撮影するだけでなく、集団の様子も撮影する。

- ・それぞれのアリの大きさの比較ができるように、数十個体を同時に撮影する。
- ・巣があれば、それも撮影する。
- ・可能であれば、手近にあるもので大きさが分かるもの(定規や筆記具等)と一緒に撮影する。

### ○死んでいるアリの場合

※死んでいるアリでも針が出ていて刺さることがありますので、素手で触らないでください。

#### 1. 明るい状態で撮影する。

- ・室内で撮影する場合は、懐中電灯やライトを当てて撮影する。
- ・室内照明だけで撮影した場合、光量が足りず画像が粗くなり、判別が難しくなることに留意。

#### 2. アリの横に定規をおくか、アリを方眼紙の上に載せて撮影する。

- ・種を判別するうえで大きさは重要なため、ミリ単位で大きさが分かるようにする。

#### 3. カメラの画質を最高レベルに設定する。(可能な範囲で)

- ・画像を拡大して種を判別するため、画質が粗いと判別が難しくなることに留意。

#### 4. 必ずアリの体にピントを合わせてから、シャッターを切る

- ・複数個体いる場合は、1 個体にピントを合わせる。
- ・接写やズーム機能を使用した方がよいが、ピンボケになる場合は、無理に近づけず、ピント  
を合わせることが最優先する。

#### 5. 可能であれば、アングルやピントを合わせる位置を変えた写真を何枚か撮影する。