



♀  
⑩. *E. longimanus longimanus*  
(INDONESIA  
(Is. Ceram 1983. III))




♂  
⑪. *E. longimanus longimanus*  
(INDONESIA  
(Is. Buru 1979. II))




♂  
⑫. *E. longimanus longimanus*  
(INDONESIA  
(Is. Ambon 1980. VI))


*E. longimanus celebicus*




♂  
⑩. *E. longimanus celebicus*  
INDONESIA  
(Celebes palu 1984. II)




♂  
⑩. *E. longimanus celebicus*  
INDONESIA  
(Celebes palu 1984. II)



♂  
⑪. *E. depomianus*  
PHILIPPINES  
(Is. Mindoro 1980. I)



♀  
⑩. *E. longimanus celebicus*  
INDONESIA  
(Celebes palu 1984. II)



♂  
①. *E. daponitianus*  
(PHILIPPINES)  
(Is. Mindanao)

♀  
①. *E. daponitianus*  
(PHILIPPINES)  
(Is. Mindanao)

♂  
①. *E. daponitianus*  
(PHILIPPINES)  
(Is. Mindanao)

♂  
①. *E. daponitianus*  
PHILIPPINES  
(Is. Mindanao 1983. V)

⑩チャイロクモテナガゴガネ

*Eucheirus longimanus* Linné

〔亜種〕

subsp. *longimanus* Linné (チャイロクモテナガゴガネ) ……アンボン、セラム、ブル島

subsp. *celebicus* Ohaus (セレベスチャイロクモテナガゴガネ) ……セレベス

体長：♂47~80mm。♀50~67mm。茶褐色。前胸背の点刻は細かく密、縦溝は浅い。♂の前脛節は長く弓状に曲り、前脛節端棘基部には長毛の束がある。♀の尾節板にはわずかに伸びる毛の束がある。セレベス産の亜種 *celebicus* Ohaus は、モルッカに在る原名亜種とくらべて、前胸背の点刻がさらに細かく密でツヤがある。

かの有名なウォーレス (A.R. Wallace) が、アンボンを訪れたのは1857年12月である。同地にいるみごとに大きいメガネトリバネアゲハや密林の林縁を飛ぶオオルリアゲハを採るうち、かねてからの念願のチャイロクモテナガゴガネが採れないかと機会をうかがっていた。その望みはあんがい早く訪れ、翌年の1月には、ヤシ酒をつくるために原地人がヤシの汁を入れて木陰に置いた竹筒に入っているものを得ることができた。ウォーレスは、その長い雄の前脚に驚嘆し、彼の著書『馬來諸島』(The Malay Archipelago, 1869) に挿図入りで、記述している。

⑪セシクモテナガゴガネ

*Eucheirus dupontianus* Burmeister

体長：♂48~70mm。♀43~56mm。前胸背は黒褐色、上翅は茶褐色で肩部から上翅端方向にかけて黒帯がはしる。黒帯は変異が多く、地色の茶褐色がほとんど無く無くなるほど黒くなるもの、反対に黒帯が中ほどで消失するものまでさまざまに変化する。

♀の前胸背点刻は細かく密。尾節板にはやや長い毛が密生する。大型個体の前脛節端棘基部には毛がない。

♀の尾節板には長毛群が1対生ずる。

分布：パラワン島を除くフィリピン全域

