

【哺乳類】環境省第4次レッドリスト(2012) 新旧対照表<五十音順>

和名	学名	新カテゴリー (2012)	旧カテゴリー (2007)	旧リストの表記他
<u>アズミトガリネズミ</u>	<u><i>Sorex hosonoi</i></u>	NT	—	亜種のアズミトガリネズミ(NT)とシロウマトガリネズミ(NT)が統合され、種で評価
アマミトゲネズミ	<i>Tokudaia osimensis</i>	EN	EN	
アマミノクロウサギ	<i>Pentalagus furnessi</i>	EN	EN	
石狩西部のエゾヒグマ	<i>Ursus arctos yezoensis</i>	LP	LP	
イリオモテヤマネコ	<i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i>	CR	CR	
ウスリホオヒゲコウモリ	<i>Myotis gracilis</i>	VU	EN	
エゾオオカミ	<i>Canis lupus hattai</i>	EX	EX	
エゾオコジョ	<i>Mustela erminea orientalis</i>	NT	NT	
エゾクロテン	<i>Martes zibellina brachyura</i>	NT	NT	
エゾシマリス	<i>Tamias sibiricus lineatus</i>	DD	DD	
<u>エゾナキウサギ</u>	<u><i>Ochotona hyperborea yezoensis</i></u>	NT	LP	夕張・芦別のエゾナキウサギ
エチゴモグラ	<i>Mogera etigo</i>	EN	EN	
エラブオオコウモリ	<i>Pteropus dasymallus dasymallus</i>	CR	CR	
<u>オオアブラコウモリ</u>	<u><i>Hypsugo alaschanicus</i></u>	DD	—	亜種のクロオオアブラコウモリ(DD)とコウライオオアブラコウモリ(DD)が統合され、種で評価
オガサワラアブラコウモリ	<i>Pipistrellus sturdeeii</i>	EX	EX	
オガサワラオオコウモリ	<i>Pteropus pselaphon</i>	EN	CR	
オキナワオオコウモリ	<i>Pteropus loochoensis</i>	EX	EX	
オキナワコキクガシラコウモリ	<i>Rhinolophus pumilus pumilus</i>	EN	EN	
オキナワトゲネズミ	<i>Tokudaia mueminki</i>	CR	CR	
オヒキコウモリ	<i>Tadarida insignis</i>	VU	EN	
オリイコキクガシラコウモリ	<i>Rhinolophus cornutus orii</i>	EN	EN	
オリイジネズミ	<i>Crocidura orii</i>	EN	EN	
<u>紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ</u>	<u><i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i></u>	LP	—	亜種フジホオヒゲコウモリ(NT)、亜種シナノホオヒゲコウモリ(VU)、オゼホオヒゲコウモリ(DD)が統合され、亜種シナノホオヒゲコウモリとして評価
紀伊半島のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP	LP	
北奥羽・北上山系のホンドザル	<i>Macaca fuscata fuscata</i>	LP	LP	
九州地方のカモシカ	<i>Capricornis crispus</i>	LP	LP	
九州地方のカワネズミ	<i>Chimarrogale platycephala</i>	LP	LP	
九州地方のニホンリス	<i>Sciurus lis</i>	LP	LP	
金華山のホンドザル	<i>Macaca fuscata fuscata</i>	LP	LP	
<u>近畿地方以西のウサギコウモリ</u>	<u><i>Plecotus sacrimontis</i></u>	LP	—	
クチバテングコウモリ	<i>Murina tenebrosa</i>	DD	DD	
クビワコウモリ	<i>Eptesicus japonensis</i>	VU	EN	
<u>クロアカコウモリ</u>	<u><i>Myotis formosus</i></u>	CR	DD	ツシマクロアカコウモリ <i>Myotis formosus tsuensis</i>
クロホオヒゲコウモリ	<i>Myotis pruinus</i>	VU	EN	
ケナガネズミ	<i>Diplothrix legata</i>	EN	EN	
コジネズミ	<i>Crocidura shantungensis</i>	NT	VU	
コヤマコウモリ	<i>Nyctalus furvus</i>	EN	VU	
サドノウサギ	<i>Lepus brachyurus lyoni</i>	NT	NT	
サドモグラ	<i>Mogera tokudae</i>	NT	NT	
四国山地のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP	LP	
シコウトガリネズミ	<i>Sorex shinto shikokensis</i>	NT	DD	
四国のチチブコウモリ	<i>Barbastella leucomelas</i>	LP	LP	
下北半島のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP	LP	
ジュゴン	<i>Dugong dugon</i>	CR	CR	
スマイロオヒキコウモリ	<i>Tadarida latouchei</i>	DD	DD	
セスジネズミ	<i>Apodemus agrarius</i>	CR	CR	
ゼニガタアザラシ	<i>Phoca vitulina</i>	VU	EN	
センカクモグラ	<i>Mogera uchidai</i>	CR	CR	
ダイトウオオコウモリ	<i>Pteropus dasymallus daitoensis</i>	CR	CR	

和名	学名	新カテゴリー (2012)	旧カテゴリー (2007)	旧リストの表記他
中国地方のシナノホオヒゲコウモリ	<i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i>	LP	—	亜種フジホオヒゲコウモリ(NT)、亜種シナノホオヒゲコウモリ(VU)、オゼホオヒゲコウモリ(DD)が統合され、亜種シナノホオヒゲコウモリとして評価
中国地方のニホンリス	<i>Sciurus lis</i>	LP	LP	
チョウセンイタチ	<i>Mustela sibirica coreana</i>	NT	NT	
ツシマテン	<i>Martes melampus tsuensis</i>	NT	NT	
ツシマヤマネコ	<i>Prionailurus bengalensis euphilurus</i>	CR	CR	
天塩・増毛地方のエゾヒグマ	<i>Ursus arctos yezoensis</i>	LP	LP	
トウキョウトガリネズミ	<i>Sorex minutissimus hawkeri</i>	VU	VU	
トクノシマトゲネズミ	<i>Tokudaia tokunoshimensis</i>	EN	EN	
徳之島のリュウキュウイノシシ	<i>Sus scrofa riukiuanus</i>	LP	LP	
トド	<i>Eumetopias jubatus</i>	NT	VU	
西中国地域のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP	LP	
ニホンアシカ	<i>Zalophus japonicus</i>	CR	CR	
ニホンイイズナ(本州亜種)	<i>Mustela nivalis namivei</i>	NT	LP	本州のニホンイイズナ
ニホンオオカミ	<i>Canis lupus hodophilax</i>	EX	EX	
ニホンカワウソ(本州以南亜種)	<i>Lutra lutra nippon</i>	EX	CR	
ニホンカワウソ(北海道亜種)	<i>Lutra lutra whiteleyi</i>	EX	CR	
波照間島のカグラコウモリ	<i>Hipposideros turpis</i>	LP	EN	カグラコウモリ
東中国地域のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	LP	LP	
ヒメヒナコウモリ	<i>Vespertilio murinus</i>	DD	DD	
本州のチチブコウモリ	<i>Barbastella leucomelas</i>	LP	LP	
ホンドオコジョ	<i>Mustela erminea nippon</i>	NT	NT	
ホンドノレンコウモリ	<i>Myotis nattereri bombinus</i>	VU	VU	
馬毛島のニホンジカ	<i>Cervus nippon</i>	LP	—	
ミズラモグラ	<i>Euroscaptor mizura</i>	NT	—	亜種のヒワミズラモグラ(NT)、フジミズラモグラ(NT)、シナミズラモグラ(NT)が統合され、種で評価
ミヤコキクガシラコウモリ	<i>Rhinolophus pumilus miyakonis</i>	EX	CR	
ミヤマクゲネズミ	<i>Myodes rex montanus</i>	NT	NT	<i>Clethrionomys rex montanus</i>
モリアブラコウモリ	<i>Pipistrellus endoi</i>	VU	EN	
ヤエヤマコキクガシラコウモリ	<i>Rhinolophus perditus</i>	VU	—	亜種のイリオモテコキクガシラコウモリ(EN)とヤエヤマコキクガシラコウモリ(EN)が統合され、種で評価
ヤマコウモリ	<i>Nyctalus aviator</i>	VU	NT	
ヤンバルホオヒゲコウモリ	<i>Myotis yanbarensis</i>	CR	CR	
与那国島のカグラコウモリ	<i>Hipposideros turpis</i>	LP	EN	カグラコウモリ
ラッコ	<i>Enhydra lutris</i>	CR	CR	
リシムクゲネズミ	<i>Myodes rex rex</i>	NT	NT	<i>Clethrionomys rex rex</i>
リュウキュウテングコウモリ	<i>Murina ryukyuana</i>	EN	EN	
リュウキュウユビナガコウモリ	<i>Miniopterus fuscus</i>	EN	EN	
ワタセジネズミ	<i>Crocodyria watasei</i>	NT	NT	

◆旧レッドリストでは複数亜種で評価されていたが、新レッドリストでは分類の整理により統合されて評価された種(亜種)

(旧)第3次レッドリスト 評価対象種名		(新)第4次レッドリスト 評価対象種名	
和名(旧カテゴリー)	学名	和名(新カテゴリー)	学名
アズミタガリネズミ(NT)	<i>Sorex hosonoi hosonoi</i>	アズミタガリネズミ(NT)	<i>Sorex hosonoi</i>
シロウマトガリネズミ(NT)	<i>Sorex hosonoi shiroumanus</i>		
イリオモテコキクガシラコウモリ(EN)	<i>Rhinolophus pumilus pumilus</i>	ヤエヤマコキクガシラコウモリ(VU)	<i>Rhinolophus perditus</i>
ヤエヤマコキクガシラコウモリ(EN)	<i>Rhinolophus perditus perditus</i>		
エゾホオヒゲコウモリ(EN)	<i>Myotis ikonnikovi yesoensis</i>	ヒメホオヒゲコウモリ(未掲載)	<i>Myotis ikonnikovi ikonnikovi</i>
ヒメホオヒゲコウモリ(未掲載)	<i>Myotis ikonnikovi ikonnikovi</i>		
オゼホオヒゲコウモリ(DD)	<i>Myotis ikonnikovi ozensis</i>	紀伊半島のシナノホオヒゲコウモリ(LP) 中国地方のシナノホオヒゲコウモリ(LP)	<i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i>
シナノホオヒゲコウモリ(VU)	<i>Myotis ikonnikovi hosonoi</i>		
フジホオヒゲコウモリ(NT)	<i>Myotis ikonnikovi fujiensis</i>		
クロオオアブラコウモリ(DD)	<i>Pipistrellus savii velox</i>	オオアブラコウモリ(DD)	<i>Hypsugo alaschanicus</i>
コウライオオアブラコウモリ(DD)	<i>Pipistrellus savii coreensis</i>		
シナノミズラモグラ(NT)	<i>Euroscaptor mizura ohtai</i>	ミズラモグラ(NT)	<i>Euroscaptor mizura</i>
ヒワミズラモグラ(NT)	<i>Euroscaptor mizura hiwaensis</i>		
フジミズラモグラ(NT)	<i>Euroscaptor mizura mizura</i>		

※上記に新旧レッドリストで和名および学名が同じ(あるいはどちらか一方のみ)種(亜種)が存在するが、既存の亜種が統合されたことで評価する集団が新旧で異なるため、新レッドリストではこれらを新規掲載種として扱っている。

◆新レッドリストで削除された種

(旧)第3次レッドリスト 掲載名		見直し内容	旧カテゴリー(2007)	理由
和名	学名			
九州地方のツキノワグマ	<i>Ursus thibetanus japonicus</i>	削除	LP	1987年に大分で捕獲された個体が、国内他地域から持ち込まれた個体であることが明らかとなり、この例を除くと九州では1950年代以降から確実な採集記録がなく、九州の集団は絶滅した可能性が高いと判断されたため。
テングコウモリ	<i>Murina hilgendorfi</i>	ランク外	VU	近年調査が進み、本種の生息確認地点数が増加したため、絶滅の危機は小さいと判断されるようになったため。
ヤマネ	<i>Glirulus japonicus</i>	ランク外	NT	近年発表された全国的な生息確認調査より、一部出現しない地域はあるが、概ね本州・九州・四国・隠岐にほぼ連続的に分布していることが明らかにされており、NTには相当しないと判断されたため。