

表-1 花、葉・枝・幹、実別にみた香り樹木225選

香りの強さ		樹 種 名								
		花	葉・枝・幹	実						
① 特 に 強 い	5m以上離れて 香る	シンチョウゲ(3上-4上) タイリンミンタタ(3下-4上) グレープフルーツ(4-6) オオシロガサミ(4上-4中) オオシロガサミ(4上-4中) オオシロガサミ(4中-4下) オオシロガサミ(4中-4下) オオシロガサミ(4中-4下) オオシロガサミ(4中-4下) オオシロガサミ(4中-4下)	スイカズラ(5-6) ハコモジヤスミ(5-6) ウツギオオシロガサミ(5-6) カラネオオシロガサミ(5上-5下) オオシロガサミ(5上-5下) オオシロガサミ(5中-6) クちなん(6-7)	ニオイハシマツリ(6-7) オオシロガサミ(6-7中) キンモクセイ(9下-10中) キンモクセイ(9下-10中) ヒラカシ(11) ロウバイ(12下-2下)	ケツケイジュ サンショウ タムシバ ニッケイ ミズメ	ユズ(8-12) カリン(10中-12下)	20	5	2	
② 強 い	2~3m離れて 香る	ウズ(1-3中) サルココク ルシフオーリア(2-3) ロウゼラ フラグランティシマ(2-3) ガマミ 赤トナリシマ(2中-3中) ウツギ(3上-4上) アヤビ(3中-4上) ミヤマシロヨウ(3下-4上) ナニワズ(3下-4中) オオシロガサミ(4) オオシロガサミ(4-5) ライラック(5下-6下)(4-5)	ダイダイ(4-6) ユズ(4-6) コブシ'ワダスメリー'(4上-4中) オオシロガサミ(4上-4中) ニオイシロガサミ(4中-6) オオシロガサミ(4下-5上) ノダツ(4下-5上) ヤマツ(4下-5上) アマナ(5) ウツギ(6下-7) カラタチ(5)	ニセアカシア(5) ミカン(5) イングリッシュランペーパー(5-6) ヒメタイサンボク(5-6) フレンチランペーパー(5-6) オオシロガサミ(5-6) ケツケイ(7-8) ヒラキモクセイ(10中-10下) ナツシロガサミ(11-12)	アオモジ アブラチャン イソツツジ イヌエンジュ イカリガサミ オオシロガサミ キンノキ クスノキ クロモジ ゴマギ ゴモジ	ダンコウバイ ニオイハバ フレンチランペーパー ベイスギ ユーカリノキ ローズマリー	シラタマノキ(9-10) ボク(9中-10上) クサボケ(10上-11下) マルメ(10下-11下)	31	17	4
③ 中 位	1m離れて香る	シナモクセイ(1-3) サルココク フラグランティシマ(2-3) ヒメサザナ(2-5) シナモクセイ(2下-3上) ピプルナム ティヌス(3) マンサクアーノルド プロミス(3) ニオイササズキ(3-4) モクセイ(3-4) ゴモジ(3下-4) オオシロガサミ(3下-4上) クレマチス アーランド(3下-4上) ミツマタ(3下-4上) アーモンド(3下-4中) フジモドキ(3下-4中) セイウチワ(4) シコクシ(4) メギ オレンジキング(4-5)	メギ グリーン カーベット(4-5) ミヤマシロガサミ(4上-4中) タムシバ(4中-4下) シナモクセイ(4中-5中) アメリカボク'ハヌーン'(4下-5上) セイシカ(4下-5上) ボク(4下-5上) ハマナス(4下-5下) アメリカヒトツバ(5) ニオイツツジ(5) ヒラキモクセイ アクイフォルム(5) アペリア シネンシス(5-6) カクツツジ(5-6) ゴンズイ(5-6) トベラ(5-6) ヒメシロガサミ(5-6) ハシ(5上)	オオシロガサミ(5中-6上) ミツバウツギ(5下-6中) ボク(5-6) アメリカヨウブ(6-7) オオシロガサミ(6-7) シナノキ(6-7) シナノキ(6-7) タイサンボク'リトル ジェム'(6-11) タイサンボク(6中-6下) ブッシュ(6下-10中) ビワ(7-8,11中-1中) アペリア モーサネンシス(7下-11上) クサギ(8下-9) ウスギモクセイ(9上) サザナ(11-12)	イトスキ エノキ カヤ ゴキウ コブシ タブノキ	ウメ(6) スモモ(6下-8中) ブドウ(9上-10下) フェイジョア(10) リンゴ(10-11) キンカン(10下-3上) キウイ(11上-12上) オレンジ(12-2)	49	6	8	
④ 弱 い	30cm離れて 香る	ボク(1-4) マンサク(4) ヒラキモクセイ(4下-5) ウツギオオシロガサミ(3-4) コブシ(3-4) アヤビ(3上-4上) ハクモクセイ(3-4上) ヒマヤアヤビ(3-4上) スモモ(3下-4上) オオシロガサミ(4) オオシロガサミ(4) アオダモ(4-5) ミズキ(5-6) アヤビ(4-5) サクラ シズカニオイ(4上-4中) サクラ シズカニオイ(4中)	モクセイ(4中-5上) クレマチス モンタナ'ウイソニー'(4下-5中) クレマチス モンタナ'エリザベス(4下-5中) ブルーベリー(4下-5中) コガクツツジ(5) セイウチワ'カワツツギ'ハシ(5) ハシ(5) ヒトツバ(5) マルメ(5) マルメ(5) ガマミ(5上-5中) ゴマギ(5上-5中) キンケイ(5-6) クロウバイ(5-6) トチノキ(5上-5下) エノキ(5中-6上)	エノキ'ヒナギク'(5中-6上) オオシロガサミ(5下) カンフ'ババジサイ(5下-6下) サイカチ(6) キンノキ(6-7) リョウブ(6-7) ネズミモチ(6-7中) ハシ(6上-7中) シラタマノキ(6中) アペリア(6中-11中) シマツツジ(6下) チャノキ(10-11) ヤツデ(11-12上) ニオイツツジ(11中-3) ヒメシロガサミ(12-1)	アスナロ カツラ セイウチワ ネズミ	モモ(6上-10下) ブルーベリー(6中-9中) ナツメ(9下-10中) カキノキ(10上-11下)	47	4	4	
⑤ 微 弱	鼻を近づけると 香る	アズミ(3下-4上) ソメイヨシノ(3下-4上) モモ(3下-4上) リンゴ(4-5)	アロニア アルブチフオリア(4下-5上) オオムラサキツツジ(4下-5上) ヒラツツジ(4下-5上) モツツツジ(4下-5上)	リュウキウツツジ(5) イヌエンジュ(7) エンジュ(7-9)	トウネズミモチ	11	1			
⑥ 悪 臭		シキミ(3-4) ハマヒサカキ(3-4,10-2) ヒサカキ(3-4,10-2) ヤマナシ(4)	コクサギ(4-5) ビクノニア(5上-6上) クリ(6) シイノキ(6)	ニワナナカド(6-7) キダチチョウセンアサガオ(6上-11中)	イヌザンショウ カラスザンショウ クサギ コクサギ	イチョウ(10-12)	10	5	1	
合 計			168				38	19		

表-2 科別にみた香り樹木(上位)

部位	科/香りの強さ	特	強	中	弱	微	悪	合
		に強	い	位	い	弱	臭	計
花	モクセイ科	4	4	2	8			18
	バラ科		1	6	4	5	2	18
	モクレン科	3	3	6	3			15
	レンブクワ科	3	3	3	3			12
	ツツジ科		1	3	3	4		11
	ミカン科	2	7	1			1	11
葉 枝 幹	クスノキ科	2	6	1				9
	ヒノキ科		2	2	2			6
	シソ科		3				2	5
実	バラ科	1	2	3	1			7
	ミカン科	1		2				3
	ツツジ科		1		1			2

表-3 花、実別にみた香り樹木の香る時期 (月)

部位	香りランク	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
花	①特	1	1	2	6	8	8	3	0	2	2	1	1
	②強	1	4	8	15	17	7	2	2	1	1	1	1
	③中	2	4	14	20	19	15	8	5	5	4	4	2
	④弱	3	4	9	18	22	14	5	1	1	2	4	3
	⑤微	0	0	3	8	6	0	2	1	1	0	0	0
	⑥悪	2	2	3	5	2	5	2	1	1	3	3	2
計		9	15	39	72	74	49	22	10	11	12	13	9
実	①特	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	2
	②強	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	2	0
	③中	2	2	1	0	0	2	1	1	1	4	3	3
	④弱	0	0	0	0	0	2	2	2	3	3	1	0
	⑤微	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	⑥悪	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		2	2	1	0	0	4	3	4	7	14	9	6

内田均(東京農業大学 短期大学部 教授)ほか "「香り樹木225選」の提案"
日本造園学会関東支部大会事例・研究報告集 No.28, pp37-38. (2010)内 参考リスト