生態影響に関して新たに収集した有害性情報（PNEC導出に用いた有害性情報のみ抜粋）

資料1－4別添

1．　今回新たに有害性クラスの付与を行う物質

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）													詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済 全て1	農薬登録基準 1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	USEPA PED 1:Cかつ化審法同等試験 2:S	OECD SIDS 1:1かつ化審法同等試験 2:1又は2	EU IUCLID 2:1or2	ECHA 2:1or2	環境省環境リスク初期評価 1:Aかつ生態影響試験 2:A又はB	EU RAR 2:valid	NITE初期リスク（有害性）評価 2:採用されたデータ	ECETOC 2:採用されたデータ	EHC 2:採用されたデータ	CICAD 2:採用されたデータ	Japan C 1:GLP 2:非GLP	データ名称								
1	19309-23-0	Ethyl ethyldimethyltetradecylammonium sulphate	藻類	急性	Pseudocirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	3	days		事業者提供情報		2017																0.00253	mg/L		0.000021	50	1	難（デフォルト）	3	高
				慢性	Pseudocirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	3	days		事業者提供情報		2017																0.00109	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	2	days		事業者提供情報		2018																0.0157	mg/L							
				慢性	Daphnia magna	Reproduction /Mortality	NOEC	21	days		事業者提供情報		2018																>= 0.0131	mg/L							
			魚類	急性	Oryzias latipes	mortality	LC50	4	Days		事業者提供情報		2017																3.56	mg/L							
				慢性																																
2	88380-00-1	ナトリウム＝ドデカノイルオキシベンゼンスルホナート	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	生長速度	EC50	72	hours	一般財団法人化学物質評価研究機構	試験報告、BA-20 の Pseudokirchneriella subcapitataによる藻類生長阻害試験、試験番号95136		2010														GLP		> 2.6	mg/L		0.00092	100	1	良	3	高
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	生長速度	NOEC	72	hours	一般財団法人化学物質評価研究機構	試験報告、BA-20 の Pseudokirchneriella subcapitataによる藻類生長阻害試験、試験番号95136		2010														GLP		0.092	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	遊泳阻害	EC50	48	hours	RCC Ltd study Report	Acute toxicity to Daphnia magna in a 48-hour immobilization test, study No. B83553		2008														GLP		> 0.56	mg/L							
				慢性																																
			魚類	急性	Oryzias latipes		LC50	96	hours	一般財団法人化学物質評価研究機構	試験報告、BA-20のヒメダカによる96時間急性毒性試験、試験番号95137		2010														GLP		> 2	mg/L							
				慢性																																
3	10461-98-0	シクロヘキシリデン（フェニル）アセトニトリル	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	72	hours		other company data		2013						2										1.96	mg/L		0.0006	1000	1	難	4	高
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	72	hours		other company data		2013						2										0.5	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	hours		other company data		2013						2										2.3	mg/L							
				慢性																																
			魚類	急性	Oncorhynchus mykiss		LC50	96	hours		(Body responsible for the test)		1997						2										0.6	mg/L							
				慢性																																
4	64-19-7	酢酸	藻類	急性	Anabaena flosaquae	growth rate	EC50	72	Hour		study report		2005						4										55.22	mg/L		0.045	1000	3	良	3	中
				慢性	Anabaena flosaquae	growth rate	EC10	72	Hour		study report		2005						4										16.16	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	Hour		study report		1998						4										18.9	mg/L							
				慢性	Daphnia magna	reproduction	NOEC	21	Day		study report		1998						4										22.7	mg/L							
			魚類	急性	Oncorhynchus mykiss	mortality	LC50	96	Hour		study report		2006						4										45	mg/L							
				慢性																																

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）													詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済 全て1	農薬登録基準 1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	USEPA PED 1:Cかつ化審法同等試験 2:S	OECD SIDS 1:1かつ化審法同等試験 2:1又は2	EU IUCLID 2:1or2	ECHA 2:1or2	環境省環境リスク初期評価 1:Aかつ生態影響試験 2:A又はB	EU RAR 2:valid	NITE初期リスク（有害性）評価 2:採用されたデータ	ECETOC 2:採用されたデータ	EHC 2:採用されたデータ	CICAD 2:採用されたデータ	Japan C 1:GLP 2:非GLP	データ名称									
5	22042-96-2	N－（ホスホノメチル）イミノビス（エチレンニトリロ）テトラキス（メチレン）テトラホスホン酸のナトリウム塩を主成分（70%以上）とする、三塩化リン又は亜リン酸、2，2’－イミノビス（エチルアミン）、ホルムアルデヒド、塩酸及び水酸化ナトリウムの反応生成物	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	95	h	TNO	Study Number BIO-95-0024-02. Effect of diethylene triamine penta (methylene phosphonic acid) (DTPMP) on the growth of the green alga Selenastrum capricornutum in relation to the free ion concentration in algal growth medium with increased iron, cobalt, copper and zinc concentrations (OECD Guideline No. 201).Final report V96.099 /study report	Unpublished report	1996				2（酸）		2（酸）										> 10	mg/L	アミン類	0.24	1000	4	難（デフォルト）	3	中
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	95	h								2（酸）		2（酸）									>= 10	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	h	Montanto	Acute toxicity of Dequest 2000, 2010, 2041,2051 and 2060 to Daphnia magna. /report ES-81-SS13	Unpublished report	1981				2（酸）	○	4（酸）									242	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Oncorhynchus mykiss	mortality	LC50	96	h	Monsanto plc Basingstoke	Monsanto report BN-76-0094 /Acute toxicity of FA-66257 (BN-76-94) to Bluegill (Lepomis macrochirus), Channel catfish (Ictalurus punctatus), Rainbow trout (Salmo gairdneri) and Midge(Chironomus tentans) larvae. /study report	Unpublished report	1976				2（酸）	○	2									216	mg/L							
				慢性	Oncorhynchus mykiss	weight	NOEC	60	ふ化後日数	ABC	Study No: 24475. Early life stage toxicity of Dequest 2060 (AB-79-1384342-3) to Rainbow trout (Salmo gairdneri) in a flow-through system. /study report	Unpublished report	1980				1（酸）	○	1									25.6	mg/L							
6	127-51-5	3-Buten-2-one, 3-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl	藻類	急性																															
				慢性																															
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	hours	U.S. Environmental Protection Agency	screening-level hazard characterization Ionone Derivatives Category.	U.S. Environmental Protection Agency, Hazard Characterization Document, September, 2010	2010						4									2.65	mg/L		0.0026	1000	2	難（デフォルト）	4	中
				慢性																															
			魚類	急性																															
				慢性																															
7	122-20-3	トリス（2－ヒドロキシプロピル）アミン［別名：トリイソプロパノールアミン］	藻類	急性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	EC50	72	hours	Huels AG, Germany	Bestimmung der Auswirkungen von Triisopropanolamin auf das Wachstum von Scenedesmus subspicatus 86.81. /study report	SAG. Report # AW-454.	1997				1		1									710	mg/L	アミン類	0.0064	100	2	難	4	中
				慢性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	NOEC	72	hours								1		1									0.64	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	immobilisation	EC50	48	hours	Huels AG, Germany	Bestimmung der Auswirkungen von Triisopropanolamin auf das Schwimmverhalten von Daphnia magna	AW-454	2009 /1997				1		1									857	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Cyprinus carpio	Mortality	LC50	96	hours	Huels AG, Germany	Bestimmung der akuten Wirkung von Triisoprpanolamin gegenueber Fischen /study report	FK 1386	1997				1		1									> 1000	mg/L							
				慢性																															

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）													詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済 全て1	農薬登録基準 1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	USEPA PED 1:Cかつ化審等試験2:S	OECD SIDS 1:1かつ化審法同等試験2:1又は2	EU IUCLID 2:1or2	ECHA 2:1or2	環境省環境リスク初期評価 1:Aかつ生態影響試験2:A又はB	EU RAR 2:valid	NITE初期リスク（有害性）評価 2:採用されたデータ	ECETOC 2:採用されたデータ	EHC 2:採用されたデータ	CICAD 2:採用されたデータ	Japan C 1:GLP 2:非GLP	データ名称									
8	3228-02-2	4ーイソプロピルー3ーメチルフェノール	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	72	hours	Tamura I, Kagota K, Yasuda Y, Yoneda S, Morita J, Nakada N, Kameda Y, Kimura K, Tatarazako N	Ecotoxicity and screening level ecotoxicological risk assessment of five antimicrobial agents: triclosan, triclocarban, resorcinol, phenoxyethanol and p-thymol.	J Appl. Toxicol.33 (11):1222-1229.	2013						4									7.4	mg/L		0.0076	1000	2	難	4	中
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	72	hours										4									2.5	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	hours										4									5.7	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Oryzias latipes	mortality	LC50	96	hours	Tamura I, Kagota K, Yasuda Y, Yoneda S, Morita J, Nakada N, Kameda Y, Kimura K,	Ecotoxicity and screening level ecotoxicological risk assessment of five antimicrobial agents: triclosan, triclocarban, resorcinol, phenoxyethanol and p-thymol.	J Appl. Toxicol.33 (11):1222-1229.	2013						4									7.6	mg/L							
				慢性																															
9	123-92-2	酢酸イソペンチル	藻類	急性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	EC50	48	Hour		study report		2010						1									> 80	mg/L		0.021	1000	3	良	4	中
				慢性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	NOEC	48	Hour		study report		2010						1									>= 80	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna		EC50	48	hours		study report		1990						2									42	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Danio rerio		LC50	96	Hour		study report		1993						2									21.5	mg/L							
				慢性																															
10	108-01-0	N, Nージメチルエタノールアミン	藻類	急性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	EC50	72	hours	BASF AG	Department of Ecology; unpublished study,01/88/1089, 20.12.90		1990				(○)								○		65	mg/L	アミン類	0.081	1000	3	良	4	中
				慢性	Desmodesmus subspicatus	growth rate	EC10	72	hours		study report /other company data		1989 /2008						2									24.49	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna	immobilization	EC50	48	hours	BASF AG	Labor Oekologie; unveroeffentlichte Unter-suchung, (1134/87) /study report		1987 /1988				○		2						○		98.37	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Pimephales promelas	Mortality	LC50	96	hours	Union Carbide Chemicals and Plastics Company Inc.	Unpublished	Letter from JM Cleverdon, Union Carbide Chemicals and	1993				○								○		81	mg/L							
				慢性																															
11	3811-73-2	2ーメルカプトピリジンーNーオキサイドナトリウム塩	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	72	Hour		study report		1994						1									0.46	mg/L		7.3E-06	1000	1	難（デフォルト）	5	中
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	72	Hour		study report		1994						1									0.08	mg/L							
			甲殻類	急性	Daphnia magna		LC50	48	Hour		study report		1976						2									0.022	mg/L							
				慢性																															
			魚類	急性	Oncorhynchus mykiss		LC50	96	Hour		study report		1988						1									0.0073	mg/L							
				慢性																															

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）												詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済 全て1	農薬登録基準 1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	USEPA PED 1:Cかつ化審法同等試験2:S	OECD SIDS 1:1かつ化審法同等試験2:1又は2	EU IUCLID 2:1or2	ECHA 2:1or2	環境省環境リスク初期評価 1:Aかつ生態影響試験2:A又はB	EU RAR 2:valid	NITE初期リスク（有害性）評価 2:採用されたデータ	ECETOC 2:採用されたデータ	EHC 2:採用されたデータ	CICAD 2:採用されたデータ	Japan C 1:GLP 2:非GLP	データ名称									
12	868-77-9	2－ヒドロキシエチル＝メタクリラート	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	EC50	72	hours	環境省	平成8年度生態影響試験(2-ヒドロキシエチルメタクリラートの藻類(Selenastrum capricornutum)に対する生長阻害試験		1997				(1)		(1)							(1)		707	mg/L								
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	72	hours	環境省	平成8年度生態影響試験(2-ヒドロキシエチルメタクリラートの藻類(Selenastrum capricornutum)に対する生長阻害試験		1997				(1)		(1)							(1)		160	mg/L								
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	EC50	48	hours	環境省	平成8年度生態影響試験(2-ヒドロキシエチルメタクリラートのオオミジンコ(Daphnia magna)に対する急性遊泳阻害試験		1997				1		1							1		380	mg/L								
				慢性	Daphnia magna	reproduction	NOEC	21	days	環境省	平成8年度生態影響試験(2-ヒドロキシエチルメタクリラートのオオミジンコ(Daphnia magna)に対する繁殖阻害試験		1997				1		1							1		24.1	mg/L								
			魚類	急性	Pimephales promelas	Mortality	LC50	96	hours	Geiger D.L., Poirier S.H., Brooke L.T., Call D.J.	Acute Toxicities of Organic Chemicals to Fathead Minnows (Pimephales promelas); Vol. III /study report	Center for Lake Superior Environmental Studies, University of	1986 /1986				2		2									227	mg/L		0.22	1000	4	良	4	低
				慢性																															
13	11099-07-3	ステアリン酸とプロパン－1，2，3－トリオールのエステル化物	藻類	急性													○										溶解限度以上								
				慢性																															
			甲殻類	急性													○										溶解限度以上								
				慢性																															
			魚類	急性	Oncorhynchus mykiss		LC50	96	hour		事業者提供情報		2000														> 0.2	mg/L		> 0.0002	1000	外	難（デフォルト）	4	外
				慢性																															
14	26266-58-0	三オレイン酸とソルビタンのエステル	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata		EC50	72	hours	環境省	水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について（トリオレイン酸ソルビタン）	中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第50 回）トリオレイン酸ソルビタン 資料	2016		（○）												> 88.1	mg/L		> 0.86	100	外	難（デフォルト）	4	外
				慢性																															
			甲殻類	急性	Daphnia magna		EC50	48	hours	環境省	水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について（トリオレイン酸ソルビタン）	中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第50 回）トリオレイン酸ソルビタン 資料	2016		（○）												> 86.7	mg/L								
				慢性																															
			魚類	急性	Cyprinus carpio		LC50	96	hours	環境省	水産動植物の被害防止に係る農薬登録保留基準の設定を不要とする農薬について（トリオレイン酸ソルビタン）	中央環境審議会土壌農薬部会農薬小委員会（第50 回）トリオレイン酸ソルビタン 資料	2016		（○）												> 99.7	mg/L								
				慢性																															
15	2695-37-6	pービニルベンゼンスルホン酸ナトリウム	藻類	急性																															
				慢性																															
			甲殻類	急性																															
				慢性																															
			魚類	急性	Danio rerio	mortality	LC50	96	hours		study report		1992						1								> 1000	mg/L		> 0.1	10000	外	難	5	外
				慢性																															

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）												詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済	農薬登録基準	USEPA PED	OECD SIDS	EU IUCLID	ECHA	環境省環境リスク初期評価	EU RAR	NITE初期リスク（有害性）評価	ECETOC	EHC	CICAD	Japan C									
														全て1	1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	1:Cかつ化審法同等試験 2:S	1:1かつ化審法同等試験 2:1又は2	2:1or2	2:1or2	1:Aかつ生態影響試験 2:A又はB	2:valid	2:採用されたデータ	2:採用されたデータ	2:採用されたデータ	2:採用されたデータ	1:GLP 2:非GLP	データ名称									
16	142-16-5	ビス（2－エチルヘキサン－1－イル）＝マレアート	藻類	急性																															
				慢性																															
			甲殻類	急性																															
				慢性	Daphnia magna	reproduction	NOEC	21	days		study report		1996						2										0.1	mg/L		0.001	100	1	難（デフォルト）	外	外
			魚類	急性	Danio rio	mortality	LL50	96	hours		study report		1999						2										> 100	mg/L							
				慢性																															
17	13189-00-9	亜鉛＝ビスメタクリラート	藻類	急性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	ErC50	72	hours		study report		2013						1										0.56	mg/L		0.001	100	1	難（デフォルト）	外	外
				慢性	Pseudokirchneriella subcapitata	growth rate	NOEC	72	hours		study report		2013						1										0.1	mg/L							
			甲殻類	急性																															
				慢性																															
			魚類	急性																															
				慢性																															

凡例1）　PNECの根拠データ

※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、
PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。

凡例2）

〇：採用（信頼性の記載なし）
「A」又は「1」：信頼性あり（制限なし）
「B」又は「2」：信頼性あり（制限付き）
「C」又は「3」：信頼性なし
「D」又は「4」：評価不能
valid：EU RARにおいて採用

凡例3）

化審法審査済	化審法審査済みの有害性データ（新規及び既存化学物質）
農薬登録基準	農薬取締法 水産動植物登録保留基準設定に用いられた有害性データで、指定試験法の条件を満足するもの
USEPA PED	米国環境保護庁（US EPA）Pesticide Ecotoxicity Database に登録された有害性データ
OECD SIDS	OECD SIDS レポート（SIDS Initial Assessment Report）で評価された有害性データ
EU IUCLID	欧州連合（EU）「IUCLID」（International Union Chemical Information Database）に登録された有害性データ
ECHA	欧州連合（EU）ECHA（European Chemicals Agency）のInformation on Registered Substancesに登録された有害性データ
環境省環境リスク初期評価	環境省 化学物質の環境リスク評価（生態リスク初期評価）で信頼性が評価された毒性値
EU RAR	EU ECB(European Chemicals Bureau）リスク評価書（EU Risk Assessment Report）で信頼性が評価された有害性データ
NITE初期リスク（有害性）評価	（独）製品評価技術基盤機構 化学物質の初期リスク評価書又は化学物質有害性評価書に採用された有害性データ
ECETOC	欧州産業界ECETOC の水生生物毒性データベース（ECETOC Aquatic Toxicity：EAT）に登録された有害性データ
EHC	WHO/IPCS 環境保健クライテリア（EHC）に採用された有害性データ
CICAD	WHO/IPCS 国際簡潔評価文書（CICAD）に採用された有害性データ
Japan C	Japan チャレンジプログラムで取得された有害性データ
WHO/FAO PDSs	WHO/FAO Pesticide Data Sheets（PDSs）
BUA	BUA Report
AQUIRE	US EPA 生態毒性データベース「AQUIRE」（AQUatic toxicity Information REtrieval）

2. 今回新たに有害性クラスの付与を行う評価単位

No.	CASRN®	物質名	生物種		学名	影響内容	エンドポイント	暴露期間（値）	暴露期間（単位）	原著				詳細な信頼性評価を必要としない有害性データ 【上段】評価書・データベース略称 【下段】信頼性評価基準（化審法ランク：評価書ランク）													詳細な信頼性評価を必要とする有害性データ	毒性値	毒性値（単位）	アミン類	PNEC(mg/L)	Ufs	有害性クラス	分解性	分解性考慮の暴露クラス	優先度
										著者	タイトル	記載誌	発行年	化審法審査済 全て1	農薬登録基準 1:分散剤規定以下及び水溶解度以下	USEPA PED 1:Cかつ化審法同等試験 2:S	OECD SIDS 1:1かつ化審法同等試験 2:1又は2	EU IUCLID 2:1or2	ECHA 2:1or2	環境省環境リスク初期評価 1:Aかつ生態影響試験 2:A又はB	EU RAR 2:valid	NITE初期リスク（有害性）評価 2:採用されたデータ	ECETOC 2:採用されたデータ	EHC 2:採用されたデータ	CICAD 2:採用されたデータ	Japan C 1:GLP 2:非GLP	データ名称									
		ポリオキシエチレンモノアルキル（又はアルケニル）（C16～18）エーテル（数平均分子量が1，000未満のものに限る。）* 【CASRN® 9005-00-9 (Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-octadecyl-.omega.-hydroxy-)の毒性値】	藻類	急性																															
				慢性																															
			甲殻類	急性	Daphnia magna	mobility	LC50	48	hours		事業者提供情報		1980														事業者提供情報	0.58	mg/L		0.00058	1000	1	難（デフォルト）	3	高
				慢性																															
			魚類	急性																															
				慢性																															

凡例1）　PNECの根拠データ
※PNEC算出では、途中計算は有効数字3桁、
PNEC算出時（(A)/(B)）は有効数字2桁（3桁目を切り捨て）とした。

凡例2）
○：採用（信頼性の記載なし）
「A」又は「1」：信頼性あり（制限なし）
「B」又は「2」：信頼性あり（制限付き）
「C」又は「3」：信頼性なし
「D」又は「4」：評価不能
valid：EU RARにおいて採用

凡例3）

化審法審査済	化審法審査済みの有害性データ（新規及び既存化学物質）
農薬登録基準	農薬取締法 水産動植物登録保留基準設定に用いられた有害性データで、指定試験法の条件を満足するもの
USEPA PED	米国環境保護庁（US EPA）Pesticide Ecotoxicity Database に登録された有害性データ
OECD SIDS	OECD SIDS レポート（SIDS Initial Assessment Report）で評価された有害性データ
EU IUCLID	欧州連合（EU）「IUCLID」（International Union Chemical Information Database）に登録された有害性データ
ECHA	欧州連合（EU）ECHA（European Chemicals Agency）のInformation on Registered Substancesに登録された有害性データ
環境省環境リスク初期評価	環境省 化学物質の環境リスク評価（生態リスク初期評価）で信頼性が評価された毒性値
EU RAR	EU ECB(European Chemicals Bureau）リスク評価書（EU Risk Assessment Report）で信頼性が評価された有害性データ
NITE初期リスク（有害性）評価	（独）製品評価技術基盤機構 化学物質の初期リスク評価書又は化学物質有害性評価書に採用された有害性データ
ECETOC	欧州産業界ECETOC の水生生物毒性データベース（ECETOC Aquatic Toxicity：EAT）に登録された有害性データ
EHC	WHO/IPCS 環境保健クライテリア（EHC）に採用された有害性データ
CICAD	WHO/IPCS 国際簡潔評価文書（CICAD）に採用された有害性データ
Japan C	Japan チャレンジプログラムで取得された有害性データ
WHO/FAO PDSs	WHO/FAO Pesticide Data Sheets（PDSs）
BUA	BUA Report
AQUIRE	US EPA 生態毒性データベース「AQUIRE」（AQUatic toxicity Information REtrieval）

*平成26年度第7回薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会　平成26年度化学物質審議会第2回安全対策部会　第149回中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会時に、AE類の取り扱い実態に基づいて決められた評価単位